





Smithsonian Institution  
Libraries



GIFT OF  
*Marcia Brady Tucker*















vaernewyck






















*De l'Ornithologie par J. N. Martini, Dilecteur de M<sup>re</sup> le Duc de Richelieu, et de J. E. G. de la Roche.*



# ORNITHOLOGIA

SIVE

## SYNOPSIS METHODICA


SISTENS AVIUM DIVISIONEM IN ORDINES,  
Sectiones, Genera, Species, ipsarumque Varietates.

*CUM ACCURATA CUJUSQUE SPECIEI  
descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium,  
Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nomi-  
nibusque vulgaribus.*

A D. BRISSON, Regiæ Scientiarum Academiae Socio.

*Opus Figuris æneis adornatum.*

VOLUMEN VI.



PARISIIS,

*AD RIPAM AUGUSTINORUM,*

Apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam,  
ad Insigne S<sup>æ</sup>. Genovefæ, & S<sup>i</sup>. Joannis in Deserto.

---

M. DCC. LX.

*CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO REGIS.*



cat. 10. R. 112.  
117-20

# ORNITHOLOGIE

O U

## M É T H O D E

CONTENANT LA DIVISION DES OISEAUX  
en Ordres, Sections, Genres, Espèces & leurs Variétés.

*A LAQUELLE ON A JOINT UNE DESCRIPTION  
exacte de chaque Espèce, avec les Citations des Auteurs  
qui en ont traité, les Noms qu'ils leur ont donnés, ceux  
que leur ont donnés les différentes Nations, & les Noms  
vulgaires.*

Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences.

*Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.*

T O M E V I.



A P A R I S,

QUAY DES AUGUSTINS,

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte  
Geneviève & S. Jean dans le Désert.

---


M. DCC. LX.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.









REGNUM	LE REGNE
ANIMALE.	ANIMAL.
CLASSIS III.	CLASSE III.
ORDO XVIII.	ORDRE XVIII.
A V E S	LES OISEAUX

*Digitis quatuor, tribus anticis, uno postico, per totam longitudinem auctis membranis fissis, præditæ.*

*Qui ont quatre doigts, trois devant, un derrière, garnis dans toute leur longueur de membranes fendues.*

**H**UJUS Ordinis Avium aliæ digitis donantur membranis simplicibus auctis; alteræ digitis membranis emarginatis auctis præditæ sunt. In duas sectiones illas dividimus: prima continet eas quarum digiti membranis simplicibus obsiti sunt (*vide Vol. I. Tab. III. fig. 1*), ut  
Tom. VI,

**P**ARMI les Oiseaux de cet Ordre, les uns ont les doigts garnis de membranes simples; & les autres les ont garnis de membranes festonnées. Ils se divisent en deux sections: dans la première sont ceux dont les doigts sont garnis de membranes simples (*voyez Tome I. Pl. III. fig. 1*), comme la Poule-d'eau: & dans  
A



## 2 LE REGNE ANIMAL.

la seconde ceux dont les doigts sont garnis de membranes fendues (voyez Tome I. Pl. III. fig. 2), comme le *Phalarope*, la *Foulque*.

*Gallinula*: secunda illas quarum digiti membranis emarginatis præditi sunt (vide Vol. I. Tab. III. fig. 2), ut *Phalaropus*, *Fulica*.

### SECTION I.

*Ceux dont les doigts sont garnis de membranes simples.*

**I**L n'y a dans cette section qu'un seul genre, qui est celui de la *Poule-d'eau*.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le bec droit & pointu.

#### LXXXVIII.

*Genre de la Poule-d'eau.*

Son caractère est d'avoir Quatre doigts, trois devant, un derrière, garnis dans toute leur longueur de membranes fendues & simples: Le bec droit & pointu.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le corps comprimé par les côtés; & la partie inférieure des jambes dégarinée de plumes. Leur synciput est aussi dégariné de plumes, & couvert seulement d'une membrane fort épaisse.

### SECTIO I.

*Ex quarum digiti membranis simplicibus obsiti sunt.*

**I**N illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Gallinulæ*.

Omnes hujus generis Alites rostro donantur recto, acuto.

#### LXXXVIII.

*Genus Gallinulæ.*

Hujus character est Digiti quatuor, tres antici, posticus unus, per totam longitudinem membranis fissis, simplicibus aucti. Rostrum rectum, acutum.

Omnium hujus generis Avium corpus est lateraliter compressum, & crura in parte inferiore plumis denudantur. Ipsarum synciput plumis est similiter denudatum, & solummodo crassissimâ membranâ obductum.



**\*\* I. LA POULE-D'EAU.**

*Voyez Pl. I. le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2.*

*Gallinula superne fusco - olivacea, infernè saturatè cinerea, marginibus pennarum albis; membranâ in syncipite saturatè rubrâ; capite, collo & pectore nigricantibus; marginibus alarum candidis; rectricibus saturatè fuscis; cruribus taniâ rubrâ circumdatis . . . . GALLINULA.*

*Gallinula Chloropos nostra major. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 449. hujus icon non satis accurata pag. 450.*

*Gallinula Chloropus. Charlet. Exer. pag. 112. N°. 1.*

*Charlet. Onomazt. pag. 107. N°. 1.*

*Gallinula Chloropus major. Jonst. Avi. pag. 109. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31, sub titulo, Gallinula aquatica.*

*Gallinula Chloropus major Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 233. hujus icon pessima Tab. LVIII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 113. N°. A. 1.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 190. N°. 15.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.*

*Gallinula Chloropus major Aldrovandi, Willugbeyi. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 320. N°. XV.*

*Chloropus major Aldrovandi. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 371.*

*Fulica fronte calva, corpore nigro, digitis simplicibus. Chloropus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 82. sp. 2.*

*Fulica major pulla, fronte cera coccinea, oblongo-quadrata glabra obducta, membrana digitorum angustissima. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 479.*

*Rallus aquaticus noster. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.*

*Poule d'eau ou Fulica Chloropos. Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 393. (ed. 1725).*

*Grande Poule d'eau ou de marais. Alb. Tom. II. pag. 46; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 72.*

*Poule de Marais. Alb. Tom. III. pag. 38; avec une figure mal coloriée de la femelle Pl. 91.*

*Les Allemands l'appellent ROHTBLASCHEN. Rzac.*

*Les Polonois, KOKOSSKA. Rzac.*

*Les Anglois, COMMON WATER-HEN. Willugh. Raj. Sibbald. MORE-HEN. Willugh. Raj. Alb. MOOR-HEN. Charlet.*

*Les Anglois de la Jamaïque, COOT. Sloane. RED-FACED COOTE Browne.*

*Les Habitans de l'isle S. Thomas, WATER-COUDE. Feuillée.*



Elle est à peu près de la grosseur d'une *petite Poule*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long ; sa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, sept lignes & demie ; son pied un pouce huit lignes ; celui du milieu de trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces une ligne & demie ; & celui de derrière treize lignes. Les membranes dont ses doigts sont garnis, n'ont guères qu'une ligne de largeur de part & d'autre. Elle a un pied sept pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col & la poitrine sont noirâtres. Le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un cendré très-foncé, chaque plume étant bordée de blanc par le bout : cette dernière couleur est cependant fort peu apparente, excepté au bas-

Cum *Gallina minore* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos unguis quatuordecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices & novem lineas ; pars crurum plumis denudata septem cum semi lineas ; pes unum pollicem cum octo lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus duos pollices cum quatuor lineis, intimus duos pollices & sesquilineam ; posticus autem tredecim lineas. Membranæ quibus digiti obfiti sunt, non multum ultra lineam unius latitudinem utrinque obtinent. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & septem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur, collum, pectusque nigricant. Ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ saturatissimo cinereo imbutæ ; albo in apice marginatæ ;



quæ tamen albedo, si ventrem infimum excipias, est minimè conspicua. Præterea in lateribus longiusculæ extant pennæ exterius latâ, longâque maculâ candidâ, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ tectrices sunt fusco-olivaceæ. Ex pennis caudam subtus obtegentibus, quæ medium locum occupant, sunt nigræ; quæ ad latera collocantur, candidæ. Inferiores alarum tectrices saturatè cinereæ, albo fimbriatæ. Alarum margines ab ipsarum exortu ad extremitatem usque similiter albæ. Remiges sunt superne splendidè fuscæ, subtus cinereo-fuscæ: prior insuper exterius niveo candore marginatur. Caudam componunt duodecim rectrices splendidissimè saturatè fuscæ. Binæ intermedix lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculorum irides rubræ. Synciput plumis est denudatum, & crassissimâ membranâ saturatè

ventre. Il y a de plus sur les côtés d'assez longues plumes marquées sur leur côté extérieur d'une large & longue tache blanche, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun-olivâtre. Parmi les couvertures du dessous de la queue, celles qui occupent le milieu, sont noires; celles qui sont sur les côtés, sont blanches. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un cendré foncé, & bordées de blanc. Le bord de l'aîle, depuis son origine jusqu'à son extrémité, est de cette dernière couleur. Les plumes de l'aîle sont d'un brun brillant en-dessus, & d'un cendré-brun en-dessous: de plus la première est bordée extérieurement d'un blanc de neige. La queue est composée de douze plumes d'un brun foncé très-brillant. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est rouge. Le synciput est dégarni de plumes, & couvert d'une membrane fort épaisse d'un rouge



foncé. Le bec est de la même couleur, excepté son bout, qui est d'un verd-d'olive tirant sur le jaune. Les jambes, à l'endroit où elles commencent à être dégarnies de plumes, sont entourées d'une petite bande rouge, d'environ deux lignes de largeur. Le reste de la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont verdâtres; & les ongles d'un verdâtre rembruni.

La femelle est un peu plus petite que le mâle. Elle en diffère encore en ce que ses couleurs sont plus claires, que la bordure blanche des plumes du ventre est plus apparente, & que sa gorge est blanche. Du reste elle lui ressemble parfaitement.

On les trouve dans les rivières & les étangs. Elles font leur nid dans les broussailles qui se trouvent sur leurs bords. Leurs œufs sont d'un blanc-verdâtre, varié de taches de rouge-brun. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

rubrâ obductum. Rostrum quoque saturatè rubrum, in extremitate tamen viridi-olivaceum, ad flavum inclinans. Crura, eo in loco in quo pennis primùm denu-  
dantur, exiguâ circumdan-  
tur taniâ rubrâ, duarum cir-  
citer linearum latitudinem  
obtinente. Crurum reliqua  
pars plumis denudata, pe-  
des & digiti, sicut & ipso-  
rum membranæ, viridescunt;  
ungues verò ex viridescente  
fulcescunt.

*Fœmina* paululùm mari crassitie cedit. Ab illo quo-  
que discrepat coloribus in  
toto corpore dilutioribus,  
pennis ventris margine albâ  
magis conspicuâ præditis,  
& gutture candido. In reli-  
quis cum illo perfectè con-  
venit.

Flumina & stagna fre-  
quentant. In fruticibus juxta  
ipsum ripas provenienti-  
bus nidificant. Ova ponunt  
ex albo viridescencia, ma-  
culis rubro-fuscis varia. *Ex  
musæo Realmuriano.*

## \*\* 2. LA PETITE POULE-D'EAU.

Gallinula superne fusco-olivacea, infernè cinerea, margini-  
bus pennarum albis; membranâ in syncipite flavo-olivaceâ;  
collo inferiorè saturatè cinereo, ad olivaceum vergente;



# LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVIII.* 7

marginibus alarum candidis ; rectricibus decem intermediis fusco-olivaceis , utrinque extimâ candidâ . . . . GALLINULA MINOR.

Gallinula alia Chloropus Fulicæ similis Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 496. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 497.*

Gallinula alia Chloropus Fulicæ similis Bellonii , Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 234.*

Gallinula Chloropus alia. *Jonst. Avi. pag. 111.*

Rallus. *Gesn. icon. Avi. pag. 90 , in qua hujus icon pessima.*

Rallus Italarum. *Gesn. Avi. pag. 392 , in qua eadem icon.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 98.*

*Jonst. Avi. pag. 99.*

*Charlet. Exer. pag. 107. N°. 2.*

*Charlet. Onomast. pag. 101. N°. 2.*

Rallus Italarum Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 238.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 116. N°. 15.*

Poulette d'eau. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 211 ; avec une mauvaise figure pag. 212.*

Poulette d'eau ou bien Rasle grand. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 48 b , dans laquelle est la même figure.*

*Les Italiens l'appellent PULLON. Bel.*

*Les Allemands , WELSCH ; WASSER HOUN. Gesn.*

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem explet , & ad extremos ungues quatuordecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est ; cauda duos pollices & sex lineas ; pars crurum plumis denudata septem lineas ; pes unum pollicem cum octo lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas , extimus duos pollices

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied , & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long ; sa queue deux pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes , sept lignes ; son pied un pouce huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , deux pouces six lignes , l'extérieur deux pouces deux lignes ,



l'intérieur deux pouces ; & celui de derrière onze lignes & demie. Les membranes dont ses doigts sont garnis , n'ont guères qu'une ligne de largeur de part & d'autre. Elle a un pied sept pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun-olivâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un cendré-foncé , tirant un peu sur l'olive. La poitrine , le ventre , le haut des jambes & les côtés sont cendrés , chaque plume étant bordée de blanc par le bout. Les couvertures du dessous de la queue sont noires. Celles du dessous des ailes sont cendrées , & bordées de blanc. Le bord de l'aile , au-dessous du pli qui répond à celui du poignet , est de cette dernière couleur. Les plumes de l'aile sont d'un brun-noirâtre en-dessus , & d'un cendré-brun en-dessous : de plus la première est bordée extérieurement d'un blanc de neige. La queue est composée de douze plumes : les dix du milieu sont d'un brun-olivâtre : la

cum totidem lineis , intus duos pollices ; posticus autem undecim cum semi lineas. Membranæ quibus digiti obfisi sunt , non multum ultra lineæ unius latitudinem utrinque obtinent. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & septem pollicum ; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , quæ alas superne obtegunt , superioresque caudæ rectrices sunt fusco-olivaceæ. Guttur & collum inferius saturatè cinerea , nonnihil ad olivaceum vergentia. Pectus , ventrem , crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ cinereæ , albo in apice marginatæ. Inferiores caudæ rectrices sunt nigræ. Pennæ alas subtus obtegentes cinereæ , albo fimbriatæ. Alarum margines , infra articulum carpo humano respondentem , candidæ. Remiges superne fusco-nigricantes , subtus cinereo-fusæ : prior insuper exteriùs niveo candore marginatur. Duodecim rectricibus cauda constat : decem intermediæ sunt fusco-olivaceæ :  
utrinque



## LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVIII.* 9

utrinque extima candida. Binæ rectrices intermediae lateraliū longitudinem nonnihil antecellunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculorum irides rubræ: palpebræ candidæ. Synciput plumis denudatur, & crassissimâ obducitur membranâ flavo-olivaceâ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, viridi-olivacei; ungues concolores quidem, sed nonnihil fuscescentes. Flumina & piscinas frequentant. *Ex museo Realmuriano.*

plus extérieure de chaque côté est blanche. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté qui est la plus courte. L'iris des yeux est rouge: les paupieres sont blanches. Le synciput est dégarni de plumes, & couvert d'une membrane fort épaisse d'un jaune-olivâtre. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un verd-d'olive; les ongles sont d'une couleur un peu plus rembrunie. On la trouve dans les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

### 3. LA GRANDE POULE-D'EAU.

Gallinula superne castanea, infernè obscurè cinerea, marginibus pennarum albis; membranâ in syncipite flavicante; capite & collo nigricantibus; imo ventre albo; rectricibus decem intermediis castaneis, utrinque extimâ candidâ....  
GALLINULA MAJOR.

Gallinula Chloropus altera. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 449. hujus icon non satis accurata pag. 451.*

Gallinula Chloropus altera. *Jonst. Avi. pag. 109. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31.*

Gallinula Chloropus altera Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 233. Raj. Syn. Avi. pag. 114. N<sup>o</sup>. 3.*

*Klein. Avi. pag. 103. N<sup>o</sup>. 2.*

Chloropus altera Avis Aldrovandi, seu Gallinula Chloropus. *Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 371.*

*Tom. VI.*

B



*Les Boulonnois l'appellent PORZANA. Aldrov. Jonst.*

Elle est beaucoup plus grosse que les précédentes. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est presque de dix-huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long. La tête, la gorge & le col sont noirâtres. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de couleur de marron. La poitrine, le haut du ventre & des côtés sont d'un cendré obscur, chaque plume étant bordée de blanc par le bout. Le bas-ventre & le bas des côtés sont blancs, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Le haut des jambes est couvert de plumes cendrées & marquées de petites lignes transversales blanches, peu distinctes les unes des autres. Les plumes de l'aîle sont de couleur de marron. La queue est composée de douze plumes : les dix du milieu sont de la même couleur que celles de l'aîle : la plus extérieure de chaque côté est blanche. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en dimi-

Præcedentes crassitie multum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octodecim ferè pollicès explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum est. Caput, guttur, collumque nigricant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ rectrices castaneo colore tinguntur. Pectus, ventrem supremum, laterumque partem supremam obtegunt pennæ obscurè cinereæ, albo in apice marginatæ. Venter imus, laterum infima pars, inferioresque caudæ rectrices albicant. Crurum partem supremam cooperiunt pennæ cinereæ, lineolis transversis albis, leviter distinctis, insignitæ. Alarum remiges castaneo colore imbutæ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum decem intermediæ remigibus concolores : utrinque extrema candida. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululum superant ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque






2. Poule-d'eau, femelle.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Poule - d'eau, mâle.

2. Poule - d'eau, femelle.







LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVIII.* 11

extimam usque breviorē. Synciput plumis est denu-  
datum, & crassissimā mem-  
branā flavicante obductum. Mandibula superior in exor-  
tu flavicans, in reliqua lon-  
gitudine nigra; mandibula  
inferior per totam longitu-  
dinem flavicat. Pars crurum  
plumis denudata, pedes &  
digiti, sicut & ipsorum mem-  
branæ, virides; unguēs verò  
fusco-viridescētes.

*Fœmina à mâle discrepat*  
coloribus in toto corpore  
dilutioribus.

Habitant in *Italia* circa  
*Bononiam*.

nuant de longueur par degrés  
jusqu'à la plus extérieure de  
chaque côté, qui est la plus  
courte. Le synciput est dé-  
garni de plumes, & couvert  
d'une membrane jaunâtre fort  
épaisse. Le demi-bec supérieur  
est jaunâtre à son origine, &  
noir dans le reste de sa lon-  
gueur; le demi-bec inférieur  
est entièrement jaunâtre. La par-  
tie des jambes qui est dégarnie  
de plumes, les pieds & les  
doigts, ainsi que leurs mem-  
branes, sont verds; & les on-  
gles d'un brun-verdâtre.

La femelle diffère du mâle en  
ce que ses couleurs sont plus  
claires.

On les trouve en *Italie* aux  
environs de *Bologne*.

SECTIO II.

*Ex quarum digiti membranis*  
*emarginatis obsiti sunt.*

**D**UO in illa sectione con-  
tinentur genera Avium,  
formâ rostri à se invicem dis-  
crepantium. Aliæ enim ros-  
tro donantur gracili, recto;  
in istis autem mandibula su-  
perior versùs apicem deorsum  
inflexa est, ut *Phalaropus*:  
aliæ rostrum habent  
conicum, lateraliter com-  
pressum, ut *Fulica*.

SECTION II.

*Ceux dont les doigts sont garnis*  
*de membranes festonnées.*

**C**ETTE section contient  
deux genres d'Oiseaux,  
qui se distinguent entr'eux par  
la forme du bec. Les uns ont  
le bec menu & droit; & ceux-  
là ont ordinairement la man-  
dibule supérieure courbée en  
en-bas vers le bout, comme le  
*Phalarope*: les autres ont le  
bec en cône applati par les cô-  
tés, comme la *Foulque*.



*Genre du Phalarope. (1).*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts , trois devant ,  
un derrière , garnis dans toute  
leur longueur de membranes  
fendues & festonnées :  
Le bec menu & droit ; la mandibule  
supérieure courbée en  
en-bas vers le bout.

Tous les Oiseaux de ce genre  
ont la partie inférieure des jambes  
dégarnie de plumes. Dans  
quelques espèces la courbure  
du bout du demi-bec supérieur  
est fort peu apparente.

(1) *Phalarope*, nom que j'ai donné aux  
Oiseaux de ce genre à cause de la ressemblance  
de leurs pieds avec ceux de la *Foulque*,  
nommée en grec *Φαλαρίς*.

*Genus Phalaropi. (1).*

Hujus character est  
Digiti quatuor, tres antici,  
posticus unus, per totam  
longitudinem membranis  
fissis, emarginatis aucti :  
Rostrum gracile, rectum ;  
mandibula superior versus  
apicem deorsum inflexa.

Omnium hujus generis  
Avium crura in parte inferiore  
plumis denudantur. In  
quibusdam speciebus mandibula  
superior est minimè  
ad apicem inflexa.

(1) *Phalaropus*, nomen Avibus hujus  
generis à me inditum ob similitudinem  
ipsorum pedum cum pedibus  
*Fulicæ*, græcè *Φαλαρίς* vocatæ.

# I. LE PHALAROPE.

*Phalaropus superne cinereo-cœrulescens, pennis in medio  
nigricantibus, infernè albus; vertice nigricante; taniâ in  
alis transversâ candidâ; rectricibus nigricantibus, dilutè  
cinereo fimbriatis . . . . PHALAROPUS.*

*Tringa gris de fer, au pied de Poule d'eau, espèce de Bécassine  
Edwards. Glanur. Tom. II. pag. 206. Chap. XCVIII; avec une figure  
exacte Pl. 308.*

*Snipe or Tringa. Philos. Transf. Vol. L. pag. 255. hujus icon satis accurata  
Tab. VI.*

*Les Anglois l'appellent GREY COOT-FOOTED TRINGA. Edwards. Philos. Transf.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Râle d'eau*. Sa longueur *Rallo aquatico paululùm  
crassitie cedit. Ipius longi-*



tudo ab apice rostri ad caudam extremam octo circiter pollices æquat, & ad extremos ungues eandem circiter mensuram obtinet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum est, cauda unum pollicem cum novem lineis; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; posticus autem binas cum semi lineas tantum. Membranæ quibus digiti tres antici obsiti sunt, in plures lobos utrinque dividuntur: membranæ digiti scilicet interioris in duos dividuntur lobos; digiti medii in tres; & digiti exterioris in quatuor. Inter lobos istos, majores lineam unicam latitudine non excedunt. Omnes sunt in marginibus exquisitè denticulati. Alæ complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Vertex capitis nigricat. Caput antèrius & ad latera, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, testricesque caudæ superiores & inferiores albescent. Pars

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces, & jusqu'à celui des ongles elle est à peu près de la même mesure. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derrière deux lignes & demie seulement. Les membranes dont les trois doigts antérieurs sont garnis, sont divisées de part & d'autre en plusieurs lobes: celles du doigt intérieur le sont en deux; celles du doigt du milieu en trois; & celles du doigt extérieur en quatre. Les plus grandes de ces lobes n'ont qu'une ligne de largeur. Tous sont bordés d'une dentelure très-fine. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est noirâtre. La partie antérieure & les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les cô-



tés sont blancs. La partie supérieure du col est cendrée. Le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un cendré-bleuâtre sur leurs bords, cette dernière couleur étant mêlée d'un peu de brun. Les scapulaires sont de la même couleur. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc mêlé d'un peu de cendré. Les plus petites du dessus sont d'un brun obscur : les moyennes sont noirâtres & bordées de blanc : les grandes sont pareillement noirâtres, bordées & terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aile une bande transversale de cette couleur. Toutes les plumes de l'aile sont en-dessous d'un cendré-clair ; mais en-dessus les huit premières sont noirâtres, & ont leur tige blanche : quelques-unes des suivantes sont noirâtres, & terminées de blanc : les premières des moyennes sont tout-à-fait blanches : enfin les plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de blanc dans toute leur circonférence. Ces dernières sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze

colli superior cinereo tingitur colore. Dorsum & uropygium obtegunt pennæ in medio nigricantes, ad margines cinereo - cœrulescentes, cui novissimo colori aliquid fusci admiscetur. Scapulares concolores. Tectrices alarum inferiores omnes sunt candidæ, paucò cinereo mixtæ. Superiores minimæ obscurè fuscæ : mediæ nigricantes, albo fimbriatæ : majores similiter nigricant, alboque marginantur & terminantur ; unde fit in utraque ala tænia transversa candida. Omnes alarum remiges sunt subtus dilutè cinereæ ; superne verò octo primores nigricant, & scapo donantur candido : sequentes quædam sunt nigricantes, albo terminatæ : ex minoribus primores penitus candidæ : corpori tandem finitimæ nigricantes, in tota circumferentia albo fimbriatæ. Quæ novissimæ dictæ maximam longitudinem obtinent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, dilutè cinereo fimbriatæ. Rostrum, quod quidem nonnihil ho-



horizontaliter planum, nigrum est. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque cinerei. In *Anglia*, idque in *Eboracensi* Provincia, maris littora frequentat.

plumes noirâtres, bordées de cendré clair. Le bec, qui est un peu applati horizontalement, est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont cendrés. On le trouve sur les côtes d'*Angleterre* dans la Province d'*York*.

## 2. LE PHALAROPE CENDRÉ.

Phalaropus superne cinereus, internè albus; tæniâ per oculos nigricante; fasciâ longitudinali in utroque colli latere rufâ; colli inferioris parte infimâ cinereâ; uropygio albo & nigricante transversim striato; tæniâ in alis transversâ candidâ; rectricibus nigricantibus . . . PHALAROPUS CINEREUS.

*Larus fidipes* alter nostras, D. Johnson. *Willugh. Ornith. pag.* 270.

*Raj. Syn. Avi. pag.* 132. N°. A. 7.

*Tringa* rostro subulato apice inflexo, pedibus virescentibus lobatis, abdomine albido. *Tringa lobata*. Linn. *Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 5.

*Tringa* mâle aux pattes de la Foulque d'eau. *Edwards. Tom. III. pag. CXLIII*; avec une figure exacte *Pl.* 143.

Les Anglois l'appellent COCK COOT-FOOTED TRINGA. *Edwards.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo circiter pollices explet, & ad extremos ungues novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda unum pollicem & sex circiter lineas; pars crurum plumis denudata septem lineas;

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue environ un pouce six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, sept



lignes ; son pied onze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , un pouce , l'extérieur dix lignes , l'intérieur huit lignes ; & celui de derrière deux lignes & demie seulement. Les membranes dont les trois doigts antérieurs sont garnis , sont divisées de part & d'autre en plusieurs lobes : celles du doigt intérieur le sont en deux ; celles du doigt du milieu en trois ; & celles du doigt extérieur en quatre. Les plus grandes de ces lobes n'ont guères qu'une ligne de largeur. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête , le dessus du col & le dos sont cendrés : cette couleur descend de chaque côté du col , & entoure le bas de sa partie inférieure. De chaque côté de la tête est une bande noirâtre , qui part d'après de l'origine du bec , & s'étend jusque vers l'occiput , en passant par les yeux. Derrière chacun des yeux part aussi une bande rousse , qui s'étend tout le long des côtés du col , à la partie inférieure duquel ces deux bandes se réunissent. Le croupion est rayé transversalement de blanc & de noirâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont

pes undecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem , extimus decem lineas , intimus octo lineas ; posticus autem binas cum semi lineas tantum. Membranæ quibus digiti tres antici obfiti sunt , in plures lobos utrinque dividuntur : membranæ digiti scilicet interioris in duos dividuntur lobos ; digiti medii in tres ; & digiti exterioris in quatuor. Inter lobos istos , majores lineam unam latitudine non multum excedunt. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores ; dorsumque tingit color cinereus : qui color in utroque colli latere descendit ; & colli inferioris partem infimam ambit. In utroque capitis latere tania extat nigricans , prope rostri exortum orta , per oculos ducta , & versus occipitium usque protensa. Ponè utrumque oculum fascia quoque oritur rufa , secundum colli latera producta ; & in ipsius inferiore parte binæ istæ fasciæ inter se connectuntur. Uropygium albo & nigricante transversim striatur. Superiores caudæ testrices concolores,



concolores. Guttur, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes albicant. Tectrices alarum inferiores omnes sunt quoque candidæ, lineisque transversis nigricantibus striatæ. Superiores minores cinereæ: majores cinereo-fuscæ, albo in apice fimbriatæ; unde fit in utraque ala tænia transversa candida. Pennæ scapulares sunt cinereo colore imbutæ, & in tota circumferentia rufo marginatæ. Remiges majores nigricantes: ex minoribus, primores concolores, albo terminatæ: corpori tandem viciniore obscure fuscæ. Quæ nuper descriptæ remiges maximâ longitudine polent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda constat. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguisque plumbeo colore tincti. Habitat in *Freto Hudsonis*.

de la même couleur. La gorge, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur, & rayées de lignes transversales noirâtres. Les petites du dessus sont cendrées: les grandes sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc par le bout; ce qui forme sur chaque aile une bande transversale de cette couleur. Les plumes scapulaires sont cendrées, & bordées de roux dans toute leur circonférence. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres: les premières des moyennes sont de la même couleur, & terminées de blanc: enfin les plus proches du corps sont d'un brun obscur. Ces dernières sont très-longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont de couleur de plomb. On le trouve à la *Baye de Hudson*.



## 3. LE PHALAROPE BRUN.

Phalaropus superne obscurè fuscus, marginibus pennarum dilutioribus, infernè albus; capite superiore nigro; collo cinereo; taniâ in alis transversâ candidâ; rectricibus obscurè fuscis, fusco dilutiore fimbriatis . . . PHALAROPUS FUSCUS.

Fulica fusca rostro tenui. *Klein. Avi. pag. 151. N°. 3.*

Tringa rostro subulato apice inflexo, pedibus virescentibus lobatis, abdomine albido. Tringa lobata. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 5.*

Tringa au pié-de-Foulque. *Edwards. Tom. I. pag. XLVI; avec une figure exacte Pl. 46.*

Les Anglois l'appellent COOT-FOOTED TRINGA. *Edwards.*

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long; sa queue seize lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, six lignes & demie; son pied un pouce; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes; & celui de derrière deux lignes seulement. Les membranes dont les trois doigts antérieurs sont garnis, sont divisées de part & d'au-

Præcedenti paululùm craf-  
sitie cedit. Ipsius longitudo  
ab apice rostri ad caudam  
extremam septem pollices  
& sex circiter lineas æquat,  
& ad extremos ungues octo  
pollices cum sex lineis. Ros-  
trum ab ipsius apice ad oris  
angulos usque undecim cum  
semi lineas longum est; cau-  
da sexdecim lineas; pars  
crurum plumis denudata sex  
cum semi lineas; pes unum  
pollicem; trium digitorum  
anticorum medius cum un-  
gue novem lineas, exti-  
mus octo lineas, intimus  
septem lineas; posticus au-  
tem binas tantummodo li-  
neas. Membranæ quibus di-  
giti tres antichi obfiti sunt,  
in plures lobos utrinque di-



viduntur : membranæ digiti scilicet interioris in duos dividuntur lobos ; digiti medii in tres ; & digiti exterioris in quatuor. Inter lobos istos , majores lineam unam latitudine non multum superant. Alæ complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Capitis superior pars nigra est. Caput ad latera , gutturque candida. Collum cinereum ; colli tamen superioris pars infima , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , superioresque caudæ tectrices sunt obscurè fuscæ , marginibus pennarum nonnihil dilutioribus. Pectus venter , latera , crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes albescent. Tectrices alarum inferiores omnes sunt cinereo imbutæ colore. Superiores minores obscurè fuscæ , colore paulò dilutiore fimbriatæ : majores fusco obscuro pariter imbutæ , albo in apice marginatæ ; unde fit in utraque ala tænia transversa concolor. Remiges alarum majores nigricantes , exterius albo fimbriatæ : ex minoribus , primores similiter nigricantes , alboque terminatæ : corpori tandem finitimæ scapularibus pennis

tre en plusieurs lobes : celles du doigt intérieur le sont en deux ; celles du doigt du milieu en trois ; & celles du doigt extérieur en quatre. Les plus grands de ces lobes n'ont guères qu'une ligne de largeur. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est noire. Les côtés de la tête sont blancs , ainsi que la gorge. Le col , si l'on en excepte le bas de sa partie supérieure , est cendré. Le bas du dessus du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun sombre , chaque plume étant bordée d'une couleur un peu plus claire. La poitrine , le ventre , le haut des jambes , les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Toutes les couvertures du dessous des aîles sont cendrées. Les petites du dessus sont d'un brun obscur , & bordées d'une couleur un peu plus claire : les grandes sont aussi d'un brun obscur , & bordées de blanc par le bout ; ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale de cette couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres , & bordées extérieurement de blanc ;



les premières des moyennes sont pareillement noirâtres, & terminées de blanc : enfin les plus proches du corps sont de la même couleur que les scapulaires. Ces dernières sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un brun obscur, & bordées d'une couleur un peu plus claire. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb; & les ongles noirs. On le trouve dans l'*Amérique Septentrionale*.

concolores. Quæ novissimæ maximam obtinent longitudinem, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices obscurè fuscæ, fusco nonnihil dilutiore fimbriatæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, plumbeo colore tincti; ungues verò nigri. Habitat in *America Septentrionali*.

#### 4. LE PHALAROPE ROUSSATRE.

Phalaropus superne rufescens, pennis in medio nigricantibus, infernè rubricæ fabrilis colore tinctus; tæniâ supra oculos dilutè rufescente; uropygio albo, nigricante maculato; tæniâ in alis transversâ candidâ; rectricibus in medio nigricantibus, ad margines rufescentibus. . . . PHALAROPUS RUFESCENS.

Tringa rostro recto, pedibus lobatis subfuscis, abdomine ferrugineo.

Fulicaria. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 6.*

Tringa rouge aux pattes de la Foulque d'eau. Edwards. *Tom. III. pag. CXLII*; avec une figure exacte Pl. 142.

Les Anglois l'appellent RED COOT-FOOTED TRINGA. Edwards.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ

Craffitie præcedentem paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo circiter



pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & septem lineas; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus octo lineas, intimus septem cum semi lineas; posticus autem binas tantummodo lineas. Membranæ quibus digiti tres antiqui obfiti sunt, in plures lobos utrinque dividuntur: membranæ digiti scilicet interioris in duos dividuntur lobos; digiti medii in tres; & digiti exterioris in quatuor. Inter lobos istos, majores sesquilineam latitudine non excedunt. Alæ complicatæ ad caudæ extremitatem protenduntur. Caput, guttur, partem colli superiorem, dorsumque vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufescentes. Scapulares, superioresque caudæ tectrices concolores. In utroque capituli latere exigua extat tænia longitudinalis dilutè rufescens, supra oculos ducta. Uropygium albicat, & ma-

huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue un pouce sept lignes; la partie de ses jambes qui est dé garnie de plumes, six lignes; son pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes & demie; & celui de derrière deux lignes seulement. Les membranes dont les trois doigts antérieurs sont garnis, sont divisées de part & d'autre en plusieurs lobes: celles du doigt intérieur le sont en deux; celles du doigt du milieu en trois; & celles du doigt extérieur en quatre. Les plus grands de ces lobes n'ont qu'une ligne & demie de largeur. Les aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le dessus du col & le dos sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & roussâtres sur leurs bords. Les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une petite bande longitudinale d'un roussâtre clair, qui passe au-dessus des yeux. Le croupion est blanc &



varié de taches noirâtres. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un rouge de brique. Toutes les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & marquées de quelques lignes transversales noirâtres, peu apparentes. Les petites du dessus sont cendrées, quelques-unes étant bordées de blanc : les grandes sont noirâtres, & terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale de cette couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les premières des moyennes sont de la même couleur, bordées extérieurement & terminées de blanc : enfin les plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de roussâtre dans toute leur circonférence. Ces dernières sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres dans leur milieu, & roussâtres sur leurs bords. Le bec, qui est un peu applati horizontalement, est orangé, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes,

culis nigricantibus variegatur. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam & pennas caudam subtus obtegentes tingit rubricæ fabrilis color. Tectrices alarum inferiores omnes sunt candidæ, lineis quibusdam transversis nigricantibus, non multum conspicuis, insignitæ. Superiores minores cineræ, quibusdam albo fimbriatis : majores nigricantes, albo terminatæ ; unde fit in utraque ala tænia transversa candida. Remiges alarum majores nigræ : ex minoribus, primores concolores, exterius albo marginatæ, & eodem colore terminatæ : corpori tandem finitimæ nigricantes, in tota circumferentia rufescente fimbriatæ. Quæ novissimè dictæ remiges maximâ longitudine pollent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus in medio nigricantibus, ad margines rufescentibus. Rostrum, quod quidem nonnihil horizontaliter planum, aurantium, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis



**LES OISEAUX**, *Classe III. Ordre XVIII.* 23  
denudata, pedes, digiti, si- les pieds, les doigts, ainsi que  
cut & ipforum membranæ, leurs membranes, & les ongles  
unguesque fusco-virescentes. sont d'un brun-verdâtre. On le  
Habitat in *Freto Hudsonis.* trouve à la *Baye de Hudson.*

X C.

X C.

*Genus Fulicæ.*

*Genre de la Foulque.*

Hujus character est  
 Digiti quatuor, tres antici,  
 posticus unus, per totam  
 longitudinem membranis  
 fissis, emarginatis aucti:  
 Rostrum conicum, laterali-  
 ter compressum.

Son caractère est d'avoir  
 Quatre doigts, trois devant ;  
 un derriere, garnis dans tou-  
 te leur longueur de membra-  
 nes fendues & festonnées :  
 Le bec en cone applati par les  
 côtés.

Omnium hujus generis  
 Avium frons plumis est de-  
 nudata, & crassissimâ mem-  
 branâ obducta. Ipsarum crura  
 in parte inferiore plumis quo-  
 que denudantur.

Tous les Oiseaux de ce genre  
 ont le front dégarni de plumes,  
 & couvert d'une membrane  
 fort épaisse. Ils ont aussi la par-  
 tie inférieure des jambes dégarnie  
 de plumes.

**\*\* I. LA FOULQUE OU MORELLE.**

*Voyez Pl. II. Fig. 1.*

*Fulica cinerea*, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; capite &  
 collo nigricantibus; marginibus alarum candidis; fronte  
 nudâ, coccineâ; cruribus taniâ flavicante circumdatis;  
 rectricibus saturatè cinereis, versùs apicem cinereo-nigri-  
 cantibus . . . . **FULICA.**

*Fulica fronte calva*, corpore nigro, digitis lobatis. *Fulica atra.* *Linn.*  
*Systh. Nat. ed. 10. Gen. 82. sp. 1.*

*Fulica fronte calva æquali.* *Faun. Suec. Linn. N° 130.*

*Fulica nigricans.* *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 71. sp. 1.*

*Fulica nigricans*, syncipite glabro. *Barr. Ornith. Class. II. Gen. 1.*  
*sp. 1.*



- Fulica major pulla , fronte cerâ albâ superne acuminatâ glabrâ obductâ , membrana digitorum latiori , lacera. *Brownz. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 479.*
- Fulica. *Gesn. icon. Avi. pag. 91 , in qua hujus icon non satis accurata. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 91. hujus icon non satis accurata pag. 95. Schwenck. Avi. Sil. pag. 263. Jonst. Avi. pag. 98. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 31. Willugh. Ornith. pag. 239. hujus icon minimè accurata Tab. LIX. Raj. Syn. Avi. pag. 116. N<sup>o</sup>. A. 1. Charlet. Exer. pag. 107. N<sup>o</sup>. XVI. Charlet. Onomazt. pag. 101. N<sup>o</sup>. XVI. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20. Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 70. hujus icon minùs accurata Tab. 33. Moehr. Avi. Gen. 78. Acta Upsal. An. 1750. pag. 22.*
- Fulica veterum. *Gesn. Avi. pag. 389.*
- Fulica Recentiorum. *Gesn. Avi. pag. 390 , in qua hujus icon non satis accurata. Klein. Avi. pag. 150. N<sup>o</sup>. 1.*
- Fulica , Fulix Latinis. *Mus. Worm. pag. 306.*
- Fulica , sive Fulix ; Phalaris Varroni ; Mergus niger Alberto magno. *Rzac. Hist. Nat. Pol. pag. 280.*
- Fulica minor Gesneri , Schwenckfeldii , & Willughby ; Gallina aquatica & arundinum ; Mergus niger Alberti. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 379.*
- Phalaris. *Gesn. Avi. pag. 130. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 260. Jonst. Avi. pag. 90.*
- Phalaris Kiranidæ. *Gesn.*
- Mergi genus. *Schwenck.*
- Pullus aquæ Alberto. *Gesn.*
- Poule d'eau. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 181 , dans laquelle il y a une figure très-peu exacte.*
- Poule d'eau , Foulque , Foucque , Foulcre , Jodelle , Joudarde , Belleque. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 39 b , dans laquelle est la même figure.*
- Foulque chauve , ou Poule d'eau. *Alb. Tom. I. pag. 73 ; avec une figure mal coloriée Pl. 83.*
- On l'appelle en quelques Provinces de France JUDELLE.
- Les Grecs l'appellent Φαλαρίς ou Φαλαρίς. *Gesn. Aldrov.*
- Les Grecs modernes , Λεῖζα. *Gesn. Aldrov.*
- Les Catalans , FOTGE ; FOLLAGA ; GALLINASA DE AIGUA. *Barr.*
- Les Italiens , FOLEGA. *Bel. Gesn. Aldrov. Worm. FOLLEGA ; FOLLATA. Aldrov.*



# LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVIII.* 25

*Les Italiens aux environs du Lac majeur, POLON ou PULLON. Bel. Gefn. Aldrov.*

*Les Suisses, BOELLHINEN ou BELCHINEN. Gefn. Aldrov.*

*Les Suisses aux environs de Neuchatel, BELLEQUE. Gefn. Aldrov.*

*Les Suisses aux environs du Lac de Constance, BELCH. Gefn. Aldrov.*

*Les Allemands, WASSER-HOUN; ROR-HEUNLE. Gefn. ROHR-HENNE. Schwenck. Rzac. TAUCHERLEIN. Rzac.*

*Les Allemands aux environs de Francfort, FLORN. Gefn. & quelques-uns, PFAFF. Gefn. Aldrov. PFAFFE. Schwenck. Rzac.*

*Les Bas-Saxons aux environs de Roslock, ZAPP. Gefn. Aldrov.*

*Les Habitans de la Souabe, BLESZ; BLESSING. Gefn. Aldrov.*

*Les Silésiens, WASSER HUN. Schwenck.*

*Les Illyriens, LYSKA. Gefn. Aldrov.*

*Les Polonois, LYSKA. Rzac. KACZA ou DZIKA. Gefn. Aldrov.*

*Les Suédois, BLAOS-KLACKA. Linn.*

*Les Danois, BLESAND. Worm.*

*Les Hollandois, MEER-COOT. Gefn. Aldrov.*

*Les Anglois, COOT. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. BALD COOT. Alb.*

*Les Anglois de la Jamaïque, PLANTANE COOTE. Browne.*

*Crassitie Gallinam medio-  
crem circiter æmulatur. Ip-  
sius longitudo ab apice rostri  
ad caudæ extremitatem qua-  
tuordecim pollices explet,  
& ad extremos ungues unum  
pedem & sex pollices. Ros-  
trum ab ipsius apice ad oris  
angulos usque sexdecim li-  
neas longum est; cauda duos  
pollices; pars crurum plumis  
denudata novem lineas; pes  
duos pollices; trium digito-  
rum anticorum medius cum  
ungue tres pollices & toti-  
dem lineas, extimus duos  
pollices cum novem lineis,  
intimus duos pollices & sep-  
tem lineas; posticus autem  
tredecim cum semi lineas.  
Membranæ quibus digiti tres*

Elle est à peu près de la gros-  
seur d'une *moyenne Poule*. Sa  
longueur depuis le bout du bec  
jusqu'à celui de la queue est  
de quatorze pouces, & jusqu'à  
celui des ongles d'un pied six  
pouces. Son bec depuis son bout  
jusqu'aux coins de la bouche a  
seize lignes de long; sa queue  
deux pouces; la partie de ses  
jambes qui est dégarnie de plu-  
mes, neuf lignes; son pied deux  
pouces; celui du milieu des  
trois doigts antérieurs, joint  
avec l'ongle, trois pouces trois  
lignes, l'extérieur deux pouces  
neuf lignes, l'intérieur deux  
pouces sept lignes; & celui de  
derrière treize lignes & demie.  
Les membranes dont les trois  
doigts antérieurs sont garnis,



sont divisées de part & d'autre en plusieurs lobes : celles du doigt intérieur le sont en deux ; celles du doigt du milieu en trois ; & celles du doigt extérieur en quatre. Chacun de ces lobes est fort grand ; quelques-uns ont jusqu'à cinq lignes de largeur. Elle a deux pieds de vol ; & ses ailes lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Le front , depuis l'origine du bec jusqu'au milieu du sommet de la tête , est dégarni de plumes , & couvert d'une membrane fort épaisse d'un rouge vif. Le reste de la tête , la gorge & le col sont noirâtres. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes , & celles du dessus de la queue sont d'un cendré très-foncé. La poitrine , le ventre , le haut des jambes & les côtés sont d'un cendré un peu plus clair. Les couvertures du dessous de la queue sont noirâtres. Celles du dessous des ailes sont cendrées , quelques-unes ayant une très-petite bordure blanche. Le bord de l'aile est de cette dernière couleur. Les grandes plumes de l'aile sont d'un cendré-brun en-dessus ; & cendrées en - dessous ; la première est de plus bordée extérieurement de blanc : les

antici obsoleti sunt , in plures lobos utrinque dividuntur : membranæ digiti scilicet interioris in duos dividuntur lobos ; digiti medii in tres ; & digiti exterioris in quatuor. Lobus autem quilibet maximus est ; quidam enim quinque linearum latitudinem obtinent. Alis expansis , extremitates majorum remigum duorum pedum intervallo distant ; alæ verò complicatæ tertiam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Frons , ab exortu rostri ad capitis medium verticem usque , plumis est denudata , & crassissimâ membranâ coccineâ obducta. Reliquum caput , guttur , collumque nigricant. Dorsum , uropygium , pennæ scapulares , quæ alas superne obtegunt , superioresque caudæ testrices sunt saturatissimè cinereæ. Pectus , venter , crurum suprema pars & latera cinereo nonnihil dilutius tinguntur. Pennæ caudam subtus obtegentes nigricantes. Inferiores alarum testrices cinereæ , quibusdam minutissimâ margine albâ præditis. Margines alarum candidæ. Remiges majores superne cinereo-fuscæ , subtus cinereæ , prioris margine



exteriore candidâ : minores colore imbuuntur nonnihil dilutiorè quàm qui majores tingit, & albo in apice fimbriantur; ex istis tamen excipiendæ sunt corpori viciniore, eodem imbutæ cinereo saturato ac dorsum ipsum tingitur. Quæ novissimè dictæ remiges sunt longissimæ, & dum ala complacatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices saturatissimè cinereæ, versùs extremitatem cinereo-nigricantes. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extrinsecam usque breviorè; unde fit cauda apice obtusa. Rostrum flavo-olivaceum, attamen extremitate candidum. Crura, eo in loco in quo pennis primùm denudantur, exiguâ circumdantur tæniâ flavicante, duarum circiter linearum latitudinem obtinente. Crurum reliqua pars plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque fusco-olivacei. Flumina, piscinas & paludes frequentat. Ipsiùs nidus, qui quidem Grami-

moyennes sont d'une couleur un peu plus claire que les grandes, & bordées de blanc par le bout; il faut cependant en excepter les plus proches du corps, qui sont du même cendré foncé que le dos. Ces dernières sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré très-foncé, qui devient noirâtre vers le bout de chaque plume. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue obtus. Le bec est d'un jaune-olivâtre, excepté son bout, qui est blanc. Les jambes, à l'endroit où elles commencent à être dégarnies de plumes, sont entourées d'une petite bande jaunâtre, d'environ deux lignes de largeur. Le reste de la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont d'un brun-olivâtre. On la trouve dans les rivières, les étangs & les marais. Son nid, qui est composé de feuilles de Chiendent, de Roseau, &c.



nage sur l'eau, afin de pouvoir s'élever ou s'abaisser avec elle selon le besoin, & est retenu par les Roseaux de peur d'être emporté par le courant. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

nis, Arundinum; &c. foliis conflatur, in summis aquis fluitat, ut unà cum aqua attollatur vel subsidat; eumque Arundines sistunt, nè cum flumine devehatur. *Ex museo Realmuriano.*

**\*\* 2. LA GRANDE FOULQUE OU LA MACROULE.**

*Voyez Pl. II. Fig. 2.*

*Fulica cinerea*, superne saturatiùs, nonnihil ad olivaceum inclinans, infernè dilutiùs; capite & collo nigricantibus; marginibus alarum candidis; fronte nudâ, candida; cruribus taniâ rubrâ circumdatis; reëtricibus cinereo-nigricantibus . . . . **FULICA MAJOR.**

*Fulica crasso corpore, aterrima. Barr. Ornith. Class. II. Gen. I. sp. 2.*

*Fulica aterrima. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 71. sp. 2.*

*Fulica major Bellonii. Willugh. Ornith. pag. 239. hujus icon non satis accurata Tab. LI.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 117. N°. 2.*

*Fulica major Bellonii, Aldrovandi. Klein. Avi. pag. 151. N°. 2.*

*Fulica major Bellonii, Gallis Macroûle, seu Diable de Mer. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 380.*

*Fulica quam Parisienses Diabolum marinum vocant. Jonst. Avi. pag. 99.*

*Alia Fulicæ species, quam Galli Macroûle, vel Diable de Mer appellant. Aldrov. Avi. Tom. III pag. 98.*

*Cotta major, sive calva. Charlet. Exer. pag. 107. N°. 1.*

*Charlet. Onomazt. pag. 101. N°. 1.*

*Autre Espèce de Poule d'eau, autrement nommée Macroûle ou Diable de Mer. Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 182.*

*Macroûle de la rivière de la Plata. Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 276. (ed. 1714).*

*Les Parisiens l'appellent DIABLE DE MER. Bel. Aldrov.*

*Les Normands, MACROULE. Bel. Aldrov.*

*Les Polonois, LYSKA WIEKSZA; NUREK WIEKSZY. Rzac.*

*Les Anglois, GREATER COOT. Willugh. BALD COOT. Charlet.*

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsiùs lon-



gitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & quatuor lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem sex pollices & novem lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda unum pollicem & undecim lineas; pars crurum plumis denudata novem cum semi lineas; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & quatuor lineas, extimus duos pollices cum novem lineis, intimus duos pollices & septem lineas; posticus autem tredecim lineas. Membranæ quibus digiti tres antici obfiti sunt, in plures lobos utrinque dividuntur: membranæ digiti scilicet interioris in duos dividuntur lobos; digiti medii in tres; & digiti exterioris in quatuor. Lobus autem quilibet maximus est; quidam enim quinque cum semi linearum latitudinem obtinent. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est viginti quatuor pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Frons

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue un pouce onze lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, neuf lignes & demie; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces quatre lignes, l'extérieur deux pouces neuf lignes, l'intérieur deux pouces sept lignes; & celui de derrière treize lignes. Les membranes dont les trois doigts antérieurs sont garnis, sont divisées de part & d'autre en plusieurs lobes; celles du doigt intérieur le sont en deux; celles du doigt du milieu en trois; & celles du doigt extérieur en quatre. Chacun de ces lobes est fort grand; quelques-uns ont jusqu'à cinq lignes & demie de largeur. Elle a vingt-quatre pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le front est dégarni de plumes, & couvert d'une membrane fort épaisse d'un beau blanc. Le reste de la tête, la



gorge & le col sont noirâtres. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré très-foncé, & tirant tant soit peu sur l'olivâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un cendré un peu plus clair. Le bord de l'aile est blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un cendré foncé : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur : les moyennes sont d'un cendré un peu plus clair, & bordées de blanc par le bout ; il faut cependant en excepter les plus proches du corps, qui sont du même cendré que le dos, & tirent de même un peu sur l'olivâtre. Ces dernières sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-noirâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure

plumis est denudata, & crassissimâ membranâ candidissimâ obducta. Reliquum caput, guttur, collumque nigricant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt saturatissimè cinereæ, nonnihil ad olivaceum inclinantes. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes cinereo nonnihil dilutius tinguntur. Margines alarum candidæ. Superiores alarum rectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, saturatè cinereæ : majores à corpore remotiores cinereo-fusæ. Remiges majores ex cinereo quoque fuscescunt : minores cinereo paululùm dilutius tinguntur, & albo in apice fimbriantur ; ex istis tamen excipiendæ sunt corpori viciniore, eodem imbutæ cinereo ac dorsum ipsum tingitur, & dorsi instar, nonnihil ad olivaceum vergentes. Quæ novissimæ remiges maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim consistat rectricibus cinereo-nigricantibus. Binæ intermedia lateraliū longitudinem pau-



lulùm superant ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum ; unde fit cauda apice obtusa. Rostrum flavo-olivaceum , attamen extremitate candidum. Crura , eo in loco in quo pennis primùm denudantur , exiguâ circumdantur taniâ rubrâ , duarum circiter linearum latitudinem obtinente. Crurum reliqua pars plumis denudata , pedes , digiti , sicut & ipsorum membranæ , unguisque fusco-olivacei. Flumina , stagna & paludes frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

de chaque côté , qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue obtus. Le bec est d'un jaune-olivâtre , excepté son bout , qui est blanc. Les jambes , à l'endroit où elles commencent à être dégarnies de plumes , sont entourées d'une petite bande rouge d'environ deux lignes de largeur. Le reste de la partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds , les doigts , ainsi que leurs membranes , & les ongles sont d'un brun-olivâtre. On la trouve dans les rivières , les étangs & les marais. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

### 3. LA FOULQUE DU MEXIQUE.

Fulica superne pallidè virescens , cyaneo & fulvo variegata , infernè purpurea ; capite & collo concoloribus ; fronte nudâ , coccineâ ; rectricibus pallidè virescentibus . . . .  
FULICA MEXICANA.

Fulicæ Mexicanæ altera species , Yohoalcoachillin dicta. *Raj. Syn. Avi. pag. 117. N<sup>o</sup>. 3.*

Yohoalcoachillin. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 30. cap. LXXIV.*

Les Mexiquains l'appellent YOHUALCOACHILLIN. *Fern. Raj.*

Magnitudine & crassitie præcedentem circiter æmulatur , & cum illa formâ convenit. Frons plumis est denudata , & crassissimâ membranâ coccineâ obducta. Reliquum caput , guttur , col-

Elle est à peu près de la grosseur & de la grandeur de la précédente , & lui ressemble par sa forme. Le front est dégarni de plumes , & couvert d'une membrane fort épaisse d'un beau rouge. Le reste de



la tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont pourpres. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un verd-pâle, varié de bleu & de fauve. Les plumes de l'aile sont aussi d'un verd pâle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est rouge, excepté son bout qui est jaune. On la trouve au *Mexique*,

lum, pectus, ventrem, crurum partem supremam, inferiores caudæ rectrices & latera tingit purpureus color. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ rectrices pallidè virescunt, & cyaneo, fulvoque variegantur. Remiges alarum sunt quoque pallidè virescences. Duodecim rectricibus concoloribus cauda constat. Rostrum rubrum, excepto apice luteo. Habitat in *Mexico*.








2. Grande Foulque ou Macroule.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Foulque ou Moselle.

2. Grande Foulque ou Macroule.









## ORDO XIX. ORDRE XIX.

### A V E S      L E S O I S E A U X

*Digitis quatuor , tribus anterioribus membranis semifissis inter se connexis , postico soluto : cruribus ad podicem positis , & intra abdomen conditis , præditæ.*

*Qui ont quatre doigts , dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes demi-fendues , & le postérieur séparé : & les jambes placées tout-à-fait derrière , & cachées dans l'abdomen.*



**N**ICO genere, Colymbi scilicet, constituitur hic Ordo.



**L**n'y a dans cet Ordre qu'un seul genre , qui est celui de la Grebe.

Omnes hujus generis Alites rostro donantur recto , acuto.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le bec droit & pointu.

#### XCI.

#### XCI.

##### *Genus Colymbi.*

##### *Genre de la Grebe.*

Hujus character est  
Digiti quatuor , tres scilicet anteriores membranis semifissis inter se connexi , posticus solutus :

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts , dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes demi-fendues , & le postérieur est séparé :

Crura ad podicem posita , & intra abdomen condita :

Les jambes placées tout-à-fait derrière , & cachées dans l'abdomen :

Rostrum rectum , acutum.

Le bec droit & pointu.



Tous les Oiseaux de ce genre n'ont point de queue. Leurs pieds sont très-applatis par les côtés ; & les écailles dont ils sont couverts, forment à leur partie postérieure une double dentelure pareille à celle d'une scie. Leurs ongles sont plats, & assez semblables à ceux de l'homme.

Omnes hujus generis Aves caudâ carent. Ipsarum pedes sunt lateraliter valdè plani ; & squamæ quibus cooperiuntur , in ipsorum posteriore parte duplicem efformant seriem dentium , serræ denticulorum æmulorum. Ungues sunt quoque plani , & unguibus humanis similes.

\*\* I. LA GREBE.

Voyez Pl. III. Fig. 1.

Colymbus superne obscurè fuscus , infernè albo - argenteus ; tectricibus alarum superioribus minoribus , & majoribus corpori finitimis , remigibusque à tredecima ad vigesimam quartam usque candidis . . . . COLYMBUS.

- Colymbus. Moehr. *Avi. Gen.* 77.  
 Colymbus major. Aldrov. *Avi. Tom. III. pag.* 251. *hujus icon minimè accurata pag.* 252.  
 Charlet. *Exer. pag.* 101. N<sup>o</sup>. 7. 1.  
 Charlet. *Onomazt. pag.* 96. N<sup>o</sup>. 7. 1.  
 Colymbus major Aldrovandi. Willugh. *Ornith. pag.* 256. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIX.*  
 Raj. *Syn. Avi. pag.* 125. N<sup>o</sup>. 6.  
 Klein. *Avi. pag.* 150. N<sup>o</sup>. 3.  
 Colymbus major primus. Jonst. *Avi. pag.* 89. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48 , sub titulo , Colymbus major.*  
 Mergi Genus quod in Lacu Lemano invenitur. Gesn. *Avi. pag.* 138.  
 Les Vénitiens l'appellent FISANELLE ; & quelques-uns , COMPITA. Willugh.  
 Les Allemands , DEUCHEL. Gesn. Aldrov.  
 Les Anglois , GREATER LOON-DIVER ; GREATER ARSEFOOT-DIVER. Willugh. GREAT ARSEFOOT ; GREAT DIDAPPER ; GREAT DOUKER. Charlet.

Elle est un peu plus grosse que la Foulque. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à

Fulicam paululùm crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad uro-



pygium extremum unum pedem & quinque pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem novem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quinque lineas longum est; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices cum quatuor lineis, extimus duos pollices & sex lineas, intimus unum pollicem & decem cum semi lineas; posticus autem septem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & quinque pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ uropygium attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt obscurè quidem, sed splendide, fuscæ; inferiores tamen scapulares albescent, fuscâque terminantur maculâ eò minore, quò penna fit inferior. Scapulares superiores maximâ longitudine pollebent, in acumen desinunt, & uropygium extremum attingunt. Caput ad latera, guttur, collum inferius & ad latera, pectus, venter & crura splendidissimo imbuuntur.

celui du croupion est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces cinq lignes de long; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces quatre lignes, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur un pouce dix lignes & demie; & celui de derrière sept lignes. Elle a deux pieds cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au croupion. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun sombre, mais brillant; cependant les scapulaires inférieures sont blanches, & terminées par une tache brune d'autant plus petite, que la plume est plus inférieure. Les scapulaires supérieures sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent jusqu'au bout du croupion. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre & les jambes sont d'un très-beau blanc-argenté. Le blanc des côtés de la tête s'étend jusque vers l'occiput; de sorte qu'il n'y



a en cet endroit qu'une bande brune assez étroite, qui joint ensemble le brun du dessus de la tête & celui de la partie supérieure du col. L'espace contenu de chaque côté depuis les coins de la bouche jusqu'aux yeux est dégarni de plumes. Les côtés sont d'un gris-brun, varié d'un peu de blanc. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les grandes & les petites du dessus depuis l'origine de l'aile jusqu'au pli qui répond à celui du coude, & les petites qui sont depuis ce pli jusqu'à celui qui répond à celui du poignet, sont de la même couleur : toutes les autres sont brunes. L'aile est composée de trente plumes : les onze premières sont brunes, excepté leur origine, qui est blanche du côté intérieur seulement ; & six de celles-là, sçavoir depuis la sixième jusqu'à l'onzième inclusivement, sont terminées par une très-petite tache blanche : la douzième est d'un gris-brun, bordée du côté extérieur de gris-blanc, & terminée de blanc ; elle a aussi un peu de blanc vers son origine du côté intérieur : les douze suivantes, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingt-quatrième inclusivement, sont blanches ; les deux premières

tur albo-argenteo. Ad latera capitis albor versus occipitium usque protenditur ; ita ut eo in loco solummodo sit stricta tænia fusca, quæ connectitur color fuscus caput superius tingens cum fusco colore quo collum superius imbitur. Spatium ab oris angulis ad oculos usque utrinque contentum plumis est denudatum. Latera sunt griseo-fusca, paucò candido variegata. Pennæ omnes alas subtus obtegentes albicant. Tectrices alarum superiores majores & minores ab alæ scilicet exortu ad articulum cubito humano respondentem usque, sicut & minores ab articulo isto ad articulum carpo humano respondentem alas vestientes, sunt quoque candidæ ; reliquæ omnes fuscæ. Alam componunt triginta remiges : undecim primores fuscæ, attamen in exortu candidæ, sed ad latus interius tantum ; ex istis autem sex, à sexta scilicet ad undecimam usque inclusivè, minutissimâ maculâ albâ terminantur : duodecima griseo-fusca, in latere exteriorè cinereo-albo fimbriata ; alboque terminata ; paucò quoque candido interius



versus exortum insignitur : duodecim proximè sequentes, à decima tertia scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, candidæ; ex istis autem binæ primores, decima tertia scilicet & decima quarta, scapo donantur ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque fusco : vigesima quinta & vigesima sexta albæ, majusculâ maculâ fuscâ, ad ipsarum apicem in latere exteriori positâ, insignitæ : vigesima septima & vigesima octava exterius & apice fuscæ, interiorius candidæ : binæ tandem corpori viciniore penitus fuscæ. Remix secunda reliquarum omnium longitudinem antecellit. Oculorum irides cineræ, paucò rubro mixtæ. Mandibula superior superne fusca, ad latera rubescens; inferior quoque rubescit, attamen in extremitate candicat. Pedes, unguesque, sicut & ipsorum membranæ, ex fusco nonnihil ad rubescentem inclinant colorem; ungues verò sunt fusci, apice candicante marginati. Habitat in *Lemano lacu. Ex museo Reaumuriano.*

de celles-là, sçavoir la treizième & la quatorzième, ont leur tige brune depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur : la vingt-cinquième & la vingt-sixième sont blanches, & marquées d'une fort grande tache brune, placée à leur bout du côté extérieur : la vingt-septième & la vingt-huitième sont brunes du côté extérieur & à leur bout, & blanches du côté intérieur : enfin les deux plus proches du corps sont entièrement brunes. La seconde des plumes de l'aîle est la plus longue de toutes. L'iris des yeux est d'un cendré mêlé d'un peu de rouge. Le demi-bec supérieur est brun en-dessus, & rougeâtre sur les côtés; l'inférieur est de cette dernière couleur, excepté son bout, qui est blanchâtre. Les pieds, les doigts & leurs membranes sont d'un brun tirant un peu sur le rougeâtre; les ongles sont bruns, & bordés de blanchâtre par le bout. On la trouve sur le *Lac de Geneve. Du cabinet de M. de Reaumur.*



## \*\* 2. LA GREBE HUPÉE.

*Voyez Pl. IV.*

*Colymbus cristatus*, superne obscure fuscus, infernè albo-argenteus; taniâ à naribus ad oculos candicante; gutture fasciculo plumoso longiori utrinque donato; tectricibus alarum superioribus minoribus, & majoribus corpori finitimis, remigibusque à decima quinta ad vigesimam quartam usque candidis . . . . *COLYMBUS CRISTATUS.*

*Colymbus subtus albus*, superne fuscus, rostro & pedibus virescentibus. *Barr. Ornith. Class. II. Gen. II. sp. 1.*

*Colymbus major cristatus.* *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 253. hujus icon satis accurata pag. 254.*

*Marfil. Danub. Tom. V. pag. 80. hujus icon satis accurata (si membranae essent semifissæ) Tab. 38.*

*Colymbus major cristatus Aldrovandi.* *Willugh. Ornith. pag. 257.*

*Colymbus major cristatus*, Marfilli. *Klein. Avi. pag. 149. N°. 2.*

*Colymbus major Bellonii.* *Jonst. Avi. pag. 89. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48, sub titulo, Mergus Bellonii.*

*Colymbus cristatus Willughby.* *Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 373.*

*Uria Bellonii.* *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 251.*

*Acitli Mergus Americanus.* *Hernand. Hist. Mex. pag. 686, in qua hujus icon non satis accurata.*

*Acitli Hernandezii.* *Raj. Syn. Avi. pag. 125.*

*Avis quædam*, Anate paulò major, mergendo victum quærens, Agri Cestrensis, Incolis Cargoos dicta. *Charlet. Exer. pag. 107. N°. 3.*

*Avis quædam*, Anate paulò major, mergendo victum quærens Charletoni. *Klein. Avi. pag. 151.*

*Grand Plongeon de mer.* *Alb. Tom. II. pag. 49; avec une figure mal coloriée Pl. 75.*

*Grand Plongeon de riviere.* *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 178; avec une figure passable pag. 179.*

*Plongeon de riviere.* *Bel. Portr. d'Ois. pag. 38 b, dans laquelle est la même figure.*

*Les Catalans l'appellent CALABRIA.* *Barr.*

*Les Italiens*, SPERGA; LURAR. *Bel.*

*Les Savoyards*, LOERE. *Bel.*

*Les Anglois*, GREAT SEA LOON; GREAT DIVER. *Alb.*

*Les Mexiquains*, ACITLI. *Hern.*



*Craffitie* præcedentem multum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad uropygium extremum unum pedem septem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues viginti quinque pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & septem lineas longum est; pes duos pollices cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus tres pollices cum linea una, intimus duos pollices & quatuor lineas; posticus autem octo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum sex pollicum & totidem linearum; alæ verò complicatæ uropygium pertingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium & pennæ scapulares sunt obscure quidem, sed splendide, fuscæ. Scapulares superiores maximam obtinent longitudinem, in acumen desinunt, & uropygium extremum attingunt. Caput ad latera, guttur, collum inferius & ad latera, pectus, venter & crura splendidissimo imbuuntur albo-argenteo. In capitis late-

Elle est beaucoup plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est d'un pied sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de vingt-cinq pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces sept lignes de long; son pied deux pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces une ligne, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derrière huit lignes. Elle a deux pieds six pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au croupion. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun sombre, mais brillant. Les scapulaires supérieures sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent jusqu'au bout du croupion. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre & les jambes sont d'un très-beau blanc-argenté. Le blanc des côtés de la tête s'étend jusque vers l'occiput, de façon à ne laisser en cet endroit qu'une bande brune assez étroite, qui joint



ensemble le brun du dessus de la tête & celui de la partie supérieure du col. L'espace contenu de chaque côté depuis les coins de la bouche jusqu'aux yeux est dégarni de plumes. Depuis les narines jusqu'aux yeux s'étend de chaque côté une petite bande blanchâtre. Les plumes du sommet de la tête sont un peu plus longues que les autres, & forment une petite hupe. De chaque côté de la gorge est aussi un petit paquet de plumes, un peu plus longues que les autres : ces plumes sont d'un blanc mêlé de gris & d'un peu de roussâtre très-clair. Les côtés sont d'un très-beau blanc-argenté, varié de grandes taches brunes. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les grandes & les petites du dessus depuis l'origine de l'aile jusqu'au pli qui répond à celui du coude, & les petites qui sont depuis ce pli jusqu'à celui qui répond à celui du poignet, sont de la même couleur : toutes les autres sont brunes. L'aile est composée de trente-six plumes : les douze premières sont brunes, excepté leur origine, qui est blanche du côté intérieur seulement : la treizième est brune du côté extérieur, & blanche du côté intérieur : la qua-

ribus albor versùs occipitium usque protenditur ; ita ut eo in loco solummodo striata sit tænia fusca , quâ connectitur color fuscus caput superius tingens cum fusco colore quo pars colli superior imbutur. Spatium ab oris angulis ad oculos utrinque contentum plumis denudatur. A naribus ad oculos usque exigua tænia candidans utrinque ducitur. Penæ summum caput vestientes reliquas paululùm longitudine excedunt , exiguamque cristam efformant. In utroque gutturis latere similiter extat fasciculus plumarum , reliquas longitudine antecellentium ; quæ plumæ sunt candidæ , griseo & paucò rufescente dilutissimo mixtæ. Latera splendidissimo imbuuntur albo - argenteo , majusculis maculis fuscis vario. Tectrices alarum inferiores omnes sunt candidæ. Superiores majores & minores ab alæ exortu ad articulum cubito humano respondentem positæ , sicut & minores ab isto articulo ad articulum carpo humano respondentem usque alas obtegentes , similiter albicant : reliquæ omnes fuscæ sunt. Triginta sex remigibus ala conflatur ;



*Statur* : duodecim primores sunt fusca, excepto exortu candido, sed in latere interiore tantum : decima tertia exterius fusca, interius alba : decima quarta similiter in latere exteriori fusca, sed solummodo ab ipsius exortu versus duas tertias longitudinis partes usque, in reliqua longitudine & toto latere interiore candida : decem proximè sequentes, à decima quinta scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, penitus candidæ : vigesima quinta & vigesima sexta concolores, sed maculâ fuscâ, exterius versus ipsarum extremitatem positâ, insignitæ ; quæ macula in vigesima quinta remige minutissima, in vigesima sexta autem multò major extat : tres quæ sequuntur, à vigesima septima scilicet ad vigesimam nonam usque inclusivè, in latere exteriori fusca, excepto exortu candido, & in latere interiore candidæ, exceptâ extremitate fuscâ ; qui color fuscus eò majus in latere interiore spatium occupat, quò remix fit corpori vicinior : septem tandem corpori finitimæ penitus fusca. Remix secunda reliquarum omnium longi-

*Tom. VI.*

torzième est pareillement brune du côté extérieur, mais seulement depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le reste est blanc, ainsi que tout le côté intérieur : le dix suivantes, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la vingt-quatrième inclusivement, sont entièrement blanches : la vingt-cinquième & la vingt-sixième sont de la même couleur, mais elles sont marquées chacune d'une tache brune, placée sur le côté extérieur vers leur extrémité ; cette tache est fort petite sur la vingt-cinquième plume, & beaucoup plus grande sur la vingt-sixième : les trois suivantes, sçavoir depuis la vingt-septième jusqu'à la vingt-neuvième inclusivement, sont brunes du côté extérieur, excepté leur origine, qui est blanche ; & blanches du côté intérieur, excepté leur extrémité, qui est brune ; cette dernière couleur s'étend d'autant plus loin sur le côté intérieur, que la plume est plus proche du corps : enfin les sept plus proches du corps sont entièrement brunes. La seconde des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. L'iris des yeux est jaune. Le demi-bec supérieur est d'un brun-noirâtre en-dessus, & rouge sur les

F



côtés; le demi-bec inférieur est de cette dernière couleur, excepté son bout, qui est blanchâtre. Les pieds; les doigts & leurs membranes sont d'un brun tirant un peu sur le rougeâtre; les ongles sont noirâtres, & bordés de blanchâtre par le bout. On la trouve dans les rivières, les lacs & sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

tudinem excedit. Oculorum irides luteæ. Mandibula superior superne fusco-nigricans, ad latera rubra; mandibula inferior quoque rubet, attamen in apice candidat. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, ex fusco nonnihil ad rubescentem inclinant colorem; ungues verò nigricant, & candidante in apice marginantur. Flumina, lacusque frequentat; & juxta maris littora versatur. *Ex museo D. de Bandeville.*

### \*\* 3. LA PETITE GREBE HUPÉE.

*Voyez Pl. III. Fig. 2.*

*Colymbus cristatus*, superne obscurè fuscus, infernè albo-argenteus; cristâ duplici; collo inferiore maculis castaneis vario; remigibus à tredecima ad vigesimam tertiam usque candidis . . . . *COLYMBUS CRISTATUS MINOR.*

An *Colymbus cinereus* major? *Raj. Syn. Avi. pag. 124. N°. A. 1.*

An *Colymbus*, seu *Podicipes cinereus* D. Brown? *Willugh. Ornith. pag. 257. hujus icon non satis accurata Tab. LXI.*

Les Anglois l'appellent *ASH-COLOURED LOON*. *Willugh. GREAT ASH-COLOURED DIVER ou GREAT ASH-COLOURED DOUCKER. Raj.*

Elle n'est guères plus grosse qu'un *Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe

*Crassitie Vanellum* non multum excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad uropygium extremum undecim pollices æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & octo lineas. Ros-



trum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; pes sesquipollicem; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & undecim lineas, extimus duos pollices cum totidem lineis, intimus unum pollicem & septem lineas; posticus autem quinque cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis septem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad uropygium usque protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ obscure quidem, sed splendide, fuscæ. Scapulares concolores, quarum superiores maximâ longitudine pollent, in acumen desinunt, & uropygium attingunt. Pennæ summum caput vestientes reliquas paululum longitudine excedunt, & binas efficiunt parvulas cristas, utrinque scilicet unam, paulò supra occipitium positam. Spatium ab oris angulis ad oculos utrinque contentum plumis est denudatum. Caput ad latera, guttur, collumque inferius & ad latera albore tinguntur; quem colorem per

jusqu'aux coins de la bouche à quinze lignes de long; son pied dix-huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce onze lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce sept lignes; & celui de derrière cinq lignes & demie. Elle a un pied sept pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au croupion. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun sombre, mais brillant. Les scapulaires supérieures sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent jusqu'au croupion. Les plumes du sommet de la tête sont un peu plus longues què les autres, & forment deux petites hupes, sçavoir une de chaque côté, placée un peu au-dessus de l'occiput. L'espace contenu de chaque côté depuis les coins de la bouche jusqu'aux yeux est dégarni de plumes. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col sont d'un beau blanc; cette couleur est variée de taches de marron dans toute la longueur de la partie inférieure du col. Le blanc des côtés de la tête s'étend sur la



partie supérieure du col qui en est la plus voisine, de façon à ne laisser dans cet endroit qu'une bande brune assez étroite, qui joint ensemble le brun du dessus de la tête & celui de la partie supérieure du col la plus proche du corps. La poitrine, le ventre & les jambes sont d'un très-beau blanc-argenté. Les côtés sont de la même couleur, variés de grandes taches brunes, & de quelques taches de marron placées dans leur partie supérieure. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Celles du dessus sont brunes, si l'on en excepte quelques-unes des plus proches du corps, qui sont blanches. L'aile est composée de vingt-huit plumes : les dix premières sont brunes du côté extérieur, & d'un cendré-brun du côté intérieur, si l'on en excepte cependant son origine, qui est blanche : l'onzième est blanche à son origine, & terminée de cendré-brun : la douzième est blanche, & marquée seulement d'une grande tache cendrée, placée à son extrémité sur le côté extérieur : les onze suivantes, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingt-troisième inclusivement, sont entièrement blanches : la vingt-qua-

totam colli inferioris longitudinem variegant maculæ castaneæ. In capitis lateribus albor supra colli superioris partem capiti proximam extenditur ; ita ut eo in loco solummodo stricta sit tænia fusca, quâ connectitur color fuscus caput superius tingens cum fusco colore quo pars colli superior corpori finitima imbitur. Pectus, venter & crura splendidissimo tinguntur albo-argenteo. Latera sunt eodem colore imbuta, majusculis maculis fuscis variegata, cum maculis quibusdam castaneis in ipsorum parte suprema respersis. Tectrices alarum inferiores omnes albæ. Superiores fuscæ ; quædam tamen ex corpori vicinioribus sunt candidæ. Alarum componunt viginti octo remiges : decem primores in latere exteriori fuscæ, in interiori cinereo-fuscæ, attamen interius in exortu candidæ : undecima in exortu albâ, cinereo-fusco terminata : duodecima albâ, majusculâ solummodo maculâ cinereâ, exterius in ipsius extremitate positâ, insignita : undecim proximè sequentes, à decima tertia scilicet ad vigesimam tertiam usque



inclusivè, penitus candidæ : vigesima quarta concolor, binis in apice notata maculis, unâ scilicet fuscâ in latere exteriori positâ, alterâ minori fusco dilutiore imbutâ, in latere interiore collocatâ : quatuor tandem corpori viciniore fuscæ, attamen in exortu candidæ, sed interiori tantum. Remix secunda reliquas omnes longitudine superat. Rostrum nigricans, attamen in ipsius extremitate & mandibulæ inferioris exortu griseo-fuscum. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, fusco-olivacei ; ungues verò nigricantes, candicante in apice fimbriatæ. Juxta maris littora versatur. *Ex museo D. de Bandeville.*

trième est de la même couleur, & marquée à son bout de deux taches, l'une brune placée sur le côté extérieur, & l'autre plus petite & d'un brun plus clair, placée sur le côté intérieur : enfin les quatre plus proches du corps sont brunes, excepté leur origine, qui est blanche du côté intérieur seulement. La seconde des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. Le bec est noirâtre, excepté son bout & l'origine du demi-bec inférieur, qui sont d'un gris-brun. Les pieds, les doigts & leurs membranes sont d'un brun-olivâtre ; les ongles sont noirâtres, & bordés de blanchâtre par le bout. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

**\*\* 4. LA GREBE CORNUE.**

*Voyez Pl. V. Fig. 1.*

Colymbus cristatus superne obscurè fuscus, infernè albo-argenteus ; capite superiore nigricante ; capite ad latera, guttureque dilutè fulvis ; collo supremo rufo, in medio longis pennis nigris circumdato ; tectricibus alarum superioribus minoribus, & majoribus corpori finitimis, remigibusque à decimâ quintâ ad vigesimam quintam usque candidis . . . . COLYMBUS CORNUTUS.

Colymbus pedibus lobato-divisis ; capite nigro. *Faun. Suec. Linn.* N°. 122.

Colymbus pedibus lobato-fissis, capite rufo, collari nigro, remigibus



- secundariis albis. Colymbus cristatus. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 68. sp. 2.*
- Colymbus major. Uria vel Urinatrix major. *Gefn. icon. Avi. pag. 88, in qua hujus icon non satis accurata.*
- Colymbus alius major cristatus & cornutus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 253. hujus icon non satis accurata pag. 255.*
- Colymbus major cristatus & cornutus. *Willugh. Ornith. pag. 257. hujus icon satis accurata Tab. LXI, sub titulo, Colymbus cristatus. Raj. Syn. Avi. pag. 124. N°. A. 2.*
- Colymbus major secundus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 251.*
- Colymbus major alter. *Jonst. Avi. pag. 89.*
- Colymbus albus, major, cristatus, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag. 149. N°. 1.*
- Colymbus cornutus. Linn. *Systh. Nat. ed. 6. Gen. 51. sp. 2.*
- Colymbus cristatus & cornutus Willughby. *Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 373.*
- Colymbus cristatus seu auritus. *Mus. Worm. pag. 304.*
- Mergus major. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 298.*
- Mergus major Schwenckfeldii, seu Colymbus major cristatus; Urinatrix major. *Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 393.*
- Mergus cirrhatus, seu cristatus. *Charlet. Exer. pag. 101. N°. 5. Charlet. Onomazt. pag. 95. N°. 5.*
- Aliud Mergi genus quod in Laeu Tigurino reperitur. *Gefn. Avi. pag. 138. hujus icon non satis accurata pag. 139.*
- Admirandæ Avis cucullatæ aquaticæ species. *Gaz. Rup. Best. hujus icon satis accurata Tab. 18. Mus. Best. pag. 32. N°. 4. hujus icon satis accurata Tab. VIII. N°. 4.*
- Avis cucullata aquatica Besleri. *Jonst. Avi. pag. 160.*
- Ardea exotica aurita. *Petiv. Gaz. Nat. hujus icon minimè accurata Tab. XLIII. fig. 12.*
- Acitli, seu aqueus Lepus. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 41. cap. CXXX.*
- Lepus aqueus. *Eus. Nieremb. pag. 207.*
- Lepus aqueus, seu Colymbus cristatus Mexicanus. *Willugh. Ornith. pag. 257.*
- Genus. Anatis quam Acitli, seu aquatilem Leporem consueverunt vocare Mexicenses. *Jonst. Avi. pag. 158.*
- Pygoscelis major. *Gefn.*
- Plongeon hupé. *Alb. Tom. I. pag. 71; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 81.*
- Les Grecs l'appellent *Εἰδία*; *Αἰδύια*; *Αἰδύια*; *Κόλυμπος*; *Κολυμβίς*. *Schwenck.*
- Les Italiens aux environs du Lac Majeur, *JURAR. Gefn. Aldrov.*
- Les Vénitiens; *SPERGA. Gefn. Aldrov.*
- Les Savoyards, *LOERE. Gefn. Aldrov.*
- Les Allemands, *DUCHEL. Gefn. MERCH; TEUCHER; STRAUS TEUCHER;*



GROSSER KOBEL TEUCHER. *Schwenck.* GROSSER KOBEL-TAEUCHER;  
GCHORNTER TAUCHER. *Rzac.*

*Les Allemands aux environs du Lac de Constance*, FLUDER. *Gefn.*

*Les Polonois*, NUREK WIEKSZY; NUREK CZUBATY Y ROGATY. *Rzac.*

*Les Hollandois*, ARSEVOET. *Gefn.*

*Les Anglois*, CRESTED-DIVER; CRESTED-LOON. *Willugh. Alb.* GREATER

CRESTED DIVER. *Raj.* NAFFE. *Charlet.*

*Les Mexiquains*, ACITLI. *Fern.* Nieremb. *Jonst.* Willugh.

*Crassitie Colymbum vulgare* paululum antecellit. Ipsi-  
us longitudo ab apice rostri ad uropygium extre-  
mum octodecim pollices æ-  
quat, & ad extremos ungues  
unum pedem decem polli-  
ces & septem lineas. Ros-  
trum ab ipsius apice ad oris  
angulos usque duos pollices  
& quinque lineas longum  
est; pes duos pollices; trium  
digitorum anticorum me-  
dius cum ungue duos polli-  
ces & quinque lineas, exti-  
mus duos pollices cum sep-  
tem lineis, intimus unum  
pollicem & undecim cum  
semi lineas; posticus autem  
septem lineas. Ab extremo  
ad extremum alarum exten-  
sarum distantia est duorum  
pedum totidem pollicum &  
novem linearum; alæ verò  
complicatæ uropygium per-  
tingunt. Capitis superior  
pars nigricat: pennæ autem  
versus occipitium positæ  
octodecim linearum longi-  
tudinem obtinent, & cristam

Elle est un peu plus grosse  
que la *Grebe ordinaire*. Sa lon-  
gueur depuis le bout du bec  
jusqu'à celui du croupion est  
de dix-huit pouces, & jusqu'à  
celui des ongles d'un pied  
dix pouces sept lignes. Son  
bec depuis sa pointe jusqu'aux  
coins de la bouche a deux  
pouces cinq lignes de long;  
son pied deux pouces; celui  
du milieu des trois doigts an-  
térieurs, joint avec l'ongle,  
deux pouces cinq lignes, l'exté-  
rieur deux pouces sept lignes,  
l'intérieur un pouce onze lignes  
& demie; & celui de derriere  
sept lignes. Elle a deux pieds  
deux pouces neuf lignes de  
vol; & ses aîles, lorsqu'elles  
sont pliées, s'étendent jusqu'au  
croupion. La partie supérieure  
de la tête est noirâtre: les plu-  
mes qui sont placées vers l'oc-  
ciput, ont jusqu'à dix-huit lig-  
nes de longueur, & forment une  
hupe. Les côtés de la tête &  
la gorge sont d'un fauve très-  
clair. La partie postérieure de  
la tête & la partie du col qui



en est la plus voisine, sont couvertes de plumes rousses, au-dessous desquelles le col est entouré de longues plumes noires, qui le font paroître en cet endroit plus gros qu'il ne l'est réellement. La partie du col la plus voisine du corps est brune en-dessus, rousse sur les côtés, & d'un blanc-argenté en-dessous. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun sombre, mais brillant; cependant les scapulaires supérieures sont mêlées d'un peu de roux, & les inférieures sont blanches, & marquées à leur extrémité de taches brunes d'autant plus petites, que la plume est plus inférieure. Les scapulaires supérieures sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent jusqu'au bout du croupion. L'espace contenu de chaque côté depuis les coins de la bouche jusqu'aux yeux est dégarni de plumes. La poitrine, le ventre & les jambes sont d'un blanc-argenté : cette couleur tire un peu sur le fauve aux côtés de la poitrine seulement. Les côtés sont variés de blanc, de brun & de fauve. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les grandes & les petites du dessus depuis l'origine de l'aile jus-

efficiunt. Caput ad latera, gutturque sunt dilutissime fulva. Caput posterius, sicut & partem colli ipsi finitimam, vestiunt pennæ rufæ, infra quas collum ambiunt pennæ nigrae longiores, quibus fit ut eo in loco collum majorem crassitiem habere videatur. Pars colli corpori vicinior est superne fusca, ad latera rufa, infernè albo-argentea. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt obscure quidem, sed splendide, fusca; scapulares tamen superiores paululùm rufi admixtum habent, inferiores autem sunt candidæ, in extremitate maculis insignitæ fuscis, eò minoribus, quò penna fit inferior. Scapulares superiores maxime obtinent longitudinem, in acumen desinunt, & ad uropygium extremum usque protenduntur. Spatium ab oris angulis ad oculos utrinque contentum plumis est denudatum. Pectus, venter & crura albo-argenteo imbuuntur : qui color in pectoris lateribus tantùm nonnihil ad fulvum inclinat. Latera albo, fusco, fulvoque variegantur. Pennæ omnes alas subtus obtegentes albescent. Tectrices alarum superiores



superiores majores & minores, ab alæ scilicet exortu ad articulum cubito humano respondentem usque, sicut & minores ab isto articulo ad articulum carpo humano respondentem alas vestientes, sunt quoque candidæ : reliquæ omnes fuscæ. Trīginta remigibus ala constat : duodecim primores fuscæ, attamen in exortu candidæ, sed interiùs tantùm ; ex istis autem quinque, ab octava scilicet ad duodecimam usque inclusivè, minutâ maculâ candidâ terminantur : decima tertia in latere exteriorè griseo-fusca, in interiorè cinereo-alba, albo terminata ; pauco quoque candido versùs ipsius exortum interiùs notatur : decima quarta in latere exteriorè versùs duas tertias longitudinis partes usque griseo-fusca, in reliqua longitudine, sicut & interiùs, alba : undecim proximè sequentes, à decima quinta scilicet ad vigesimam quintam usque inclusivè, candidæ ; ex istis autem novissimis tres primores, à decima quinta scilicet ad decimam septimam usque inclusivè, scapo donantur ab ipsarum exortu mediam versùs longitudi-

qu'au pli qui répond à celui du coude, & les petites qui sont depuis ce pli jusqu'à celui qui répond à celui du poignet, sont de la même couleur : toutes les autres sont brunes. L'aîle est composée de trente plumes : les douze premières sont brunes, excepté leur origine, qui est blanche du côté intérieur seulement ; & cinq de celles-là, sçavoir depuis la huitième jusqu'à la douzième inclusivement, sont terminées par une petite tache blanche : la treizième est d'un gris-brun du côté extérieur, d'un gris-blanc du côté intérieur, & terminée de blanc ; elle a aussi un peu de blanc vers son origine du côté intérieur : la quatorzième est d'un gris-brun du côté extérieur jusque vers les deux tiers de sa longueur ; tout le reste est blanc, ainsi que son côté intérieur : les onze suivantes, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la vingt-cinquième inclusivement, sont blanches ; les trois premières de celles-là, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la dix-septième inclusivement, ont leur tige brune depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur : la vingt-sixième est blanche, & marquée d'une tache brune, placée à son ex-



trémité sur le côté extérieur : la vingt-septième & la vingt-huitième sont brunes du côté extérieur & à leur bout, & blanches du côté intérieur : enfin les deux plus proches du corps sont entièrement brunes. La seconde des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. Le demi-bec supérieur est brun en-dessus, & rougeâtre sur les côtés ; l'inférieur est de cette dernière couleur, excepté son bout, qui est blanchâtre. Les pieds, les doigts & leurs membranes sont extérieurement d'un cendré-bleuâtre, & intérieurement d'un brun tirant un peu sur le rougeâtre ; les ongles sont bruns, & bordés de blanchâtre par le bout. Elle se tient dans les lacs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

nem usque fusco : vigesima sexta candida, maculâ fuscâ, exterius in extremitate positâ, insignita : vigesima septima & vigesima octava in latere exteriori & apice fusca, in latere interiore candida : binæ tandem corpori viciniore penitus fusca. Remix secunda reliquarum omnium longitudinem excedit. Mandibula superior superne fusca, ad latera rubescens ; inferior quoque rubescit, attamen in extremitate candidat. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, exterius cinereo-cœrulescentes, interius ex fusco nonnihil ad rubescentem vergentes colorem ; ungues verò fusci, candicante in apice marginati. Lacus frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

## \*\* 5. LA PETITE GREBE CORNUE.

Colymbus superne obscurè fuscus, infernè albo-argenteus ; capite & collo supremo nigro-virescentibus ; collo inferiore castaneo ; fasciculo plumoso aurantio-rufescente ponè utrumque oculum ; taniâ utrinque à rostro ad oculum nudâ coccineâ ; remigibus à duodecima ad vigesimam sextam usque candidis . . . . COLYMBUS CORNUTUS MINOR.

Colymbus pedibus lobato-divisis ; capite rufo. *Faun. Suec. Linn. N<sup>o</sup>. 123.*

Colymbus pedibus lobatis, capite nigro, auribus cristato ferrugineis. *Colymbus auritus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 68. sp. 3.*



# LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIX.* 51

- Colymbus minor pullus, digitis internè connectis, superne marginalis. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 480.*
- Colymbus minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 256.*  
*Jonst. Avi. pag. 89.*  
*Charlet. Exer. pag. 102. N°. 7. 2.*  
*Charlet. Onomazt. pag. 96. N°. 7. 2.*  
*Klein. Avi. pag. 150. N°. 4.*
- Colymbus minor; Colymbis. Uria vel Urinatrix minor. Pygoscelis minor. Mergulus. *Gesn. icon. Avi. pag. 89, in qua hujus icon non satis accurata.*
- Colymbus five Podicipes minor. *Willugh. Ornith. pag. 258. hujus icon non satis accurata Tab. LXI.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 125. N°. A. 3.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 190. N°. 14.*  
*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*  
*Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 322. N°. IV. hujus icon pessima Tab. 271. fig. 1.*  
*Marfil. Danub. Tom. V. pag. 82. hujus icon non satis accurata Tab. 39.*
- Trapazorola. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 51. sp. 3.*
- Trapazorola vel Mergulus. *Gesn. Avi. pag. 140, in qua hujus icon non satis accurata.*
- Yacapitzahoac, seu Avis rostri mucronati. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 29. cap. LXVIII.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 177.*
- Foulque à aigrettes ou à cornes. *Edwards. Tom. III. pag. CXLV; avec une figure exacte Pl. 145.*
- Petit Plongeon de mer. *Alb. Tom. II. pag. 50; avec une figure mal coloriée Pl. 76.*
- Les Portugais l'appellent ADEM; GATHIRAS. *Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens, ARZAVOLA. *Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens aux environs du Lac Majeur, PIOMBIN. *Gesn. Aldrov.*
- Les Ferrarois, TRAPAZOROLA. *Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands, DEUCHELIN; DUCHENTLIN; HURCHELIN; MÏRGIGELN. *Gesn. Aldrov. ARSSFOUSS DER KLEIN. Gesn.*
- Les Habitans de la Souabe, KAEFERENTLE. *Gesn. Aldrov.*
- Les Grisons, KAEFERENTLE. *Gesn. Aldrov.*
- Les Suisses, TEUCHTERLIN; RUCHEN; RUGGELEN; PFURTZI. *Gesn. Aldrov.*
- Les Hollandois, AERSEVOET. *Gesn. Aldrov.*
- Les Ostro-Bothniens, FIORNA. *Linn.*
- Les Anglois, DIDAPPER. *Willugh. Raj. Sloane. DIPPER; DOUCKER; DOBCHICK. Willugh. Raj. DOB-CHICK. Alb. DOBCHIKIN. Gesn. Aldrov. ARSE-FOOT. Sibbald. SMALL-ARSFOOT. Willugh. SMALL-LOON. Willugh. Raj. Sibbald. EARED DOB-CHICK; HORNED DOB-CHICK. Edwards.*



*Les Habitans de la Province de Cornouailles , DIVING KILLEGREW.*

*Charlet.*

*Les Mexiquains , YACAPITZAHUAC. Fern.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *petite Grebe hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; son pied un pouce six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes; & celui de derrière cinq lignes & demie. Elle a un pied huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au croupion. La tête & la partie du col qui en est la plus voisine, sont couvertes de longues plumes d'un noir tirant sur le verd, & qui font paroître la tête & cette partie du col plus grosses qu'elles ne le sont réellement. Derrière chacun des yeux part un petit faisceau de plumes d'un orangé-roussâtre, un peu plus longues que les autres, qui tendent vers l'occiput, & y forment deux petites especes de cornes. De chaque côté de la tête est une petite ligne nue d'un rouge vif,

*Cum Colymbo cristato minore* circiter crassitie convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad uropygium extremum unum pedem explet, & ad extremos ungues quindecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; pes unum pollicem & sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extimus duos pollices & totidem lineas, intimus unum pollicem cum quinque lineis; posticus autem quinque cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & octo pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad uropygium usque protenduntur. Caput, partemque colli ipsi finitimam vestiunt longiusculæ pennæ nigro-virescentes, quibus fit ut caput & colli pars ista majorem crassitiam habere videantur. Ponè utrumque oculum fasciculus oritur plumis constans aurantio-rufescentibus, reliquas longitudine paululùm excedentibus, versus occi-



pitium tendentibus, ibique cornicula bina quodammodo efficientibus. In utroque capitis latere lineola extat nuda coccinea, ab exortu rostri orta & ad oculum usque producta. Partem colli corpori finitimam subtus tingit color castaneus elegans. Ipsius superior pars, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices sunt obscure quidem, sed splendide, fusca. Scapulares superiores maximâ longitudine pollent, in acumen desinunt, & uropygium extremum attingunt. Pectus, venter & crura splendidissimo imbuuntur albo-argenteo. Latera castaneo colore tinguntur. Inferiores alarum tectrices omnes albicant. Alarum componunt triginta remiges: undecim primores fusca, attamen in exortu candida, sed in latere interiore tantum: quindecim proximè sequentes, à duodecima scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè, candida: vigesima septima & vigesima octava in latere exteriori & extremitate fusca, in latere interiore alba; binæ tandem corpori viciniores penitus fusca. Remix secunda reliquarum

qui part de l'origine du bec, & s'étend jusqu'à l'œil. La partie du col la plus voisine du corps est en-dessous d'une belle couleur de marron. Sa partie supérieure, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un brun sombre, mais brillant. Les scapulaires supérieures sont très-longues, se terminent en pointe, & s'étendent jusqu'au bout du croupion. La poitrine, le ventre & les jambes sont d'un blanc-argenté très-brillant. Les côtés sont de couleur de marron. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. L'aile est composée de trente plumes: les douze premières sont brunes, excepté leur origine, qui est blanche du côté intérieur seulement: les quinze suivantes, savoir depuis la douzième jusqu'à la vingt-sixième inclusivement, sont blanches: la vingt-septième & la vingt-huitième sont brunes du côté extérieur & à leur bout, & blanches du côté intérieur: enfin les deux plus proches du corps sont entièrement brunes. La seconde des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. L'iris des yeux est rouge. Le demi-bec supérieur est noirâtre, excepté son bout, qui est blan-



châtre ; l'inférieur est rouge à son origine , ensuite noirâtre , & terminé de blanchâtre. Les pieds , les doigts & leurs membranes sont extérieurement d'un cendré-bleuâtre , & intérieurement d'un brun tirant un peu sur le rougeâtre ; les ongles sont bruns , & bordés de blanchâtre par le bout. Elle se tient sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

omnium longitudinem excedit. Oculorum irides rubræ. Mandibula superior nigricans , attamen in extremitate candicans ; inferior in exortu rubra , deinde nigricans , candicante terminata. Pedes & digiti , sicut & ipsorum membranæ , exterius cinereo-cœrulescentes , interius ex fusco nonnihil ad rubescentem inclinantes colorem ; ungues verò fusci , albedo in extremitate marginati. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

#### 6. LA GREBE A OREILLES.

Colymbus superne fusco-nigricans , infernè albus ; capite & collo nigris , collo inferiore maculis albis vario ; fasciculo plumoso flexibili aurantio ponè utrumque oculum ; marginibus alarum , remigibusque intermediis candidis . . .  
COLYMBUS AURITUS.

Colymbus pedibus lobatis , capite nigro , auribus cristato ferrugineis.

Colymbus auritus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 68. sp. 3.*

Colymbus minor alius. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 256.*

Alterum Merguli genus. *Gesn. Avi. pag. 141 , in qua hujus capitis icon non satis accurata.*

Mergulus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 299.*

Mergulus niger. *Gesn. icon. Avi. pag. 89 , in qua hujus capitis icon non satis accurata.*

Mergulus niger Schwenckfeldii seu Colymbus minor. *Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 392.*

Fouque oreillée. *Edwards. Tom. II. pag. XCVI ; avec une figure exacte Pl. 96.*

Les Turcs l'appellent KARABATAK. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands , SCHWARTZ DUCHELE. *Gesn. SCHWARTZ TAEUCHER.*



LEIN. *Rzac.* SCHWARTZ TEUCHERLIN; KLEIN SCHWARTZ TEUCHERLIN; DUCH ENDTLIN; KAEFER ENDTLE. *Schwenck.*

*Les Polonois, NUREK CZARNY MALY. Rzac.*

Magnitudine & crassitie *Colymbum fluviatilem nostratam* nonnihil antecellit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum circiter pollicem longum est. Alæ complicatæ ad uropygium usque protenduntur. Caput, guttur, collumque nigra sunt: quam nigredinem in gutture & parte colli inferiore variegant minutæ maculæ albæ. Ponè utrumque oculum fasciculus oritur plumis constans aurantiis, longiusculis, flexibilibus, binasque quodammodo efficientibus auriculas, quas Avis ad libitum movere potest. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices ex fusco nigricant. Pectus, venter & crura albeant. Latera similiter candida, aurantio per totam corporis longitudinem variegata. Tectrices alarum inferiores omnes albicant. Alarum margines, ab ipsius exortu ad extremitatem usque candidæ. Remiges majores fusco-nigricantes: proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum tenent, candidæ: corpori

Elle est un peu plus grande & un peu plus grosse que notre Grebe de riviere. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a environ un pouce de longueur. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au croupion. La tête, la gorge & le col sont noirs: cette couleur est variée sur la gorge & la partie inférieure du col de petites taches blanches. Derrière chacun des yeux part un petit faisceau de plumes orangées, longues & flexibles, & qui forment comme deux especes d'oreilles, que l'Oiseau peut faire mouvoir à volonté. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un brun-noirâtre. La poitrine, le ventre & les jambes sont d'un beau blanc. Les côtés, qui sont de la même couleur, sont variés d'orangé dans toute la longueur du corps. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Le bord de l'aile, depuis son origine jusqu'à son extrémité, est de la même couleur. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun-noirâtre: les suivantes, sçavoir celles qui oc-



cupent le milieu , sont blanches : les plus proches du corps sont de la même couleur que le dos. L'iris des yeux est d'un beau rouge. Le bec est noir , excepté le bout du demi - bec inférieur , qui est blanchâtre. Les pieds , les doigts & leurs membranes sont extérieurement d'un verdâtre obscur , & intérieurement rougeâtres ; les ongles sont bruns. Elle se tient dans les étangs.

finitimæ dorso concolores. Oculorum irides eleganter rubræ. Rostrum nigrum , exceptâ mandibulæ inferioris extremitate albidâ. Pedes & digiti , sicut & ipsorum membranæ , exterius obscurè viridescentes , interiùs rubefcentes ; ungues verò fusci. Piscinas frequentat.

#### 7. LA PETITE GREBE.

*Colymbus superne fusco-nigricans , infernè albus ; capite superiore nigro-virescente ; taniâ utrinque à rostro ad oculum nudâ saturatè rubrâ ; maculâ utrinque rostrum inter & oculum , marginibus alarum , remigibusque intermediis candidis . . . . COLYMBUS MINOR.*

Fouque noire & blanche. *Edwards. Tom. II. pag. XCVI ; avec une figure exacte Pl. 96.*

Elle est à peu près de la grandeur & de la grosseur de la *petite Grebe cornue*. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a environ quinze lignes de long. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au croupion. La partie supérieure de la tête est d'un noir tirant sur le verd. De chaque côté de la tête est une petite tache blanche , placée entre la base du demi-bec supérieur & l'œil. Au-dessous de cette tache est une ligne nue

Magnitudine & crassitie *Colymbum cornutum minorem* circiter æmulatur. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quindecim circiter lineas longum est. Alæ complicatæ uropygium extremum pertingunt. Capitis superior pars ex nigro virescit. In utroque capitis latere exigua extat macula candida , basim mandibulæ superioris inter & oculum posita. Infra maculam istam linea adest saturatè rubra ,  
ab



ab exortu mandibulæ superioris orta, & ad oculum usque producta. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores alarum testrices sunt fusco-nigricantes. Caput ad latera, guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ albæ : infimus tamen venter nigricante maculatur. Inferiores alarum testrices omnes sunt candidæ. Alarum margines ab ipsarum exortu ad extremitatem usque concolores. Remiges majores nigricantes : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium obtinent locum, candidæ : corpori viciniore dorso concolores. Oculorum irides coccineæ. Mandibula superior nigricans, ab ipsius tamen exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque ad margines rubra ; mandibula inferior in exortu similiter rubet, in extremitate nigricat. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, exterius obscurè viridescentes, interiùs rubescentes ; ungues verò fusci. Juxta maris littora versatur.

d'un rouge foncé, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'à l'œil. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un brun-noirâtre. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un beau blanc : le bas-ventre est cependant tacheté de noirâtre. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Le bord de l'aile, depuis son origine jusqu'à son extrémité, est de la même couleur. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont blanches : les plus proches du corps sont de la même couleur que le dos. L'iris des yeux est d'un rouge vif. Le demi-bec supérieur est noirâtre, excepté ses bords, qui sont rouges depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le demi-bec inférieur est de cette dernière couleur à son origine, & noirâtre à son extrémité. Les pieds, les doigts & leurs membranes sont extérieurement d'un verdâtre obscur, & intérieurement rougeâtres ; les ongles

sont bruns. Elle se tient sur les bords de la mer.



## 8. LA GREBE DE L'ISLE S. THOMAS.

*Colymbus superne obscurè fuscus, infernè albus, maculis griseis variegatus; maculâ utrinque rostrum inter & oculum candidâ; maculâ in medio pectore nigrâ; remigibus pallidè rufis . . . . COLYMBUS INSULÆ S. THOMÆ.*

Espece de Plongeon ou *Mergus major leucophæus*. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 391. (ed. 1725).*

*Les Habitans de l'Isle S. Thomas l'appellent DUC-LAART. Feuillée.*

Elle est aussi grosse qu'une jeune Poule. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de longueur. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au croupion. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun sombre mais brillant. De chaque côté de la tête est une tache blanche, placée entre le bec & l'œil. La partie inférieure du col & la poitrine sont de cette dernière couleur, avec une grande tache noire au milieu de la poitrine. Le ventre, les côtés & les jambes sont d'un blanc varié de taches grises. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Celles du dessus & les plumes de l'aile sont d'un roux pâle. Les yeux sont d'un gris-roux, & entourés de blanc. Le bec est noir depuis son origine jusque vers

*Crassitie Gallinam juniorum adæquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est. Alæ complicatæ ad uropygium usque protendantur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt obscurè quidem, sed splendidè, fusæ. In utroque capitis latere macula extat candida, rostrum inter & oculum posita. Pars colli inferior & pectus similiter albicant; medium autem pectus majusculâ insignitur maculâ nigrâ. Venter, latera & crura alben, & maculis griseis variegantur. Tectrices alarum inferiores omnes sunt candidæ. Superiores, sicut & alarum remiges, pallidè rufæ. Oculi sunt griseo-rufi, albo circumdati. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs lon-*



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIX.* 59

gitudinem usque nigrum, la moitié de sa longueur; & inde ad extremitatem for- de-là, jusqu'à son extrémité il didè album. Pedes, digiti, est d'un blanc sale. Les pieds, sicut & ipsorum membranæ, les doigts, ainsi que leurs mem- unguesque nigricantes. Ha- branes, & les ongles sont noi- bitat in *Insula S. Thomæ* in râtres. On la trouve à l'*Ile S. America.* *Thomas en Amérique.*

\*\* 9. LA GREBE DE RIVIERE OU LE CASTAGNEUX.

*Colymbus superne fuscus, ad fulvum vergens, infernè albo-argenteus; collo inferiore griseo-fulvo; imo ventre griseo; uropygio infimo albo; remigibus à decima sexta ad vigesimam primam usque candidis, griseo-fusco maculatis....*  
COLYMBUS FLUVIATILIS.

*Colymbus cinereus, rostro & pedibus nigris. Barr. Ornith. Class. II. Gen. II. sp. 2.*

*Colymbus & Colymbis, vel Urinatrix. Gesn. Avi. pag. 128.*

*Colymbus minor Bellonii. Jonst. Avi. pag. 89. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48, sub titulo, Colymbus major Bellonii.*

*Colymbus minor Bellonii, vel saltem simillima Avis. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 257. hujus icon minimè accurata pag. 258.*

*Colymbus tertius. Jonst. Avi. pag. 89.*

*Mergus parvus fluviatilis. Gesn. Avi. pag. 141.*

*Tertium Urinatricum genus, sive Mergus minimus fluviatilis Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 257.*

*Petit Plongeon nommé Castagneux ou Zoucet. Bel. Hist. nat. des Ois. pag 177, dans laquelle est une assez bonne figure.*

*Castagneux, Zoucet, petit Plongeon. Bel. Portr. d'Ois. pag. 38 a, dans laquelle est la même figure.*

*Les Grecs l'appellent Κολυμβίς. Gesn.*

*Les Catalans, CABUSSET; CABUSSO. Barr.*

*Pullum Gallinaceum minorem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad uropygium extremum novem pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices & decem lineas.*

Il est à peu près de la grosseur d'un petit Poulet. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces dix lignes. Son bec depuis sa



pointe jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long ; son pied quatorze lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes ; l'extérieur est de la même longueur ; l'intérieur n'a que quinze lignes & demie de long ; & celui de derrière cinq lignes. Elle a quatorze pouces trois lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au croupion. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, les plumes scapulaires & le haut du croupion sont d'un brun brillant & tirant un peu sur le fauve. Le bas du croupion est blanc. Les scapulaires supérieures sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent jusqu'au bout du croupion. Les côtés de la tête, la partie inférieure & les côtés du col sont d'un gris-fauve : cette couleur s'étend de chaque côté de la tête jusque vers l'occiput ; de sorte qu'il n'y a en cet endroit qu'une bande brune assez étroite, qui joint ensemble le brun du dessus de la tête & celui de la partie supérieure du col. L'espace contenu de chaque côté depuis les coins de la bouche jusqu'aux yeux, est garni de plumes. La gorge est

Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim cum semi lineas longum est ; pes quatuordecim cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas ; extimus eandem obtinet longitudinem ; intimus quindecim cum semi lineas solummodo longus est ; posticus autem quinque lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & trium linearum ; alæ verò complicatæ uropygium attingunt. Partes capitis & colli superiores , dorsum ; uropygii suprema pars , scapularesque pennæ sunt splendide fuscæ , nonnihil ad fulvum vergentes. Uropygium infimum albicat. Scapulares superiores maximâ longitudine pollent , in acumen desinunt , & ad uropygium extremum usque protenduntur. Caput ad latera , collumque inferius & ad latera tingit color griseo-fulvus : qui color in utroque capitis latere versùs occipitium usque extenditur ; ita ut eo in loco solummodo stricta sit tænia fusca , quâ connectitur color fuscus caput superius tingens cum fusco colore quo col-



lum superius imbuatur. Spatium ab oris angulis ad oculos utrinque contentum plumis denudatur. Guttur ex albo nonnihil ad fulvum inclinatur. Pectus & venter superius albo-argenteo imbuuntur colore. Imum ventrem & crura tingit griseus color. Latera griseo-fulvo & fusco, confusè mixtis, variegantur. Tectrices alarum inferiores omnes sunt candidæ; superiores omnes fuscæ. Alarum componunt viginti quinque remiges, quarum undecim primores griseo-fuscæ, scapo fusco præditæ: quatuor proximè sequentes, à duodecima scilicet ad decimam quintam usque inclusivè, concolores, attamen in exortu interiùs albæ; quæ albedo eò magis versùs remigis extremitatem protenditur, quò remix fit corpori vicinior: sex quæ novissimas istas sequuntur, à decima sexta scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, candidæ, in extremitate tamen exterius griseo-fuscæ; qui color eò minus spatium occupat, quò remix fit corpori finitima; sex autem istæ remiges maculæ insuper notantur griseo-fuscæ, versùs ipsarum extremitatem in latere in-

d'un blanc tirant un peu sur le fauve. La poitrine & le haut du ventre sont d'un blanc-argenté. Le bas-ventre est gris, ainsi que les jambes. Les côtés sont variés de gris-fauve & de brun, mêlés confusément ensemble. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches: toutes celles du dessus sont brunes. L'aile est composée de vingt-cinq plumes: les onze premières sont d'un gris-brun, & ont leur tige brune: les quatre suivantes, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la quinzième inclusivement, sont de la même couleur, excepté qu'elles sont blanches à leur origine du côté intérieur; le blanc s'étend d'autant plus loin vers le bout de la plume, qu'elle est plus proche du corps: les six qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la seizième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont blanches, excepté l'extrémité de leur côté extérieur, qui est d'un gris-brun; & il y a d'autant moins de cette dernière couleur, que la plume est plus proche du corps; ces six plumes sont de plus marquées d'une tache de gris-brun, placée sur leur côté intérieur vers leur extrémité, & qui est d'autant plus grande que la plume est



plus proche du corps : la vingt-deuxième & la vingt-troisième sont brunes , excepté leur origine , qui est blanche du côté intérieur : enfin les deux plus proches du corps sont entièrement brunes. La seconde des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. Le demi-bec supérieur est brun en-dessus , & d'un brun-rougeâtre sur les côtés ; l'inférieur est rougeâtre , excepté son bout qui est blanchâtre. Les pieds , les doigts & leurs membranes sont d'un brun tirant un peu sur le rougeâtre ; les ongles sont bruns , & bordés de blanchâtre par le bout. On la trouve dans les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

teriore positâ , & eò majore , quò remix fit corpori vicinior : vigesima secunda & vigesima tertia fusca , excepto exortu in latere interiore candido : binæ tandem corpori viciniore penitus fusca. Remix secunda omnium est longissima. Mandibula superior superne fusca , ad latera fusco - rubescens ; inferior rubescit , attamen in extremitate candicat. Pedes & digiti , sicut & ipsorum membranæ , ex fusco nonnihil ad rubescentem inclinant colore ; ungues verò fusci , albido in extremitate marginati. Flumina , piscinasque frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

#### A. LA GREBE DE RIVIERE NOIRASTRE.

*Colymbus fluviatilis nigricans.*

*Colymbi minoris aliud genus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 257. hujus icon satis accurata pag. 259.*

*Colymbus alter. Jonst. Avi. pag. 89. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48 , sub titulo , Colymbus minor.*

Elle est de la grandeur & de la grosseur de la précédente. Elle n'en diffère que parce que sa couleur est un peu plus foncée ou noirâtre. On la trouve dans les rivières & les étangs.

Magnitudine & crassitie cum præcedente convenit. Ab illo tantum discrepat colore paululum saturatiore sive nigricante. Flumina & piscinas frequentat.



## 10. LA GREBE DE RIVIERE DE LA CAROLINE.

*Colymbus fuscus*, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; pectore ad olivaceum vergente; gutture nigro; imo ventre fordidè albo; remigibus fuscis.... *COLYMBUS FLUVIATILIS CAROLINENSIS*.

*Colymbus pedibus lobatis*, corpore fusco, rostro fascia sesquialtera. Podiceps. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 68. sp. 4.*

*Colymbus fuscus. Klein. Avi. pag. 150. N°. 5.*

Foulque à bec varié. *Catesb. Tom. 1. pag. 91; avec une figure exacte Pl. 91.*

Les Anglois l'appellent *PIED BILL DOBCHICK. Catesb.*

Præcedentem paululùm crassitie superat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad uropygium extremum novem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues duodecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus unum pollicem cum octo lineis, intimus unum pollicem; posticus autem quinque lineas. Alæ complicatæ uropygium attingunt. Partes capitis & colli superiores tingit color saturatè fuscus. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque alarum tectrices fusco im-

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est d'environ neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur un pouce huit lignes, l'intérieur un pouce; & celui de derriere cinq lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au croupion. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un brun foncé. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un brun un peu moins foncé.



La gorge est noire. Les côtés de la tête & la partie inférieure du col sont d'un brun clair. La poitrine est de la même couleur, mais elle tire un peu sur l'olivâtre. Le ventre, les côtés & les jambes sont d'un blanc sale. Les plumes de l'aile sont brunes. Ses yeux sont assez grands, & entourés d'un cercle blanc. Le bec est gris, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est noire. Une bande de la même couleur entoure le bec vers le milieu de sa longueur. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont gris. On la trouve à la *Caroline*, où elle se tient dans les étangs.

buuntur paulò minùs saturato. Guttur nigrum est. Caput ad latera, collumque inferius sunt dilutè fusca. Pectus eodem colore tingitur, sed nonnihil ad olivaceum vergit. Venter, latera & crura sordidè albicant. Alarum remiges fusca. Oculi magni, quos ambit circulus albus. Rostrum griseum, excepto mandibulae inferioris exortu nigro. Tania similiter nigra mediam versùs longitudinem rostrum circumdat. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranae, unguisgue grisei. Habitat in *Carolina*, ibique piscinas frequentat.

\*\* II. LA GREBE DE RIVIERE DE S. DOMINGUE.

*Voyez Pl. V. Fig. 2.*

*Colymbus superne nigricans, infernè cinereo-albo-argenteus, maculis fuscis aspersus; collo inferiore griseo-fusco-nigricante; remigibus ab octava ad undecimam usque cinereo-albis . . . . COLYMBUS FLUVIATILIS DOMINICENSIS.*

Elle est beaucoup moins grosse que *notre Grebe de riviere*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est de sept pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins

*Colymbo fluviatili nostrati* multum crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad uropygium extremum septem pollices & decem lineas aequat, & ad extremos unguis decem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius



ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim cum ſemi lineas longum eſt; pes duodecim cum ſemi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & ſex cum ſemi lineas, extimus ſeſquipollicem, intimus quatuordecim lineas; poſticus autem quatuor lineas. Alis expanſis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & decem linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad uropygium uſque protendantur. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſum, uropygium & ſcapulares pennæ nigricant. Scapulares ſuperiores maximâ longitudine pollent, & uropygium ferè extremum pertingunt. Spatium ab oris angulis ad oculos utrinque contentum plumis eſt denudatum. Caput ad latera, guttur, collumque inferiùs & ad latera ſunt ſaturatè grifeo-fuſca & ferè nigricantia. Pectus, venter, latera & crura colore tinguntur cinereo-albo-argenteo, minutis maculis fuſcis aſperſo. Feſtrices alarum inferiores omnes ex cinereo albicant. Superiores minores, ſicut & majores corpori finitimæ, ſunt nigrican-

de la bouche a treize lignes & demie de longueur; ſon pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce ſix lignes & demie, l'extérieur dix-huit lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derriere quatre lignes. Elle a treize pouces dix lignes de vol; & ſes aîles, lorsqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au croupion. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les plumes ſcapulaires ſont noirâtres. Les ſcapulaires ſupérieures ſont fort longues, & s'étendent preſque juſqu'au bout du croupion. L'eſpace contenu de chaque côté depuis les coins de la bouche juſqu'aux yeux, eſt dégarni de plumes. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col ſont d'un gris-brun foncé & preſque noirâtre. La poitrine, le ventre, les côtés & les jambes ſont d'un gris-blanc-argenté, tout parſemé de petites taches brunes. Toutes les couvertures du deſſous des aîles ſont d'un gris-blanc. Les petites du deſſus, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont noirâtres: les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un gris-brun. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plu-



mes : les sept premières sont d'un gris-blanc à leur origine & d'un gris-brun vers leur extrémité ; cette dernière couleur occupe beaucoup plus d'espace sur le côté extérieur que sur l'intérieur ; & ces plumes ont d'autant plus de gris-blanc , qu'elles sont plus proches du corps ; de façon que la septième n'a qu'une petite tache de gris-brun vers son extrémité : les quatre suivantes , sçavoir depuis la huitième jusqu'à l'onzième inclusivement , sont entièrement d'un gris-blanc ; cependant les trois premières de celles-là sont marquées d'une ligne grise , qui s'étend sur leur côté extérieur tout le long de leur tige : les trois qui suivent ces dernières , sçavoir depuis la douzième jusqu'à la quatorzième inclusivement , sont grises du côté extérieur , & d'un gris-blanc du côté intérieur : les cinq suivantes , sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement , sont d'un gris-blanc , & bordées de gris seulement vers leur bout du côté extérieur ; cette couleur grise occupe d'autant plus d'espace , & est d'autant plus foncée , que la plume est plus proche du corps : les trois suivantes , sçavoir depuis la vingtième jusqu'à la vingt-deuxième inclusivement , sont d'un gris-

tes : majores à corpore remotiores griseo-fuscæ. Vingtiquatuor remigibus ala conflatur : septem primores in exortu cinereo-albæ , versus ipsarum extremitatem griseo-fuscæ ; color autem griseo-fuscus majus in latere exteriori spatium occupat quam in interiore ; & remiges istæ eò magis cinereo-albo tinguntur , quò fiunt corpori viciniore ; ita ut septima minurâ tantummodo maculâ griseo-fuscâ versus extremitatem notetur : quatuor proximè sequentes , ab octava scilicet ad undecimam usque inclusivè , penitus cinereo-albæ ; ex istis tamen tres primores lineâ insigniuntur griseâ , in latere exteriori secundum scapi longitudinem ductâ : tres quæ novissimas istas sequuntur , à duodecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè , in latere exteriori griseæ , in latere interiore cinereo-albæ : quinque proximè sequentes , à decima quinta scilicet ad decimam nonam usque inclusivè , cinereo-albæ , & solummodo versus apicem in latere exteriori griseo-simbriatæ ; qui color griseus eò majus spatium occupat , &



ed saturation est, quò remix fit corpori vicinior : tres quæ sequuntur, à vigesima scilicet ad vigesimam secundam usque inclusivè, in exortu cinereo-albæ, griseo-nigricante terminatæ; qui griseo-nigricans color majus spatium in latere exteriorè quàm in interiorè occupat : binæ tandem corpori finitimæ nigricant. Remix tertia reliquarum omnium longitudinem excedit. Rostrum nigrum. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, fusci; ungues verò nigricantes, albedo in extremitate fimbriati. Habitat in *Dominicensi Insula*; unde in *museum Realmurianum* missus est à *D. Chervain*.


blanc à leur origine, & terminées de gris-noirâtre, cette couleur occupant plus d'espace du côté extérieur que du côté intérieur : enfin les deux plus proches du corps sont noirâtres. La troisième des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. Le bec est noir. Les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont bruns; les ongles sont noirâtres, & bordés de blanchâtre par le bout. On la trouve à *S. Domingue*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.











2. *Petite Grebe huppée.*









Designé et Gravé par Maréchal.

1. Grèbe. 2. Petite Grèbe hupée.

















Designé et Gravé par Martinot.

*Grebe hupée.*









de riviere de S. Domingue.









1. Grebe Cornue.

2. Grebe de riviere de S. Domingue.









## ORDO XX. ORDRE XX.

A V E S

LES OISEAUX

*Digitis tribus anticis, membranis integris inter se connexis, digito postico nullo: cruribus ad podicem positis, & intra abdomen conditis, præditæ.*

*Qui ont trois doigts devant, tous joints ensemble par des membranes entieres, & point de doigt derriere: & les jambes placées tout-à-fait derriere, & cachées dans l'abdomen.*

**H**UJUS Ordinis Avium aliæ rostro donantur recto, acuto; aliæ rostro lateraliter plano, & transversim striato præditæ sunt. In duas sectiones dividimus: in prima continentur illæ quæ rostro donantur recto & acuto, ut *Uria*: in secunda verò eæ quæ rostrum habent lateraliter planum, transversim striatum, ut *Fratercula*, *Alca*.

**P**ARMI les Oiseaux de cet Ordre, les uns ont le bec droit & pointu; les autres ont le bec applati par les côtés, & cannelé transversalement. Je les divise en deux sections: dans la premiere sont ceux dont le bec est droit & pointu, comme le *Guillemot*: & dans la seconde ceux dont le bec est applati par les côtés, & cannelé transversalement, comme le *Macareux*, le *Pingoin*.

### SECTIO I.

*Eæ quæ rostrum habent rectum, acutum.*

**I**N illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Uria*.

### SECTION I.

*Ceux dont le bec est droit & pointu.*

**C**ETTE section ne contient qu'un seul genre, qui est celui du *Guillemot*.



*Genre du Guillemot.**Genus Uria.*

Son caractère est d'avoir  
Trois doigts devant, tous joints  
ensemble par des membranes  
entieres; & point de doigt  
derriere :

Les jambes placées tout-à-fait  
derriere, & cachées dans  
l'abdomen :

Le bec droit & pointu.

Hujus character est  
Digiti tres antici, membra-  
nis integris inter se con-  
nexi; digitus posticus nul-  
lus :

Crura ad podicem posita,  
& intra abdomen con-  
dita :

Rostrum rectum, acutum.

## \*\* I. LE GUILLEMOT.

*Voyez Pl. VI. Fig. 1.*

*Uria superne fusco-nigricans, infernè alba; gutture & collo inferiore fusco-nigricantibus; remigibus minoribus apice albis; reëtricibus fusco-nigricantibus . . . . URIA.*

*Uria. Gefn. Avi. pag. 129.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 260.*

*Jonst. Avi. pag. 90.*

*Alca rostro lævi oblongo; mandibula superiore margine flavescente.*

*Lomvia. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 63. sp. 4.*

*Lomwia. Clus. Exot. Aucuar. pag. 367.*

*Euf. Nieremb. pag. 236.*

*Jonst. Avi. pag. 129.*

*Lomwia Intulæ Farræ Hoieri. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

*Willugh. Ornith. pag. 244. hujus icon satis accurata Tab. LXV, sub titulo, Lomwia Hoieri.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 120. N°. 4.*

*Jomuvia. Charlet. Exer. pag. 102. N°. 12.*

*Lomben. Klein. Avi. pag. 148. N°. 8.*

*Klein. Avi. pag. 168. N°. III.*

*Cataractes. Moehr. Avi. Gen. 75.*

*Plautus rostro Larino. Klein. Avi. pag. 146. N°. 2.*



Poule de mer. *Alb. Tom. I. pag. 74 ; avec une figure mauvaise & mal colorée Pl. 84.*

*Les Grecs l'appellent ὀψα. Gefn.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë, LOMWIA. Cluf. Nieremb. LAMVIER.*

*Les Norvegois, LANGIRIE ; LOMGIRIE ; LOMVIFIRE.*

*Les Anglois, GUILLAM. Charlet. GUILLEMOT FROM GREENLAND. Alb.*

*Les Habitans de la Principauté de Galles, GUILLEM. Willugh. Raj.*

*Les Habitans du Comté de Northumberland, GUILLEMOT ou SEA-HEN. Willugh. Raj.*

*Les Habitans de la Province de Duresme, GUILLEMOT ou SEA-HEN. Willugh. Raj.*

*Les Habitans de la Province d'York, SKOUT. Willugh. Raj.*

*Les Habitans de la Province de Cornouailles, KIDDAW. Willugh. Raj.*

Cum *Anate* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices æquat, & ad extremos ungues octodecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & novem lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pes unum pollicem & quinque lineas; trium digitorum medius cum ungue unum pollicem & undecim lineas, extimus unum pollicem cum decem lineis, & intimus septemdecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes

Il est à peu près de la grosseur d'un *Canard*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix-huit pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces neuf lignes de long; sa queue deux pouces deux lignes; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts, joint avec l'ongle, un pouce onze lignes, l'extérieur un pouce dix lignes, & l'intérieur dix-sept lignes. Il a un pied onze pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun-



noirâtre. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les petites & les moyennes couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur : les plus grandes sont cendrées, & bordées de blanc. L'aile est composée de vingt-huit plumes : les dix premières sont d'un brun-noirâtre, & ayant une partie de leur côté intérieur d'un gris-blanc ; les trois premières ont aussi leur tige blanche jusque vers leur extrémité : les seize suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-sixième inclusivement, sont d'un brun-noirâtre, & terminées de blanc, cette dernière couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps : enfin les deux plus proches du corps sont entièrement d'un brun-noirâtre. La queue est composée de douze plumes d'un brun-noirâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté qui est la plus courte. La couleur noirâtre de ces Oiseaux est plus ou moins foncée en différens individus. Le bec est noir : le bout de

usque protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ rectrices ex fusco-nigricant. Pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obtegentes alben. Rectrices alarum inferiores minimæ & mediæ sunt similiter candidæ : majores cinereæ, albo fimbriatæ. Alam componunt viginti octo remiges : decem primores sunt fusco-nigricantes, attamen in latere interiore partim cinereo-albæ ; tres primores scapo quoque donantur versùs extremitatem usque candido : sexdecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè, fusco-nigricantes, albo terminatæ ; quæ albedo eò majus spatium occupat, quò remix fit corpori vicinior : binæ tandem corpori finitimæ penitus ex fusco nigricant. Duodecim rectricibus fusco-nigricantibus cauda conflatur. Binæ intermediæ lateraliū longitudinem paululūm excedunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. In variis istarum Avium individuīs color



lor nigricans modò plus  
modò minùs est saturatus.  
Rostrum nigrum : hujus au-  
tem utraque mandibula est  
ad apicem utrinque nonni-  
hil emarginata. Pedes, di-  
giti, sicut & ipsorum mem-  
branæ, unguisque nigri. Ha-  
bitat in Septentrionalibus re-  
gionibus. Prope mare in re-  
pibus inaccessis nidificat.  
Uno incubitu ovum unicum  
ponit, ovum Anserinum  
crassitie æquans, viridescens,  
maculisque irregularibus ni-  
gricantibus varium. A *Kil-  
da Insula* in *musæum Real-  
murianum* missa à *D. Mor-*  
*ton.*

ses deux mandibules est un peu  
échancré de chaque côté. Les  
pieds, les doigts & leurs mem-  
branes, & les ongles sont noirs.  
On le trouve dans les pays du  
Nord. Il fait son nid près de  
la mer sur les rochers escarpés.  
Il ne pond à chaque couvée  
qu'un œuf gros comme celui  
d'une Oye, verdâtre & varié de  
taches irrégulières noirâtres. Il  
a été envoyé de l'*Isle S. Kilda*  
à *M. de Reaumur* par *Milord*  
*Morton.*

**\*\* 2. LE PETIT GUILLEMOT.**

*Uria superne nigricans, infernè alba; (gutturè & collo infe-  
riore nigricantibus mas); (gutturè albo; collo inferiore  
obscurè cinereo fœmina); remigibus minoribus apice albis;  
rectricibus nigricantibus . . . URIA MINOR.*

*Alca rostro lævi conico, abdomine fasciaque alarum alba, pedibus  
nigris. Alle. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 63. sp. 6.*

*Arctica. Moehr. Avi. Gen. 69.*

*Mergulus melanoleucos rostro acuto brevi D. Brown. Willugh. Ornith.  
pag. 261. fœminæ icon non satis accurata Tab. LIX.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 125. N°. A. 5.*

*Plautus Columbarius. Klein. Avi. pag. 146. N°. 1.*

*Duyf Martensii. Klein.*

*Rottge of Rotttetterje. Klein. Avi. pag. 148. N°. 11.*

*Rotge of Rotttetergen. Klein. Avi. pag. 169. N°. VI.*

*Tourterelle de mer. Alb. Tom. 1. pag. 74; avec une figure mal coloriée  
du mâle Pl. 85.*

*Petit Plongeon noir & blanc. Edwards. Tom. II. pag. XCI; avec des  
figures assez exactes du mâle & de la femelle Pl. 91.*

*Tom. VI,*

**K.**



*Les Anglois l'appellent* GREENLAND DOVE; SEA TURTLE. *Alb.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë, FULD-KOPPE.*

Il est à peu près de la grosseur d'un Pigeon. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue un pouce six lignes; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur treize lignes, & l'intérieur dix lignes. Il a treize pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont noirâtres. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessous des aîles sont d'un cendré-brun: les grandes sont blanches. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun-noirâtre: les moyennes sont de la même couleur, & terminées de blanc, excepté cependant les quatre plus pro-

*Columbam* crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices explet, & ad extremos unguis novem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda unum pollicem & sex lineas; pes undecim lineas; trium digitorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus tredecim lineas, & intimus decem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigricantes. Scapulares, quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ testrices concolores. Pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus cooperientes albicant. Testrices alarum inferiores minores sunt cinereo-fuscæ: majores candidæ. Remiges majores fusco-nigricantes: minores eodem imbutæ colore, albo termina-



tæ, exceptis tamen quatuor corpori vicinioribus per totam longitudinem nigricantibus. Caudam componunt quatuordecim rectrices similiter nigricantes. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum nigrum : hujus autem utraque mandibula est ad apicem utrinque nonnihil emarginata. Pedes & digiti sunt obscurè rubescentes : ipsorum membranæ nigricantes; ungues verò nigri.

*Fœmina* à *mare* discrepat gutture albo, albedine scilicet utrinque versùs occipitium usque ascendente. Pars colli inferior est obscurè cinerea; qui color sensim atque sensim, versùs pectus procedendo, fit dilutior. Pennæ omnes alas subtus obtegentes sunt cinereo-fuscæ. In reliquis cum *mare* perfectè convenit.

*Mare* plenum plerumque petit hæc Avis, & rarò juxta littora versatur. Ab *Insula Ferroensi* ad *D. de Marigni* missa est à *D. Thuro*.

ches du corps, qui sont noirâtres dans toute leur longueur. La queue est composée de quatorze plumes de la même couleur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir : le bout de ses deux mandibules est un peu échancré de chaque côté. Les pieds & les doigts sont d'un rougeâtre sombre : les membranes sont noirâtres; & les ongles noirs.

La *femelle* diffère du *mâle* en ce qu'elle a la gorge blanche; cette couleur remontant de chaque côté jusque vers l'occiput. La partie inférieure de son col est d'un cendré obscur; mais qui s'éclaircit peu à peu, en approchant de la poitrine. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont d'un cendré-brun. Du reste elle ressemble parfaitement au *mâle*.

Cet Oiseau se tient ordinairement en pleine mer, & approche rarement des côtes. Il a été envoyé de l'*Isle Ferroë* à *M. le Marquis de Marigni* par *M. Thuro*.



**\*\* 3. LE PETIT GUILLEMOT NOIR, APPELÉ VULGAIREMENT  
COLOMBE DE GROENLAND.**

*Uria nigricans* ; *rectricibus alarum superioribus mediis*, & *majoribus corpori finitimis candidis* ; *rectricibus nigricantibus* . . . . *URIA MINOR NIGRA*, *COLUMBA GROENLANDICA* VULGO DICTA.

*Uria. Moehr. Avi. Gen. 73.*

*Alca* rostro lævi subulato , abdomine maculaque alarum alba , pedibus rubris. *Grylle. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 63. sp. 5.*

*Colymbus* pedibus tridactylis palmatis. *Faun. Suec. Linn. N°. 124.*

*Columba Groenlandica. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 51. sp. 4.*

*Columba Groenlandica dicta. Willugh. Ornith. pag. 245.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

*Columba Groenlandica Hollandis. Raj. Syn. Avi. pag. 121. N°. 6.*

*Columbus Groenlandicus. Klein. Avi. pag. 168. N°. II.*

*Pigeon du Groenland. Andersf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. pag. 54 ; avec une figure assez exacte Pl. I.*

*Colombe de Groenland. Alb. Tom. II. pag. 53 ; avec une figure passable du mâle Pl. 80. ( Le bec est cependant trop court ).*

*Les Suédois l'appellent SJOE-ORRE ; GRISLA. Linn.*

*Les Habitans de l'Isle de Gothland, GRYLLE ; GRAUTLE. Linn.*

*Les Habitans de l'Isle d'Oeland, ALLE. Linn.*

*Les Anglois, GREENLAND-DOVE. Willugh. Raj. Alb. SEA-TURTLE. Raj. SEA-TURTLE-DOVE. Willugh. Sibbald.*

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes & demie de long ; sa queue un pouce neuf lignes ; son pied un pouce ; celui du milieu des trois doigts , joint avec l'on-

*Craffitie præcedentem paululum antecellit. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem duodecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octodecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & novem lineas ; pes unum pollicem; trium digito-*



rum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, & intimus tredecim cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & septem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ ferè pertingunt. Caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ nigricantes. Scapulares, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Pennæ omnes alas subtus obtegentes albicant. Tectrices alarum superiores minimæ sunt nigricantes: mediæ, sicut & majores corpori viciniore, candidæ: majores à corpore remotiores in latere exteriori fuscæ, in latere interiore & apice albæ. Viginti novem remigibus ala constat: decem primores fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte candidæ: quindecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam quintam usque inclusivè, in latere exteriori fuscæ, in interiore candidæ, candido quoque terminatæ; maculâ insuper donantur fuscâ, versus ipsarum extremitatem in

gle, un pouce sept lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, & l'intérieur treize lignes & demie. Il a un pied sept pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes noirâtres. Les scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Toutes les couvertures du dessous des aîles sont blanches. Les plus petites du dessus sont noirâtres: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches: les grandes les plus éloignées du corps sont brunes du côté extérieur, & blanches du côté intérieur & à leur bout. L'aîle est composée de vingt-neuf plumes: les dix premières sont brunes, ayant la plus grande partie de leur côté intérieur blanche: les quinze suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-cinquième inclusive-ment, sont brunes du côté extérieur, blanches du côté intérieur, & terminées de cette dernière couleur; elles ont aussi une tache brune sur leur côté intérieur, placée vers leur extrémité; cette tache devient toujours de plus petite en plus



petite depuis l'onzième plume jusqu'à la dix-neuvième, ensuite sa grandeur augmente depuis la vingtième plume jusqu'à la vingt-cinquième, dont le côté intérieur n'est blanc qu'à son origine : les quatre plus proches du corps sont noirâtres. La queue est composée de quatorze plumes de la même couleur : les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir : le bout de ses deux mandibules est un peu échancré de chaque côté. Les pieds, les doigts & leurs membranes sont rouges ; & les ongles noirs. On le trouve dans les mers du Nord. Il se tient ordinairement en pleine mer, & approche rarement des côtes. Il a été envoyé de l'*Ile S. Kilda* à *M. de Reaumur* par *Milord Morton*.

*A Kilda Insula in museum Realmurianum missa à D. Morton.*

latere interiore positâ ; quæ macula ab undecima remige ad decimam nonam usque magis magisque minuitur, deinde vero majorem acquirit magnitudinem à vigesima remige ad vigesimam quintam, cujus novissimæ latus interius non nisi in exortu albicat : quatuor corpori finitimæ nigricant. Quatuordecim rectricibus similiter nigricantibus cauda conflatur. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum nigrum : hujus autem utraque mandibula est ad apicem utrinque nonnihil emarginata. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri ; ungues verò nigri. Habitat in mare Septentrionali. Mare plenum plerumque petit, & rarò juxta littora versatur.

#### 4. LE PETIT GUILLEMOT RAYÉ.

*Uria superne nigricans, nigro saturatiore transversim striata, infernè alba, tæniis transversis cinereis varia ; tectricibus alarum superioribus mediis candidis, nigro variegatis ; rectricibus nigris . . . . URIA MINOR STRIATA.*



*Plautus Columbarius. Klein. Avi. pag. 146. N<sup>o</sup>. 1.*

*Colombe tachetée de Groenlande. Edwards. Tom. I. pag. L ; avec une figure exacte Pl. 50.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octodecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & novem lineas; pes undecim lineas; trium digitorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus quatuordecim lineas, & intimus undecim lineas. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt nigricantes, nigro saturatiore transversim striatæ. Caput ad latera, guttur, collum inferius & ad latera, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices albicant, tæniisque variegantur transversis cinereis, non multum conspicuis. Laterrum infima pars quibusdam insuper maculis nigricantibus insignitur. Rectrices ala-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes & demie de long; sa queue un pouce neuf lignes; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur quatorze lignes, & l'intérieur onze lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête, le dessus du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noirâtre rayé transversalement d'un noir plus foncé. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc varié de bandes transversales cendrées peu apparentes. Le bas des côtés est de plus marqué de quelques taches noirâtres. Les plus petites couver-



tures du dessus des aîles sont noires : les moyennes sont blanches & variées de noir : les grandes les plus proches du corps sont noires, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont entièrement noires. Toutes les plumes de l'aîle, ainsi que celles de la queue, sont de cette dernière couleur. Le bec est noir. Les pieds, les doigts & leurs membranes sont d'un couleur de chair sale ; & les ongles noirs. Le côté intérieur du doigt intérieur est garni dans toute sa longueur d'une petite membrane. On le trouve dans les mers du Nord.

rum superiores minimæ nigrae : mediae candidæ, nigro variegatæ : majores corpori viciniore nigrae, albo terminatæ : majores à corpore remotiores penitus nigrae. Remiges alarum omnes, sicut & rectrices, nigro pariter imbutæ. Rostrum nigrum. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, sordide carneo colore tincti ; ungues verò nigri. Digitus intimus per totam lateris interioris longitudinem membranulâ donatur. Habitat in mare Septentrionali.

## SECTION II.

## SECTIO II.

*Ceux dont le bec est applati par les côtés, & cannelé transversalement.*

*Eæ quæ rostrum habent lateraliter planum, transversim striatum.*

CETTE section contient deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par l'épaisseur de leur bec, proportionnellement à sa longueur. Les uns ont le bec aussi épais que long, comme le *Maca-reux* : les autres ont le bec plus long qu'épais, comme le *Pingoin*.

BINA in illa sectione continentur genera Avium rostri crassitie, longitudinis proportionem servatâ ; à se invicem discrepantium. In aliis enim rostri crassities longitudinem æquat, ut in *Fratercula* : in aliis verò rostri longitudo crassitiem superat, ut in *Alca*.



XCIII.

XCIII.

*Genus Fratercula.*

*Genre du Macareux.*

Hujus character est  
 Digiti tres antici, membra-  
 nis integris inter se con-  
 nexi; digitus posticus nul-  
 lus:

Crura ad podicem posita, &  
 intra abdomen condita:

Rostrum lateraliter planum,  
 transversim striatum, cu-  
 jus crassities longitudi-  
 nem aequat.

Son caractère est d'avoir  
 Trois doigts devant, tous joints  
 ensemble par des membranes  
 entières; & point de doigt  
 derriere:

Les jambes placées tout-à-fait  
 derriere, & cachées dans  
 l'abdomen:

Le bec applati par les côtés,  
 cannelé transversalement, &  
 aussi épais que long.

**\*\* I. LE MACAREUX.**

**• Voyez Pl. VI. Fig. 2.**

Fratercula superne nigra, infernè alba; capite ad latera, gut-  
 tureque sordide albo-griseis; torque nigro; rectricibus ni-  
 gricantibus. . . . FRATERCULA.

Alca rostri sulcis quatuor, oculorum regione temporibusque albis.  
*Faun. Suec. Linn. N°. 118.*

Alca rostro compresso-ancipiti sulcato sulcis quatuor, oculorum orbita  
 temporibusque albis. Alca Arctica. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 63.*  
*sp. 3.*

Arctica. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 52. sp. 1.*

Anas Arctica. *Clus. Exot. Lib. V. cap. X. pag. 104, in qua hujus icon*  
*fatis accurata.*

Anas Arctica Clusii. *Mus. Worm. pag. 302.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20. hujus icon minimè ac-*  
*curata Tab. 16. fig. 1.*

Anas Arctica Clusii; Pica marina, vel Fratercula Gefneri, Aldro-  
 vandi. *Willugh. Ornith. pag. 244. hujus icon non satis accurata*  
*Tab. LXV.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 120. N°. A. 5.*

Pica marina. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 215.*

*Tom. VI.*

L



Plautus Arcticus. *Klein. Avi. pag. 146. N<sup>o</sup>. 3.*

Puffinus. *Charlet. Exer. pag. 107. N<sup>o</sup>. XV.*

*Charlet. Onomazt. pag. 101. N<sup>o</sup>. XV.*

Puffinus Anglicus. *Gesn. Avi. pag. 113.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 238.*

Puphinus Anglicus. *Gesn. Avi. pag. 725, in qua hujus icon non satis accurata.*

Puphinus vulgò ab Anglis dictus. *Gesn. icon. Avi. pag. 80, in qua eadem icon.*

Spheniscus. *Moehr. Avi. Gen. 64.*

Lunda. *Cluf. Exot. Auduar. pag. 367.*

*Euf. Nieremb. pag. 236.*

*Jonst. Avi. pag. 129.*

Papegey Duycker. *Klein. Avi. pag. 169. N<sup>o</sup>. VIII.*

Perroquet du Groenland. *Anderf. Hist. de l'Isl. & de Gro. Tom. II. pag. 55; avec une assez bonne figure Pl. 1.*

Plongeon ou Pie de mer à gros bec. *Alb. Tom. II. pag. 52; avec des figures mal colorées Pl. 78 & 79.*

*Les François l'appellent PERROQUET DE MER.*

*Les Norvegeois, LUND.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë, LUNDA. Cluf. Nieremb. Worm. Willugh. Raj. Linn. LUND.*

*Les Anglois, PUFFIN. Gesn. Aldrov. Charlet. Alb.*

*Les Anglois Septentrionaux qui habitent aux environs de l'embouchure du Fleuve Tesa, COULTERNEB. Willugh. Raj. Alb. COUNTERNEB. Willugh. Raj.*

*Les Anglois qui habitent la Province de Cornouailles, POPE. Willugh. Raj.*

*Les Habitans de la Province d'York, aux environs de Scarborough, MULLET. Willugh. Raj.*

*Les Habitans de la partie Septentrionale de la Principauté de Galles, PUFFIN. Willugh. Raj.*

*Les Habitans de la partie Méridionale de la Principauté de Galles, GULDEN-HEAD; BOTTLENOSE; HELEGUG. Willugh. Raj.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Guillemot*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec, qui a à sa base un pouce cinq lignes & demie d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins

*Uria paululum* crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem explet, & ad extremos ungues tredecim pollices. Rostrum, quod ad basim unius pollicis & quinque cum semi linearum crassitiem obtinet, ab ipsius



apice ad oris angulos quindecim lineas longum est, & figuram triangularem circiter æmulatur. Cauda unum pollicem & octo lineas longa est; pes duodecim lineas; trium digitorum medius cum ungue unum pollicem cum octo lineis, extimus octodecim cum semi lineas, & intimus tredecim lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis septem pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium nigro tinguntur: qui color in utroque colli latere protenditur, & in ipsius inferiore parte, immediate infra guttur, transversam efformat tæniam unum circiter pollicem latam; unde Avis torque quodammodo donatur. Pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ tectrices eodem imbuuntur nigro ac dorsum ipsum tingitur. Caput ad latera, gutturque tingit color sordide albo-griseus; in quo colore collocantur oculi. Pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus

de la bouche quinze lignes de long, & est d'une figure à peu près triangulaire. Sa queue est longue d'un pouce huit lignes; son pied d'un pouce; celui du milieu des trois doigts, joint avec l'ongle, a un pouce huit lignes de long, l'extérieur dix-huit lignes & demie, & l'intérieur treize lignes. Il a un pied sept pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont noirs: cette couleur s'étend de chaque côté du col, & forme dans sa partie inférieure, immédiatement sous la gorge, une bande transversale d'environ un pouce de largeur; ce qui fait à l'Oiseau une espece de collier. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont du même noir que le dos. Les côtés de la tête & la gorge sont d'un blanc sale & grisâtre. Les yeux sont placés dans cette couleur. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs; il y a cependant une partie des côtés qui est noirâtre. Les plus petites couvertures du dessous



des aîles sont de cette dernière couleur : les moyennes & les grandes sont d'un cendré-brun. L'aîle est composée de vingt-six plumes : les dix premières sont noirâtres : les douze suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-deuxième inclusivement, sont noires du côté extérieur, & d'un noirâtre clair du côté intérieur : les quatre plus proches du corps sont entièrement noires. La queue est composée de seize plumes noirâtres. Les yeux sont noirs : leur iris est de couleur de cendre : leurs paupières sont noires. Au-dessus de la supérieure est une petite excroissance de chair d'une couleur livide & de figure triangulaire. La bête du demi-bec supérieur est garnie d'une substance calleuse, après laquelle le bec est d'une couleur livide ; le reste en est rouge. De chaque côté sont pratiquées trois rainures, sçavoir une immédiatement après la partie livide, & deux dans la partie rouge. Les narines sont oblongues, & placées dans la partie livide tout auprès de l'ouverture du bec. Le demi-bec supérieur est un peu crochu à son bout. Les pieds, les doigts & leurs membranes sont d'un bel orangé dans les uns, & rouges dans d'autres ;

cooperientes albicant ; latera tamen partim nigricant. Inferiores alarum tectrices minimæ sunt quoque nigricantes : mediæ , majoresque cinereo - fuscæ. Vingt-six remigibus ala conflatur : decem primores nigricantes : duodecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam secundam usque inclusivè, in latere exteriori nigræ ; in interiore dilutè nigricantes : quatuor tandem corpori viciniore penitus nigræ. Caudam componunt sexdecim rectrices nigricantes. Oculi sunt nigri : ipsorum irides cinereo colore imbutæ : palpebræ nigræ. Supra autem superiorem palpebram exiguum extat incrementum carnosum, colore livido imbutum, & triangularis figuræ æmulum. Mandibulæ superioris basis substantiâ oblitata est callosâ, ultra quam rostrum tingit color lividus ; in reliqua verò longitudine rostrum rubet. Rostrum autem tribus utrinque exaratur fulcis, uno scilicet immediatè ultra partem livido colore imbutam, duobus verò in parte rubra collocatis. Nares sunt oblongæ, in livida parte prope rictum oris





2. *Macareux*.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Guillemot.

2. Macaroux.







LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XX.* 85

positæ. Mandibula superior est nonnihil apice adunca. Pedes & digiti, sicut & ipforum membranæ, sunt in aliis eleganter aurantii, in alteris verò rubri; ungues autem nigro-cœrulescentes. In *Septentrionalibus* regionibus habitat. In rupium foraminibus terrâ præditi nidificat; & ovum unicum unâ vice ponit. *Ex museo Reaumuriano.*

les ongles sont d'un noir-bleuâtre. On le trouve dans les pays *Septentrionaux*. Il fait son nid dans les trous des rochers, dans lesquels il y a de la terre; & ne pond qu'un œuf à chaque couvée. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

XCIV.

*Genus Alcæ.*

Hujus character est  
Digiti tres antici, membranis integris inter se connexi; digitus posticus nullus :  
Crura ad podicem posita, & intra abdomen condita :  
Rostrum lateraliter planum, transversim striatum, cujus longitudo crassitiem superat.

XCIV.

*Genre du Pingoin.*

• Son caractère est d'avoir  
Trois doigts devant, tous joints ensemble par des membranes entières; & point de doigt derrière :  
Les jambes placées tout-à-fait derrière, & cachées dans l'abdomen :  
Le bec applati par les côtés, cannelé transversalement, & plus long qu'épais.

\*\* I. LE GRAND PINGOIN.

*Voyez Pl. VII.*

Alca superne nigra, infernè alba; maculâ utrinque rostrum inter & oculos ovatâ candidâ; gutture & colli inferioris parte supremâ nigris; remigibus minoribus albo in apice marginatis; rectricibus nigris . . . ALCA MAJOR.

Alca rostri sulcis octo; macula alba ante oculum. *Faun. Suec. Linn.*  
Nº. 119.



- Alca rostro compresso-ancipiti sulcato macula ovata utrinque ante oculos. Alca impennis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 63. sp. 2.*
- Alca torquata, subtus albicans, superne nigricans. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. VI. sp. 1.*
- Pinguin. *Mus. Worm. pag. 300. hujus icon non satis accurata pag. 301.*
- Pinguin Nautis nostratibus dicta. *Willugh. Ornith. pag. 242. hujus icon à Wormio mutuata Tab. LXV.*
- Pinguin Nautis nostratibus, quæ Goifugel Hoieri esse videtur. *Raj. Syn. Avi. pag. 118. N° 1.*
- Chenalopex. *Moehr. Avi. Gen. 68.*
- Mergus Americanus. *Clus. Exot. Lib. V. cap. VII. pag. 103, in qua hujus icon minimè accurata.*
- Euf. Nieremb. pag. 215, in qua hujus icon à Clusio mutuata.*
- Willugh. Ornith. hujus icon à Clusio mutuata Tab. XLII.*
- Charlet. Exer. pag. 102. N° 10.*
- Charlet. Onomazt. pag. 96. N° 10.*
- Anser Magellanicus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 52. sp. 2.*
- Goifugel. *Clus. Exot. Aucuar. pag. 367.*
- Goifugel. *Euf. Nieremb. pag. 237.*
- Jonst. Avi. pag. 129.*
- Pinguin du Nord. *Edwards. Tom. III. pag. CXLVII; avec une figure exacte Pl. 147.*
- Les Suédois l'appellent PENGWIN. *Linn.*
- Les Anglois, NORTHERN PENGWIN. *Edwards.*
- Les Habitans de l'Isle Ferroë, GOIRFUGEL. *Clus. GOIFUGEL. Nieremb.*

Il approche de la grosseur de l'Oye domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces. Son bec, qui a dix-huit lignes & demie d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche quatre pouces trois lignes de long; sa queue trois pouces; son pied deux pouces une ligne & demie; celui du milieu des trois doigts, joint avec l'ongle,

Ad Anseris domestici crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem undecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues duos pedes & totidem pollices. Rostrum, quod quidem octodecim cum semi lineas crassum, ab ipsius extremitate ad oris angulos usque quatuor pollices & tres lineas longum est; cauda tres pollices; pes viginti quinque cum semi li-



neus; trium digitorum medius cum ungue tres pollices cum linea unica; extremus eandem obtinet longitudinem; intimus autem duos pollices & quatuor lineas longus. Nunquam volat hæc Avis; corporis enim ipsius crassitie proportionem servatâ, alas habet valde breves: quælibet scilicet, ab ipsius exortu ad extremitatem usque, novem pollicum & sex tantummodo linearum longitudine pollet. Caput, guttur, collum, dorsum & uropygium cooperiunt pennæ splendide nigra, serici instar, mollissimæ. Quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ tectrices similiter nigro tinguntur. In utroque capitis latere, mandibulæ superioris exortum inter & oculum, majuscula extat macula candida, ovata figuræ circiter æmula, cujus major diameter sexdecim linearum longitudinem obtinet. Pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores albescent; albedo autem supra partem colli inferiorem in acumen ascendit. Pennæ alas subtus obtegentes sunt sordide albæ, aut ex albo griseæ. Alam componunt tri-

trois pouces une ligne; l'extérieur est de la même longueur; & l'intérieur a deux pouces quatre lignes de long. Cet Oiseau ne vole jamais, ses ailes étant extrêmement courtes proportionnellement à la grosseur de son corps; puisque chacune n'a, depuis son origine jusqu'à son extrémité, que neuf pouces six lignes de long. La tête, la gorge, le col, le dos & le croupion sont couverts de plumes d'un très-beau noir, & douces comme de la soie. Les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont pareillement noires. De chaque côté de la tête, entre l'origine du demi-bec supérieur & l'œil, est une assez grande tache blanche, qui a à peu près la figure d'un ovale, dont le grand diamètre a seize lignes de longueur. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs: cette couleur remonte en pointe sur la partie inférieure du col. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc sale ou grisâtre. L'aile est composée de trente plumes: les onze premières sont noires: les dix-huit suivantes, savoir depuis la douzième jusqu'à la vingt-neu-



vième inclusivement, sont de la même couleur, mais elles sont bordées de blanc par le bout : enfin la plus proche du corps est entièrement noire. La première des plumes de l'aile est fort courte : la seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de seize plumes noires, qui se terminent en pointe. Les deux du milieu sont les plus longues : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte que les deux du milieu d'un pouce huit lignes; ce qui rend la queue pointue. Le bec est noirâtre : sur chacun de ses côtés sont pratiquées huit rainures sur le demi-bec supérieur, & dix ou onze sur le demi-bec inférieur. Le demi-bec supérieur est un peu crochu à son bout; & l'inférieur est anguleux en-dessous. Les narines sont oblongues, & placées sous les plumes, tout auprès de l'ouverture du bec. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. On le trouve dans les mers du Nord. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ginta remiges, quarum undecim primores nigrae : octodecim proximè sequentes, à duodecima scilicet ad vigesimam nonam usque inclusivè, eodem imbutæ colore, sed albo in apice marginatae : corpori tandem vicinior penitus nigra. Remix prima valdè brevis est : secunda reliquarum omnium longitudinem antecellit. Sexdecim rectricibus nigris, in acumen desinentibus, cauda conflatur. Binæ intermediæ longiores : laterales autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis unius pollicis & octo linearum longitudine cedentem; unde fit cauda acuta. Rostrum nigricat : utrinque autem octo in mandibula superiore, & decem undecimve in mandibula inferiore sulcis exaratur. Mandibula superior est nonnihil extremitate adunca; inferior verò subtus angulosa. Nares sunt oblongæ, sub pennis, prope rictum oris, positæ. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranae, unguesque nigri. Habitat in mare Septentrionali. *Ex museo Realmuriano.*



**\*\* 2. LE PINGOIN.**

*Voyez Pl. VIII. Fig. 1.*

Alca superne nigra, infernè alba; lineâ utrinque à rostro ad oculos candidâ; gutture & colli inferioris parte supremâ fuliginosis; remigibus minoribus albo in apice marginatis; rectricibus nigricantibus . . . . ALCA.

Alca rostri fulcis quatuor; linea utrinque alba à rostro ad oculos.  
*Faun. Suec. Linn. N°. 120.*

Alca rostri fulcis quatuor, linea utrinque alba à rostro ad oculos.  
*Torda. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 63. sp. 1.*

Alca. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 52. sp. 3.*

Alca Hoieri, Clusii, Wormii Musei. *Raj. Syn. Avi. pag. 119. N°. A. 3.*

Alca. *Clus. Exot. Auctuar. pag. 367.*

*Euf. Nieremb. pag. 236.*

*Mus. Worm. pag. 303.*

*Jonst. Avi. pag. 129.*

Alca Hoieri. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

Alca Hoieri in epistola ad Clusium. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 433.*

Alca Hoieri in epistola ad Clusium, Wormii Musei. *Willugh. Ornith. pag. 243. hujus icones non satis accuratæ Tab. LXIV & LXV.*

Plautus tonfor. *Klein. Avi. pag. 47. N°. 5.*

Oiseau à bec tranchant. *Alb. Tom. III. pag. 40; avec une figure passable Pl. 95.*

*Les Norvégeois l'appellent ALK.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë, ALKA. Clus. Nieremb. ALCK.*

*Les Habitans de la Province de Gothland, TORD. Linn.*

*Les Habitans de la Province d'Angermanland, TORDMULE. Linn.*

*Les Anglois Septentrionaux, AUK. Willugh. Raj. Sibbald. Alb.*

*Les Anglois Occidentaux, RAZOR-BILL. Willugh. Raj. Alb. Klein. RUCK. Klein.*

*Les Habitans de la Province de Cornouailles, MURRE. Willugh. Raj. Klein.*

*Les Ecoffois, SCOUT. Sibbald.*

*Anati domesticæ paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quatuordecim*

*Tom. VI,*

*Il n'est pas tout-à-fait si gros que le Canard domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de*

*M*



quatorze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces cinq lignes. Son bec, qui a vers sa bête dix lignes d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche un pouce onze lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce huit lignes, & l'intérieur seize lignes. Il a un pied onze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une ligne blanche, fort étroite, qui s'étend depuis l'origine du demi-bec supérieur jusqu'à l'œil. La gorge & la partie inférieure du col qui en est la plus voisine, sont d'un brun-noirâtre ou de couleur de suie. Le reste de la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du des-

pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & quinque lineas. Rostrum, quod quidem versùs basim decem lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & undecim lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas; extimus unum pollicem cum octo lineis, & intimus sexdecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad mediam caudæ longitudinem non pertingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigræ. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices concolores. In utroque capitis latere strictissima adest linea candida, ab exortu mandibulæ superioris ad oculum usque producta. Guttur & colli inferioris pars ipsi finitima fusco-nigricante sive fuliginoso colore tinguntur. Colli inferioris reliquæ pars, pectus, venter, late-



ra, crura, inferioresque caudæ testrices albicant. Pennæ alas subtus obtegentes eodem imbutæ colore; majores tamen à corpore remotiores sunt cineræ. Alam componunt viginti octo remiges : undecim primores nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo - albæ : quindecim proximè sequentes, à duodecima scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè, in latere exteriori nigricantes, in latere interiore cinereo-albæ, albo in apice marginatæ : unde fit in utraque ala complicata linea transversa candida : binæ tandem corpori viciniores nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, in acumen desinentes. Binæ intermediæ reliquas longitudine excedunt : laterales autem omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum nigrum est : in utroque autem latere tribus in mandibula superiore, & binis tantummodo in mandibula inferiore sulcis exaratur, quorum capiti vicinior albicat. Mandibula superior est nonnihil apice adun-

sous des aîles sont de la même couleur, si l'on en excepte cependant les plus grandes les plus éloignées du corps, qui sont cendrées. L'aîle est composée de vingt-huit plumes : les onze premières sont noirâtres, & ont une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-blanc : les quinze suivantes, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingt-sixième inclusivement, sont noirâtres du côté extérieur, d'un gris-blanc du côté intérieur, & bordées de blanc par le bout; ce qui forme sur chaque aîle, lorsqu'elle est pliée, une ligne transversale de cette couleur : enfin les deux plus proches du corps sont noires. La queue est composée de douze plumes noirâtres, & qui se terminent en pointe. Les deux du milieu sont les plus longues : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est noir : sur chacun de ses côtés sont pratiquées trois rainures sur le demi-bec supérieur & deux seulement sur le demi-bec inférieur, dont la plus proche de la tête est blanche. Le demi-bec supérieur est un peu crochu à son bout; &



l'inférieur est anguleux en-dessous. Les narines sont oblongues, & placées sous les plumes, tout auprès de l'ouverture du bec. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. On le trouve dans les pays Septentrionaux. Il vient quelquefois jusque sur les côtes de France. Il fait son nid dans les trous des rochers escarpés : ses œufs sont blancs, & marqués de taches noires. Du cabinet de M. de Reaumur.

ca; inferior verò subtus angulosa. Nares sunt oblongæ, sub pennis, prope rictum oris, positæ. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigri. Habitat in Septentrionalibus regionibus. Juxta maris littora in Gallia quandoque versatur. In rupium foraminibus inaccessibleis nidificat : ova ponit candida, maculis nigris insignita. Ex museo Realmuriano.

### \*\* 3. LE PETIT PINGOIN.

Voyez Pl. VIII. Fig. 2.

Alca superne nigra, infernè alba; tæniâ utrinque à rostro ad oculos albo punctulatâ; fasciâ infra oculos nigricante; remigibus minoribus albo in apice marginatis; rectricibus nigris . . . . ALCA MINOR.

Æthia. Bell. Obs. pag. 18.

Mergus Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 240. hujus icon à Bellonio mutuata (cui tamen crista fuit addita) pag. 241.

Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 47.

Mergus Bellonii, Aldrovandi Willugh. Ornith. pag. 243. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXIV.

Raj. Syn. Avi. pag. 119. N°. 2.

Plongeon de mer. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 179; avec une figure très-peu exacte pag. 180.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 39 a, dans laquelle est la même figure.

Les Habitans de l'Isle de Candie l'appellent UTUMANIA. Aldrov. Willugh. Raj.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam



extremam quindecim pollices aequat, & ad extremos ungues quindecim pollices & sex lineas. Rostrum, quod quidem basin versus septem cum semi lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pes tredecim lineas; trium digitorum medius cum ungue unum pollicem & octo cum semi lineas, extimus unum pollicem cum octo lineis, intimus verò quindecim cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium obtinent pennæ nigræ. Scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices eodem colore tinguntur. In utroque capitis latere exigua extat tænia albo punctulata, ab exortu mandibulæ superioris ad oculum usque protensa. In utraque gena altera adest fascia longitudinalis nigricans, prope rostri exortum orta, & infra oculos ducta. Caput ad la-

celui de la queue est de quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces six lignes. Son bec, qui a vers sa bête sept lignes & demie d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche deux pouces de long; sa queue deux pouces quatre lignes; son pied treize lignes; celui du milieu des trois doigts, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes & demie, l'extérieur un pouce huit lignes, & l'intérieur quinze lignes & demie. Il a un pied onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une petite bande pointillée de blanc, qui s'étend depuis l'origine du demi-bec supérieur jusqu'à l'œil. Sur chaque joue est une autre bande longitudinale noirâtre, qui part d'après de l'origine du bec, & s'étend par - dessous les yeux. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le



ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un beau blanc. Le noir de la partie supérieure du col s'étend sur ses côtés vers le milieu de sa longueur : & le blanc des côtés de la tête s'étend jusque vers l'occiput. Les grandes plumes de l'aile sont noires en-dessus & cendrées en-dessous : les moyennes sont de la même couleur, mais elles sont bordées de blanc par le bout. La queue est composée de douze plumes noires, qui se terminent en pointe. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend la queue fort pointue. Le bec est noir ; & sur chacun de ses côtés sont pratiquées deux rainures fort peu profondes. Le demi-bec supérieur est un peu crochu à son bout ; & l'inférieur est anguleux en-dessous. Les narines sont oblongues, & placées sous les plumes, tout auprès de l'ouverture du bec. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tera sive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Color niger collum superius tingens ad latera colli versus mediam ipsius longitudinem extenditur : albor autem ad latera capitis versus occipitium usque protenditur. Remiges alarum majores sunt superne nigre, subtus cinereæ : minores concolores, sed albo in apice marginatæ. Duodecim rectricibus nigris, in acumen desinentibus, cauda constat. Binæ intermedia lateraliū longitudinem paululum excedunt ; laterales autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē ; unde fit cauda valdè acuta. Rostrum nigrum, & in utroque latere binis sulcis minimè profundis exaratum. Mandibula superior est nonnihil extremitate adunca ; inferior verò subtus angulosa. Nares sunt oblongæ, sub pennis, prope rictum oris, positæ. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membrana, unguisque nigricant. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*





*Grand Pingoin.*









Dessiné et Gravé par Martin.

*Grand Pingoin.*









2. *Petit Pingoin.*









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pingoin.

2. Petit Pingoin.









## ORDO XXI. ORDRE XXI.

A V E S

LES OISEAUX

*Digitis quatuor, tribus anterioribus membranis integris inter se connexis, postico soluto: cruribus ad podicem positis, & intra abdomen conditis, præditæ.*

*Qui ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur séparé: & les jambes placées tout-à-fait derrière, & cachées dans l'abdomen.*

**H**U J U S Ordinis Avium aliæ rostro donantur recto, apice mandibulæ superioris adunco; aliæ rostro recto, acuto præditæ sunt. In duas sectiones dividuntur: prima continet eas quæ rostro donantur recto, apice mandibulæ superioris adunco, ut *Spheniscus*, *Catarractes*: & secunda illas quæ rostrum habent rectum & acutum, ut *Mergus*.

**P** A R M I les Oiseaux de cet Ordre, les uns ont le bec droit, & le bout de la mandibule supérieure crochu; les autres ont le bec droit & pointu. Je les divise en deux sections: dans la première sont ceux qui ont le bec droit, & le bout de la mandibule supérieure crochu, comme le *Manchot*, le *Gorfou*: & dans la seconde ceux qui ont le bec droit & pointu, comme le *Plongeon*.





SECTION I.

*Ceux dont le bec est droit , & le bout de la mandibule supérieure crochu.*

**I**L y a dans cette section deux genres d'Oiseaux , qui se distinguent entr'eux par la forme du bout de leur mandibule inférieure. Dans les uns le bout de la mandibule inférieure est comme tronqué , comme dans le *Manchot* : dans les autres le bout de la mandibule inférieure est arrondi , comme dans le *Gorfou*.

XCV.

*Genre du Manchot. ( 1 ).*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts , dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières , & le postérieur est séparé :

Les jambes placées tout-à-fait derrière , & cachées dans l'abdomen :

Le bec droit :

Le bout de la mandibule supérieure crochu , & celui de la mandibule inférieure comme tronqué.

( 1 ) *Manchot* , nom que j'ai donné aux Oiseaux de ce genre à cause de la brièveté de leurs ailes.

SECTIO I.

*Eæ quæ rostro donantur recto , apice mandibulæ superioris aduncæ.*

**D**UO in illa sectione continentur genera Avium mandibulæ inferioris apicis formâ à se invicem discrepantium. In aliis enim mandibulæ inferioris apex est quasi truncatus , ut in *Sphenisco* : in aliis verò mandibulæ inferioris apex est rotundatus , ut in *Catarracte*.

XCV.

*Genus Sphenisci. ( 1 ).*

Hujus character est  
Digiti quatuor , tres scilicet anteriores membranis integris inter se connexi ; posticus solutus :

Crura ad podicem posita , & intra abdomen condita :

Rostrum rectum :

Apex mandibulæ superioris aduncus , inferioris quasi truncatus.

( 1 ) *Spheniscus* , nomen à me hujus generis Avibus inditum.

Omnium



Omnium hujus generis      Tous les Oiseaux de ce genre  
Avium digitus intimus per      ont une petite membrane tout  
totam lateris interioris lon      le long du côté intérieur du  
gitudinem membranulâ do-      doigt intérieur.  
natur.

I. LE MANCHOT.

Spheniscus superne nigricans, infernè albus; capite ad latera,  
guttuque sordidè griseis; rectricibus nigricantibus . . .  
SPHENISCUS.

Diomedea alis impennibus, pedibus tetradactylis. Diomedea demersa.  
*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 65. sp. 2.*

Anser Magellanicus. *Clus. Exot. Lib. V. Cap. V. pag. 101, in qua hujus  
icon minimè accurata.*

*Euf. Nieremb. pag. 206, in qua hujus icon à Clusio mutuata.*

*Jonst. Avi. pag. 126. hujus icon à Clusio mutuata Tab. 56.*

*Charlet. Exer. pag. 104. N°. 5.*

*Charlet. Onomazt. pag. 98. N°. 5.*

Anser Magellanicus, seu Pinguin. *Mus. Worm. pag. 300.*

Pinguin. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 511, in qua hujus icon à Clusio  
mutuata.*

Pinguin Batavorum, seu Anser Magellanicus Clusii. *Willugh. Ornith.  
pag. 242.*

Plautus pinguis. *Klein. Avi. pag. 147. N°. 4.*

Pinguin aux piez noirs. *Edwards. Tom. II. pag. XCIV; avec une  
figure exacte Pl. 94.*

Les Hollandois l'appellent PENGUIN. *Willugh.*

Les Anglois, PENGUIN; PINGUIN. *Charlet.*

Magnitudine & crassitie  
cum proximè sequenti cir-  
citer convenit. Nunquam  
volat; alas enim habet valdè  
breves: easque gerit penitus  
explicatas, & secundùm ip-  
sius latera extensas. Partem  
capitis superiorem, collum,  
dorsum & uropygium ves-  
tiunt plumulæ maximè rigi-  
des & nigricantes. Superio-

*Tom. VI.*

Il est à peu près de la gran-  
deur & de la grosseur du sui-  
vant. Il ne vole jamais; car  
ses aîles sont extrêmement cour-  
tes: il les porte tout-à-fait  
déployées, & étendues le long  
de ses côtés. La partie supé-  
rieure de la tête, le col, le dos  
& le croupion sont couverts  
de petites plumes fort roides  
& noirâtres. Les couvertures

N



du dessus de la queue sont de la même couleur. Les côtés de la tête & la gorge sont d'un gris sale. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les ailes sont en-dessus noires, & bordées de blanc dans leur partie inférieure; & en-dessous elles sont blanchâtres, & variées de noir. Toutes les plumes dont elles sont couvertes, sont si petites & si roides, qu'elles ressemblent à des écailles. La queue est composée de plumes très-étroites, fort roides & noirâtres. Les deux du milieu sont les plus longues; toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec, qui depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur est tout couvert de rides, est noirâtre, & marqué vers son extrémité d'une bande transversale jaunâtre. Les narines sont placées sur le demi-bec supérieur environ vers la moitié de sa longueur. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. Le doigt de derrière est placé assez haut & sur le côté intérieur du pied. On le trouve dans les mers du Sud.

res caudæ testrices concolores. Caput ad latera, gutturque fordidè grisea. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ testrices albescent. Alæ sunt superne nigrae, albo in parte inferiore fimbriatae, subtus verò candidantes; nigro variegatae. Pennae autem omnes illas obtegentes ita sunt exiguae & rigidae, ut squamas æmulentur. Caudam componunt rectrices strictissimae, maximè rigides & nigricantes, quarum binæ intermediae longiores; laterales autem omnes sensim atque sensim longitudine minuentes ad utrinque extimam usque breviores. Rostrum, quod ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque penitus rugosum, nigricat, & versùs ipsius extremitatem tantà insignitur transversâ flavicante. Nares in mandibula superiore versùs ipsius mediam circiter longitudinem posita sunt. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguisque nigri. Digitus posticus altius & in interiore pedis latere collocatur. Habitat in mari Meridionali.



## \*\* 2. LE MANCHOT TACHETÉ.

*Voyez Pl. IX.*

*Spheniscus superne nigricans, punctulis cinereo-albis aspersus, infernè albus; taniâ utrinque supra oculos candidâ; capite ad latera, guttureque fusco-nigricantibus; fasciâ supra pectus arcuatâ fusco-nigricante, utrinque secundùm latera ad pedes usque protensâ; rectricibus nigricantibus....*  
 SPHENISCUS NÆVIUS.

*Diomedea alis impennibus, pedibus tetradactylis. Diomedea demersa.*

*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 65. sp. 2.*

*Penguin aux piez noirs. Edwards. Tom. II. pag. XCIV; avec une figure exacte Pl. 94.*

*Crassitie Anatem moschazam paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & novem pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda octodecim lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum quinque lineis, intimus unum pollicem & decem lineas; posticus autem, qui altiùs & in interiore pedis latere positus, septem lineas. Nunquam volat hæc*

Il est un peu plus gros que le *Canard musqué*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue dix-huit lignes; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces cinq lignes, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere, qui est placé assez haut & sur le côté intérieur du pied, sept lignes. Cet Oiseau ne vole jamais, ses ailes étant extrêmement courtes; puisque cha-



cune n'a, depuis son origine jusqu'à son extrémité, que six pouces quatre lignes de long. Il les porte tout-à-fait déployées, & étendues le long de ses côtés. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de petites plumes fort roides, dont la tige est d'un noir brillant, & les barbes sont noirâtres, & variées de petits points d'un fort joli gris-blanc. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par-dessus les yeux, ensuite vers l'occiput, & va de-là joindre le blanc des côtés du col. Les côtés de la tête & la gorge sont d'un brun-noirâtre, varié, comme le dos, de petits points de gris-blanc, mais fort peu apparens. La partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Au-dessus de la poitrine est une assez large bande d'un brun-noirâtre, courbée en arc, & qui s'étend tout le long des côtés & des jambes jusqu'aux pieds. Les aîles sont en-dessus noires, & bordées de blanc sale dans leur partie in-

Avis; alas enim habet valdè breves: quælibet scilicet, ab ipsius exortu ad extremitatem usque, sex pollicum & quatuor tantummodo linearum longitudinem obtinet. Eas gerit penitus explicatas, & secundum ipsius latera extensas. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt plumulae maxime rigides, scapo splendide nigro, & pinnulis nigricantibus, punctulis elegantissime cinereo-albis variegatis, præditæ. Superiores caudæ tectrices concolores. In utroque capitis latere tania extat candida, prope rostri exortum orta, supra oculos ducta, dein versus occipitium protensa, indeque alborem in colli lateribus attingit. Caput ad latera, gutturque ex fusco-nigricant, & dorsi instar, punctulis cinereo-albis, sed minime conspicuis, variegantur. Collum inferius & ad latera, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores albescent. Supra pectus latiuscula extat fascia fusco-nigricans, arcuata, secundum laterum, crurumque longitudinem ad pedes usque protensa. Alæ sunt superne nigrae, sordide albo in parte



inferiore fimbriatæ, subtus verò sordidè albæ, nigro variæ. Pennæ autem omnes illas cooperientes ita sunt exiguæ & rigidæ, ut squamas æmulentur. Caudam componunt viginti duæ rectrices strictissimæ & maximè rigides, scapo plano & splendidè nigro, pinnulisque nigricantibus præditæ. Binæ rectrices intermediæ reliquarum longitudinem superant : laterales autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum, quod ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque penitùs rugosum, nigricat, & versùs ipsius extremitatem tanià insignitur transversâ flavicante. Nares in mandibula superiore versùs ipsius mediam longitudinem positæ sunt. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigri. Habitat in mari Meridionali. A *Capite Bonæ Spei* missus est ad *D. Savalette de Buchelay*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

Ille cujus descriptionem dedit *Edwardus*, ab isto colore discrepat. Omnibus in locis in quibus nuper des-

férieure ; & en-dessous elles sont d'un blanc sale, varié de noir. Toutes les plumes dont elles sont couvertes, sont si petites & si roides, qu'elles ressemblent à des écailles. La queue est composée de vingt-deux plumes très-étroites & fort roides, dont la tige est plate & d'un noir brillant, tandis que les barbes sont noirâtres. Les deux plumes du milieu de la queue sont les plus longues : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec, qui depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur est tout couvert de rides, est noirâtre, & marqué vers son extrémité d'une bande transversale jaunâtre. Les narines sont placées sur le demi-bec supérieur environ vers la moitié de sa longueur. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. On le trouve dans les mers du Sud. Il a été envoyé du *Cap de Bonne Espérance*, à *M. Savalette de Buchelay*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

Celui qu'*Edwards* a décrit, diffère de celui-ci par sa couleur. Il est brun par-tout où celui que je viens de décrire,



est noirâtre, & n'est point varié de petits points de gris-blanc. Du reste il lui ressemble en tout. Il n'en diffère peut-être que par le sexe.

criptus nigricat, ille fuscescit, & punctulis cinereo-albis nequaquam variegatur. In reliquis cum isto perfectè convenit. Forſan ab eo ſexu ſolummodo differt.

## XCVI.

*Genre du Gorſou. ( 1 ).*

Son caractère eſt d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois  
antérieurs ſont joints enſem-  
ble par des membranes en-  
tières, & le poſtérieur eſt  
ſéparé :

Les jambes placées tout-à-fait  
derrière, & cachées dans  
l'abdomen :

Le bec droit :

Le bout de la mandibule ſu-  
périeure crochu, & celui de  
la mandibule inférieure ar-  
rondi.

Les Oiſeaux de ce genre ont  
une petite membrane tout le  
long du côté intérieur du doigt  
intérieur.

( 1 ) *Gorſou*, nom que j'ai donné à ce  
genre d'Oiſeaux.

## XCVI.

*Genus Catarractis. ( 1 ).*

Hujus character eſt  
Digiti quatuor, tres ſcilicet  
anteriores membranis in-  
tegris inter ſe connexi,  
poſticus ſolutus :

Crura ad podicem poſita,  
& intra abdomen con-  
dita :

Roſtrum rectum :

Apex mandibulæ ſuperioris  
aduncus, inferioris ro-  
tundatus.

Hujus generis Avium di-  
gitus intimus per totam la-  
teris interioris longitudinem  
membranulâ donatur.

( 1 ) *Catarractes*, nomen huic Avium  
generi à me inditum.

## I. LE GORFOU.

Catarractes ſuperne fulco-purpureſcens, infernè albus ; ca-  
pite anteriore, guttureque fulcis ; rectricibus nigris . . .  
CATARRACTES.













Dessiné et Gravé par Martinet.

*Manchot tacheté.*







Phaëthon alis impennibus, rostro mandibulis edentulis, digito postico distincto. Phaëthon demersus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 67. sp. 2.*

Penguin. *Edwards. Tom. I. pag. XLIX ; avec une figure exacte Pl. 49.*

*Anserem domesticum* magnitudine & crassitie circiter æmulatur. Rostrium, quod undecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices & quatuor lineas longum est. Digitus posticus altius & in interiore pedis latere collocatur. Nunquam volat hæc Avis; alas enim habet valdè breves : easque gerit penitus explicatas, & secundum ipsius latera extensas. Caput anterius, gutturque fusca sunt. Partem colli superiorem, dorsum & uropygium obtegunt plumulæ maximè rigidæ, fusco - purpurascens. Superiores caudæ tectrices concolores. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus cooperientes albicant. Alæ fuscae sunt, albo in parte inferiore fimbriatæ. Pennæ omnes illas vestientes ita sunt exiguæ & rigidæ, ut squamas æmulentur. Rectricibus nigris brevissimis, strictissimis & maximè rigidis cauda conflatur. Pennæ synciput obtegentes in utro-

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur de l'Oye domestique. Son bec, qui a onze lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche deux pouces quatre lignes de long. Le doigt de derrière est placé assez haut & sur le côté intérieur du pied. Cet Oiseau ne vole jamais; car ses ailes sont extrêmement courtes : il les porte tout-à-fait déployées, & étendues le long de ses côtés. La partie antérieure de la tête & la gorge sont brunes. Le dessus du col, le dos & le croupion sont couverts de petites plumes fort roides d'un brun-pourpré. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les ailes sont brunes, & bordées de blanc dans leur partie inférieure. Toutes les plumes dont elles sont couvertes, sont si petites & si roides, qu'elles ressemblent à des écailles. La queue est composée de plumes



noires très-courtes, très-étroites & fort roides. Les plumes du synciput avancent en pointe de chaque côté sur le demi-bec supérieur, & couvrent les narines. Le bec est rouge. Les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge terni; & les ongles bruns. On le trouve dans les mers du Sud.

que mandibulæ superioris latere in acumen porriguntur, narefque cooperiunt. Rostrum rubrum. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, sordidè rubri; ungues verò fusci. Habitat in mari Meridionali.

## SECTION II.

*Ceux dont le bec est droit & pointu.*

**I**L n'y a dans cette section qu'un seul genre, qui est celui du *Plongeon*.

## XCVII.

*Genre du Plongeon.*

Son caractère est d'avoir Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé:

Les jambes placées tout-à-fait derrière, & cachées dans l'abdomen:

Le bec droit & pointu.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le pied très-applati par les

## SECTIO II.

*Eæ quæ rostrum habent rectum & acutum.*

**I**N illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Mergi*.

## XCVII.

*Genus Mergi.*

Hujus character est Digiti quatuor, tres scilicet antichi membranis integris inter se connexi, posticus solutus:

Crura ad podicem posita, & intra abdomen condita:

Rostrum rectum, acutum.

Omnes hujus generis Alites pedes habent valdè lateraliter



teraliter compressos. Ipsorum digitus intimus per totam lateris interioris longitudinem membranulâ donatur. côtés. Ils ont aussi une petite membrane tout le long du côté intérieur du doigt intérieur.

*Les Hébreux appellent le Plongeon en général KAATH. Gefn.*

*Les Arabes, SEMAG. Gefn.*

*Les Perses, KAATH. Gefn.*

*Les Grecs, Αἰθια. Gefn.*

*Les Grecs modernes, Χαθιατζί. Gefn.*

*Les Italiens, MERGON. Gefn. Aldrov. SMERGO. Aldrov.*

*Les Allemands, DUCHER; DUCHENT; TUCHER; TEUCHER. Gefn. Aldrov. TAUCHER. Rzac.*

*Les Flamands, DEUKECKIN. Gefn. DUYCKER; SICHKECKIN; SCLOVER; SCHOLVAER. Aldrov.*

## \*\* I. LE GRAND PLONGEON.

*Voyez Pl. X. Fig. 1.*

Mergus superne saturatè fuscus, marginibus pennarum cinereis, infernè albus; capite & collo superioribus fuscis; capite ad latera minutis maculis candidis vario; torque fusco-nigricante; reëtriciibus saturatè fuscis, albo in apice marginatis . . . . MERGUS MAJOR.

*Colymbus maximus. Jonst. Avi. pag. 89.*

*Klein. Avi. pag. 150. N<sup>o</sup>. 6.*

*Colymbus maximus Gefneri. Willugh. Ornith. pag. 260.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 126. N<sup>o</sup>. 8.*

*Quædam Avis Colymbis congener, quæ in Acronio Lacu reperitur. Gefn. Avi. pag. 140.*

*Avis Fluder dicta, seu Colymbus maximus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 253.*

*Les Habitans des environs du Lac de Constance l'appellent FLUDER. Gefn. Aldrov. Jonst.*

*Les Allemands, GROSSE ZEE-FLUDER. Willugh. Raj.*

*Les Norvégeois. IMBER.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë, IMBER; IMBRIL; HAUGAS. Tom. VI.*



Il est à peu près de la grosseur d'une *Oye domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds deux pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds sept pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces quatre lignes de long; sa queue deux pouces deux lignes; son pied deux pouces onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces deux lignes, l'extérieur quatre pouces quatre lignes, l'intérieur trois pouces six lignes; & celui de derrière dix lignes seulement. Il a trois pieds dix pouces huit lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont brunes. Les côtés de la tête, depuis les narines jusque vers l'occiput en passant par les yeux, sont variés de très-petites taches blanches. Vers le milieu de la longueur du col est une bande transversale d'un brun-noirâtre, d'environ un pouce de large, qui forme une espèce de collier, lequel n'entoure pas le col en entier. Au-dessus de ce collier les côtés

Cum *Anser domestico* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes totidem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues duos pedes septem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices & totidem lineas longum est; cauda duos pollices cum totidem lineis; pes duos pollices & undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & lineas binas, extimus quatuor pollices & totidem lineas, intimus tres pollices cum sex lineis; posticus autem decem tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum decem pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores fuscæ. Caput ad latera, à naribus scilicet versùs occipitium usque per oculos procedendo, minutissimis variegatur maculis candidis. Mediam versùs colli longitudinem tantæ extat transversa fusco-nigricans, unius



circiter pollicis latitudinem obtinens, & torquem quodammodo efficiens; qui torquis collum non penitus ambit. Supra torquem autem colli latera minutissimis maculis albis & nigricantibus variegantur. Dorsum, uropygium & latera pennis vestiuntur saturatè fuscis, cinereo marginatis. Scapulares, superioresque caudæ teatrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus & venter eleganter albicant. Eo in loco in quo collum torque circumdatur, ipsius inferior pars minutis variegatur maculis fuscis. Crura sunt quoque fusco imbuta. Pennæ caudam subtus obtegentes fusco & albo variæ. Inferiores alarum teatrices candidæ; ex illis tamen excipiendæ sunt majores corpori viciniore in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscæ, & in tota circumferentia albo fimbriatæ. Superiores alarum teatrices fusco imbuuntur colore non ita saturato quàm qui dorsum tingit, & cinereo marginantur. Alarum remiges sunt in latere exteriori & apice saturatè quidem, sed splendidè fuscæ, in latere interiore fusco

du col sont variés de blanc & de noirâtre par très-petites taches. Le dos, le croupion & les côtés sont couverts de plumes d'un brun foncé, bordées de cendré. Les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & le ventre sont d'un beau blanc. A la hauteur du collier, la partie inférieure du col est variée de petites taches brunes. Les jambes sont de cette dernière couleur. Les couvertures du dessous de la queue sont variées de brun & de blanc. Celles du dessous des ailes sont blanches; il faut cependant en excepter les grandes les plus proches du corps, qui sont brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & bordées de blanc dans toute leur circonférence. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un brun moins foncé que celui du dos, & bordées de cendré. Les plumes de l'aile sont d'un brun foncé, mais brillant, du côté extérieur & à leur bout, & d'un brun plus clair du côté intérieur. La queue est composée de vingt plumes d'un brun foncé, bordées de blanc par le bout. Celles du milieu sont un peu plus longues que les



latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec est d'un cendré-brun. Les pieds, les doigts & les ongles sont noirâtres. Les membranes qui réunissent les doigts, sont de la même couleur, excepté dans leur milieu, où elles sont blanchâtres. On le trouve sur le *Lac de Constance. Du cabinet de Madame de Bandeville.*

dilutior imbutæ. Caudam componunt viginti rectrices saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ. Intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum; unde fit cauda apice rotundata. Rostrum cinereo-fuscum. Pedes, digiti, unguesque nigricantes. Membranæ quibus digiti inter se connectuntur, concolores, attamen in ipsarum medio candicantes. In *Acronio Lacu* reperitur. *Ex museo D. de Bandeville.*

## \*\* 2. LE PETIT PLONGEON.

*Voyez Pl. X. Fig. 2.*

*Mergus* superne cinereo-fuscus, lineolis candicantibus variis, infernè albus; capite & collo superioribus cinereis, pennis ad latera cinereo-albo fimbriatis; tæniâ ad anum transversâ, rectricibusque cinereo-fuscis . . . *MERGUS MINOR.*

*Mergus maximus. Klein. Avi. pag. 141. N°. 1.*

*Æthyia. Gesn. Avi. pag. 126.*

*Cepphus. Moehr. Avi. Gen. 76.*

*Colymbus maximus caudatus. Willugh. Ornith. pag. 258. hujus icon minimè accurata Tab. LXI.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 125. N°. A. 4.*

*Colymbus maximus stellatus. Willugh. Ornith. hujus icon satis accurata Tab. LXII.*

*Grand Plongeon tacheté. Alb. Tom. I. pag. 72; avec une figure mal coloriée Pl. 82.*



*Les Grecs l'appellent Αἰθια. Gesn.*

*Les Anglois, GREATEST-LOON. Willugh. Raj. GREATEST-DIVER. Willugh. GREATEST TAILED DIVER. Raj. GREATEST SPECKLED DIVER; GREATEST SPECKLED LOON. Alb.*

*Crassitie Anatem moschatam paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem novem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes unum pollicem & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & novem lineas longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pes duos pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus tres pollices & totidem insuper lineas, intimus duos pollices & septem cum semi lineas; posticus autem septem tantummodo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum undecim pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Partes capitis & colli superiores vestiunt pennæ cineræ, utrinque cinereo-albo marginatæ: attamen quæ capitis verticem obtegunt, paululum in ipsarum*

Il est un peu plus gros que le *Canard musqué*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces neuf lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; son pied deux pouces six lignes; celui du milieu de trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur trois pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces sept lignes & demie; & celui de derrière sept lignes seulement. Il a deux pieds onze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes cendrées, & bordées des deux côtés de gris-blanc: celles qui couvrent le sommet de la tête, sont un peu rembrunies dans leur milieu. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun, varié de petites



lignes blanchâtres, chaque plume étant marquée de deux de ces lignes, sçavoir une de chaque côté, placées obliquement vers son extrémité. La gorge est blanche. La partie inférieure & les côtés du col sont d'un blanc varié d'un peu de cendré clair. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un beau blanc : il y a cependant vers l'anus une bande transversale d'un cendré - brun ; & les couvertures du dessous de la queue sont variées d'un peu de cette couleur. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches ; & quelques-unes des plus grandes sont marquées d'un peu de cendré. Les moyennes du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les scapulaires : les plus petites, ainsi que les grandes les plus éloignées du corps, sont d'un cendré - brun & sans taches. L'aile est composée de trente-une plumes : les seize premières sont brunes, excepté leur côté intérieur, qui est d'une couleur plus claire vers leur origine seulement : toutes les autres sont d'un cendré-brun, & marquées chacune de deux lignes blanchâtres, sçavoir une de chaque côté, placées obliquement vers

medio fuscescunt. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt cinereo-fuscæ, lineolis candicantibus variæ ; quælibet enim penna duabus insignitur lineolis, utrinque scilicet unâ, versùs ipsius extremitatem obliquè positis. Guttur albicat. Collum inferiùs & ad latera candidum, paucò cinereo diluto varium. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices eleganter albeant : attamen anum versùs tænia adest transversa cinereo-fusca ; & tectrices caudæ inferiores paucò cinereo-fusco quoque variegantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt candidæ, quibusdam ex majoribus paucò cinereo notatis. Superiores alarum tectrices mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, scapularibus concolores : minimæ, sicut & majores à corpore remotiores, cinereo-fuscæ & immaculatæ. Tringinta & unâ remigibus ala conflatur : sexdecim primores fuscæ, attamen in latere interiore colore dilutiore imbutæ, sed solummodo versùs ipsarum exortum : reliquæ omnes cinereo-fuscæ, binis insignitæ lineis candicanti-



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXI.* 111

bus, utrinque scilicet unâ, versùs ipsarum extremitatem obliquè positis. Remix prima valdè brevis est : secunda & tertia reliquarum omnium longitudinem antecellunt. Viginti rectricibus cinereo-fuscis cauda constat. Intermediæ lateralium longitudinem paululùm superant ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorè ; unde fit cauda apice rotundata. Rostrum griseo-fuscum sive corneo colore imbutum. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguisque fusci ; pedes tamen & digiti in latere interiore nonnihil ad rubescentem inclinant colorem. Lacus frequentat. A Geneva in museum Reatmurianum missus est à D. Gannebin.

leur extrémité. La première des plumes de l'aile est très-courte : la seconde & la troisième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de vingt plumes d'un cendré-brun. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec est d'un gris-brun ou de couleur de corne. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont bruns ; cependant le côté intérieur des pieds & des doigts tire un peu sur le rougeâtre. On le trouve sur les lacs. Il a été envoyé de Genève à M. de Reaumur par M. Gannebin.

\*\* 3. LE PLONGEON A GORGE ROUGE.

Voyez Pl. XI. Fig. 1.

Mergus superne splendide fuscus, infernè albus ; capite posteriore & collo superiore fuscis, pennis ad latera albo fimbriatis ; capite & collo ad latera cinereis ; taniâ longitudinali in collo inferiore castaneâ ; pennis scapularibus, alisque minutis maculis albis variegatis ; rectricibus fuscis . . .  
MERGUS GUTTURE RUBRO.

Mergus rostro nigro, capite & lateribus colli plumbeis, cervice & lateribus thoracis nigris lineolis variegatis ; gula cum inferiori collo



rubris ; internis digitis lobus angustus additus. *Klein. Avi. pag. 142.*

N<sup>o</sup>. 3.

Plongeon rouge-gorge. *Edwards. Tom. II. pag. XCVII ; avec une figure assez bonne , cependant pas assez exactement coloriée Pl. 97.*

*Les Norvégeois l'appellent LOOM.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë , LOME ou LAUME.*

*Les Anglois RED THROATED LOON. Edwards.*

Il est un peu plus gros que le *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces six lignes , & jusqu'à celui des ongles de deux pieds trois pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long ; sa queue un pouce dix lignes ; son pied deux pouces huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , trois pouces une ligne , l'extérieur trois pouces trois lignes , l'intérieur deux pouces huit lignes ; & celui de derrière huit lignes seulement. Il a trois pieds huit lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Le sommet de la tête est couvert de petites plumes brunes dans leur milieu , & cendrées sur leurs bords. Tout le reste de la tête , la gorge & les côtés du col , jusque vers les deux tiers de sa longueur , sont cendrés. L'oc-

*Anatem domesticam* crassitie paululum antecellit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem undecim pollices & sex lineas æquat , & ad extremos ungues duos pedes tres pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & decem lineas longum est ; cauda unum pollicem cum decem lineis ; pes duos pollices & octo lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum linea unica , extimus tres pollices & totidem lineas ; intimus duos pollices cum octo lineis ; posticus autem octo solummodo lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum trium pedum & octo linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protrahuntur. Summum caput vestiunt plumulæ in medio fuscæ , ad margines cineræ.

Reliquum



Reliquum caput , guttur , collumque ad latera , idque versùs duas tertias longitudinis partes usque , sunt cinerea. Occipitium & collum superius , sicut & ipsius latera in parte corpori proxima , plumulis obteguntur fuscis , in utroque latere albo fimbriatis ; unde fit ut maculis longitudinalibus , aliis fuscis alteris candidis , variegata appareant : pennæ tamen collum in parte corpori magis finitima vestientes albo non marginantur , sed minutis maculis albis ad margines solummodo insigniuntur. Dorsum , uropygium & superiores caudæ tectrices sunt splendide fusca. Pennæ scapulares concolores , quibusdam tamen minutis aliquibus maculis albis notatis. In parte colli inferiore macula extat elegantissimè castanea , quatuor pollices longa , & in ipsius parte infima octodecim circiter lineas lata : figurâ suâ isocellum æmulatur triangulum , cujus apex guttur spectat. Infra quam maculam partem colli inferiorem vestiunt pennæ in medio fusca , in tota circumferentia albo fimbriatæ. Pectus , venter & crura eleganter albi-

ciput & le dessus du col , ainsi que ses côtés dans sa partie la plus voisine du corps , sont couverts de petites plumes brunes , bordées de blanc des deux côtés ; ce qui les fait paroître variés de taches longitudinales , les unes brunes & les autres blanches : cependant les plumes du col qui approchent le plus du dos , au lieu d'être bordées de blanc , sont marquées seulement sur leurs bords de petites taches de cette couleur. Le dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun brillant. Les plumes scapulaires sont de la même couleur , quelques-unes étant marquées de quelques petites taches blanches. Sur la partie inférieure du col est une tache d'un très-beau marron , longue de quatre pouces , & large dans sa partie inférieure d'environ dix-huit lignes : elle a la figure d'un triangle isocelle , dont le sommet est tourné vers la gorge. Audessous de cette tache la partie inférieure du col est couverte de plumes brunes dans leur milieu , & bordées de blanc dans toute leur circonférence. La poitrine , le ventre & les jambes sont d'un très-beau blanc. Les côtés sont couverts de plumes brunes , dont la



plupart sont bordées de blanc. Les couvertures du dessous de la queue sont pareillement brunes, & presque toutes bordées de blanc par le bout. Celles du dessous des aîles sont blanches; quelques-unes des plus grandes ont cependant un peu de cendré clair sur leur côté extérieur. Les petites couvertures du dessus des aîles & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun brillant : les moyennes & les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur, & marquées sur leurs bords de quelques petites taches blanches. L'aîle est composée de trente plumes d'un brun foncé & presque noirâtre; mais qui sont d'une couleur beaucoup plus claire à leur origine du côté intérieur seulement : les deux plus proches du corps sont de plus marquées de quelques petites taches blanches, placées sur leurs bords vers leur extrémité. La première des plumes de l'aîle est fort courte : la seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de vingt plumes brunes. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui

cant. *Latera cooperiunt pennæ fuscae, plerisque albo marginatis. Inferiores caudæ testrices similiter fuscae, & ferè omnes albo in apice marginatae. Pennæ alas subtus obtegentes candidæ; quædam tamen ex majoribus paucò cinereo diluto in latere exteriorè notantur. Superiores alarum testrices minimæ, sicut & majores à corpore remotiores, sunt splendide fuscae: mediæ & majores corpori viciniore eodem imbutæ colore, & minutis quibusdam maculis albis ad margines insignitæ. Alam componunt triginta remiges saturatè fuscae & ferè nigricantes, in ipsarum tamen exortu, sed in latere interiorè tantùm, colore multò dilutiore tinctæ: binæ corpori finitimæ minutis insuper quibusdam notantur maculis albis, versùs ipsarum extremitatem ad margines positis. Remix prima valdè brevis est: secunda reliquarum omnium longitudinem excedit. Viginti restrictibus fuscis cauda conflatur. Intermediæ lateralium longitudinem paululùm superant, laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque exte-*



manusque brevior; unde fit cauda apice rotundata. Rostrum nigrum. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranae, unguisque nigricantes; pedes tamen & digiti in latere interiore nonnihil ad rubescentem inclinant colorem. Habitat in mari Septentrionali. Supra loca paululum excelsa in fluminibus posita nidificat, & ova solummodo bina ponit. *Ex museo Realmuriano.*

est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec est noir. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirâtres; cependant le côté intérieur des pieds & des doigts tire un peu sur le rougeâtre. On le trouve dans les mers du Nord. Il fait son nid sur des petites élévations, qui se trouvent dans les rivières, & ne pond que deux œufs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

#### 4. LE PLONGEON A GORGE NOIRE.

Mergus superne splendide niger, inferne albus; capite posteriore & collo superiore cinereis; collo ad latera albo, maculis nigris vario; taniâ longitudinali in collo inferiore nigra, violaceo & viridi variante; pennis scapularibus, alisque maculis albis variegatis; rectricibus nigris . . . .  
MERGUS GUTTURE NIGRO.

- Mergus Arcticus simpliciter. *Klein. Avi. pag. 141. N° 2.*  
Colymbus pedibus palmatis indivisis. *Faun. Suec. Linn. N° 121.*  
Colymbus pedibus palmatis indivisis, gutture nigro-purpurascente.  
Colymbus Arcticus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 68. sp. 1.*  
Colymbus Arcticus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 51. sp. 1.*  
Colymbus Arcticus Lumme Wormio dictus. *Willugh. Ornith. pag. 259. hujus icon à Wormio mutuata Tab. LXII.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 125. N° 7.*  
*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*  
Colymbus Arcticus Wormii & Willughby. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 373.*  
Lumme. *Mus. Worm. pag. 304. hujus icon satis accurata pag. 305.*  
*Andersf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. pag. 93.*  
*Andersf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. pag. 51.*  
Singularis Hirundinis aquaticæ exoticæ species. *Mus. Best. pag. 31. N° 3. hujus icon satis accurata Tab. VIII. N° 3.*  
*Gaz. Rup. Best. eadem icon Tab. 17.*



*Hirundo exotica aquatica. Jonst. Avi. pag. 160.*

*Plongeon marqueté. Edwards. Tom. III. pag. CXLVI ; avec une figure exacte Pl. 146.*

*Les Polonois l'appellent NUREK. Rzac.*

*Les Suédois , LOM ou LOMM. Linn.*

*Les Norvégeois , LUMME. Worm. Willugh. Rzac.*

*Les Islandois , LUMME. Worm. Willugh. Rzac. Anderf.*

*Les Anglois , SPECKLED DIVER ; SPECKLED LOON. Edwards.*

Il est de la grandeur & de la grosseur du précédent. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a près de trois pouces de long. La partie antérieure de la tête & la gorge sont noires. La partie postérieure de la tête & le dessus du col sont d'un joli cendré. Les côtés du col sont d'un blanc varié de taches noires : ces taches s'étendent aussi sur les côtés de la poitrine. Sur la partie inférieure du col est une large bande d'un noir changeant en violet & en verd, qui s'étend dans toute sa longueur, & a cinq pouces de long, & deux pouces de large dans sa partie inférieure. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir brillant. Les plumes scapulaires sont de la même couleur, & marquées de taches blanches, qui ont la forme d'un quarré-long. La poitrine & le ventre sont blancs. Les côtés sont noirs. Les jambes sont extérieurement de cette dernière cou-

Magnitudine & crassitie præcedentem æmulatur. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres ferè pollices longum est. Capitis anterior pars, gutturque nigro tinguntur colore. Caput posterius & collum superius sunt eleganter cinerea. Collum ad latera albicat, & maculis variegatur nigris : quæ maculæ pectus quoque ad latera variegant. In parte colli inferiore lata extat tænia nigra, violaceo & viridi colore variante, per totam ipsius longitudinem extensa, quinque pollices longa, & duos pollices in infima parte lata. Dorsum, uropygium & superiores caudæ tectrices tingit color splendide niger. Pennæ scapulares eodem imbutæ colore, & maculis albis oblongo-quadratis insignitæ. Pectus & venter alben. Latera sunt nigra. Crura exterius similiter nigra, interius verò candida. Tectrices caudæ inferiores albæ,



nigro transversim striatæ. Pennæ caudam subtus obtegentes penitus candidæ. Alarum margines, ab ipsis exortu ad extremitatem usque, concolores. Superiores alarum tectrices nigræ, minutisque maculis rotundis albis variæ. Remiges majores nigro imbutæ colore : mediæ similiter nigræ, & minutis quibusdam notatæ maculis albis, ad ipsarum margines positæ. Caudam componunt viginti rectrices nigræ. Intermediæ lateraliū longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum; unde fit cauda apice rotundata. Rostrum, pedes, digiti, sicut & ipsorum membræ, unguisque nigri; pedes tamen & digiti in latere interiore nonnihil ad rubescentem inclinant colorem. Habitat in mari Septentrionali.

leur, & blanches intérieurement. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches, & rayées transversalement de noir. Celles du dessous des ailes sont entièrement blanches. Le bord de l'aile, depuis son origine jusqu'à son extrémité, est de la même couleur. Les couvertures du dessus des ailes sont noires, & variées de petites taches rondes blanches. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont de la même couleur, & marquées de quelques petites taches blanches, placées sur leurs bords. La queue est composée de vingt plumes noires. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs; cependant le côté intérieur des pieds & des doigts tire un peu sur le rougeâtre. On le trouve dans les mers du Nord.

**\*\* 5. LE PLONGEON TACHETÉ.**

*Mergus superne nigricans, maculis candidis varius, infernè albus; capite & collo splendide nigris; taniâ transversâ*



in collo inferiore albo & nigro longitudinaliter striatâ; rectricibus nigricantibus . . . . MERGUS NÆVIUS.

Colymbus maximus caudatus circa Insulam Jarfey occisus. *Willugh. Ornith. pag. 259.*

Colymbus maximus caudatus alius. *Raj. Syn. Avi. pag. 125. N°. A. 4.*

Il est un peu plus gros que le *Plongeon à gorge rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds cinq pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces onze lignes de long; sa queue deux pouces; son pied deux pouces dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces six lignes, l'extérieur trois pouces huit lignes, l'intérieur trois pouces; & celui de derrière neuf lignes seulement. Il a trois pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un noir brillant. La partie inférieure du col est marquée d'une bande transversale, large d'environ dix-huit lignes, & variée de rayes longitudinales alternativement blanches & noires. Le dos, le croupion, les plumes

*Mergum gutture rubro* paululum crassitie superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & unum pollicem explet, & ad extremos ungues duos pedes quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & undecim lineas longum est; cauda duos pollices; pes duos pollices & decem lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue tres pollices & sex lineas, extimus tres pollices cum octo lineis, intimus tres pollices; posticus autem novem solummodo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & totidem pollicum; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput, guttur, collumque sunt splendidè nigra. Pars colli inferior taniâ insignitur transversâ, octodecim circiter lineas latâ, striis



longitudinalibus alternatim albis & nigris variegatâ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices nigricant, & maculis variegantur candidis, in dorso & scapularibus pennis majusculis & subquadratis, in uropygio & superioribus caudæ rectricibus minutissimis & rotundis. Pectus, venter & crura eleganter albicant; pectus tamen pauco variegatur nigro, sed ad latera tantum. Latera cooperiunt pennæ nigricantes, minutis maculis rotundis candidis variæ. Inferiores caudæ rectrices similiter nigricant, & pauco variegantur candido. Pennæ alas subtus obtegentes penitus albicant. Superiores alarum rectrices, sicut & majores corpori viciniores, nigricantes, & minutis maculis rotundis albis variegatæ: majores à corpore remotiores nigricantes & immaculatæ. Triginta remigibus nigricantibus ala conflatur. Prior valdè brevis est: secunda reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt viginti rectrices remigibus concolores. Intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt;

scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noirâtre varié de taches blanches, assez grandes & presque carrées sur le dos & les plumes scapulaires, fort petites & rondes sur le croupion & les couvertures du dessus de la queue. La poitrine, le ventre & les jambes sont d'un beau blanc; la poitrine est cependant variée d'un peu de noir sur ses côtés seulement. Les côtés sont couverts de plumes noirâtres, variées de petites taches rondes blanches. Les couvertures du dessous de la queue sont pareillement noirâtres, & variées d'un peu de blanc. Celles du dessous des aîles sont entièrement blanches. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & variées de petites taches rondes blanches: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres & sans taches. L'aîle est composée de trente plumes noirâtres. La première est fort courte: la seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de vingt plumes de la même couleur que celles de l'aîle. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur



par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le demi-bec supérieur est noirâtre; l'inférieur est blanchâtre. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirâtres; cependant le côté intérieur des pieds & des doigts tire un peu sur le bleuâtre. On le trouve dans les mers du Nord. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē; unde fit cauda apice rotundata. Mandibula superior nigricans, inferior candicans. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigricantes; pedes tamen & digiti in latere interiore nonnihil ad cœrulescentem inclinant colorem. Habitat in mari Septentrionali. *Ex museo Realmuriano.*

## \*\* 6. LE GRAND PLONGEON TACHETÉ.

*Voyez Pl. XI. Fig. 2.*

Mergus superne niger, maculis candidis varius, infernè albus; capite & collo nigro-virescentibus, violaceo colore variantibus; tæniis transversis in collo inferiùs & ad latera albo & nigro longitudinaliter striatis; rectricibus nigricantibus . . . MERGUS MAJOR NÆVIUS.

Mergus maximus Farrensis. *Mus. Worm. pag. 303.*

Mergus maximus Farrensis, sive Arcticus. *Clus. Exot. Lib. V. Cap. VI. pag. 102, in qua hujus icon minimè accurata.*

*Euf. Nieremb. pag. 216, in qua hujus icon à Clusio mutuata.*

*Jonst. Avi. pag. 159. hujus icon à Clusio mutuata Tab. 56, sub titulo, Mergus Arcticus Clusii.*

Mergus maximus Farrensis, sive Arcticus Clusii. *Willugh. Ornith. pag. 259.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 125. N°. 4.*

*Klein. Avi. pag. 141. N°. 1.*

Mergus Arcticus seu Farrensis. *Charlet. Exer. pag. 102. N°. 11.*

*Charlet. Onomazt. pag. 96. N°. 11.*

Colymbus maximus stellatus nostras. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II.*

*Lib. III. pag. 20. hujus icon non satis accurata Tab. 15. fig. 1.*

Anser Nostratibus The Embergoose dictus. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II.*

*Lib. III. pag. 21. j.*

Anser



Anser Embergoose dictus Sibbaldi. *Klein. Avi. pag. 130. N°. 12.*

Ildbrimel. *Clus. Exot. Auctuar. pag. 367.*

*Euf. Nieremb. pag. 237.*

*Jonst. Avi. pag. 129.*

Grand Plongeon de mer de Terre Neuve. *Alb. Tom. III. pag. 39 ; avec une figure mal coloriée Pl. 93.*

Oiseau appelé en Islande Huubryre. *Andersf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. pag. 94.*

Les Islandois l'appellent HUUBRYRE. *Andersf. HIMBRYNE. Worm.*

Les Habitans de l'Isle Ferroë, IMBRIM. *Andersf. ILDBRIMEL. Clus. Worm. Nieremb.*

Les Habitans des Orcades, EMBERGOOSE. *Sibbald. Andersf.*

Les Anglois, GREATEST DIVER ; GREATEST LOON. *Sibbald. GREAT SPECKLED LOON FROM NEWFOUND LAND. Alb.*

Crassitie *Anserem domesticum* antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes sex pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duos pedes undecim pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuor pollices & quinque lineas longum est ; cauda duos pollices cum sex lineis ; pes tres pollices & lineas binas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & quinque lineas, extimus quatuor pollices cum octo lineis, intimus tres pollices & decem lineas ; posticus autem decem cum semi lineas tantum. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & trium pollicum intervallo distant ; alæ

*Tom. VI.*

Il est plus gros que l'Oye domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds onze pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces cinq lignes de long ; sa queue deux pouces six lignes ; son pied trois pouces deux lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces cinq lignes, l'extérieur quatre pouces huit lignes, l'intérieur trois pouces dix lignes ; & celui de derriere dix lignes & demie seulement. Il a quatre pieds trois pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un

Q



noir-vert assez brillant : de plus cette couleur change sur la tête & la partie du col qui en est la plus voisine, en une couleur violette. Au-dessous de la gorge est une petite bande transversale, variée de rayes longitudinales alternativement blanches & noires : cette bande a un pouce neuf lignes de longueur & trois lignes de largeur. Vers le milieu de la longueur du col est placée sur chacun de ses côtés une autre bande transversale variée, comme la première, de rayes longitudinales alternativement blanches & noires : cette bande a la figure d'un triangle, dont la base est tournée vers la partie supérieure du col, & le sommet vers sa partie inférieure. Elle a deux pouces trois lignes de longueur, & environ dix-huit lignes de largeur à la base du triangle. Ces deux figures triangulaires forment ensemble une espèce de collier : leurs sommets sont distants l'un de l'autre d'environ un pouce, & leurs bases ne sont séparées que par un espace de trois lignes. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau noir, varié de taches blanches, assez grandes & presque carrées sur le dos & les

verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput, guttur & collum nigro-virescente tinguntur splendido : qui color in capite & parte colli ipsi finitima violaceo insuper colore variat. Infra guttur exigua extat tænia transversa, striis longitudinalibus alternatim albis & nigris variegata : quæ tænia unius pollicis & novem linearum longitudinem, triumque linearum latitudinem obtinet. Mediam versùs colli longitudinem in utroque latere alia adest tænia transversa, prioris instar, striis longitudinalibus alternatim albis & nigris varia : quæ tænia figurâ suâ triangulum æmuletur, cujus basis partem colli superiorem, apex verò collum inferius spectat. Duorum pollicum & trium linearum longitudine, & octodecim circiter linearum ad basim trianguli latitudine pollet. Binæ triangulares istæ figuræ torquem quodammodo simul efficiunt : ipsarum apices unius circiter pollicis intervallo distant, & inter utramque basim trium tantummodo linearum spatium extat. Dorsum, uropygium, pennas scapulares & supe-



riores caudæ tectrices tingit color splendide niger, maculis variegatus candidis, in dorso & scapularibus pennis majusculis & subquadratis, in uropygio & superioribus caudæ tectricibus minutissimis & rotundis. Pectus ad latera, immédiate infra collum, tæniis variegatur longitudinalibus alternatim nigris & candidis. Medium pectus, venter, crura & laterum maxima pars eleganter albicant. Partem laterum dorso finitimam cooperiunt pennæ nigrae, minutis maculis rotundis albis variæ. Inferiores caudæ tectrices nigricantes, pauco quoque candido variegatæ. Pennæ alas subtus obtegentes albæ; quædam tamen ex majoribus tæniâ insigniuntur cinereâ, secundum ipsarum scapi longitudinem extensâ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniore, sunt nigricantes, minutisque maculis rotundis candidis variæ: majores à corpore remotiores nigricantes & immaculatæ. Alam componunt triginta remiges nigricantes, atamen in ipsarum exortu, sed interiùs tantùm, colore multò dilutiore imbutæ: binæ

plumes scapulaires, fort petites & rondes sur le croupion & les couvertures du dessus de la queue. Les côtés de la poitrine, immédiatement au-dessous du col, sont variés de rayes longitudinales alternativement noires & blanches. Le milieu de la poitrine, le ventre, les jambes & une grande partie des côtés sont d'un beau blanc. La partie des côtés la plus proche du dos est couverte de plumes noires, variées de petites taches rondes blanches. Les couvertures du dessous de la queue sont noirâtres, & variées de même d'un peu de blanc. Celles du dessous des ailes sont blanches; quelques-unes des plus grandes sont cependant marquées d'une bande cendrée, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & variées de petites taches rondes blanches: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres & sans taches. L'aile est composée de trente plumes noirâtres, mais qui sont d'une couleur beaucoup plus claire à leur origine du côté intérieur seulement: les deux plus proches du corps sont de plus marquées de quelques pe-



tites [taches blanches, placées sur leurs bords vers leur extrémité. La première des plumes de l'aile est fort courte : la seconde & la troisième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de vingt plumes noirâtres. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec est noir, excepté son extrémité, qui est blanchâtre. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirâtres ; cependant le côté intérieur des pieds & des doigts tire un peu sur le rougeâtre. On le trouve dans les mers du Nord. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

corpori finitimæ minutis insuper quibusdam notantur maculis candidis, versùs ipsarum extremitatem ad margines positis. Remix prima valdè brevis est : secunda & tertia reliquarum omnium longitudinem excedunt. Vingt rectricibus nigricantibus cauda constat. Intermediæ lateralium longitudinem nonnihil antecellunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē ; unde fit cauda apice rotundata. Rostrum nigrum ; attamen in extremitate candicans. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigricant ; pedes tamen & digiti in latere interiore nonnihil ad rubescentem inclinant colorem. Habitat in mari Septentrionali. *Ex museo Realmuriano.*








2. *Petit Plongeon.*










Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Grand Plongeon.

2. Petit Plongeon.









2 . *Grand Plongeon tacheté.*









Desiné et Gravé par Martinet.

1. Plongeon à Gorge rouge .

2 . Grand Plongeon tacheté'.









# ORDO XXII. ORDRE XXII.

*A V E S*

*LES OISEAUX*

*Digitis tribus anticis, membranis integris inter se connexis, digito postico nullo: cruribus circa corpus medium & extra abdomen positis, corpore brevioribus, præditæ.*

*Qui ont trois doigts devant, tous joints ensemble par des membranes entieres, & point de doigt derriere: & les jambes avancées vers le milieu du corps, & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps.*

**I**N illo Ordine unicum continetur genus, scilicet *Albatri.*

**C**ET Ordre ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de l'*Albatros.*

Omnes hujus generis Alites rostro donantur lateraliter compresso; apice mandibulæ superioris adunco, inferioris quasi truncato.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le bec comprimé par les côtés; le bout de la mandibule supérieure crochu, & celui de la mandibule inférieure comme tronqué.

XCVIII.

XCVIII.

*Genus Albatri.*

*Genre de l'Albatros.*

Hujus character est  
 Digiti tres antichi, membranis integris inter se connexi; digitus posticus nullus;

Son caractère est d'avoir  
 Trois doigts devant, tous joints ensemble par des membranes entieres; & point de doigt derriere;

Q iij



Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

Le bec comprimé par les côtés :

Le bout de la mandibule supérieure crochu, & celui de la mandibule inférieure comme tronqué.

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora :

Rostrum lateraliter compressum :

Apex mandibulæ superioris aduncus, inferioris quasi truncatus.

Les Oiseaux de ce genre ont une petite membrane tout le long du côté intérieur du doigt intérieur, & une autre tout le long du côté extérieur du doigt extérieur. Ils ont aussi la partie inférieure de la jambe dégarnie de plumes.

Hujus generis Avium digitus intimus in latere interiore, & digitus extimus in latere exteriori per totam longitudinem membranulâ donantur. Ipsarum crurum pars infima plumis denudatur.

#### \* I. L'ALBATROS.

Albatrus superne fusco-rufescens, nigricante transversim striatus & maculatus, infernè albus; vertice griseo-rufescente; collo superiore & lateribus fusco transversim striatis; remigibus majoribus nigris, minoribus, rectricibusque plumbeo-nigricantibus . . . . ALBATRUS.

Diomedea alis pennatis, pedibus tridactylis. Diomedea exulans. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 65. sp. 1.*

Plautus Albatrus. *Klein. Avi. pag. 148. N<sup>o</sup>. 13.*

Albatros. *Edwards. Tom. II. pag. LXXXVIII; avec une figure exacte Pl. 83.*

Vaisseau de Guerre. *Alb. Tom. III. pag. 34; avec une figure peu exacte de la tête Pl. 81.*

Il est un peu plus grand & plus gros que le *Pelican*. Son bec, qui est la seule partie que

Magnitudine & crassitie *Onocrotalum* paululum superat. Rostrum, quod solum



ex hac Ave observavi, ab ipsius extremitate ad oris angulos usque sex pollices longum est. Pluribus partibus inter se connexis conflatum videtur. Nares supra mandibulam superiorem prope caput positæ sunt : constant tubulis figurâ suâ coni æmulis, cujus apex caput spectat, basis verò, in qua naris extat foramen, antrorsum vertitur. Pes quatuor pollices & sex circiter lineas longus est ; & trium digitorum medius cum ungue septem ferè pollices : laterales paulò sunt breviores. Membranis quoque exterius obfiti sunt. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem ferè pedum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Vertex capitis ex griseo rufescit. Reliquum caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albedinem autem in collo superiore & pectoris corporisque lateribus variegant lineolæ transversæ fuscæ. Dorsum & scapulares pennæ sunt fusco rufescentes, nigricante transversim striatæ, & majusculis insuper maculis con-

j'ai vue, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche six pouces de long. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. Ses narines sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de la tête : ce sont des tuyaux en forme de cône, dont le sommet est tourné vers la tête, tandis que la base, où est placée l'ouverture de la narine, est tournée en devant. Son pied a environ quatre pouces six lignes de long ; & celui du milieu des trois doigts, joint avec l'ongle, près de sept pouces : les latéraux sont un peu plus courts. Ils sont garnis aussi extérieurement de membranes. Il a près de dix pieds de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est d'un gris-roussâtre. Tout le reste de la tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs : cette couleur est variée sur la partie supérieure du col, & sur les côtés de la poitrine & du corps de petites lignes transversales brunes. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un brun-roussâtre, rayé transversa-



lement de noirâtre, & marqué en outre d'assez grandes taches de la même couleur. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont roussâtres. Le bord de l'aîle depuis le pli qui répond à celui du coude jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, est blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un plombé-noirâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur : les moyennes, ainsi que les plumes de la queue, sont d'un plombé-noirâtre. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un jaunâtre sale. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont de couleur de chair. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*.

coloribus insignitæ. Uropygium & superiores caudæ rectrices rufescunt. Alarum margines, ab articulo cubito humano respondente ad articulum carpum humanum referentem, albicant. Superiores alarum rectrices minores, sicut & majores corpori viciniore, sunt plumbeo-nigricantes : majores à corpore remotiores nigrae. Remiges majores nigro quoque imbutæ colore : minores, sicut & caudæ rectrices, plumbeo - nigricantes. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Rostrum sordide flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque carneo colore imbuti. Habitat in *Capite Bonæ Spei*.





# ORDO XXIII. ORDRE XXIII.

## A V E S

## LES OISEAUX

*Digitis quatuor, tribus anterioribus membranis integris inter se connexis, postico soluto: cruribus circa corpus medium & extra abdomen positis, corpore brevioribus: & rostro edentulo præditæ.*

*Qui ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur séparé: les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps: & le bec sans dentetures.*

**I**NTER hujus Ordinis Aves aliæ rostro donantur versùs apicem adunco; aliæ rostro recto & lateraliter plano præditæ sunt. In duas sectiones dividimus: in prima continentur illæ quæ rostrum habent versùs apicem aduncum (*vide Vol. I. Tab. VII. fig. 5*), ut *Puffinus*, *Procellaria*, *Stercorarius*, *Larus*: in secunda verò illæ quæ rostrum habent rectum & lateraliter planum (*vide Vol. I. Tab. VII. fig. 6*), ut *Sterna*, *Rygchopsalia*.

**P**ARMI les Oiseaux de cet Ordre, les uns ont le bec crochu vers le bout; les autres ont le bec droit & applati par les côtés. Ils se divisent en deux sections: dans la première sont ceux dont le bec est crochu vers le bout (*voyez Tom. I. Pl. VII. fig. 5*), comme le *Puffin*, le *Pétrel*, le *Stercoraire*, le *Goi-land*: & dans la seconde ceux qui ont le bec droit & applati par les côtés (*voyez Tom. I. Pl. VII. fig. 6*), comme l'*Hirondelle-de-mer*, le *Bec-en-ciseaux*.



## SECTION I.

*Ceux dont le bec est crochu vers le bout.*

CETTE section contient quatre genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns l'ont presque cylindrique; & parmi ceux-là, dans les uns le bout des deux mandibules est crochu, comme dans le *Puffin*: dans d'autres le bout de la mandibule supérieure est crochu, & celui de la mandibule inférieure est comme tronqué, comme dans le *Pétrel*: dans d'autres enfin le bout de la mandibule supérieure est crochu, & celui de la mandibule inférieure est arrondi, comme dans le *Stercoraire*: les autres ont le bec comprimé par les côtés; tous ceux-là ont le dessous de la mandibule inférieure anguleux, comme le *Goiland*.

## XCIX.

*Genre du Puffin.*

Son caractère est d'avoir quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé;

## SECTIO I.

*Eæ quæ rostro donantur versus apicem adunco.*

IN illa sectione quatuor continentur genera Avium formâ rostri à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostrum habent subcylindraceum; inter quas in aliis utriusque mandibulæ apex est aduncus, ut in *Puffino*: in aliis apex mandibulæ superioris est aduncus, inferioris quasi truncatus, ut in *Procellaria*: in aliis apex mandibulæ superioris est aduncus, inferioris rotundatus, ut in *Stercorario*: aliæ rostrum habent lateraliter compressum; quarum omnium mandibula inferior est infra angulosa, ut *Larus*.

## XCIX.

*Genus Puffini.*

Hujus character est Digiti quatuor, tres scilicet antichi membranis integris inter se connexi; posticus solutus;



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIII.* 131

<b>Crura circa corpus medium &amp; extra abdomen posita, corpore breviora :</b>	Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen , & plus courtes que le corps :
<b>Rostrum edentulum, subcylindraceum :</b>	Le bec sans dentelures , presque cylindrique :
<b>Apex utriusque mandibulæ aduncus.</b>	Le bout des deux mandibules crochu.

Omnium hujus generis Avium digitus intimus in latere interiore, & digitus extimus in latere exteriori per totam longitudinem membranulâ donatur. Ipsarum crurum pars infima plumis denudatur.

Tous les Oiseaux de ce genre ont une petite membrane tout le long du côté intérieur du doigt intérieur, & une autre tout le long du côté extérieur du doigt extérieur. Ils ont aussi la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes.

**\*\* I. LE PUFFIN.**

**Puffinus** superne saturatè cinereo-fuscus ; infernè albus ; reëtricibus lateralibus exteriùs fuscis, interiùs candidis ....  
**PUFFINUS.**

**Puffinus.** *Jonst. Avi. pag. 98.*

**Puffinus Anglorum.** *Willugh. Ornith. pag. 251.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 134. N°. A. 4.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

**Larus piger, cunicularis.** *Klein. Avi. pag. 139. N°. 18.*

**Sterna media, dorso fusco, ventre, uropygio & fronte albidis.** *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 482.*

**Diomedea Avis.** *Gesn. Avi. pag. 381.*

**Avis Diomedea.** *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 57. hujus icon satis accurata pag. 59.*

*Jonst. Avi. pag. 92. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 46.*

*Willugh. Ornith. pag. 251.*

*Charlet. Exer. pag. 100. N°. II.*

*Charlet. Onomazt. pag. 94. N°. II.*

**Avis Diomedea Aldrovandi & Gesneri.** *Raj. Syn. Avi. pag. 133. N° 1.*

**Shear-Water, i. e. Aquæ superficiem radens.** *Raj. Syn. Avi. pag. 133. N°. A. 2.*



Shear-Water, i. e. Avis aquæ superficiem radens. Willugh. Ornith. pag. 252.

Les Habitans des Isles de Tremiti l'appellent ARTENNA. Aldrov.

Les Anglois, MANKS PUFFIN. Raj. PUFFIN OF THE ISLE OF MAN. Willugh.

Les Anglois de la Jamaïque, WHITE-FACED SHEAR-WATER. Browne.

Il est à peu près de la grosseur d'un Canard. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces une ligne de long. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. Ses narines, qui sont formées par deux petits tuyaux cylindriques, sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de la tête. Sa queue a cinq pouces de long; la partie de ses jambes qui est dégarbie de plumes, six lignes; son pied seize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce onze lignes, l'extérieur un pouce neuf lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes; & celui de derrière, qui n'est autre chose qu'un ongle, n'a qu'une ligne de longueur. Il a trois pieds trois pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce au-delà du

Cum *Anate* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues quindecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque viginti quinque lineas longum est. Pluribus partibus inter se connexis conflatum videtur. Nares, quæ binis constant tubulis cylindraceis, supra mandibulam superiorem prope caput positæ sunt. Cauda quinque pollices longa est; pars crurum plumis denu data sex lineas; pes sexdecim lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & undecim lineas, extimus unum pollicem cum novem lineis, intimus unum pollicem & quinque lineas; posticus autem, qui ungue solummodo constat, unius tantum lineæ longitudine pollet. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & totidem pollicum inter-



vallo distant, alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, scapulares pennas, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices tingit color cinereo-fuscus saturatus. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescent. Alas componunt triginta remiges, quarum duodecim primores in latere exteriori & extremitate fuscæ, in latere interiori candidæ: quatuordecim proximè sequentes, à decima tertia scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè, concolores, attamen interiùs per totam longitudinem candidæ: quatuor tandem corpori viciniore fuscæ, excepto exortu candido, sed in latere interiori tantùm. Quæ quatuor novissimæ remiges maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, mediam caudæ longitudinem attingunt. Remix prima reliquas omnes longitudine superat. Duodecim tectricibus cauda conficitur:

bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un cendré-brun assez foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. L'aile est composée de trente plumes: les douze premières sont brunes du côté extérieur & à leur extrémité, & blanches du côté intérieur: les quatorze suivantes, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingt-sixième inclusivement, sont de la même couleur, excepté que leur côté intérieur est blanc dans toute sa longueur: enfin les quatre plus proches du corps sont brunes, si l'on en excepte leur origine, qui est blanche, mais du côté intérieur seulement. Ces quatre dernières plumes sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont brunes: toutes les latérales sont de la même cou-



leur du côté extérieur, & blanches du côté intérieur. Le bec est jaunâtre, excepté son crochet, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont jaunâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve dans les pays du Nord. Il a été envoyé de l'*Isle S. Kilda* à *M. de Reaumur* par *Milord Morton*.

binæ intermediæ fuscae; laterales omnes in latere exteriori concolores, in interiori candidæ. Rostrum flavicans, excepto unco nigricante. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti; sicut & ipforum membranæ, flavicant; ungues verò nigricant. In Septentrionalibus regionibus habitat. A *Kilda Insula* in museum *Realmurianum* missus est à *D. Morton*.

## \*\* 2. LE PUFFIN CENDRÉ.

*Voyez Pl. XII. Fig. 1.*

*Puffinus superne cinereus, infernè albus; reëtricihus candidis . . . . PUFFINUS CINEREUS.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces une ligne de long. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. Ses narines, qui sont formées par deux petits tuyaux cylindriques, sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de la tête. Sa

Crassitie præcedentem circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues quindécim pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque viginti quinque lineas longum est. Pluribus partibus inter se connexis conflatum videtur. Nares; quæ binis constant tubulis cylindræis, supra mandibulam superiorem prope caput positæ sunt. Cauda qua-



tuor pollices & decem lineas longa est; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum decem lineis, extimus unum pollicem & octo cum semi lineas, intimus sexdecim cum semi lineas; posticus autem, qui ungue solummodo constat, unius tantum lineæ longitudinem obtinet. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum duorum pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis posterior pars eleganter albicat, & paululum cinerei admixtum habet. Collum superius & ad latera, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque alarum teñtrices elegantissimo imbuuntur cinereo. Caput antèrius, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, teñtrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes niveo candore nitent. Alæ nothæ pennæ majores minutis quibusdam maculis nigricanti-

queue a quatre pouces dix lignes de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes, l'extérieur un pouce huit lignes & demie, l'intérieur seize lignes & demie; & celui de derrière qui n'est autre chose qu'un ongle, n'a qu'une ligne de longueur. Il a trois pieds deux pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce au-delà du bout de la queue. La partie postérieure de la tête est d'un beau blanc mêlé d'un peu de cendré. La partie supérieure & les côtés du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un très-joli cendré. La partie antérieure de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des ailes sont d'un blanc de neige. Les grandes plumes de l'aile bâtarde sont marquées de quelques petites taches noîrâtres. L'aile est composée de trente plumes: la première est



noire du côté extérieur & à son bout, & d'un gris-blanc du côté intérieur : la seconde & la troisième sont d'un gris-blanc, & terminées de noir : la quatrième & la cinquième sont d'un gris-blanc dans toute leur longueur, excepté leur extrémité, qui est noire & terminée par une très-petite tache blanche : les sept suivantes, sçavoir depuis la sixième jusqu'à la douzième inclusivement, sont d'un gris-blanc, & bordées intérieurement de blanc ; mais la sixième est marquée vers son extrémité d'une petite tache noire : les quatorze qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingt-sixième inclusivement, sont d'un gris-blanc du côté extérieur, & blanches du côté intérieur & à leur bout : enfin les quatre plus proches du corps sont d'un gris-blanc, si l'on en excepte leur origine, qui est blanche, mais du côté intérieur seulement. Ces quatre dernières plumes sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est noir. La partie des jambes qui

bus notantur. Triginta remigibus ala conflatur : prima in latere exteriori & apice nigra, in latere interiori cinereo-alba : secunda & tertia cinereo-albæ, nigro terminatæ : quarta & quinta per totam longitudinem cinereo-albæ, attamen in extremitate nigra & minutissimâ maculâ candidâ terminatæ : septem proximè sequentes, à sexta scilicet ad duodecimam usque inclusivè, cinereo-albæ, interius candido fimbriatæ ; sexta tamen versus ipsius extremitatem minutâ maculâ nigrâ notatur : quatuordecim quæ nuper descriptas sequuntur, à decima tertia scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè, in latere exteriori cinereo-albæ, in latere interiori & apice candidæ : quatuor tandem corpori viciniore cinereo-albæ, excepto exortu candido, sed interius tantum. Quæ quatuor novissimæ remiges maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, ad mediam caudæ longitudinem pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem antecellit. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Rostrum nigrum.



nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, sunt griseo-fuscescentes; ungues verò nigricantes. In Septentrionalibus regionibus habitat. *Ex museo D. Aubry.*

est dégarinée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un gris-brun; & les ongles noirâtres. On le trouve dans les pays du Nord. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

### 3. LE PUFFIN DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

*Puffinus in toto corpore fusco-nigricans; reëtricibus concoloribus . . . PUFFINUS CAPITIS BONÆ SPEI.*

*Procellaria fusca immaculata, rostro flavo. Procellaria æquinoëctialis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 64. sp. 2.*

*Sterna major fusca humile volans. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 482.*

*Plautus Albatros spurius major. Klein. Avi. pag. 148. N°. 14.*

*Grand Pierrot, Oiseau de tempête. Edwards. Tom. II. pag. LXXXIX; avec une figure exacte Pl. 89.*

*Les Anglois de la Jamaïque l'appellent, LARGER DARK PETTERILL; ou SHEAR-WATER. Browne.*

*Corvum* crassitie circiter æmulatur. Rostrum ab ipsis unco ad oris angulos usque tres circiter pollices longum est. Pluribus partibus inter se connexis conflatum videtur. Nares, quæ binis constant tubulis cylindraceis sex circiter lineas longis, supra mandibulam superiorem prope caput positæ sunt. Alæ, ab articulo carpo humano respondente ad majoris remigis extremitatem usque quindecim circiter pollices longæ sunt, & dum

*Tom. VI.*

Il est à peu près de la grosseur d'un *Corbeau*. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a environ trois pouces de long. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. Ses narines, qui sont formées par deux tuyaux cylindriques longs d'environ six lignes, sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de la tête. Ses ailes, depuis le pli qui répond à celui du poignet jusqu'à l'extrémité de la plus grande plume, ont environ

S



quinze pouces de longueur, & lorsqu'elles sont pliées, elles s'étendent bien au-delà du bout de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un brun-noirâtre. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, celles du dessus & du dessous de la queue, les plumes de l'aile & celles de la queue sont de la même couleur. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. Les deux du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont bruns; & les ongles noirs. Le doigt de derrière, qui n'est autre chose qu'un ongle, a tout au plus deux lignes de longueur. On le trouve au Cap de Bonne Espérance.

complicantur, ultra caudam extremam multum protenduntur. Per universum corpus pennis vestitur fusco-nigricantibus. Scapulares, quæ alas superne & inferne obtegunt, rectrices caudæ superiores & inferiores, alarum remiges, caudæque rectrices eodem colore tinguntur. Remix prima omnium est longissima. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, fusci; ungues verò nigri. Digitus posticus, qui ungue solummodo constat, duarum linearum, nec amplius, longitudinem obtinet. Habitat in Capite Bonæ Spei.

#### 4. LE PUFFIN DU BRÉSIL.

*Puffinus fusco-nigricans*; collo inferiore flavo; rectricibus fusco nigricantibus . . . . *PUFFINUS BRASILIENSIS.*

*Majague Pison. Hist. Nat. pag. 83, in qua hujus icon præfata.*

*Majague Brasiliensium Pisoni. Willugh. Ornith. pag. 252, hujus icon & Pisonæ mutata Tab. LXII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 133. N°. 3.*

*Les Brasiiliens l'appellent MAJAGUE. Pison.*



Magnitudine & crassitie  
*Anserem* circiter æmulator.  
Caput, partem colli superiorem, universumque corpus vestiunt pennæ fusconigricantes. Scapulares, alas superne & infernè coopèrantes, rectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Quæ partem colli inferiorem obtegunt, sunt flavæ. Alarum remiges, sicut & caudæ rectrices, ex fusco nigricant. Cujus coloris sint rostrum, pedesque, prorsus me latet. Habitat in *Brasilia*. Circa fluviorum ostia in mari vivit; & in littore nidificat.

C.

*Genus Procellariæ.*

Hujus character est  
Digiti quatuor, tres scilicet  
antici membranis integris  
inter se connexi, posticus  
solutus :

Crura circa corpus medium  
& extra abdomen posita,  
corpore breviora :

Rostrum edentulum, subcylindraceum :

Apex mandibulæ superioris  
aduncus, inferioris quasi  
truncatus.

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur d'une Oye. La tête, le dessus du col & tout le corps sont couverts de plumes d'un brun-noirâtre. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les plumes qui couvrent la partie inférieure du col, sont jaunes. Les plumes de l'aile & celles de la queue sont d'un brun-noirâtre. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve au *Bresil*. Il se tient dans la mer, près de l'embouchure des rivières; & fait son nid sur le rivage.

C.

*Genre du Pétrel.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois  
antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé :

Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

Le bec sans dentelures, presque cylindrique :

Le bout de la mandibule supérieure crochu, & celui de la mandibule inférieure comme tronqué.



Tous les Oiseaux de ce genre ont une petite membrane tout le long du côté intérieur du doigt intérieur. Ils ont aussi la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes.

Omnium hujus generis Avium digitus intimus per totam lateris interioris longitudinem membranulâ donatur. Ipsarum crurum pars infima plumis denudatur.

\*\* 1. LE PÉTREL.

Voyez Pl. XIII. Fig. 1.

*Procellaria superne nigricans , internè cinereo-fusca ; rectricibus caudæ superioribus candidis , nigricante terminatis ; rectricibus nigricantibus , tribus utrinque extimis in exortu albidis . . . . PROCELLARIA.*

*Procellaria nigra , uropygio albo. Procellaria pelagica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 64. sp. 1.*

*Procellaria. Faun. Suec. Linn. N°. 249. hujus icon non satis accurata Tab. II. N°. 249.*

*Moehr. Avi. Gen. 72.*

*Plautus minimus procellarius. Klein. Avi. pag. 148. N°. 12.*

*Plautus Albatrosi spurius minimus. Klein. Avi. pag. 148. N°. 14.*

*Avis Petri. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 85. sp. 1.*

*Stromfinck. Clus. Exot. Auctuar. pag. 368.*

*Euf. Nieremb. pag. 237.*

*Jonst. Avi. pag. 129.*

*Willugh. Ornith. pag. 306.*

*Pétrel des Anglois. Ab. Tom. III. pag. 38 ; avec une figure peu exacte & mal coloriée Pl. 92.*

*Petit Pierrot. Edwards. Tom. II. pag. XC ; avec une figure peu exacte Pl. 90.*

*Pintou de mer ou de Tempête. Catesb. append. pag. 14 ; avec une figure passable Pl. 14.*

*Petit Oiseau appelé Rotje. Andersf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. pag. 54 ; avec une mauvaise figure Pl. 1.*

*Les Suédois l'appellent STROMWÆ SFOGEL ou STROMWÆDERS FOGELN. Linn.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë , STROMFINCK. Clus. Nieremb.*

*Les Hollandois , ROTJE. Andersf.*

*Les Hambourgeois , ROTIE. Andersf.*

*Les Anglois , PETTERIL. Alb.*



Cum *Alauda* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & decem lineas explet, & ad extremos ungues quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque sex lineas longum est. Pluribus partibus inter se connexis conflatum videtur. Nares, quæ binis constant tubulis cylindraceis, supra mandibulam superiorem prope caput positæ sunt. Cauda duos pollices & totidem lineas longa est; pars crurum plumis denudata binas cum semi lineas; pes decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas, extimus octo cum semi lineas, intimus septem cum semi lineas; posticus autem, qui ungue solummodo constat, tres quartas tantum lineæ unius partes longus est. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis posterior pars, collum superius, dorsum, uropygium,

Il est à peu près de la longueur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de longueur. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. Ses narines, qui sont formées par deux petits tuyaux cylindriques, sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de la tête. Sa queue a deux pouces deux lignes de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux lignes & demie; son pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'extérieur huit lignes & demie, l'intérieur sept lignes & demie; & celui de derrière, qui n'est autre chose qu'un ongle, n'a que trois quarts de lignes de longueur. Il a douze pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie postérieure de la tête, le dessus du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des



ailes sont noirâtres. La partie antérieure de la tête, la gorge, le dessous du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré-brun ; cependant quelques-unes de ces dernières sont blanchâtres. Toutes les couvertures du dessus de la queue sont blanches, & terminées de noirâtre. Les petites & les moyennes du dessous des ailes sont d'un brun-noirâtre : les grandes sont d'un cendré-brun. Le bord de l'aile au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes noirâtres, bordées de cendré-brun. L'aile est composée de vingt-deux plumes : les neuf premières sont noirâtres : toutes les autres sont de la même couleur, excepté leur origine, qui est blanchâtre, mais du côté intérieur seulement. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont noirâtres : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur, si l'on en excepte son origine, qui est blanchâtre, mais du côté intérieur seulement : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanchâtres à leur origine, & noirâtres dans le reste de leur

pennæ scapulares, alarumque superiores tectrices nigricant. Caput anterius, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices ex cinereo fuscescunt ; quædam tamen ex tectricibus caudæ inferioribus candicant. Pennæ omnes caudam superne cooperientes sunt candidæ, nigricante terminatæ. Tectrices alarum inferiores minores & mediæ sunt fusco-nigricantes : majores cinereo-fuscæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, obtegunt plumulæ nigricantes, cinereo-fusco fimbriatæ. Viginti duabus remigibus ala conflatur : novem primores nigricant : reliquæ omnes eodem colore tinguntur, attamen in exortu candicant, sed in latere interiore tantum. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum quatuor intermediæ sunt nigricantes : utrinque proximè sequens eodem imbuitur colore, excepto ipsius exortu candicante, sed interius tantum : tres utrinque extimæ in exortu albidæ, in reliqua longitudine nigricantes. Rostrum, pars crurum plumis



denudata, pedes, digiti, sicut & ipforum membranæ, unguesque nigri. Habitat in mari Septentrionali. In rupibus nidificat; & sapissimè mare plenum petit. *Ex museo Realmuriano.*

longueur. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. On le trouve dans les mers du Nord. Il fait son nid dans les rochers; & s'avance souvent très-loin en mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**\*\* 2. LE PÉTREL CENDRÉ.**

*Voyez Pl. XII. Fig. 2.*

*Procellaria superne cinerea, infernè alba; capite & collo concoloribus; rectricibus duodecim intermediis cinereo-albis, utrinque extimâ candidâ . . . . . PROCELLARIA CINEREA.*

*Haffbert. Clus. Exot. Auctuar. pag. 368.*

*Euf. Nieremb. pag. 237.*

*Haffbert seu Equus marinus. Jonst. Avi. pag. 129.*

*Haffbert, hoc est, Equus marinus. Willugh. Ornith. pag. 306.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë l'appellent HAFHERT. Clus. Nieremb. Jonst. Willugh. HAUBEST.*

*Les Allemands, SEEPFERD.*

*Crassitie Anatem domesticam circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque viginti quinque lineas longum est. Pluribus partibus inter se connexis conflatum*

Il est à peu près de la grosseur du *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces neuf lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces une ligne de longueur. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les au-



tres. Ses narines, qui sont formées par deux tuyaux cylindriques, sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de la tête. Sa queue a quatre pouces trois lignes de long; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, sept lignes & demie; son pied un pouce onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces huit lignes, l'extérieur deux pouces neuf lignes, l'intérieur deux pouces deux lignes; & celui de derrière, qui n'est autre chose qu'un ongle, n'a que deux lignes & demie de longueur. Il a trois pieds quatre pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessus des ailes & les côtés sont blancs. Les plumes qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont cendrées. Celles qui couvrent le croupion, & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré plus clair. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même cendré que le dos; les

videtur. Nares, quæ binis constant tubulis cylindraceis, supra mandibulam superiorem prope caput positæ sunt. Cauda quatuor pollices & tres lineas longa est; pars crurum plumis denudata septem cum semi lineas; pes unum pollicem & undecim lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices & octo lineas; extimus duos pollices cum novem lineis, intimus duos pollices & totidem lineas; posticus autem, qui ungue solummodo constat, binas tantum cum semi lineas longus est. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum quatuor pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra caudam extremam nonnihil extenduntur. Caput, guttur, collum; pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes al-bent. Quæ dorsum vestiunt; sicut & scapulares, sunt cinereæ. Quæ uropygium cooperiunt, superioresque caudæ tectrices dilutiore cinereo imbutæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ; eodem



eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores cinereo saturatiore tinguntur. Alarum componunt triginta remiges : decem primores in latere exteriori & apice saturatè cinereæ , in latere interiore cinereo-albæ : sexdecim proximè sequentes , ab undecima scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè , exterius & extremitate cinereæ , interiorius candidæ : quatuor corpori viciniore in tota longitudine cinereæ , excepto tamen ipsarum exortu candido , sed solummodo in latere interiore. Cauda quatuordecim constat rectricibus , quarum duodecim intermediæ cinereo-albæ : utrinque extrema candida. Rostrum dilutè griseum , exceptis extremitate flavicante & naribus fuscis. Pars crurum plumis denudata , pedes , digiti , sicut & ipsorum membranæ , unguisque grisei. Habitat in mari Septentrionali. In rupibus nidificat. A *Kilda Insula* in museum *Realmurianum* missa à *D. Morton*.

grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré plus foncé. L'aile est composée de trente plumes : les dix premières sont d'un cendré foncé du côté extérieur & à leur extrémité , & d'un gris-blanc du côté intérieur : les seize suivantes , savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-sixième inclusivement , sont cendrées du côté extérieur & à leur bout , & blanches du côté intérieur : les quatre plus proches du corps sont cendrées dans toute leur étendue , si l'on en excepte cependant leur origine , qui est blanche , mais du côté intérieur seulement. La queue est composée de quatorze plumes : les douze du milieu sont d'un gris-blanc : la plus extérieure de chaque côté est blanche. Le bec est d'un gris clair ; le bout en est cependant jaunâtre ; & les narines sont brunes. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes , les pieds , les doigts , ainsi que leurs membranes , & les ongles sont gris. On le trouve dans les mers du Nord. Il fait son nid dans les rochers. Il a été envoyé de l'*Isle S. Kilda* à *M. de Reaumur* par *Milord Morton*.



**\*\* 3. LE PÉTREL TACHETÉ APPELLÉ VULGAIREMENT  
DAMIER.**

*Procellaria alba*, superne maculis nigricantibus varia; capite, gutture & collo superiore nigricantibus; rectricibus lateralibus in exortu candidis, in extremitate nigricantibus....  
**PROCELLARIA NÆVIA.**

*Procellaria albo fuscoque varia. Procellaria Capensis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 64 sp. 3.*

*Plautus Albatros spurius minor, è nigro & albo varius. Klein. Avi. pag. 148. N°. 14.*

*Pierrot tacheté. Edwards. Tom. II. pag. XC; avec une figure exacte Pl. 90.*

*Damier. Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 211. (ed. 1714).*

*Les Habitans du Cap de Bonne Espérance l'appellent PENTADO. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon Romain*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces onze lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. Ses narines, qui sont formées par deux tuyaux presque cylindriques, sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de la tête. Sa queue a quatre pouces de long; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, quatre lignes; son pied un pouce six lignes; celui du milieu des trois

*Cum Columba Romana* circiter crassitie convenit. *Ipsius* longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices æquat; & ad extremos ungues tredecim pollices & undecim lineas. *Rostrum* ab ipsis unco ad oris angulos usque octodecim lineas longum est. *Pluribus* partibus inter se connexis conflatum videtur. *Nares*, quæ binis constant tubulis subcylindraceis, supra mandibulam superiorem prope caput posita sunt. *Cauda* quatuor pollices longa est; *pars crurum* plumis denudata quatuor lineas; *pes* octodecim lineas; *trium digitorum anticorum* medius



cum ungue duos pollices cum linea una ; extimus eadem longitudine pollet ; intimus unum pollicem & novem lineas longus ; posticus autem binas tantum cum semi lineas ; ungue enim solo ferè constat. Alis expansis , extremitates majorum remigum duorum pedum & septem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad undecim linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput , guttur & collum superius nigricant. Pennæ dorsum & uropygium vestientes , sicut & scapulares , tectricesque caudæ superiores & inferiores , albescent , & maculæ nigricantes terminantur. Pars colli inferior , pectus , venter , crurum suprema pars & latera albicant ; latera tamen variegant minutæ quædam maculæ nigricantes : pars colli inferior ad latera quibusdam quoque maculis nigricantibus variegatur. Tectrices alarum inferiores minimæ nigricantes : mediæ & majores candidæ , quibusdam minutæ maculæ nigricante terminatis. Superiores minimæ , sicut & majores à corpore remotiores , nigricantes : mediæ & majores medium

doigts antérieurs , joint avec l'ongle , vingt-cinq lignes ; l'extérieur est de la même longueur ; l'intérieur a un pouce neuf lignes de long ; & celui de derrière deux lignes & demi seulement ; car il ne consiste presque que dans l'ongle. Il a deux pieds sept pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à onze lignes au-delà du bout de la queue. La tête , la gorge & la partie supérieure du col sont noirâtres. Les plumes qui couvrent le dos & le croupion , ainsi que les scapulaires & les couvertures du dessus & du dessous de la queue , sont blanches , & terminées par une tache noirâtre. La partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , le haut des jambes & les côtés sont blancs ; les côtés sont cependant variés de quelques petites taches noirâtres : il y en a aussi quelques-unes sur les côtés de la partie inférieure du col. Les plus petites couvertures du dessous des ailes sont noirâtres : les moyennes & les grandes sont blanches , & quelques-unes sont terminées par une petite tache noirâtre. Les plus petites du dessus , ainsi que les grandes les plus éloignées du corps , sont de cette dernière couleur : les



moyennes & les grandes qui occupent le milieu, sont blanches du côté intérieur, noirâtres & bordées de blanc du côté extérieur : enfin les moyennes & les grandes les plus proches du corps sont blanches, & terminées par une tache noirâtre. L'aile est composée de vingt-neuf plumes : les deux premières sont noirâtres, excepté leur côté intérieur, qui est blanc depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur : la troisième & la quatrième sont de la même couleur, mais elles ont aussi un peu de blanc à leur origine du côté extérieur : toutes les autres, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la vingt-neuvième inclusivement, sont blanches, & terminées de noirâtre, cette dernière couleur occupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus proche du corps. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de quatorze plumes : les deux du milieu sont cendrées depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur ; le reste est noirâtre : toutes les latérales sont blanches depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur ; & de-là à leur extrémité elles sont noirâ-

locum obtinentes in latere interiore candidæ, in exteriore nigricantes, albo finibriatæ : mediæ tandem & majores corpori finitimæ candidæ, maculâ nigricante terminatæ. Alam componunt viginti novem remiges : binæ primores nigricantes, attamen in latere interiore ab ipsarum exortu versùs tres quartas longitudinis partes usque candidæ : tertia & quarta concolores, sed paucò quoque albo exteriùs in ipsarum exortu notantur : reliquæ omnes, à quinta scilicet ad vigesimam nonam usque inclusivè, candidæ, nigricante terminatæ ; color autem nigricans eò minus spatium occupat, quò remix fit corpori vicinior. Remix prima reliquarum omnium longitudinem antecellit. Caudam componunt quatuordecim rectrices, quarum binæ intermediæ ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque cinereæ, in reliqua longitudine nigricantes : laterales omnes ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque candidæ, inde ad extremitatem nigricantes : in duabus tamen utrinque rectrici-



bus binas intermedias proximè sequentibus albedo cinereo respersitur. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum nigrum. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, nigricantes; ungues verò nigri. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Abbate de la Caille*.

tres : cependant le blanc des deux de chaque côté qui approchent le plus des deux du milieu, est tout parsemé de cendre. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir. Les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont noirâtres; & les ongles noirs. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. l'Abbé de la Caille*.

CI.

*Genus Stercorarii.*

Hujus character est  
Digiti quatuor, tres scilicet antici membranis integris inter se connexi, posticus solutus :

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora :

Rostrum edentulum, subcylindraceum :

Apex mandibulae superioris aduncus, inferioris rotundatus,

CI.

*Genre du Stercoraire.*

Son caractere est d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé :

Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

Le bec sans dentelures, presque cylindrique :

Le bout de la mandibule supérieure crochu, & celui de la mandibule inférieure arrondi.



Tous les Oiseaux de ce genre ont une petite membrane tout le long du côté intérieur du doigt intérieur, & une autre tout le long du côté extérieur du doigt extérieur. Ils ont aussi la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes.

Omnia hujus generis Avium digitus intimus in latere interiore, & digitus extimus in latere exteriori per totam longitudinem membranulâ donantur. Ipsarum crurum pars infima plumis denudatur.

### \*\* I. LE STERCORAIRE.

*Stercorarius fuscus*, superne saturatius, infernè dilutius; rectricibus saturatè fuscis . . . STERCORARIUS.

Il est un peu plus gros que le *Puffin cendré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de longueur. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. Ses narines sont oblongues, & placées sur les côtés du demi-bec supérieur assez près de son crochet. Sa queue a quatre pouces neuf lignes de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied un pouce neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur seize lignes & demie, l'inté-

*Crassitie Puffinum cinereum* nonnihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & quinque pollices æquat, & ad extremos ungues sexdecim pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est. Pluribus partibus inter se connexis conflatum videtur. Nares sunt oblongæ, & ad latera mandibulæ superioris prope ipsius uncum positæ. Cauda quatuor pollices & novem lineas longa est; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes unum pollicem cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus sex-



decim cum semi lineas, intimus quatuordecim lineas; posticus autem quatuor lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duorum pollicum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscae. Scapulares, superioresque caudæ teñtrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ teñtrices & pennæ alas subtus obtegentes fusco tinguntur nonnihil dilutior. Teñtrices alarum superiores, ipsarumque remiges fusco imbuuntur colore paulò saturiore, quàm qui dorsum tingit. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigri. In Septentrionalibus regionibus habitat. *Ex museo Reaumuriano.*

rieur quatorze lignes; & celui de derriere quatre lignes. Il a trois pieds six pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux pouces au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes. Les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont d'un brun un peu plus clair. Les couvertures du dessus des ailes & les plumes de l'aile sont d'un brun un peu plus foncé que celui du dos. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aile. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. On le trouve dans les pays du Nord. *Du cabinet de M. de Reaumur.*



## \*\* 2. LE STERCORAIRE RAYÉ.

*Voyez Pl. XIII. Fig. 2.*

*Stercorarius superne fuscus , pennis apice rufescente marginatis , infernè sordidè albus , fusco transversim striatus ; capite fusco ; gutture fusco-candicante , rectricibus in exortu albidis , in reliqua longitudine saturatè fuscis . . . .*  
**STERCORARIUS STRIATUS.**

Oiseau Arctique. *Edwards. Tom. III. pag. CXLIX ; avec une figure exacte Pl. 149.*

*Les Anglois l'appellent ARCTICK BIRD. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur du *Pétrel cendré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied six pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles d'un pied quatre pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de longueur. Il semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. Ses narines sont oblongues , & placées sur les côtés du demi - bec supérieur assez près de son crochet. Sa queue a six pouces de long ; la partie de ses jambes qui est dé garnie de plumes , six lignes ; son pied un pouce huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , un pouce dix lignes , l'extérieur un pouce sept lig-

*Cum Procellaria cinerea* crassitie circiter convenit. *Ipsius* longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem sex pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues unum pedem quatuor pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices longum est. Pluribus partibus inter se connexis conflatum videtur. Nares sunt oblongæ , & ad latera mandibulæ superioris prope ipsius uncum positæ. Cauda sex pollices longa est ; pars crurum plumis denudata sex lineas ; pes unum pollicem & octo lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum decem lineis , extimus unum pollicem & septem lineas ;



lineas, intinus sexdecim cum semi lineas; posticus autem quatuor cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum sex pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput fuscum est. Guttur fusco dilutissimo sive fusco-candicante tingitur. Collum, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscae, rufescente in apice marginatæ: quæ margo rufescens in uropygio & dorso infimo multò magis est conspicua quàm in parte dorsi suprema. Scapulares superiores eodem imbuuntur colore ac pennæ dorsum vestientes ipsæ tinguntur: inferiores, quæ quidem majores, sunt fuscae, quibusdam solummodo minutissimis maculis rufescentibus insignitæ. Superiores caudæ teatrices fusco & albo-rufescente transversim striatæ. Pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera obtegunt pennæ sordide albæ, latis tæniis transversis fuscis variæ. Teatrices caudæ inferiores sunt quoque sordide albæ & fusco transversim striatæ. Pennæ alas subtus cooperientes tæ-

nes, l'intérieur seize lignes & demie; & celui de derrière quatre lignes & demie. Il a trois pieds six pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête est brune. La gorge est d'un brun très-clair ou blanchâtre. Le col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, bordées de roussâtre par le bout: cette bordure est beaucoup plus apparente sur le croupion & la partie inférieure du dos que sur sa partie supérieure. Les scapulaires supérieures sont de la même couleur que les plumes du dos: les inférieures, qui sont les plus grandes, sont brunes, & marquées seulement de quelques taches roussâtres très-petites. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de brun & de blanc-roussâtre. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes d'un blanc sale, variées de larges bandes transversales brunes. Les couvertures du dessous de la queue sont aussi rayées transversalement de blanc sale & de brun. Celles du dessous des aîles sont rayées des mêmes couleurs, mais assez irrégulièrement. Les



plus petites couvertures du dessus des ailes sont brunes, & bordées de roussâtre par le bout : les moyennes & les grandes sont d'un brun foncé & sans bordures. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur, si l'on en excepte leur côté intérieur, qui est d'un blanc sale depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur : les moyennes (excepté les quatre plus proches du corps) sont blanches à leur origine, & d'un brun foncé dans tout le reste de leur longueur : enfin les quatre plus proches du corps sont entièrement d'un brun foncé. La queue est composée de douze plumes blanchâtres à leur origine, & cela dans un très-petit espace, & d'un brun foncé dans tout le reste de leur longueur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de corne, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont jaunâtres ; les membranes sont d'une couleur plus obscure ; & les ongles noirâtres. On le

niis variegantur iisdem coloribus imbutis, non quidem transversis, sed irregularibus. Superiores alarum rectrices minimæ fuscæ, rufescente in apice marginatæ : mediæ & majores saturatè fuscæ, marginibus destitutæ. Remiges majores fusco quoque saturato imbutæ, attamen in latere interiore ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque sordidè albæ : minores (quatuor tamen corpori finitimis exceptis) in exortu candidæ, in reliqua longitudine saturatè fuscæ : quatuor tandem corpori viciniore fusco saturato penitus imbutæ. Caudam componunt duodecim rectrices in exortu albidæ, idque per minimum intervallum, in reliqua longitudine saturatè fuscæ. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum corneo colore imbutum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti flavicantes ; ipsorum membrana obscuriore colore tincta ; ungues verò nigricantes. In



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIII.* 155  
 Septentrionalibus regioni- trouve dans les pays du Nord.  
 bus habitat. *Ex museo D. Du cabinet de M. Mauduyt.*  
*Mauduyt.*

### 3. LE STERCORAIRE A LONGUE QUEUE.

*Stercorarius superne saturatè cinereus, infernè albus; capite superiùs nigricante; collo candido; imo ventre dilutè cinereo; rectricibus cinereo-nigricantibus, binis intermediis longissimis . . . . STERCORARIUS LONGICAUDUS.*

*Plautus Stercorarius. Klein. Avi. pag. 148. N°. 10.*

*Sterna rectricibus maximis nigris. Faun. Suec. Linn. N°. 129.*

*Larus rectricibus intermediis longissimis. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 53.*

*Sp. 4.*

*Larus rectricibus duabus intermediis longissimis. Larus parasiticus. Linn.*

*Systh. Nat. ed. 10. Gen. 69. sp. 6.*

*Larus subfuscus major, vertice nigro, ventre albido, rectricibus intermediis longissimis. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 482.*

*Strundt-Jager, id est Κοπεθιδης. Raj. Syn. Avi. pag. 127. N°. 2.*

*Oiseau Arctique. Edwards. Tom. III. pag. CXLVIII; avec une figure exacte Pl. 148.*

*Les Suédois l'appellent SWARTLASSE. Linn.*

*Les Suédois qui habitent la Province d'Angermanland, LABBEN. Linn.*

*Les Anglois, ARCTICK BIRD. Edwards.*

*Les Anglois de la Baye de Hudson, MAN-OF WAR BIRD. Edwards.*

Præcedenti paululùm craf-  
 sitie cedit. Rostrum ab ipsius  
 unco ad oris angulos usque  
 unum pollicem & sex circi-  
 ter lineas longum est. Pluri-  
 bus partibus inter se con-  
 nexis conflatum videtur. Na-  
 res sunt oblongæ, & ad la-  
 tera mandibulæ superioris  
 prope ipsius uncum positæ.  
 Cauda tredecim pollices  
 longa est; pes duos ferè pol-  
 lices; trium digitorum anti-

Il est un peu moins gros que  
 le précédent. Son bec depuis  
 son crochet jusqu'aux coins de  
 la bouche a environ un pouce  
 six lignes de longueur. Il sem-  
 ble être composé de plusieurs  
 pieces articulées les unes avec  
 les autres. Ses narines sont  
 oblongues, & placées sur les  
 côtés du demi-bec supérieur  
 assez près de son crochet. Sa  
 queue a treize pouces de lon-  
 gueur; son pied près de deux




pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs; joint avec l'ongle, environ quinze lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est très-court. Ses aîles, depuis le pli qui répond à celui du poignet jusqu'à l'extrémité des plus grandes plumes, ont environ un pied de longueur; & lorsqu'elles sont pliées, elles s'étendent jusque vers le tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noirâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un cendré foncé. Les côtés de la tête, la gorge, le col, la poitrine, le haut du ventre & le haut des côtés sont blancs. Le bas-ventre, le bas des côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré clair. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un cendré-noirâtre, quelques-unes ayant leur tige blanche : les moyennes sont du même cendré que celui du dos. Les plumes de la queue sont d'un cendré-noirâtre. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la

corum medius cum ungue quindecim circiter lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem brevissimus. Alæ, ab articulo carpo humano respondente ad majorum remigum extremitatem usque, unius circiter pedis longitudinem obtinent ; & dum complicantur, versus tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput superius nigricat. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, rectricesque caudæ superiores & inferiores cinereo tinguntur saturato. Caput ad latera, guttur, collum, pectus, venter supremus & laterum suprema pars albicant. Ventrem imum, laterum partem inferam, crurum partem supremam, inferioresque caudæ rectrices tingit color dilutè cinereus. Remiges alarum majores ex cinereo nigricant, quibusdam scapis albis præditis : minores eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur. Caudæ rectrices sunt cinereo-nigricantes. Binæ intermedia lateralium longitudinem multum antecellunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrin-



Fig. 1.



2. Pétrel cendré.







Fig. 2.

Fig. 1.



De la rue et Gravés par Martinet

1. Puffin cendré.

2. Pétrel cendré.









Fig. 2.

aire rayé.









Dessiné d'Ornè par Martini.

1. Pétrel.

2. Stercoraire rayé.







que extimam usque brevior-  
rem. Rostrum rubescens ,  
exceptâ extremitate nigri-  
cante. Pars crurum plumis  
denudata , pedes & digiti  
flavi ; ipsorum membranæ ,  
unguesque nigricantes. In  
Septentrionalibus regioni-  
bus habitat.

plus extérieure de chaque côté ;  
qui est la plus courte. Le bec  
est rougeâtre , excepté son ex-  
trémité , qui est noirâtre. La  
partie des jambes qui est dé-  
garnie de plumes , les pieds &  
les doigts sont jaunes : les  
membranes & les ongles sont  
noirâtres. On le trouve dans  
les pays du Nord.

CII.

*Genus Lari.*

Hujus character est  
Digiti quatuor , tres scilicet  
antici membranâ inte-  
gris inter se connexi , pos-  
ticus solutus :

Crura circa corpus medium  
& extra abdomen posita ,  
corpore breviora :

Rostrum edentulum , latera-  
liter compressum , versùs  
apicem aduncum :

Mandibula inferior infra an-  
guloſa.

Omnium hujus generis  
Avium pars crurum infima  
plumis denudatur.

*Les Normands appellent le Goiland en général MAULVE. Aldrov.*

*Les Habitans de Marseille , GABIAN. Aldrov.*

*Les Grecs , Λάρος. Gefn. Aldrov.*

*Les Italiens en quelques endroits , OCA ou OCA MARINA. Aldrov.*

*Les Vénitiens , CROCALO. Aldrov.*

*Les Allemands , MEWE. Aldrov.*

CII.

*Genre du Goiland.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts , dont les trois  
antérieurs sont joints ensen-  
ble par des membranes entie-  
res , & le postérieur est séparé :

Les jambes avancées vers le  
milieu du corps & hors de  
l'abdomen , & plus courtes  
que le corps :

Le bec sans dentelures , com-  
primé par les côtés , & cro-  
chu vers le bout :

Le dessous de la mandibule  
inférieure anguleux.

Tous les Oiseaux de ce genre  
ont la partie inférieure des jam-  
bes dégarnie de plumes.



*Les Allemands qui habitent près des bords de la mer, SEA-MEWE Aldrov.*

*Les Hollandois, KOCK-MEW. Aldrov.*

*Les Illyriens, WLASTO WIGE ou MORSKA. Aldrov.*

*Les Anglois, SEECOB ou SEEGEL. Aldrov.*

## \*\* 1. LE GOILAND NOIR.

**Larus superne splendide niger, infernè albus; capite & collo concoloribus; remigibus nigris, apice albis; reëtricibus candidis . . . . LARUS NIGER.**

*Larus albus, dorso atro. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 53. sp. 3.*

*Larus albus, dorso nigro. Larus marinus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 69. sp. 3.*

*Larus ingens marinus. Clus. Exot. Lib. V. cap. IX. pag. 104, in qua hujus icon minùs accurata.*

*Larus maximus ex albo & nigro seu cœruleo-nigricante varius. Willugh. Ornith. pag. 261.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

*Larus maximus ex albo & nigro seu cœruleo-nigricante varius, marinus ingens Clusii. Raj. Syn. Avi. pag. 127. N<sup>o</sup>. A. 1.*

*Larus maximus Willughby, ex albo & nigro seu cœruleo-nigricante varius. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 389.*

*Larus maximus ex albo & nigro vel subcœruleo varius. Klein. Avi. pag. 136. N<sup>o</sup>. 1.*

*Gavia. Moehr. Avi. Gen. 70.*

*Grande Mouette noire & blanche. Alb. Tom. III. pag. 39; avec une figure mal coloriée Pl. 94.*

*Les Suédois l'appellent HOMAOKA. Linn.*

*Les Anglois GREAT BLACK AND WHITE GULL. Willugh. Raj. Sibbald. Alb.*

Il est un peu plus gros que le *Canard musqué*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de vingt-quatre pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de vingt-quatre pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long;

*Anatem moschatam* crassitie nonnihil superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam viginti quatuor pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sex li-



neus longum est; cauda sex pollices; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices & octo lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices & decem lineas, extimus duos pollices cum sex lineis, intimus viginti quinque lineas; posticus autem sesquipollicem. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum duorum pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duorum pollicum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, rectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes eleganter albicant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque alarum rectrices sunt splendide nigræ. Ala triginti quatuor conflatur remigibus nigris, albo terminatis. Caudam componunt duodecim rectrices penitus candidæ. Palpebræ sulphureo colore imbutæ. Rostrum flavum; mandibula tamen inferior binis utrinque in parte angulosa insignitur maculis,

la queue six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces dix lignes, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derrière six lignes. Il a cinq pieds deux pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux pouces au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des aîles sont d'un beau blanc. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un très-beau noir. L'aile est composée de trente-quatre plumes noires, & terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes entièrement blanches. Les paupières sont de couleur de safran. Le bec est jaune; mais le demi-bec inférieur est marqué sur sa partie anguleuse de deux taches de chaque côté, dont la supérieure est noire, & l'inférieure est rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plu-



mes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont blanchâtres; & les ongles noirs. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

quarum superior nigra, inferior verò rubra. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, candicantes; ungues verò nigri. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

## \*\* 2. LE GOILAND CENDRÉ.

*Voyez Pl. XIV.*

*Larus superne cinereus, infernè albus; capite & collo concoloribus; remigibus cinereis, apice albis, quatuor primoribus versùs apicem nigricantibus, extimâ exteriùs nigricante; rectricibus candidis . . . . LARUS CINEREUS.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces trois lignes de long; sa queue sept pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied deux pouces cinq lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces sept lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes & demie, l'intérieur un pouce onze lignes; &

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & undecim pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem novem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & totidem lineas longum est; cauda septem pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes duos pollices & quinque cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & septem lineas, extimus duos pollices & tres cum



cum semi lineas , intimus unum pollicem cum undecim lineis ; posticus autem quinque lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum quatuor pedum septem pollicum & quatuor linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad unius pollicis & novem linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput , guttur , collum , pectus , venter , latera , crurum suprema pars , tectrices caudæ superiores & inferiores , & pennæ alas subtus obtegentes eleganter albescent. Dorsum , uropygium , scapulares pennas , superioresque alarum tectrices tingit color cinereus elegans : ex scapularibus tamen pennis , majores albo terminantur ; & ex majoribus alarum tectricibus superioribus à corpore remotioribus , extrema est in latere exteriori candida. Alarum margines ab ipsarum exortu ad extremitatem usque niveo candore nitent. Remix prima in latere interiori cinerea , in latere exteriori & versus extremitatem nigricans , & tandem albo terminata , albedine maculâ nigricante notata : tres proximè sequen-

celui de derrière cinq lignes. Il a quatre pieds sept pouces quatre lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à un pouce neuf lignes au-delà du bout de la queue. La tête , la gorge , le col , la poitrine , le ventre , les côtés , le haut des jambes , les couvertures du dessus & du dessous de la queue , & celles du dessous des ailes sont d'un beau blanc. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un fort joli cendré : cependant les plus grandes des plumes scapulaires sont terminées de blanc ; & la plus extérieure des grandes couvertures du dessus des ailes les plus éloignées du corps est blanche du côté extérieur. Le bord de l'aile , depuis son origine jusqu'à son extrémité , est d'un blanc de neige. La première des plumes de l'aile est cendrée du côté intérieur , noirâtre du côté extérieur & vers son extrémité , & enfin terminée de blanc , sur lequel est une tache noirâtre : les trois suivantes , sçavoir depuis la seconde jusqu'à la quatrième inclusivement , sont cendrées , excepté leur bout , qui est noirâtre & terminé de blanc ; dans ces plumes , le noirâtre occupe



d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure : toutes les autres plumes de l'aile sont cendrées, & terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes entièrement blanches. Le bec est jaunâtre, excepté la partie anguleuse de la mandibule inférieure, qui est rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge pâle ou de couleur de chair; & les ongles d'un rouge-noirâtre. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tes, à secunda scilicet ad quartam usque inclusivè, cinereæ, attamen in extremitate nigricantes, albo terminatæ; color autem nigricans. eò majus spatium occupat, quò remix exterior sit: reliquæ remiges omnes sunt cinereæ, albo terminatæ. Duodecim rectricibus penitus candidis cauda constat. Rostrum flavicans; mandibulæ tamen inferioris pars angulosa rubet. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, pallidè rubri sive carneo colore imbuti; ungues verò ex rubro nigricantes. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

### \*\* 3. LE GOILAND GRIS.

**Larus** superne griseo-fuscus, infernè albus; capite, collo & uropygio concoloribus; remigibus griseo-fuscis, apice albis, binis extimis extremitate nigris; rectricibus candidis....  
**LARUS GRISEUS.**

*Larus albus, dorso cinereo-fusco. Faun. Suec. Linn. N°. 126.*

*Larus albus, dorso fusco. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 53. sp. 2.*

*Larus albus, dorso fusco. Larus fuscus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 69. sp. 4.*

*Larus cinereus maximus. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 322. N°. III. Willugh. Ornith. pag. 262.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 127. N°. A. 2.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

*Klein. Avi. pag. 137. N°. 2.*

*Larus cinereus maximus marinaris piscator. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 84. hujus icon pessima Tab. 40.*



An *Larus subtus albus*, dorso, rostro & pedibus fulcis? *Barr. Ornith.*

*Class. I. Gen. IV. sp. 4.*

Burgher-meister Spitzbergenfis Friderici Martensii. *Raj. Syn. Avi.* pag. 127. N° 3.

Burgermeester. *Klein. Avi. pag. 169. N° IV.*

Plautus præconsul. *Klein. Avi. pag. 148. N° 7.*

Gaviotas de Oviedo. *Sloane. Klein.*

Goiland ou *Larus λευκομελας*, caudâ brevissimâ. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 371. (ed. 1714).*

*Les Catalans l'appellent* GABINA. *Barr.*

*Les Suédois*, MAOS. *Linn.*

*Les Anglois*, HERRING-GULL. *Willugh. Raj. Sloane. Sibbald.*

Cum *Anate domestica* craf-  
sitie circiter convenit. Ipsi-  
us longitudo ab apice rostri ad  
caudam extremam unum pe-  
dem novem pollices & quin-  
que lineas æquat, & ad ex-  
tremos ungues unum pedem  
undecim pollices cum sex li-  
neis. Rostrum ab ipsius apice  
ad oris angulos usque unum  
pollicem & decem cum se-  
mi lineas longum est; cauda  
quatuor pollices & octo li-  
neas; pars crurum plumis  
denudata quindecim lineas;  
pes duos pollices cum octo  
lineis; trium digitorum an-  
ticorum medius cum ungue  
duos pollices & decem li-  
neas, extimus duos pollices  
cum sex lineis, intimus vi-  
ginti quinque lineas; posticus  
autem quinque cum semi li-  
neas. Alis expansis, extre-  
mitates majorum remigum  
quatuor pedum tres pollicum  
& sex linearum intervallo

Il est à peu près de la gros-  
seur du *Canard domestique*. Sa  
longueur depuis le bout du bec  
jusqu'à celui de la queue est  
d'un pied neuf pouces cinq li-  
nes, & jusqu'à celui des on-  
gles d'un pied onze pouces six  
lignes. Son bec depuis son bout  
jusqu'aux coins de la bouche  
a un pouce dix lignes & demie  
de long; sa queue quatre pou-  
ces huit lignes; la partie de ses  
jambes qui est dégarnie de plu-  
mes, quinze lignes; son pied  
deux pouces huit lignes; celui  
du milieu des trois doigts anté-  
rieurs, joint avec l'ongle, deux  
pouces dix lignes, l'extérieur  
deux pouces six lignes, l'inté-  
rieur deux pouces une ligne;  
& celui de derrière cinq lignes  
& demie. Il a quatre pieds  
trois pouces six lignes de vol;  
& ses ailes, lorsqu'elles sont  
pliées, s'étendent jusqu'à un  
pouce cinq lignes au-delà du  
bout de la queue. La tête, la



gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les côtés, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des aîles sont d'un beau blanc. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun; cependant les plus grandes des scapulaires sont terminées de blanc. L'aîle est composée de trente plumes d'un gris-brun : les deux premières sont marquées vers leur extrémité d'une tache blanche, & terminées de noir : la cinquième & la sixième sont terminées de brun : toutes les autres sont terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes entièrement blanches. Les paupières sont jaunes dans les uns, & d'un rouge vif dans d'autres. L'iris des yeux est d'un beau jaune. Le bec est jaune; mais le demi-bec inférieur est marqué sur chaque côté de sa partie anguleuse d'une large bande rouge. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont jaunes dans les uns, & blanchâtres ou d'un couleur de chair pâle dans d'autres; les ongles sont noirs. On le trouve sur les bords de la

distant; alæ verò complicatæ ad unius pollicis & quinque linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, venter, crurum suprema pars, latera, uropygium, tectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus cooperientes eleganti candore nitent. Dorsum, scapulares pennas & superiores alarum tectrices tingit color griseo-fuscus; ex scapularibus tamen, majores albo terminantur. Alarum componunt triginta remiges griseo-fusæ : binæ primores versùs ipsarum extremitatem maculâ insigniuntur albâ, & nigro terminantur : quinta & sexta sunt fusco terminatæ : reliquæ omnes apice albo præditæ sunt. Duodecim rectricibus penitus candidis cauda conflatur. Palpebræ sunt in aliis flavæ, in alteris coccineæ. Oculorum irides luteæ. Rostrum flavum; mandibula tamen inferior in parte angulosa liturâ amplâ rubrâ utrinque notatur. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, in aliis flavi, in alteris candicantes sive carneo colore pallido imbuti; un-



gues verò nigri. Juxta maris mer & des lacs. *Du cabinet de littora versatur, & lacuum M. de Reaumur. ripas frequentat. Ex museo Realmuriano.*

\*\* 4. LE GOILAND BRUN.

*Larus superne obscurè fuscus, capite & collo concoloribus, infernè griseus, fusco transversim striatus; remigibus majoribus, rectricibusque nigris, rectricibus lateralibus in exortu albidis . . . . LARUS FUSCUS.*

*Larus fuscus. Klein. Avi. pag. 137. N° 7.*

*Catarrhaetes. Gesn. Avi. pag. 246.*

*Catharraeta. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 84. hujus icon non satis accurata pag. 86.*

*Jonst. Avi. pag. 94. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 47.*

*Catarracta. Charlet. Exer. pag. 100. N° 6.*

*Charlet. Onomazt. pag. 95. N° 6.*

*Catarracta Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 265. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXVII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 129. N° 7.*

*Catarractes noster. Willugh. Ornith. pag. 265.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 128. N° A. 6.*

*Catarractes noster. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20. hujus icon pessima Tab. 14. fig. 2.*

*Mouette brune. Alb. Tom. II. pag. 55; avec une figure mal coloriée Pl. 85.*

*Les Grecs l'appellent Καταρακτις. Gesn. Aldrov.*

*Les Anglois, BROWN GULL. Alb. PLUNGEON. Charlet.*

*Les Anglois qui habitent la Province de Cornouaille, GANNET. Willugh. Raj.*

Craffitie præcedentem non-nihil antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & octo pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem & septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sep-

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces sept lignes de long; la queue six pouces; la



partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, neuf lignes ; son pied deux pouces ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , deux pouces trois lignes , l'extérieur deux pouces , l'intérieur un pouce huit lignes ; & celui de derrière quatre lignes & demie. Il a trois pieds dix pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête , la gorge , le col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun sombre. La poitrine , le ventre , les côtés , le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris rayé transversalement de brun. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un brun clair. Les grandes plumes de l'aîle sont noires , excepté leur côté intérieur , qui est blanchâtre vers leur origine : les moyennes sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noires : toutes les latérales sont de la même couleur , si l'on en excepte leur origine , qui est blanchâtre , sur-tout du côté intérieur. Les deux plumes du mi-

tem lineas longum est ; cauda sex pollices ; pars crurum plumis denudata novem lineas ; pes duos pollices ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & tres lineas , extimus duos pollices , intimus unum pollicem cum octo lineis ; posticus autem quatuor cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensionum distantia est trium pedum decem pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad caudam extremam pertingunt. Caput , guttur , collum , dorsum , uropygium , pennæ scapulares ; quæ alas superne cooperiunt , superioresque caudæ rectrices sunt obscure fuscæ. Pectus , ventrem , latera , crurum partem supremam , inferioresque caudæ rectrices colore imbuuntur griseo , fusco transversim striato. Pennæ alas subtus obtegentes sunt dilutè fuscæ. Remiges alarum majores nigra , excepto latere interiore versùs ipsarum exortum candicante : minores eodem imbutæ colore ac dorsum ipsum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices , quarum binæ intermediae nigrae : laterales omnes conco-



lores, attamen in ipsarum exortu, præsertim in latere interiore, candicantes. Binæ rectrices intermedia lateraliū longitudinem paululū superant. Oculorum irides luteæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipforum membranæ, griseo-flavicantes; ungues verò nigri. Maris littora frequentat.

lieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. L'iris des yeux est jaune. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un gris-jaunâtre; & les ongles noirs. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

*Ex museo Realmuriano.*

**\*\* 5. LE GOILAND VARIÉ OU LE GRISARD.**  
*Voyez Pl. XV.*

Larus superne albo & griseo-fusco, infernè albo & griseo varius; gutture candido; remigibus majoribus superne obscurè fuscis, subtus cinereis; rectricibus in exortu albis, fusco variegatis, deinde fuscis, albido in apice marginatis . . . . LARUS VARIUS SIVE SKUA.

Larus. *Jonst. Avi. pag. 92. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 46, sub titulo, Larus major.*

Larus major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 64. hujus icon non satis accurata pag. 65.*

Larus major Aldrovandi, hybernus Baltneri. *Raj. Syn. Avi. pag. 129. N<sup>o</sup>. 10.*

Larus major Aldrovandi, Ein Winder-Meb, id est, Larus hybernus Leonardi Baltneri. *Willugh. Ornith. pag. 267.*

Larus maritimus major griseus, Ein Grosse grau See-Meb Leonardi Baltneri. *Willugh. Ornith. pag. 267.*

Larus griseus maximus. *Klein. Avi. pag. 137. N<sup>o</sup>. 6.*

Larus cinereus major. *Charlet. Exer. pag. 100. N<sup>o</sup>. 1.*

*Charlet. Onomazt. pag. 94. N<sup>o</sup>. 1.*

Wagell Cornubiensium. *Willugh. Ornith. pag. 266. hujus icon non satis accurata Tab. LXVI, sub titulo, Larus griseus maximus.*

Wagellus Cornubiensium. *Raj. Syn. Avi. pag. 130. N<sup>o</sup>. A. 13.*

Skua. *Clus. Exot. Auduvar. pag. 368.*

*Euf. Nieremb. pag. 237. hujus icon pessima pag. 238, sub titulo, Skua Hoyer.*



- Jonst. Avi. pag. 129. hujus icon à Nierembergio mutuata Tab. 56, sub titulo, Skua Hoieri.*
- Skua Hoieri. Clus. Exot. Auctuar. pag. 369.*
- Willugh. Ornith. hujus icon minimè accurata Tab. LXVII.*
- Buphagus. Moehr. Avi. Gen. 71.*
- Malleinuck Spitzbergensis Friderici Martensii. Raj.*
- Malle-Mucke. Klein. Avi. pag. 170. N°. XI.*
- Mallemucke. Anders. Hist. d'Isle. & de Gro. Tom. II. pag. 56.*
- Grande Mouette grise. Alb. Tom. II. pag. 54; avec une figure mal coloriée Pl. 83.*
- Caniar, Colin ou Grifard. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 167; avec une figure peu exacte pag. 168.*
- Caniar, Grifard, Colin. Bel. Portr. d'Ois. pag. 34. b, dans laquelle est la même figure.*
- Les Grecs l'appellent Νύκτα. Bel.*
- Les Italiens, GAVIA; GAVINA. Bel.*
- Les Vénitiens, MARTINAZZO. Willugh. Raj. Klein.*
- Les Habitans de l'Isle Ferroë, SKUA. Clus. Nieremb.*
- Les Hollandois aux environs d'Amsterdam, BURGO-MASTER OF GROENLAND. Willugh. Raj.*
- Les Anglois, GREAT GREY GULL. Willugh. Raj. Charlet. Alb. HERRING-GULL. Charlet.*
- Les Anglois qui habitent la Province de Cornouaille, WAGELL. Willugh. Raj. Klein. GANET. Charlet.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Goiland cendré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied huit pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces huit lignes de long; sa queue six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux

*Laro cinereo paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & novem pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem octo pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & octo lineas longum est; cauda sex pollices; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos*



duos pollices & quinque lineas, extimus duos pollices cum totidem lineis, intimus unum pollicem & decem lineas; posticus autem quinque lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum trium pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duorum pollicum & octo linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum & uropygium albo & griseo-fusco variegantur, griseo-fusco scilicet colore cujuslibet pennæ medium præsertim occupante. Superiores caudæ tectrices sunt griseo-fusco & albo transversim striatæ. Pennæ scapulares, alarumque tectrices superiores minimæ & mediæ maculis irregularibus, taniusque transversis iisdem coloribus imbutis variæ: majores alarum tectrices superiores fuscæ, margine candicante terminatæ. Guttur albicat. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices minores, sicut & minores alarum inferiores, griseo & albo variegantur. Tectrices alarum

pouces cinq lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere cinq lignes. Il a quatre pieds trois pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux pouces huit lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont variés de blanc & de gris-brun, cette dernière couleur occupant sur-tout le milieu de chaque plume. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de gris-brun & de blanc. Les plumes scapulaires, les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont variées des mêmes couleurs par taches irrégulières & par bandes transversales: les grandes couvertures du dessus des aîles sont brunes, & terminées par une bordure blanchâtre. La gorge est blanche. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les petites couvertures du dessous de la queue, les petites du dessous des aîles & les côtés sont variés de gris & de blanc. Les grandes couvertures du dessous des aîles sont d'un gris-blanc. Les grandes du dessous de la queue sont blanches,



& rayées transversalement de gris-brun. L'aile est composée de trente plumes : les dix premières sont d'un brun sombre en-dessus, & cendrées en-dessous, où elles ont leur tige blanche : les dix-sept suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-septième inclusivement, sont d'un gris-brun du côté extérieur, & variées d'un peu de blanc sur leur bord vers leur extrémité ; leur côté intérieur est gris & varié de blanc : les trois plus proches du corps sont de la même couleur que les scapulaires. La queue est composée de douze plumes blanches à leur origine, & variées de taches brunes, les unes longitudinales & les autres irrégulières, ensuite brunes, & bordées de blanchâtre par le bout : sur chacune de ces plumes, le brun occupe d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure. L'iris des yeux est d'un joli gris. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont blanchâtres dans les uns & orangés dans d'autres ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer.

*Du cabinet de M. de Reaumur,*

*inferiores majores sunt cinereo-albæ. Inferiores caudæ majores candidæ, griseofusco transversim striatæ. Triginta remigibus ala conflatur : decem primores superne obscurè fuscæ, subtus cinereæ, ibique scapo albo præditæ : septemdecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam septimam usque inclusivè, in latere exteriori griseofuscæ, ad margines versùs ipsarum extremitatem paucò candido variegatæ, in latere interiori griseæ, albique variæ : tres tandem corpori finitimæ scapularibus concolores. Caudam componunt duodecim rectrices in exortu albæ, fuscis variegatæ maculis, aliis longitudinalibus, alteris irregularibus, deinde fuscæ, albido tandem in apice marginatæ : in quibus rectricibus fuscus color eò minus spatium occupat, quò rectrix fit exterior. Oculorum irides elegantè griseæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, in aliis candicantes, in alteris aurantii ; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora versatur. Ex museo Realmuriano.*



**\*\* 6. LA MOUETTE GRISE.**

**Larus superne albo & griseo varius, infernè albidus; vertice griseo; imo ventre candido; remigibus majoribus, rectricibusque obscure griseis, exterius rufescente marginatis, rectricibus lateralibus interiùs maximâ parte albis . . .**  
**GAVIA GRISEA.**

**Larus chlamyde leucophæa alis brevioribus.** *Klein. Avi. pag. 139. N<sup>o</sup>. 17.*

**Goiland ou Larus clamide leucophæa, alis brevioribus.** *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 12. (ed. 1725).*

**Crassitie Anatem domestica** circiter æmulatur. Ipsi-  
 us longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & octo pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & octo lineas longum est; cauda quatuor pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices & octo lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum decem lineis, extimus duos pollices & sex lineas, intimus duos pollices & totidem lineas; posticus autem sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensurum distantia est trium pe-

Elle est à peu près de la grosseur du *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces huit lignes de long; sa queue quatre pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces dix lignes, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur deux pouces deux lignes; & celui de derrière six lignes. Elle a trois pieds dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois



quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est gris. Le dessus du col, le dos & le croupion, sont variés de gris & de blanc. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont blanchâtres. Le bas - ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes. Le haut des jambes est varié de gris clair & de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont grises du côté extérieur, & blanches du côté intérieur. Les grandes plumes de l'aile sont d'un gris sombre, & bordées extérieurement de rouffâtre ; elles ont aussi vers leur origine une partie de leur côté intérieur blanche : les moyennes sont de la même couleur que les scapulaires. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris sombre, & bordées de rouffâtre : toutes les latérales sont de la même couleur, excepté une assez grande

dum decem pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Vertex capitis griseo imbitur colore. Pars colli superior, dorsum & uropygium griseo & albo variegantur. Pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter supremus & latera candicant. Venter imus, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus obtegentes alben. Crurum pars suprema griseo diluto & albo variegatur. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores in latere exteriori griseæ, in interiori albæ. Remiges majores obscurè griseæ, exteriùs rufescente marginatæ ; versùs ipsarum exortum sunt quoque in latere interiori partim candidæ : minores scapularibus concolores. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ obscurè griseæ, rufescente marginatæ : laterales omnes eodem imbutæ colore, attamen in latere interiori maximâ parte albæ.



Oculi sunt nigri; ipforum irides fuscescentes. Rostrum eleganter luteum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denu- data, pedes & digiti, sicut & ipforum membranæ, flavi- cantes; ungues verò nigri- cantes. Maris littora fre- quentat. *Ex museo Realmu- riano.*

partie de leur côté intérieur, qui est blanche. Les yeux sont noirs; & leur iris est brunâtre. Le bec est d'un beau jaune, excepté son extrémité, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont jaunâ- tres; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**\*\* 7. LA PETITE MOUETTE GRISE.**

*Larus superne albo & griseo varius; infernè albus; remigi- bus majoribus, rectricibusque nigricantibus, albo termina- tis, rectricibus lateralibus interiùs maximâ parte albis . . .*  
**GAVIA GRISEA MINOR.**

*Larus maculatus. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 94. hujus icon satis accu- rata Tab. 45.*

*Larus maculatus Marfilli. Klein. Avi. pag. 138. N°. 14.*

*An Cephphus? Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 88. hujus icon non satis accurata: pag. 89.*

*An Cephphus Aristotelis? Jonst. Avi. pag. 94. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 47.*

*An Cephphus Aldrovandi? Willugh. Ornith. pag. 267. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXVII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 129. N°. 11.*

*Les Grecs l'appellent Κεφαλα. Aldrov.*

*Gaviam cineream majo- rem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extrema- tem quindecim pollices & novem lineas explet, & ad*

Elle est à peu près de la gros- seur de la grande Mouette cen- drée. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces neuf lig- nes, & jusqu'à celui des ongles



de seize pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long ; sa queue quatre pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatorze lignes ; son pied un pouce dix lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce sept lignes, l'intérieur seize lignes ; & celui de derrière trois lignes seulement. Elle a deux pieds onze pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce au-delà du bout de la queue. Le dessus de la tête, le col, le dos & le croupion sont variés de blanc & de gris. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Les côtés de la tête, la gorge, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessous des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc. Les grandes plumes de l'aîle sont

extremos ungues sexdecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est ; cauda quatuor pollices & sex lineas ; pars crurum plumis nudata quatuordecim lineas ; pes unum pollicem cum decem lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus unum pollicem cum septem lineis, intimus sexdecim lineas ; posticus autem tres tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & undecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis superior pars, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt albo & griseo variæ. Caput ad latera, guttur, pectus, venter, latera, crurum suprema pars ; inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Tectrices alarum superiores minores ; sicut & majores corpori viciniore, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tin-



gitur : majores à corpore remotiores nigricant, alboque marginantur. Remiges majores sunt pariter nigricantes, albo terminatæ; versùs ipsarum exortum sunt quod in latere interiore partim candidæ : minores scapularibus concolores. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ nigricantes, albo terminatæ : laterales omnes concolores, attamen in latere interiore maximâ parte albæ. Oculi sunt nigri : ipsorum irides candicantes. Rostrum aurantium, exceptâ extremitate nigrâ. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, aurantii; ungues verò nigri. Juxta maris littora versatur, & fluviorum, piscinarumque ripas frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

pareillement noirâtres, & terminées de blanc; elles ont aussi vers leur origine une partie de leur côté intérieur blanche : les moyennes sont de la même couleur que les scapulaires. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres, & terminées de blanc : toutes les latérales sont de la même couleur, excepté une assez grande partie de leur côté intérieur, qui est blanche. Les yeux sont noirs; & leur iris est blanchâtre. Le bec est orangé, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont orangés; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer, des rivières & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**\*\* 8. LA MOUETTE CENDRÉE.**

*Voyez Pl. XVI. Fig. 1.*

Larus superne cinereus, infernè niveus; remigibus quinque primoribus in extremitate nigris, extimâ exterius nigrâ, quarta & quinta albâ maculâ apice notatis; rectricibus candidis . . . . GAVIA CINEREA.

Larus albus, dorso cano. *Faun. Suéc. Linn. N°. 125.*  
*Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 53. sp. 1.*



*Larus albus*, dorso cano. *Larus canus*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 69. sp. 2.*

*Larus rostro nigro*. Klein. *Avi. pag. 137. N<sup>o</sup>. 5.*

*Larus cinereus minor*. Aldrov. *Avi. Tom. III. pag. 73. hujus icon non satis accurata pag. 75.*

*Larus cinereus minor* Aldrovandi. Willugh. *Ornith. pag. 268.*

*Larus cinereus alter*. Jonst. *Avi. pag. 93.*

*Larus Americanus ad cyaneum vergens*, cervice longiori. Barr. *Ornith. Class. I. Gen. IV. sp. 7.*

Kessler Leonardi Baltneri. Willugh.

Mouette blanche. Alb. *Tom. II. pag. 55; avec une figure mal coloriée Pl. 84.*

Les Suédois l'appellent HOMAOKA. Linn.

Les Suédois qui habitent la Province de Gothland, MAVE ou MAWE. Linn.

Les Lapons, STRAULE. Linn.

Les Anglois, WHITE WEB FOOTED GULL. Alb.

Elle est un peu plus grosse qu'un Pigeon Romain. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long; sa queue quatre pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, sept lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce sept lignes, l'intérieur seize lignes; & celui de derrière, qui n'a point d'ongle, une ligne seulement. Elle a deux pieds onze pouces huit lignes

*Columbam Romanam* crassitie nonnihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda quatuor pollices & decem lineas; pars crurum plumis denudata septem lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus unum pollicem cum septem lineis, intimus sexdecim lineas; posticus autem, qui quidem ungue caret, unicam tantummodo lineam.

Alis



Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum undecim pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad unius pollicis & octo linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis anterior pars tota candore nitet : qui candor in capitis vertice ad cinereum inclinatur. Ante oculos quædam extant plumulæ nigrae, pilorum æmulæ, ipsorum semicircumferentiam anteriorem ambientes. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores alarum teñtrices sunt elegantissimè cinereæ : ex scapularibus, majores tamen albo terminantur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, teñtrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus cooperientes niveo candore nitent. Remiges alarum omnes eleganti cinereo imbutæ, colore, sed nonnihil dilutiore quàm qui dorsum tingit : remix insuper prima est in latere exteriori & extremitate nigra : secunda & tertia nigro tantum terminatæ : quarta & quinta sunt quoque in extremitate nigrae,

*Tom. VI,*

de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce huit lignes au-delà du bout de la queue. Toute la partie antérieure de la tête est d'un beau blanc : sur le sommet de la tête cette couleur tire sur le cendré. Devant les yeux sont quelques petites plumes noires en forme de poils, qui en entourent la demi-circonférence antérieure. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un très-joli cendré : les plus grandes des scapulaires sont cependant terminées de blanc. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des ailes sont d'un blanc de neige. Toutes les plumes de l'aile sont d'un joli cendré, mais un peu plus clair que celui du dos : de plus la première est noire du côté extérieur & à son extrémité : la seconde & la troisième sont seulement terminées de noir : la quatrième & la cinquième sont pareillement noires à leur extrémité, & terminées par une tache blanche, qui est beaucoup plus petite sur la

Z



quatrième plume que sur la cinquième ; le noir qui est au bout de ces cinq plumes, occupe d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure : toutes les autres plumes de l'aile ( si l'on en excepte les trois plus proches du corps ) sont terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est d'un joli gris : les paupieres sont orangées. Le bec est d'un jaunâtre tirant un peu sur l'olive vers son origine. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont orangés ; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

in apice albâ notatâ maculâ, in quarta remige multò minore quàm in quinta ; in istarum remigum extremitate color niger eò majus spatium occupat, quò remix fit exterior : remiges reliquæ omnes ( exceptis tamen tribus corpori finitimis ) albo terminantur. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum irides eleganter griseæ : palpebræ aurantiæ. Rostrum flavicans ; versùs ipsius exortum nonnihil ad olivaceum inclinans. Pars crurum plumis nudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, aurantii ; ungues verò nigricantes. Flumina & piscinas frequentat. *Ex museo Reali muriano.*

**\*\* 9. LA PETITE MOUETTE CENDRÉE.**

*Voyez Pl. XVII. Fig. 1.*

**Larus** superne dilutè cinereus, infernè niveus ; capite & collo concoloribus ; maculâ utrinque ponè oculos fuscâ ; remigibus septem primoribus nigro terminatis, interiùsque marginatis, extimâ exterius nigro fimbriatâ, sexta & septima albâ maculâ apice notatis ; rectricibus candidis . . . .

**GAVIA CINEREA MINOR.**

**Larus cinereus.** *Gesn. Avi. pag. 585. hujus icon minimè accurata pag. 586.*  
**Larus cinereus** Aristoteli. *Gesn. icon. Avi. pag. 95, in qua eadem icon.*  
**Larus cinereus major.** *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 72. hujus icon notis satis accurata pag. 74.*



- Larus cinereus primus. Jonst. Avi. pag. 93.*  
*Larus cinereus Jonstoni. Barr. Ornith. Class. I. Gen. IV. sp. 1.*  
*Larus cinereus, seu Gavia cinerea Aldrovandi; Hirundo marina Gellneri. Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 389.*  
*Larus albus major. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 71.*  
*Jonst. Avi. pag. 93.*  
*Larus albus major Bellonii. Willugh. Ornith. pag. 264.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 129. N<sup>o</sup>. 9.*  
*Larus major albus. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*  
*Larus marinus albus. Gesn. Avi. pag. 589.*  
*Larus marinus. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 286.*  
*Mouette blanche. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 170.*  
*Les Grecs l'appellent Λαγος λευκός. Bel.*  
*Les Turcs, BAHARE. Gesn. RAHARE. Aldrov.*  
*Les Italiens, GAVINA. Gesn. GALETRA. Gesn. Aldrov.*  
*Les Italiens aux environs de Comachio, CROCALO. Aldrov.*  
*Les Italiens aux environs de Come, GALEDOR. Gesn. Aldrov.*  
*Les Savoyards, GREBE ou GRIARBE; BEGUE. Gesn. Aldrov.*  
*Les Suisses, HOLBROD; HOLBROUDER. Gesn. Aldrov.*  
*Ceux qui habitent près des bords du Lac de Constance, ALENBOCK. Gesn. Aldrov.*  
*Les Frisons, KABEL; MEW. Gesn. Aldrov.*  
*Les Allemands, MEB; MEW; MEISS; SEEGALL; ALBUKE. Gesn. Aldrov.*  
*MEWE. Rzac.*  
*Les Bas-Allemands, COCKMAEU ou MAEU. Aldrov.*  
*Les Polonois, MEWA; RUBITW MORSKI. Rzac.*  
*Ceux qui habitent près des bords de la mer Baltique, MEWE. Rzac.*  
*Les Anglois, SECOB; SEEGEL. Gesn. Aldrov. SEA-MEW. Sibbald.*  
*Les Anglois qui habitent la Province de Cornouaille, TARROCK. Willugh. Raj.*

Præcedenti paululùm craf-  
 fitie cedit. Ipfius longitudo  
 ab apice roftri ad caudam  
 extremam tredecim pollices  
 & novem lineas æquat, &  
 ad extremos unguës trede-  
 cim pollices & lineas binas.  
 Roſtrum ab ipſius apice ad  
 oris angulos uſque unum  
 pollicem & novem lineas  
 longum eſt; cauda quatuor

Elle n'eſt pas tout-à-fait ſi  
 groſſe que la précédente. Sa  
 longueur depuis le bout du bec  
 juſqu'à celui de la queue eſt  
 de treize pouces neuf lignes,  
 & juſqu'à celui des ongles de  
 treize pouces deux lignes. Son  
 bec depuis ſon bout juſqu'aux  
 coins de la bouche a un pouce  
 neuf lignes de long; ſa queue  
 quatre pouces trois lignes; la



partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes ; son pied un pouce six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur treize lignes ; & celui de derrière trois lignes seulement. Elle a deux pieds dix pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce neuf lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des aîles sont d'un blanc de neige : il y a cependant de chaque côté de la tête une tache brune, placée derrière les yeux vers les oreilles. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessous des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un joli cendré clair. Les grandes couvertures du dessus des aîles les plus éloignées du corps sont blanches, une d'entr'elles seulement étant marquée d'une petite tache noire. L'aîle bâtarde est entièrement blanche. Le bord de l'aîle, depuis son origine jusqu'à son extrémité, est de la même

pollices & tres lineas ; pars crurum plumis denudata decem lineas ; pes unum pollicem cum sex lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas ; extimus quatuordecim lineas, intimus tredecim lineas ; posticus autem tres solummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & decem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad unius pollicis & novem linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, testrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes niveo candore nitent : in utroque tamen capitis latere macula extat fusca, ponè oculos & versùs aures posita. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores alarum testrices minores, sicut & majores corpori viciniore, sunt eleganter dilutè cinereæ. Testrices alarum superiores majores à corpore remotiores albæ, ex illis tantummodo una minutâ maculâ nigrâ notata. Ala notha penitus albicat. Alarum margi-



ñes, ab ipsarum exortu ad extremitatem usque, similiter candidæ. Remix prima candida, nigro in tota circumferentia marginata, & eodem colore terminata; margo autem interior est latiuscula: secunda alba, nigro interiùs fimbriata, nigroque terminata, margine nigrâ quàm in præcedente adhuc latiore; versùs ipsius exortum pauco insuper notatur cinereo, in latere interiore nigrum inter & album colorem posito, & secundùm remigis longitudinem protenso: tertia præcedenti concolor, ab illa tamen discrepans in eo quod color cinereus versùs remigis extremitatem multò magis protendatur, & color niger remigis apicem tingens supra marginem exteriorem paululùm ascendat: quarta in latere exteriori candida, in interiore cinerea, nigro interiùs fimbriata, & eodem colore terminata, margine nigrâ adhuc valdè latâ: tres proximè sequentes, à quinta scilicet ad septimam usque inclusivè, in utroque latere cineræ, nigro interiùs marginatæ, nigroque terminatæ; sexta insuper & septima minutissimâ maculâ albâ in

couleur. La première des plumes de l'aile est blanche, bordée dans toute sa circonférence & terminée de noir; la bordure intérieure est assez large: la seconde est blanche, bordée intérieurement & terminée de noir, sa bordure noire étant encore plus large que celle de la précédente; de plus elle a vers son origine un peu de cendré, placé sur le côté intérieur entre le noir & le blanc, & qui s'étend selon sa longueur: la troisième est colorée comme la précédente, avec cette différence seulement que le cendré s'étend beaucoup plus loin vers l'extrémité de la plume; & que le noir qui est à son bout, remonte un peu sur le bord extérieur: la quatrième est blanche du côté extérieur, cendrée du côté intérieur, bordée intérieurement & terminée de noir, la bordure noire étant encore fort large: les trois suivantes, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la septième inclusivement, sont cendrées des deux côtés, bordées intérieurement & terminées de noir; de plus la sixième & la septième sont marquées à leur bout d'une très-petite tache blanche: toutes les autres plumes de l'aile sont du même cendré que le dos. La queue



est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un rouge très-foncé & presque noir. La partie des jambes qui est dégar- nie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membra- nes, sont d'un rouge-orangé; & les ongles noirâtres. On la trou- ve sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ungues verò nigricantes. Fluvios & piscinas frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

apice notantur : remiges reliquæ omnes eodem im- buuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Rostrum rubro satu- ratissimo & quodammodo nigro imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubro-aurantii;

\*\* 10. LA GRANDE MOUETTE CENDRÉE.

*Voyez Pl. XVI. Fig. 2.*

Larus superne dilutè cinereus, infernè niveus; capite & collo superioribus albis, fusco maculatis; remigibus sex primo- ribus in extremitate, quatuor extimis exteriùs nigris, quintâ exteriùs nigro marginatâ, binis extimis albâ maculâ versùs apicem notatis; rectricibus candidis.... GAVIA CINEREA MAJOR.

Larus cinereus minor. *Willugh. Ornith. pag. 262. hujus icon non satis accurata Tab. LXXVI.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 127. N°. A. 3.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

*Charlet. Exer. pag. 100. N°. 2.*

*Charlet. Onomast. pag. 94. N°. 2.*

*Klein. Avi. pag. 137. N°. 4.*

Les Anglois l'appellent COMMON SEA-MEW. *Willugh. Raj. Sibbald: COMMON SEA-MALL. Willugh. Raj. COMMON SEA GULL. Willugh; LESSER GREY GULL. Charlet.*

Elle est un peu plus grosse que la *Mouette cendrée*. Sa lon- gueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de

*Gaviam cineream paulu- lum crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexde-*



cim pollices explet , & ad extremos ungues quindecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & undecim lineas longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata undecim lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue, unum pollicem & septem cum semi lineas, extimus unum pollicem & quinque lineas, intimus quatuordecim cum semi lineas; posticus autem tres cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum quinque pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad trium pollicum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores albescent, minutifque maculis fuscis variegantur. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt dilutè cineræ : ex scapularibus, majores tamen albo terminantur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, rectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas

seize pouces, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce onze lignes de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, onze lignes; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes & demie, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur quatorze lignes & demie; & celui de derrière trois lignes & demie. Elle a trois pieds cinq pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois pouces au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un blanc varié de petites taches brunes. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un cendré clair: les plus grandes des scapulaires sont cependant terminées de blanc. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des ailes sont d'un blanc de neige. Le bord de l'aile est de la même couleur, & varié de



petites taches brunes. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même cendré que le dos; mais les plus petites, savoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont tachetées de brun : les grandes les plus éloignées du corps sont pareillement cendrées ; mais elles ont une grande partie de leur côté extérieur noirâtre, vers leur bord ; & l'extrémité de leur côté intérieur est tachetée de la même couleur. Les plumes de l'aile bâtarde sont colorées comme ces dernières couvertures. Les quatre premières plumes de l'aile sont noires, excepté leur côté intérieur, dont la plus grande partie est cendrée vers son origine, cette dernière couleur s'étendant d'autant plus loin, que la plume est plus intérieure ; de plus les deux plus extérieures sont marquées vers leur extrémité d'une grande tache blanche : la cinquième & la sixième sont cendrées, & terminées de noir ; mais cette dernière couleur remonte sur le côté extérieur de la cinquième plume, & en occupe la moitié de la largeur vers le bord : la septième est cendrée, & terminée d'un blanc mar-

subtus obtegentes niveo candore nitent. Margines alarum concolores, minutis maculis fuscis variæ. Superiores alarum teñtrices minores, sicut & majores corpori viciniore, eodem imbutæ cinereo ac dorsum ipsum tingitur ; attamen minimæ, illæ scilicet quæ articulum carpo humano respondentem vestiunt, fusco maculantur : majores à corpore remotiores similiter cinereæ, sed in latere exteriori versùs margines maximâ parte nigricantes, & in lateris interioris extremitate eodem colore maculatæ. Alæ nothæ pennæ teñtricibus nuper descriptis concolores. Remiges quatuor primores nigræ, attamen in latere interiori versùs exortum maximâ parte cinereæ, cinereo colore eò majus spatium occupante, quò remix fit interior ; binæ insuper extimæ versùs ipsarum extremitatem majusculâ maculâ albâ notatæ : quinta & sexta cinereæ, nigro terminatæ ; nigredo autem supra latus exterius quintæ remigis protenditur ; & ipsius mediam latitudinem versùs margines occupat : septima cinerea, ipsius apice albo, maculâ nigrâ, in



in latere exteriori positâ, insignito: reliquæ omnes remiges dilutè cineræ, albo terminatæ. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Rostrum fusco-olivaceum, exceptâ extremitate flavicante. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, fusco-olivacei; ungues verò nigricantes. Flumina, piscinasque frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

qué d'une tache noire, placée sur le côté extérieur: toutes les autres plumes de l'aile sont d'un cendré clair, & terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un brun-olivâtre, excepté son extrémité, qui est jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un brun-olivâtre; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

\*\* II. LA MOUETTE CENDRÉE TACHETÉE.

*Voyez Pl. XVII. Fig. 2.*

Larus superne cinereus, infernè niveus; tectricibus alarum superioribus minoribus in exortu cinereis, in apice fusco-nigricantibus; remigibus sex primoribus in extremitate, quatuor extimis exterioribus nigris, quinta & sexta albâ maculâ apice notatis; rectricibus candidis, decem intermediis apice nigris . . . . GAVIA CINEREA NÆVIA.

Larus cinereus Bellonii. *Willugh. Ornith. pag. 263. hujus icon minimè accurata Tab. LXVIII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 128. N<sup>o</sup>. A. 4.*

Larus cinereus piscator. *Klein. Avi. pag. 137. N<sup>o</sup>. 3.*

Larus cinereus major Bellonii, Hirundo marina, Vultur piscarius: Gyr-falco marinus aliquibus dictus. *Marsil. Danub. Tom. V. pag. 86. hujus icon non satis accurata Tab. 41.*

Larus albo-cinereus torque cinereo. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 73. hujus icon non satis accurata pag. 77.*

Larus albo-cinereus torque cinereo Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 266. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXVI.*

Larus albus. *Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 46. Tom. VI,*



Larus Kuutge-Gef. *Klein. Avi. pag. 148. N°. 9.*

Kautke-Gef. *Klein. Avi. pag. 169. N°. IV.*

Kudge-Ghef Friderici Martensii. *Raj.*

An Avis Kittiwake? *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20. hujus icon pessima Tab. 16. fig. 2.*

Mouette cendrée. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 169, dans laquelle est une mauvaise figure.*

Mouette cendrée, Gavian, Glammet. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 35 a, dans laquelle est la même figure.*

Les Grecs l'appellent *Λαγός σποδοειδής*. *Bel.*

Les Italiens, *GALETRA; GALEDOR.* *Bel.*

Les Savoyards, *GREBE ou GRIAIBE; BEGUE.* *Bel.*

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces deux lignes de long; sa queue quatre pouces onze lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes, l'extérieur un pouce huit lignes, l'intérieur seize lignes; & celui de derrière, qui n'a point d'ongle, deux tiers de ligne seulement. Elle a deux pieds neuf pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce six lignes au-delà du bout de la queue. Toute la partie antérieure de

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices æquat, & ad extremos unguis tredecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & totidem lineas longum est; cauda quatuor pollices & undecim lineas; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas, extremus unum pollicem cum octo lineis, intimus sexdecim lineas; posticus autem, qui quidem ungue caret, duas tantummodo tertias lineæ partes longus est. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum novem pollicum & sex linearum inter-



vallo distant; alæ verò complicatæ ad unius pollicis & sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis anterior pars tota albicat: albor autem in capitis vertice ad cinereum vergit. Ante oculos quædam extant plumulæ nigræ piliformes, illorum semicircumferentiam anteriorem ambientes. Collum superius cinerascit, & aliquid candidi admixtum habet. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt eleganter cinereæ: ex scapularibus, majores tamen albo terminantur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes niveo candore nitent. Superiores alarum tectrices minores sunt in ipsarum exortu cinereæ, in extremitate fusco-nigricantes; cinereus autem color est minimè conspicuus: majores corpori finitimæ cinereæ, quibusdam maculis fusco-nigricantibus variegatis: majores à corpore remotiores in latere exteriori & apice nigricantes, in latere interiore cinereæ. Ala notha penitus

la tête est d'un beau blanc: sur le sommet de la tête cette couleur tire sur le cendré. Devant les yeux sont quelques petites plumes noires en forme de poils, qui en entourent la demi-circonférence antérieure. La partie supérieure du col est d'un cendré mêlé d'un peu de blanc. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un fort joli cendré: les plus grandes des scapulaires sont cependant terminées de blanc. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des ailes sont d'un blanc de neige. Les petites couvertures du dessus des ailes sont cendrées à leur origine, & d'un brun-noirâtre à leur extrémité; le cendré ne paroît presque point: les grandes les plus proches du corps sont cendrées, quelques-unes étant variées de taches de brun-noirâtre: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres du côté extérieur & à leur bout, & cendrées du côté intérieur. L'aîle bâtarde est entièrement noirâtre. Les quatre premières plumes de l'aîle sont noires, ayant cependant la plus grande partie de leur côté



intérieur cendrée : la cinquième & la sixième sont cendrées, excepté leur extrémité, qui est noire & terminée par une tache blanche, qui est beaucoup plus petite sur la cinquième plume que sur la sixième ; de plus la cinquième plume est noirâtre sur son côté extérieur vers son origine seulement : toutes les autres plumes de l'aile, si l'on en excepte les quatre plus proches du corps, sont d'un blanc tirant sur le cendré du côté extérieur, & entièrement blanches du côté intérieur & à leur extrémité : enfin les quatre plus proches du corps sont cendrées, & terminées de blanc ; de celles-là, les trois plus extérieures sont marquées sur leur côté extérieur d'une tache d'un brun-noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La queue est composée de douze plumes : les huit du milieu sont blanches, & terminées de noir : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur, mais le noir s'étend fort peu sur le côté extérieur : enfin la plus extérieure de chaque côté est entièrement blanche. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un

nigricat. Remiges quatuor primores nigrae sunt, attamen in latere interiore maximâ parte cinerea : quinta & sexta cinerea, excepta extremitate nigra & maculâ candidâ terminata, quâ macula in quinta multò minor est quàm in sexta remige ; quinta insuper remix in latere exteriori nigricat, sed tantum versùs ipsius exortum : reliquæ omnes remiges, quatuor corpori vicinioribus exceptis, sunt in latere exteriori ex albo ad cinereum vergentes, in latere interiore & extremitate penitus candidæ : quatuor tandem corpori finitimæ cinerea, albo terminata ; ex istis autem tres exteriores in latere exteriori maculâ fusconigricante, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notantur. Cauda duodecim conflatur rectricibus, quarum octo intermediæ candidæ, nigro terminata : utrinque proximè sequens concolor ; in ea autem color niger supra latus exterius minimè extenditur : utrinque tandem extrema est penitus candida. Rostrum nigricat. Pars erurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, sunt



flavo-olivacei; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora versatur; fluminaque & piscinas frequentat. *Ex museo D. de Bandeville.*

jaune - olivâtre; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les bords de la mer, sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

## 12. LA MOUETTE D'HYVER.

*Larus superne cinereus, infernè niveus; capite albo, maculis fuscis vario; collo superiore fusco; rectricibus alarum superioribus minoribus cinereo & nigricante variis; remigibus septem primoribus in extremitate, primâ in totum, quatuor sequentibus exterius nigricantibus; rectricibus candidis, areâ transversâ nigrâ versùs apicem notatis . . .*  
GAVIA HYBERNA.

*Larus albicans dorso canescente, rectricibus excepto extimo nigris; pedibus tridactylis. Larus tridactylus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 69. sp. 1.*

*Larus fuscus seu hybernus. Willugh. Ornith. pag. 266. hujus icon minimè accurata Tab. LXVI.*

*Larus fuscus sive hybernus. Raj. Syn. Avi. pag. 130. N°. A. 14.*

*Larus hybernus. Klein. Avi. pag. 138. N°. 9.*

*Larus Brasiliensibus Guaca guacu dictus, Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 130. N°. 12.*

*Larus Brasiliensibus Guaca guacu dictus, Lusitanis Gaivota, Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 268.*

*Guaca guacu Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 205.*

*Jonst. Avi. pag. 140.*

*An Larus minimus? Rac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 390.*

*An Goiland ou Larus torquatus chlamyde nigra, & pedibus cinereis? Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 14. (ed. 1725).*

*Petite Mouette d'Irlande. Alb. Tom. II. pag. 56; avec une figure mal coloriée Pl. 87.*

*Les Anglois l'appellent WINTER-MEW. Raj.*

*Les Anglois qui habitent la Province de Cambridgeshire, CODDY MODDY. Willugh. Raj. Alb.*

*Les Portugais, GAIVOTA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

*Les Hollandois, MEEUWE. Marcgr. Jonst.*

*Les Brâsiliens, GUACA GUACU. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*



Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue & celui des ongles est de seize pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un peu plus de deux pouces de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, son pied & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, le tout pris ensemble, environ cinq pouces: les doigts latéraux sont un peu plus courts que celui du milieu; & celui de derriere est fort court. Elle a trois pieds six pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à deux pouces au-delà du bout de la queue. La tête est blanche, & variée de taches brunes. La partie supérieure du col est de cette dernière couleur. Le dos est cendré. Les plumes scapulaires sont de la même couleur, & variées de taches brunes. La gorge est brunâtre. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des aîles sont d'un blanc de neige. Les peti-

Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem & extremos ungues sexdecim pollices & decem lineas explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & paulò plus longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata; pes & trium digitorum anteriorum medius cum ungue; simul commensurati, quinque circiter pollices: digiti laterales mediò paululum longitudine cedunt; posticus autem valdè brevis est. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum sex pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duorum circiter pollicum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput album est; maculis fuscis varium. Collum superius fuscum. Dorsum cinereum. Pennæ scapulares cinereo quoque imbutæ, maculis fuscis variegatæ. Guttur fuscescit. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars; uropygium, caudæ tectrices superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes niveo candore nitent. Su-



periores alarum testrices minores cinereo & nigricante variegantur: majores corpori finitimæ sunt penitus cineræ; quædam tamen maculis quibusdam nigricantibus variæ: majores à corpore remotiores in latere exteriori & extremitate nigricantes, in latere interiore cineræ. Remix prima nigricans: secunda in latere exteriori & extremitate concolor, in latere interiore cinerea: tres proximè sequentes, à tertia scilicet ad quintam usque inclusivè, secundæ concolores, attamen exterius in exortu cineræ, cinereo colore eò majus spatium occupante, quò remix fit interior: sexta & septima cineræ, nigricante terminatæ: tres proximè sequentes ab octava scilicet ad decimam usque inclusivè, cineræ, albo terminatæ: tres quæ nuper descriptas sequuntur, ab undecima scilicet ad decimam tertiam usque inclusivè, penitus cineræ, maculâ tamen fuscâ versùs ipsarum extremitatem notatæ: decem quæ proximè sequuntur, à decima quarta scilicet ad vigesimam tertiam usque inclusivè, cineræ, exterius nigricante

tes couvertures du dessus des ailes sont variées de cendré & de noirâtre: les grandes les plus proches du corps sont entièrement cendrées, quelques-unes sont cependant variées de quelques taches noirâtres: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres du côté extérieur & à leur bout, & cendrées du côté intérieur. La première des plumes de l'aile est noirâtre: la seconde est de la même couleur du côté extérieur & à son extrémité, & cendrée du côté intérieur: les trois suivantes, scavoir depuis la troisième jusqu'à la cinquième inclusivement, sont de la même couleur que la seconde, excepté que leur côté extérieur est cendré à son origine, cette couleur s'étendant d'autant plus loin, que la plume est plus intérieure: la sixième & la septième sont cendrées, & terminées de noirâtre: les trois suivantes, scavoir depuis la huitième jusqu'à la dixième inclusivement, sont cendrées, & terminées de blanc: les trois qui suivent ces dernières, scavoir depuis l'onzième jusqu'à la treizième inclusivement, sont entièrement cendrées, & marquées d'une tache brune vers leur extrémité: les dix suivantes, scavoir depuis la quatorzième



me jusqu'à la vingt-troisième inclusivement, sont cendrées, & bordées extérieurement de noirâtre : la vingt-quatrième & la vingt-cinquième sont entièrement cendrées : enfin les plus proches du corps sont de la même couleur depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est noirâtre. La queue est composée de douze plumes blanches, marquées vers leur extrémité d'une bande transversale noire, large d'environ six lignes. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un gris-brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un gris-verdâtre; & les ongles noirs. On la trouve dans les prairies humides, les marais, & sur les bords des rivières.

fimbriatæ : vigesima quarta & vigesima quinta penitus cinereæ : corpori tandem viciniore sunt ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque concolores, inde ad apicem nigricantes. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ, areâ transversâ nigrâ, sex circiter lineas latâ, versùs apicem notatæ. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum griseo-fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, griseo-viridescens; ungues verò nigri. Prata humida, paludisque frequentat, & juxta fluviorum ripas versatur.

### \*\* 13. LA MOUETTE RIEUSE.

*Voyez Pl. XVIII. Fig. 1.*

Larus superne cinereus, infernè niveus; capite & collo supremo cinereo-nigricantibus (capite anteriore albo maculato *fœmina*); remigibus sex primoribus in extremitate; tribus extimis exterius nigris, sexta albâ maculâ apice notata; rectricibus candidis . . . GAVIA RIDIBUNDA.

Larus albus, capite alarumque apicibus nigris, rostro rubro. Atricilla.  
*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 69. sp. 5.*

Larus minor, capite nigro, rostro rubro. *Klein. Avi. pag. 139. N°. 16.*

Larus



*Larus major cinereus* Baltneri. *Raj. Syn. Avi. pag. 129. N<sup>o</sup>. 8.*

*Larus major cinereus* Leonardi Baltneri. *Ein Große See-Meb. Willugh. Ornith. pag. 263. hujus icon pessima Tab. LXVII.*

*Larus major cinereus* Baltneri, apud Willughby; *Gavia piscator. Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 388.*

Mouette rieuse. *Catesb. Tom. 1. pag. 89; avec une figure passable Pl. 89.*

*Les Allemands l'appellent GROSSERER FISCH FRESSER. Rzac.*

*Les Polonois, RYBITW POPIELASTY WIEKSZY; KULIG. Rzac.*

*Les Anglois, LANGHING GULL. Catesb.*

Cum *Gavia cinerea minore* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda quatuor pollices cum totidem lineis; pars crurum plumis denudata octo cum semi lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas, extimus quindecim cum semi lineas, intimus tredecim lineas; posticus autem quatuor tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duorum pollicum & quatuor linearum

*Tom. VI.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *petite Mouette cendrée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue quatre pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes & demie; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quinze lignes & demie, l'intérieur treize lignes; & celui de derrière quatre lignes seulement. Elle a trois pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux pouces quatre lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie du col qui en est la plus voisine, & la gorge sont d'un cendré-noirâtre; il faut

Bb



cependant en excepter le tour des yeux, qui est blanc. Le reste du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc de neige. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un fort joli cendré : les plus grandes des scapulaires sont cependant terminées de blanc. Le bord de l'aile, depuis son origine jusque vers l'extrémité, est de cette dernière couleur. Les petites couvertures du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont cendrées. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même cendré que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré un peu plus foncé, excepté le côté extérieur des deux plus extérieures, & le bord extérieur de la troisième, qui sont noirâtres : la troisième a de plus une petite tache longitudinale noirâtre, placée auprès de sa tige vers l'extrémité du côté intérieur. L'aile est composée de trente-deux plumes : les trois premières sont noires, excepté l'origine du côté intérieur, qui est cendrée : les trois suivantes,

distans ultra caudæ extremitatem protenduntur. Caput, pars colli ipsi finitima, gutturque ex cinereo nigricant; attamen oculorum ambitus albet. Reliquum collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores niveo candore nitent. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt eleganter cinereæ : ex scapularibus, majores tamen albo terminantur. Alarum margines ab ipsarum exortu versus extremitatem usque similiter candidæ. Tectrices alarum inferiores minores, sicut & majores corpori viciniore, albæ : majores à corpore remotiores cinereæ. Superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbutæ cinereo ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores cinereo nonnihil saturatiore tinctæ ; exceptis tamen duarum extimarum latere exteriori & tertiæ margine extimâ nigricantibus : tertia insuper minutâ insignitur maculâ longitudinali nigricante, prope scapum versus lateris interioris extremitatem positâ. Triginta duabus remigibus ala conflatur : tres primores



nigræ, attamen interiùs in exortu cinereæ : tres proximè sequentes , à quarta scilicet ad sextam usque inclusivè , sunt in exortu cinereæ , in extremitatè nigræ , nigro scilicet colore eò minus spatium occupante , quò remix fit corpori viciniôr ; sexta insuper minutâ maculâ albâ apice notatur : viginti tres proximè sequentes , à septima scilicet ad vigesimam nonam usque inclusivè , cinereæ , albo terminatæ : tres tandem corpori viciniôres penitùs cinereæ. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Rostrum sanguineo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata , pedes , digiti , sicut & ipsorum membranæ , unguesque nigricantes.

*Femina à mare discrepat capite cinereo non ità saturato tincto , & parte capitis anteriore , guttureque albo maculatis.*

*Aves istæ voce risum quodammodo æmulantur ; unde ridibundæ nomen. Juxta maris littora versantur. Ex museo Realmuriano ; in quem eadem species à Dominicensi Insula missa à D. Chervain.*

sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la sixième inclusivement ; sont cendrées à leur origine ; & noires à leur extrémité ; cette dernière couleur occupant d'autant moins d'espace , que la plume est plus proche du corps ; la sixième est de plus terminée par une petite tache blanche : les vingt-trois suivantes , sçavoir depuis la septième jusqu'à la vingt-neuvième inclusivement , sont cendrées , & terminées de blanc ; enfin les trois plus proches du corps sont entièrement cendrées. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un rouge de sang. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds , les doigts , ainsi que leurs membranes , & les ongles sont noirâtres.

*La femelle diffère du mâle en ce que le cendré de sa tête n'est pas si foncé , & que la partie antérieure de sa tête & sa gorge sont tachetées de blanc.*

Ces Oiseaux par leur cris imitent en quelque façon le rire ; c'est ce qui leur a fait donner leur nom. On les trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.* La même espèce lui a été envoyée de *S. Domingue* par *M. Chervain*.



## \*\* 14. LA MOUETTE RIEUSE A PATTES ROUGES.

*Larus superne cinereus*, infernè niveus; capite fusco-nigricante; remigibus decem primoribus albis, nigro utrinque marginatis & terminatis; rectricibus candidis . . . . .

GAVIA RIDIBUNDA PHÆNICOPOS.

*Larus cinereus alter* rostro & pedibus rubris. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 73. hujus icon non satis accurata pag. 76.*

*Larus cinereus* rostro & pedibus rubris Aldrovandi. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 389.*

*Larus cinereus* Ornithologi, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 264. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXVI, sub titulo, Larus cinereus, rostro & pedibus rubris.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 128. N°. A. 5.*

*Larus cinereus tertius. Jonst. Avi. pag. 93. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 46, sub titulo, Larus cinereus.*

*Larus major cinereus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 292.*

*Larus major cinereus* Schwenckfeldii. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 388.*

*Larus albus erythrocephalus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 293.*

*Klein. Avi. pag. 138. N°. 8.*

*Cepphus Turneri. Gefn. Avi. pag. 249.*

*Pipixcan, seu Avis furax. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 3. cap. LXXXIX.*

*Mouette à tête brune. Alb. Tom. II. pag. 56; avec une figure mal coloriée Pl. 86.*

*Les Allemands l'appellent* GROSSER SEE-SCHWALM; GRAVER MEER-SCHWALM; WEISSER SEE-SCHWALBE; SEE-SCHWALBE; FISCH AHR; ROTKOEFFICHTER. *Schwenck.*

*Les Anglois, PÉWIT ou BLACK-CAP. Willugh. Raj. BROWN HEADED GULL. Alb.*

*Ceux qui habitent Chester, SEA CROW. Willugh. Raj.*

*Les Mexiquains, PIPIXCAN. Fern.*

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues quindecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius



apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est ; cauda quatuor pollices cum tribus lineis ; pars crurum plumis denudata octo lineas ; pes unum pollicem & septem lineas ; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & sex lineas , extimus quindecim lineas , intimus tredecim lineas ; posticus autem quatuor tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad duorum pollicum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput , gutturque ex fusco nigricant, excepto tamen oculorum ambitu albo. Collum , pectus , venter , latera , crurum suprema pars , testricisque caudæ superiores & inferiores niveo candore nitent. Dorsum , uropygium & scapulares pennæ sunt eleganter cineræ ; ex scapularibus , majores tamen albo terminantur. Alarum margines ab ipsarum exortu versùs extremitatem usque similiter candidæ. Testrices alarum inferiores minores , sicut & majores corpori viciniore , albæ ; majores à corpore re-

coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long ; sa queue quatre pouces trois lignes ; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes , huit lignes ; son pied un pouce sept lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , un pouce six lignes , l'extérieur quinze lignes , l'intérieur treize lignes ; & celui de derriere quatre lignes seulement. Elle a trois pieds de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à deux pouces au-delà du bout de la queue. La tête & la gorge sont d'un brun-noirâtre ; il faut cependant en excepter le tour des yeux qui est blanc. Le col , la poitrine , le ventre , les côtés , le haut des jambes , & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc de neige. Le dos , le croupion & les plumes scapulaires sont d'un fort joli cendré : les plus grandes des scapulaires sont cependant terminées de blanc. Le bord de l'aîle , depuis son origine jusque vers l'extrémité , est de cette dernière couleur. Les petites couvertures du dessous de aîles , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont cendrées. Les petites du



dessus ; ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont du même cendré que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré un peu plus foncé , excepté le bord extérieur des deux ou trois plus extérieures , qui est noirâtre. L'aîle est composée de trente - deux plumes : les dix premières sont blanches , bordées des deux côtés & terminées de noir ; cette bordure noire s'étend d'autant moins vers l'origine de la plume , que la plume est plus extérieure : les dix-neuf suivantes , savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-neuvième inclusivement , son cendrées , & terminées de blanc : enfin les trois plus proches du corps sont entièrement cendrées. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est de couleur de noisette ; les paupieres sont rouges. Le bec , la partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les doigts , ainsi que leurs membranes , sont d'un rouge de sang ; & les ongles noirâtres. Son cri , comme celui de la précédente , imite en quelque façon le rire ; c'est ce qui lui a fait donner le nom de *Rieuse*. On la trouve sur les bords de la mer , sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

motiores cinereæ. Superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbutæ cinereo ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores cinereo non nihil saturatiore tinctæ , exceptâ tamen duarum triumve extimarum margine exteriori nigricante. Alam componunt triginta duæ remiges : decem primores albæ , nigro utrinque marginatæ & terminatæ ; quæ margo nigra eò minùs versus remigis extortum protenditur , quò remix fit exterior : novemdecim proximè sequentes , ab undecima scilicet ad vigesimam nonam usque inclusivè , cinereæ , albo terminatæ : tres tandem corpori viciniore penitus cinereæ. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Oculorum irides avellaneæ ; palpebræ rubræ. Rostrum , pars crurum plumis denudata , pedes & digiti , sicut & ipsorum membranæ , sanguineo colore tincti ; ungues verò nigricantes. Præcedentis instar , voce risum quodammodo æmulatur ; unde *ridibundæ* nomen. Juxta maris littora versatur ; & flumina , piscinasque frequentat. *Ex museo Realmuriano.*



**\*\* 15. LA MOUETTE BRUNE.**

*Voyez Pl. XVIII. Fig. 2.*

**Larus fuscus** ; *syncephala candicante* ; capite superiore cinereo-albo ; *tæniâ* utrinque longitudinali supra oculos nigricante ; rectricibus fusco-nigricantibus . . . . **GAVIA FUSCA.**

**Larus Americanus minor stolidus** , corpore fusco-rubente , vertice albo  
*D. Sloane. Raj. Syn. Avi. pag. 132. N° 10.*

**Larus Americanus** , castaneus , capite albo. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. IV. sp. 8.*

**Larus** , *Hirundo marina minor* capite albo. *Klein. Avi. pag. 139. N° 15.*

*Hirundo marina minor* capite albo. *Sloane. Voy. of Jamaic. Tom. I. pag. 31. hujus icon satis accurata ( rostro & pedibus exceptis ) Tab. 6. fig. 2.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 190. N° 2.*

*Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 134.*

**Sterna cauda cuneiformi** , corpore nigro , fronte albicante. *Sterna stolidula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 70. sp. 1.*

**Anæthetus minor fuscus** , vertice cinereo , rostro glabro. *Browne. Nat. Hist of Jamaic. pag. 481.*

**Passer stultus.** *Euf. Nieremb. pag. 207.*

*Jonst. Avi. pag. 126.*

*Willugh. Ornith. pag. 297.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 154.*

*Charlet. Exer. pag. 118. N° XXII.*

*Charlet. Onomazt. pag. 115. N° XXII.*

**Hirondelle marine à la tête blanche.** *Catesb. Tom. I. pag. 88 ; avec une figure assez exacte Pl. 88.*

**Oiseau appelé Diable ou Diablotin.** *Nouv. Voy. de l'Amér. Tom. II. pag. 350.*

*Les Anglois l'appellent NODDY. Raj. Browne. Catesb. NODDE. Sloane. FOOLISH SPARROW OF BRASIL. Charlet.*

*Les Indiens de la Guiane, THOUAROU. Barr.*

*Sternam majorem paululum crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem qua-*

Elle est un peu plus grosse que la grande Hirondelle - de - mer. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue



est de quatorze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce onze lignes de long ; sa queue cinq pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, quatre lignes ; son pied dix lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes & demie, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur onze lignes ; & celui de derrière quatre lignes seulement. Elle a deux pieds quatre pouces huit lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes de distance en-deçà du bout de la queue. Le synciput est blanchâtre. Tout le dessus de la tête est d'un gris-blanc. De chaque côté de la tête est une petite bande longitudinale noirâtre, qui s'étend au-dessus de l'œil. Les yeux sont entourés d'une petite ligne blanche. La gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes brunes. Les scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un cendré-brun assez foncé. Les petites du dessus, ainsi que les

tuordecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & undecim lineas longum est ; cauda quinque pollices ; pars crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes decem cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor cum semi lineas, extimus quatuordecim lineas, intimus undecim lineas ; posticus autem quatuor tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & octo linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem, exceptâ solummodo sex linearum distantia, pertinent. Synciput candicat. Capitis superior pars tota ex cinereo albet. In utroque capitis latere exigua extat tænia longitudinalis nigricans, supra oculos extensa. Lineola alba oculos circumdat. Guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ fuscæ. Scapulares, rectricesque caudæ superiores & inferiores eodem imbutæ colore.



lore. Pennæ alas subtus obtegentes sunt saturatè cinereo-fuscæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, fuscæ : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes. Alam componunt viginti sex remiges, quarum viginti primores ex fusco nigricant : sex reliquæ eodem imbuuntur fusco ac dorsum ipsum tingitur. Cauda duodecim constat rectricibus fusco-nigricantibus. Quatuor intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque quatuor intermediis octodecim linearum longitudine cedentem. Rostrum, unguesque nigricantes. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, fusci. Habitat in *America Septentrionali*. Mare frequentat ; quandoque procul à littore discedit ; & *Piscibus* victitat. *Ex museo Realmuriano.*

grandes les plus proches du corps, sont brunes : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. L'aîle est composée de vingt-six plumes : les vingt premières sont d'un brun-noirâtre : les six autres sont du même brun que le dos. La queue est composée de douze plumes d'un brun-noirâtre. Les quatre du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de dix-huit lignes que les quatre du milieu. Le bec & les ongles sont noirâtres. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont bruns. On la trouve dans l'*Amerique Septentrionale*. Elle se tient sur la mer, s'éloignant quelquefois beaucoup de terre ; & se nourrit de *Poissons*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*





## SECTION II.

*Ceux dont le bec est droit & applati par les côtés.*

**I**L y a dans cette section deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la longueur respective de leurs mandibules. Dans les uns les deux mandibules sont d'égale longueur, comme dans l'*Hirondelle-de-mer*: dans les autres la mandibule inférieure est beaucoup plus longue que la supérieure, comme dans le *Bec-en-ciseaux*.

## CIII.

*Genre de l'Hirondelle-de-mer.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé:  
Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps:  
Le bec sans dentelures, droit & applati par les côtés:  
Les deux mandibules d'égale longueur.

Tous les Oiseaux de ce genre ont la partie inférieure des

## SECTIO II.

*Eæ quæ rostro donantur recto, lateraliter plano.*

**I**Æc sectio duobus constat generibus Avium respectivâ mandibularum longitudine à se invicem discrepantium. In aliis enim utraque mandibula æquali longitudine pollet, ut in *Sterna*: in alteris verò mandibula inferior superiore multò longior est, ut in *Rynchopsalia*.

## CIII.

*Genus Sternæ.*

Hujus character est  
Digiti quatuor, tres scilicet antichi membranis integris inter se connexi, posticus solutus:  
Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora:  
Rostrum edentulum, rectum, lateraliter planum:  
Mandibula utraque æqualis longitudinis.

Omnium hujus generis Avium pars crurum infima





*Gaillard cendré.*









Dessiné et Gravé par Martinet.

*Goiland cendré.*









*Goiland varié ou Grisard.*










Designé et Gravé par Martinet.

*Gouland varié ou Grisard.*










2. Grande Mouette cendrée.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. *Mouette cendrée.*

2. *Grande Mouette cendrée.*







Fig. 1.



2. *Mouette cendrée tachetée.*









Designé et Gravé par Martinet.

1. Petite Mouette cendrée.


2. Mouette cendrée tachetée.







Fig. 1.



2. Mouette brune.









Designé et Gravé par Martinet.

1. Mouette ricieuse.

2. Mouette brune.







plumis est denudata. Ipsa- jambes dégarinée de plumes. Il  
rum quoque cauda est bi- ont aussi la queue fourchue.  
furca.

**\*\* I. LA GRANDE HIRONDELLE-DE-MER.**

*Voyez Pl. XIX. Fig. 1.*

*Sterna superne cinereo-alba, infernè nivea; capite superiore nigro; remigibus septem primoribus interius versùs scapum cinereo-nigricantibus; rectricibus cinereo-albis . . .*  
**STERNA MAJOR.**

*Sterna rectricibus extimis maximis dimidiato albis nigrisque. Faun. Suec. Linn. N°. 127.*

*Sterna cauda forcipata: rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis. Hirundo. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 70. sp. 2.*

*Sterna. Gesn. Avi. pag. 586. hujus icon minùs accurata pag. 587. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 78, in qua hujus icon à Gesnero mutuata.*

*Jonst. Avi. pag. 94. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 46, sub titulo; Larus minor; Sterna.*

*Sterna Turneri. Willugh. Raj. Sibbald. Klein.*

*Hirundo marina. Willugh. Ornith. pag. 268. hujus icon minimè accurata Tab. LXVIII, sub titulo, Hirundo marina major.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 131. N°. A. 1.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.*

*Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 54. sp. 1.*

*Hirundo marina major. Raj. Syn. Avi. pag. 191. N°. 7.*

*Hirundo marina; Sterna Turneri. Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 385.*

*Larus minor; Sterna vel Stirna. Gesn. icon. Avi. pag. 96, in qua hujus icon minùs accurata.*

*Larus albicans. Marsil. Danub. Tom. V. pag. 88. hujus icon non satis accurata Tab. 42.*

*Klein. Avi. pag. 138. N°. 10.*

*Larus. Moehr. Avi. Gen. 74.*

*Spetirer, Baltneri. Willugh. Klein.*

*Patines de Oviedo. Raj.*

*Goiland ou Larus minor melanocephalos. Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 410. (ed. 1725).*

*Grande Alouette de mer. Alb. Tom. II. pag. 57; avec une figure mal coloriée Pl. 88.*

*Les Suisses l'appellent SCHNIRRING. Gesn Aldrov.*



*Les Allemands*, SEE SCHWALBE ; KLEINE MEWE. *Rzac.*

*Les Allemands aux environs de Strasbourg*, SPYRER. *Gefn. Aldrov.*  
SPEURER. *Willugh.*

*Les Frisons*, STIRN. *Gefn. Aldrov.*

*Les Polonois*, JASKOLKA MORSKA ; KULIG MORSKI. *Rzac.*

*Les Suédois*, TAERNA. *Linn.*

*Les Hollandois*, ICSTERRE. *Aldrov.*

*Les Anglois*, SEA-SWALLOW. *Willugh. Raj. GREATER SEA-SWALLOW.*  
*Willugh. Raj. Alb.*

*Les Anglois Septentrionaux*, TERN. *Willugh.*

*Les Anglois qui habitent l'Isle Caldey*, SPURRE : & en quelques endroits ,  
SCRAYE. *Willugh.*

*Les Ecoissois*, PICTARNE. *Sibbald.*

Elle n'est guères plus grosse que le *Râle d'eau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces sept lignes de long ; sa queue cinq pouces trois lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes ; son pied onze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce, l'extérieur neuf lignes & demie, l'intérieur huit lignes ; & celui de derrière trois lignes seulement. Elle a un pied neuf pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quinze lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un beau noir ; cette couleur des-

*Crassitie Rallum aquaticum non multum excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex lineas aequat, & ad extremos ungues duodecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & septem lineas longum est ; cauda quinque pollices & tres lineas ; pars crurum plumis denudata sex lineas ; pes undecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem, extremus novem cum semi lineas, intimus octo lineas ; posticus autem tres tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & novem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad quindecim linearum distantiam*



ultra caudam extremam protrahuntur. Capitis pars superior est splendide nigra; quæ nigredo supra partem colli superiorem in acumen descendit. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ teatrices sunt eleganter cinereo-albæ. Caput ad latera, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ teatrices & pennæ alas subtus obtegentes niveo candore nitent. Alarum componunt viginti novem remiges : septem primores in latere exteriori & apice eleganter cinereo-albæ, sed in latere interiori secundum ipsarum scapi longitudinem cinereo-nigricantes, versus margines verò albæ; color autem cinereo-nigricans eò saturatior est, quò remix fit exterior : tres proximè sequentes, ab octava scilicet ad decimam usque inclusivè, eleganter cinereo-albæ, interiorius candido fimbriatæ : reliquæ omnes concolores, sed albo quoque in apice marginatæ : albedo autem eò majus spatium in latere interiori occupat, quò remix fit corpori vicinior. Remix prima reliquarum omnium lon-

gend en pointe sur la partie supérieure du col. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un fort joli gris-blanc. Les côtés de la tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc de neige. L'aile est composée de vingt-neuf plumes : les sept premières sont d'un joli gris-blanc du côté extérieur & à leur bout; mais leur côté intérieur est d'un cendré-noirâtre tout le long de leur tige, & d'un blanc de neige vers les bords; le cendré-noirâtre est d'autant plus foncé, que la plume est plus extérieure : les trois suivantes, savoir depuis la huitième jusqu'à la dixième inclusivement, sont d'un joli gris-blanc, & bordées intérieurement de blanc : toutes les autres sont de la même couleur, mais elles sont aussi bordées de blanc par le bout : de plus le blanc occupe d'autant plus d'espace sur le côté intérieur, que la plume est plus proche du corps. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze



plumes d'un gris-blanc : cette couleur est plus claire sur le côté intérieur des quatre plumes les plus extérieures de chaque côté. Les deux du milieu sont les plus courtes : toutes les latérales vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue de deux pouces trois lignes que les deux du milieu ; ce qui rend la queue très - fourchue. Le bec est rouge. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge obscur ; & les ongles noirâtres. Elle construit son nid avec des roseaux ; & pond trois ou quatre œufs à chaque couvée. On la trouve sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

gitudinem antecellit. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-albo imbutæ colore : qui color in quatuor utrinque extimarum rectricum exteriori latere fit dilutior. Binæ intermediae breviores : laterales autem omnes sensim atque sensim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extimam usque binas intermedias duorum pollicum & trium linearum longitudine superantem ; unde fit cauda maximè bifurca. Rostrum rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, obscurè rubri ; ungues verò nigricantes. Ex arundinibus nidum construit ; tresque quatuorve ova uno incubitu ponit. Fluvios, piscinasque frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

\*\* 2. LA PETITE HIRONDELLE-DE-MER.

*Voyez Pl. XIX. Fig. 2.*

*Sterna superne cinerea, infernè nivea ; syncipite albo ; vertice & occipitio nigris ; remigibus tribus primoribus nigricantibus, interiùs maximâ parte albis ; rectricibus candidis....*  
STERNA MINOR.

*Sterna supra cana, capite rostroque rubro, pedibus rubris. Faun. Suec. Linn. N<sup>o</sup>. 128.*

*Sterna cauda subforficata, corpore cano, capite rostroque nigro, pedibus rubris. Sterna nigra. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 70. sp. 3.*



*Sterna nigra.* Linn. *Systh. Nat. ed. 6. Gen. 54. sp. 2.*

*Larus subcinereus*, roïtro & pedibus croceis. Barr. *Ornith. Class. I. Gen. IV. sp. 3.*

*Larus piscator.* Gesn. *Avi. pag. 587. hujus icon minùs accurata pag. 588. Gesn. icon. Avi. pag. 96, in qua eadem icon.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 80, in qua hujus icon non satis accurata ; & insuper altera icon à Gesnero mutuata pag. 79.*

*Jonst. Avi. pag. 93. hujus duæ icones Tab. 46 ; una scilicet à Gesnero , & altera ab Aldrovando mutuata, sub titulo , Marina Hirundo.*

*Charlet. Exer. pag. 100. N°. 3.*

*Charlet. Onomazt. pag. 94. N°. 3.*

*Larus piscator Aldrovandi & Gesneri. Willugh. Ornith. pag. 269. hujus icon non satis accurata Tab. LXVIII, sub titulo , Hirundo marina minor.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 131. N°. A. 2.*

*Larus piscator Aldrovandi , Gesneri , Baltneri , Willughbeji. Klein. Avi. pag. 138. N°. 13.*

*Larus minor cinereus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 293.*

*Klein. Avi. pag. 138. N°. 11.*

*Larus minor cinereus Schwenckfeldii ; Larus piscator Gesneri. Gavia minor. Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 388.*

*Larus fluviatilis, seu Gavia , Gesnero Piscator. Rzac. Hist. Nat. Pol. pag. 285.*

*Larus albus minor. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 71.*

*Jonst. Avi. pag. 93.*

*Larus albus minor Bellonii. Willugh. Ornith. pag. 265.*

*Fischerlin Leonardi Baltneri. Willugh.*

*Petite Hirondelle de mer. Alb. Tom. II. pag. 58 ; avec une figure mal coloriée Pl. 90.*

*Hirondelle de mer. Bel. Portr. d'Ois. pag. 35 b , dans laquelle est une mauvaise figure.*

*Petite Mouette blanche. Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 171.*

*Les Italiens l'appellent GAVIA MARINA. Bel.*

*Les Allemands , KLEIN SEE-SCHWALBE ; ROHR-SCHWALM. Schwenck ; FISCH-WEIHER. Rzac.*

*Les Allemands aux environs de Strasbourg , FISCHERLIN. Gesn. Aldrov. Schwenck, Jonst. Willugh.*

*Les Allemands aux environs d'Oppenheim , FEL. Gesn. Aldrov. Jonst.*

*Les Polonois , RYBITW. Rzac.*

*Les Anglois , LESSER SEA-SWALLOW. Willugh. Raj. Alb. FISHERLING ou PLUNGING GULL. Charlet.*

*Cinclum* crassitie non multum superat. Ipsius longitudo Elle n'est guères plus grosse que l'Alouette-de-mer. Sa lon-



gueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes & demie de long; sa queue trois pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux lignes; son pied six lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie, l'extérieur six lignes, l'intérieur cinq lignes; & celui de derrière deux lignes seulement. Elle a un pied six pouces huit lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à huit lignes au-delà du bout de la queue. Le synciput est blanc. Le sommet de la tête & l'occiput sont noirs: cette couleur s'étend un peu sur la partie supérieure du col, & en outre de chaque côté depuis les yeux jusqu'à l'origine du bec. Le reste du dessus du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & les petites du dessus de la queue sont d'un joli cendré: les trois plus grandes couvertures du dessus des ailes les plus éloignées du corps sont cependant d'un cendré

ab apice rostri ad caudæ extremitatem octo pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octodecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices cum quatuor lineis; pars crurum plumis denudata lineas binas; pes sex cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas; extimus sex lineas, intimus quinque lineas; posticus autem lineas tantummodo binas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis sex pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad octo linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Synciput albicat. Vertex capitis & occipitium nigro tinguntur colore; nigredo autem paululum supra partem colli superiorem, & utrinque insuper ab oculis ad rostri exortum usque protenditur. Reliquum collum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares; quæ alas superne vestiunt, tectricesque caudæ superiores minores sunt eleganter cinereæ: tres tamen alarum tectrices



teatrices superiores majores à corpore remotiores cinereo multò saturatiore tinguntur. Guttur, collum inferius & ad latera, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ alas subtus cooperientes, teatricesque caudæ inferiores, sicut & majores superiores, niveo candore nitent. Viginti quinque remigibus ala conflatur: tres primores nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte albæ: sex proximè sequentes, à quarta scilicet ad nonam usque inclusivè, eleganter cinereæ, interius maximâ quoque parte candidæ: duodecim quæ nuper descriptas sequuntur, à decima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, cinereo dilutioribus imbutæ, sed in latere interiore similiter maximâ parte albæ, & albo insuper in apice marginatæ: quatuor tandem corpori finitimæ eodem imbutæ cinereo ac scapulares ipsæ tinguntur. Cauda duodecim conflatur rectricibus candidis, quarum binæ intermedie breviores: laterales autem omnes gradatim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extimam usque binas intermedias oc-

*Tom. VI.*

beaucoup plus foncé. La gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous des ailes & celles du dessous de la queue, ainsi que les grandes du dessus, sont d'un blanc de neige. L'aile est composée de vingt-cinq plumes: les trois premières sont noirâtres, excepté une grande partie de leur côté intérieur, qui est blanche: les six suivantes, sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont d'un joli cendré, ayant aussi une grande partie de leur côté intérieur blanche: les douze qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont d'un cendré plus clair, excepté une grande partie de leur côté intérieur, qui est blanche, & sont de plus bordées de blanc par le bout: enfin les quatre plus proches du corps sont du même cendré que les scapulaires. La queue est composée de douze plumes d'un beau blanc. Les deux du milieu sont les plus courtes: toutes les latérales vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue que les deux du milieu

D d



de dix-huit lignes ; ce qui rend la queue très-fourchue. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges ; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

todecim linearum longitudine excedentem ; unde fit cauda maximè bifurca. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri ; ungues verò nigricantes. Flumina & piscinas frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

### 3. L'HIRONDELLE-DE-MER CENDRÉE.

*Sterna cinerea* ; capite nigro ; marginibus alarum & rectricibus caudæ inferioribus albis ; rectricibus cinereis . . .  
STERNA CINEREA.

*Larus cinereus minor. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 90. hujus icon non satis accurata Tab. 43.*

*Larus fidipes alius alis brevioribus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 83, in qua hujus icon non satis accurata.*

*Larus fidipes alter. Jonst. Avi. pag. 94. hujus icon ab Aldrovando mutata Tab. 46.*

*Larus fidipes alter alis brevioribus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 270.*

*Larus niger fidipes alter, alis brevioribus, Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 131. N° 5.*

*Les Boulonnois l'appellent RONDONE MARINO. Aldrov. Willugh.*

*Les Génois, MARTIN PESCAO. Aldrov.*

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ treize pouces. Sa queue a quatre pouces de long. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas jusqu'au bout de la queue. La tête est noire,

Præcedentem paululùm crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tredecim circiter pollices explet. Cauda quatuor pollices longa est. Alæ complicatæ ad caudæ extremitatem nequaquam pertingunt. Caput,



gutturque nigra sunt. In quibusdam individuis colorem nigrum in fronte & sub gutture variegat color candidus. Collum, dorsum, uropygium, pennas scapulares, superiores caudæ rectrices, pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera tingit cinereus color. Inferiores caudæ rectrices albæ. Alarum margines concolores. Superiores ipsarum rectrices, sicut & remiges, cinereæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda constat. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri; ungues verò nigri. Juxta fluviorum & stagnorum ripas versatur.

ainsi que la gorge. Dans quelques individus cette couleur est variée de blanc sur le front & sous la gorge. Le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont cendrés. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Le bord de l'aile est de la même couleur. Les couvertures du dessus des ailes, & les plumes de l'aile sont cendrées. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords des rivières & des étangs.

\*\* 4. L'HIRONDELLE-DE-MER NOIRE OU L'EPOUVANTAIL.

*Voyez Pl. XX. Fig. 1.*

*Sterna superne cinerea, infernè cinereo-nigricans; capite & collo superiore nigricantibus; imo ventre niveo; rectricibus cinereis, utrinque extimâ exteriùs cinereo-alba . . .*  
STERNA NIGRA.

*Larus niger. Gesn. Avi. pag. 588. hujus icon minùs accurata pag. 589. Gesn. icon. Avi. pag. 97, in qua eadem icon.*  
*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 81, in qua hujus icon à Gesnero mutuata.*  
*Jonst. Avi. pag. 94. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 46.*  
D d ij



*Charlet. Exer. pag. 100. N<sup>o</sup>. 4.*

*Charlet. Onomast. pag. 95. N<sup>o</sup>. 4.*

*Larus niger Gefneri. Raj. Syn. Avi. pag. 131. N<sup>o</sup>. A. 3.*

*Larus niger Gefneri Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 269. hujus icon minus accurata Tab. LXVIII.*

*Larus minor niger. Schwenck. Avi. Sil. pag. 294.*

*Klein. Avi. pag. 138. N<sup>o</sup>. 12.*

*Larus minor niger Schwenckfeldii, Gefneri; Meva nigra. Raz. Auct.*

*Hist. nat. Pol. pag. 389.*

*Larus fidipes primus. Jonst. Avi. pag. 94.*

*Larus niger fidipes. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 82, in qua hujus icon non satis accurata.*

*Larus niger fidipes alis longioribus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 270. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXVIII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 131. N<sup>o</sup>. 4.*

*Larus niger fidipes noster. Willugh. Ornith. pag. 270.*

*Larus minor fidipes nostras. Raj. Syn. Avi. pag. 132. N<sup>o</sup>. A. 6.*

*Larus Pyrenaicus totus ater. Barr. Ornith. Class. I. Gen. IV. sp. 5.*

*Meva nigra, Schwenckfeldii.*

*Brand-Vogel seu Mey-Vogel Leonardi Baltneri. Willugh.*

*Les Boulonnois l'appellent RONDONE MARINO. Aldrov. Willugh.*

*Les Allemands, SCHWARTZER MEW. Gefn. Aldrov. SCHWARTZER MEWE;*

*KLEIN SCHWARTZER SEE-SCHWALBE; & quelques-uns, KLEIN MEU-*

*BESZLIN. Schwenck.*

*Les Allemands aux environs de Strasbourg, MEY-VOGEL. Schwenck.*

*MEY-VOEGELIN. Gefn. Aldrov. Willugh.*

*Les Habitans des environs de Gand, BRAND-VOGEL. Gefn. Aldrov.*

*Les Anglois, SCARE-CROW. Willugh. Raj. SMALL BLACK CLOVEN-FOO-*

*TED SEA-SWALLOW. Raj. BLACK HEADED GULL; & quelques-uns,*

*SHEAR WATER. Charlet.*

Il est un peu plus gros que la petite *Hirondelle-de-mer*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neufpouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégar-

*Sternam minorem paululum crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata tres*



cum semi lineas; pes septem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus novem lineas, intimus sex cum semi lineas; posticus autem binas tantum cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad unius pollicis & octo linearum distantiam ultra caudam extremitates protenduntur. Caput & pars colli superior nigricant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices sunt eleganter cineræ. Guttur, collum inferius, pectus, venter supremus & latera cinereo tinguntur saturatissimo & nigricante. Venter imus & rectrices caudæ inferiores niveo candore nitent. Pennæ alas subtus obtegentes eleganter cinereo-albæ. Alarum component viginti septem remiges cineræ, quarum majores scapo donantur superne & infernè candido; minores verò scapo infernè tantummodo albo præditæ sunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur: decem intermediæ cineræ; utrinque extrema in

nie de plumes, trois lignes & demie; son pied sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur six lignes & demie; & celui de derrière deux lignes & demie seulement. Il a un pied onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce huit lignes au-delà du bout de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont noirâtres. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, & celles du dessus de la queue sont d'un joli cendré. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un cendré très-foncé & noirâtre. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc de neige. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un joli gris-blanc. L'aile est composée de vingt-sept plumes cendrées: la tige des grandes est blanche en-dessus & en-dessous; & celle des moyennes n'est blanche qu'en-dessous. La queue est composée de douze plumes: les dix du milieu sont cendrées: la plus extérieure de chaque côté est de la même couleur du côté in-



térieur, & d'un gris-blanc du côté extérieur. Les deux plumes du milieu de la queue sont les plus courtes : toutes les latérales vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue de sept lignes que les deux du milieu ; ce qui rend la queue un peu fourchue. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge obscur ; & les ongles noirs. Les membranes qui réunissent les doigts, sont très-échancrées. On le trouve sur les rivières & les étangs. Il fait son nid dans les roseaux, & pond trois ou quatre œufs d'un verd sale, variés de taches noires, & entourés par le milieu d'une large bande noire. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

latere interiore concolor ; in exteriore cinereo-alba. Binæ rectrices intermedia breviores : laterales autem omnes sensim atque sensim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extimam usque, binas intermedias septem linearum longitudine excedentem ; unde fit cauda paululum bifurca. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, obscurè rubri ; ungues verò nigri. Membranae, quibus digiti inter se connectuntur, sunt valdè emarginatae. Flumina & piscinas frequentat. Inter arundines nidificat ; & ova ponit tria vel quatuor sordidè viridia, maculis nigricantibus variegata, latèque fasciâ nigrâ per medium cincta. *Ex museo Realmuriano.*

**\*\* 5. L'HIRONDELLE-DE-MER A TESTE NOIRE OU LE GACHET.**

*Sterna superne saturatè cinerea, infernè alba ; capite, collo & pectore supremo nigris ; oculorum ambitu cinereo-albo ; rectricibus saturatè cinereis, utrinque extimâ exteriùs albâ, saturatè cinereo marginatâ . . . STERNA ATRICAPILLA.*

Goiland ou *Larus albo-niger Hirundinis cauda.* *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 268. (ed. 1725).*

Petite Hironnelle de mer. *Alb. Tom. II. pag. 58 ; avec une figure mal coloriée Pl. 89.*

*Les Anglois l'appellent LESSER SEA SWALLOW. Alb.*



Crassitie præcedentem non-nihil antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & tres lineas. Rostrum ab ipso apice ad oris angulos usque unum pollicem & quatuor lineas longum est; cauda tres pollices cum totidem lineis; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes septem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus novem lineas, intimus septem lineas; posticus autem tres lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & totidem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad quindecim linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur, collum, pectusque supremum nigra sunt: oculos tamen ambiunt pennæ cinereo-albæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ tectrices saturato imbuuntur cinereo. Imum pectus, venter, latera, crurum suprema pars,

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce quatre lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, quatre lignes; son pied sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur sept lignes; & celui de derrière trois lignes. Il a un pied dix pouces dix lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quinze lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge, le col, & le haut de la poitrine sont noirs: les yeux sont cependant entourés de plumes d'un gris-blanc. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un cendré foncé. Le bas de la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les plumes de l'aile sont d'un



cendré plus foncé à leur extrémité qu'à leur origine. La queue est composée de douze plumes : les dix du milieu sont d'un cendré foncé : la plus extérieure de chaque côté est de la même couleur du côté intérieur, blanche & bordée de cendré foncé du côté extérieur. Les deux plumes du milieu de la queue sont les plus courtes : toutes les latérales vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue d'un pouce sept lignes que les deux du milieu ; ce qui rend la queue très-fourchue. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge obscur ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Alarum remiges sunt cinereæ quidem ; sed in extremitate saturatiùs quàm in exortu. Duodecim rectricibus cauda constat : decem intermediæ saturatè cinereæ : utrinque extrema in latere interiore concolor, inexteriore alba, saturatè cinereo marginata. Binæ rectrices intermediæ breviores : laterales autem omnes sensim atque sensim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extimam usque binas intermedias unius pollicis & septem linearum longitudine superantem ; unde fit cauda maximè bifurca. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, sunt obscurè rubri ; ungues verò nigricantes. Fluvios & piscinas frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

**\*\* 6. L'HIRONDELLE-DE-MER TACHETÉE.**

*Voyez Pl. XX. Fig. 2.*

*Sterna superne fusca, marginibus pennarum rufescentibus, infernè alba, rufescente ad latera adumbrata ; maculâ ponè oculos nigricante ; uropygio dilutè cinereo ; remigibus majoribus interiùs versùs scapum & ad apicem saturatè cinereis ;*



reis; rectricibus dilutè cinereis, ad apicem saturatioribus & albo-rufescente marginatis, utrinque extimâ exteriùs candidâ . . . . STERNA NÆVIA.

Larus cinereus fissipes rostro ac pedibus rufescentibus. *Marfil. Danub.*

*Tom. V. pag. 92. hujus icon minimè accurata Tab. 44.*

Rallus subrus albedo-flavescens cervice cœrulescenti maculato, digitis marginatis. Rallus Lariformis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 83. Sp. 3.*

Rallus cinereus facie Lari. *Klein. Avi. pag. 103. N°. 3.*

Kirr-Meuw. *Klein. Avi. pag. 107. N°. X.*

Mouette à pieds fendus. *Alb. Tom. II. pag. 54; avec une figure très-mauvaise & très-mal colorée Pl. 82.*

Les Anglois l'appellent CLOVEN FOOTED GULL. *Alb.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octodecim lineas longum est; cauda tres pollices cum quatuor lineis; pars crurum plumis denudata quatuor cum semi lineas; pes novem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus unum pollicem, intimus novem lineas; posticus autem quatuor lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum viginti quinque pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad

*Tom. VI.*

Elle est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long; sa queue trois pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes & demie; son pied neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur neuf lignes; & celui de derrière quatre lignes. Elle a deux pieds un pouce quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce cinq lignes au-delà du bout de la queue. La base du demi-bec

Ee



supérieur & le synciput sont couverts de petites plumes d'un gris-blanc, bordées de roussâtre. Celles qui couvrent le dessus de la tête, sont noirâtres, & bordées pareillement de roussâtre. Celles qui couvrent l'occiput & la partie supérieure du col qui en est la plus voisine, sont noirâtres, & bordées de gris-blanc. Le dos est couvert dans sa partie supérieure de plumes brunes, & dans sa partie inférieure de plumes cendrées, toutes étant bordées de roussâtre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré clair. Les plumes scapulaires sont cendrées à leur origine, & dans le reste de leur longueur elles sont roussâtres, & variées de grandes taches brunes. Derrière chacun des yeux est une grande tache noirâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs : cette couleur est mêlée sur les côtés d'une très-légère teinte de roussâtre. Le bord de l'aile est blanc dans toute sa longueur. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-blanc : mais les moyennes sont

unius pollicis & quinque linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Basim mandibula superioris & synciput obtinent plumula cinereo-alba, rufescente fimbriata. Quae partem capitis superiorem vestiunt, nigricant, & rufescente pariter marginantur. Quae occipitum & colli superioris partem illi finitimam cooperiunt, sunt nigricantes, cinereo-albo fimbriatae. Dorsum supremum pennae fuscae, dorsum inferius pennae cinerae vestiunt; omnes autem marginibus donantur rufescentibus. Uropygium, tectricesque caudae superiores sunt dilute cinerae. Pennae scapulares in exortu cinerae, in reliqua longitudine rufescentes; majusculis maculis fuscis variae. Ponè utrumque oculum majuscula extat macula nigricans. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferiores caudae tectrices & pennae alas subtus obtegentes albescent; albedo autem rufescente ad latera adumbratur. Alarum margines per totam longitudinem candidae. Tectrices alarum superiores cinereo-albae;



media tamen exigua terminantur margine ad rufescentem inclinante colorem, & majores corpori viciniore sunt ad apicem rufescentes, & quælibet penna in rufescente colore majusculâ maculâ fuscâ notatur. Remiges alarum majores sunt in latere exteriori cinereo-albæ, in interiori secundum scapi longitudinem saturatè cineræ, versùs ipsarum margines candidæ; lateris tamen interioris extremitas est penitus saturatè cineræ, qui color supra album ducitur, ibique strictam efficit taniâ remigis margini parallelam: minores sunt in latere interiori candidæ, in latere exteriori & extremitate dilutè cineræ, rufescente in apice marginatæ; quatuor tamen corpori viciniore iisdem ac scapulares pennæ coloribus variegantur. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè cineræ, qui color in extremitate uniuscujusque rectricis fit saturatior: rectrix insuper utrinque extrema est exterius candida; omnes autem albo-rufescente in apice marginantur. Binæ rectrices intermedia breviores: laterales autem omnes gradatim majorem acqui-

terminées par une petite bordure tirant sur le roussâtre; & parmi les grandes, celles qui sont les plus proches du corps, sont terminées de roussâtre, & sur chaque plume cette couleur est marquée d'une grande tache brune. Les grandes plumes de l'aile sont d'un gris-blanc du côté extérieur; leur côté intérieur est d'un cendré foncé tout le long de la tige, & blanc vers le bord de la plume; son extrémité est cependant entièrement d'un cendré foncé, laquelle couleur remonte sur le blanc, & y forme une étroite bande parallèle au bord de la plume: les moyennes sont blanches du côté intérieur, d'un cendré clair du côté extérieur & à leur extrémité, & bordées de roussâtre par le bout; les quatre plus proches du corps sont cependant variées des mêmes couleurs que les scapulaires. La queue est composée de douze plumes d'un cendré clair, qui devient cependant très-foncé à l'extrémité de chaque plume; de plus la plus extérieure de chaque côté est blanche du côté extérieur; & toutes sont bordées de blanc-roussâtre par le bout. Les deux plumes du milieu de la queue sont les plus courtes: toutes les laterales



vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue de sept lignes que les deux du milieu; ce qui rend la queue un peu fourchue. Le bec est d'un brun-noirâtre. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un gris-verdâtre; & les ongles noirâtres. Les membranes qui réunissent les doigts, sont très-échancrées. On la trouve sur les bords de la mer, sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

runt longitudinem ad utrinque extimam usque binas intermedias septem linearum longitudine excedentem; unde fit cauda nonnihil bifurca. Rostrum ex fusco nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, sunt griseo-viridescentes; ungues verò nigricantes. Membranæ, quibus digiti inter se connectuntur, sunt valdè emarginatæ. Juxta maris littora versatur; fluminaque & stagna frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

**\*\* 7. L'HIRONDÈLLE-DE-MER BRUNE.**

*Voyez Pl. XXI. Fig. 1.*

*Sterna superne fusco-nigricans, pennis dorsi rufescente in apice marginatis, infernè fusca; rectricibus alarum inferioribus cinereo-albis; rectricibus nigricantibus, binis inter mediis minutâ maculâ rufescente terminatis . . .*  
**STERNA FUSCA.**

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long;

Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem undecim pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem &



octo lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes decem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas, extimus decem cum semi lineas, intimus octo lineas; posticus autem tres cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est viginti quatuor pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè pertingunt. Caput, guttur & pars colli superior ex fusco nigricant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, & superiores caudæ rectrices eodem colore tinguntur, sed quælibet penna rufescente in apice marginatur. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem, crurum partem supremam, inferiores caudæ rectrices & latera tingit color fuscus. Pennæ alas subtus obtegentes sunt eleganter cinereo-albæ. Superiores alarum rectrices minimæ fusco-nigricantes; mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, pennis dorsum vestientibus concolores; majores à corpore remotiores nigricantes. Alam componunt viginti sex remiges nigrican-

sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégar-nie de plumes, six lignes; son pied dix lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur dix lignes & demie, l'intérieur huit lignes; & celui de derrière trois lignes & demie. Elle a vingt-quatre pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, & la partie supérieure du col sont d'un brun-noirâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, mais chaque plume est bordée de roussâtre par le bout. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont bruns. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un joli gris-blanc. Les plus petites du dessus sont d'un brun-noirâtre: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes du dos: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. L'aîle est composée de vingt-six plumes noirâtres, dont



la tige est blanchâtre en-dessous : les deux plus proches du corps sont bordées de roussâtre par le bout. La queue est composée de douze plumes pareillement noirâtres, & qui ont leur tige blanchâtre en-dessous : les deux du milieu sont de plus terminées par une très-petite tache roussâtre. Ces deux dernières sont les plus courtes : toutes les autres vont en augmentant un peu de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue de trois lignes & demie que les deux du milieu ; ce qui rend la queue un peu fourchue. Le bec est d'un gris-brun, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge obscur ; & les ongles noirâtres. On la trouve à *S. Domingue*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

## CIV.

*Genre du Bec-en-ciseaux.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois  
antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé :

tes, scapo subtus candicante prædita, quarum binæ corpori viciniore rufescente in apice marginantur. Cauda duodecim conflatur rectricibus similiter nigricantibus, & scapo subtus candicante præditi : binæ insuper intermedia minutissimâ maculâ rufescente terminantur. Quæ binæ novissimè dictæ breviores : reliquæ omnes sensim atque sensim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extremam usque binas intermediarum trium cum semi linearum longitudine superantem ; unde fit cauda nonnihil bifurca. Rostrum griseofuscum, exceptâ extremitate nigricante. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, obscure rubri ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Chervain*.

## CIV.

*Genus Rygchopsalia.*

Hujus character est  
Digiti quatuor, tres scilicet  
antici membranis integris  
inter se connexi, posticus  
solutus :





Fig. 2.

2. Petite Hirondelle-de-mer.









Desiné et Gravé par Martinet.

1. Grande Hirondelle-de-mer.

2. Petite Hirondelle-de-mer.









ou Epouvantail.

2. Hirondelle-de-mer tachetée.









Designé d'après par Martinet.

1. Hirondelle-de-mer noire ou Epouvantail.

2. Hirondelle-de-mer tachetée.







*Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora :* Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

*Rostrum edentulum, rectum, lateraliter planum :* Le bec sans dentelures, droit & applati par les côtés :

*Mandibula inferior superiore multò longior.* La mandibule inférieure beaucoup plus longue que la supérieure.

*Hujus generis Avium pars crurum infima plumis est denudata.* Les Oiseaux de ce genre ont la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes.

**\*\* I. LE BEC-EN-CISEAUX.**

*Voyez Pl. XXI. Fig. 2.*

*Rygchopsalia superne fusco-nigricans, infernè alba; capite anteriore concolore; rectricibus quatuor utrinque extimis candidis, secundum scapi longitudinem fusco notatis....*  
**RYGCHOPSALIA.**

*Rygchopsalia dorso nigro, ventre albo. Barr. Ornith. Class. I. Gen. VII. sp. I.*

*Rynchops nigra, subtus alba, rostro basi rubro. Rynchops nigra. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 71. sp. I.*

*Larus pilicator ater, rostro depressio, forcices referente. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 135.*

*Plotus rostro conico inæquali. Klein. Avi. pag. 142. N°. 2.*

*Phalacrocorax. Moehr. Avi. Gen. 109.*

*Avis Carolinensis rostro cultriformis. Petiv. Gaz. Nat. hujus rostri icon accurata Tab. LXXVI. fig. 2.*

*Avis Maderaspatana major, Novaculæ facie. Raj. Syn. Avi. pag. 194. N°. 5. hujus icon pessima Tab. I. fig. 5.*

*Coupeur d'eau. Catesb. Tom. I. pag. 90; avec une figure très-exacte Pl. 90. Les François de la Guiane l'appellent BEC-A-CISEAUX; & quelques-uns, COUPEUR D'EAU. Barr.*

*Les Anglois, CUT WATER. Catesb. SEA CROW. Raj.*

*Les Indiens de la Guiane, TAYA-TAYA. Barr.*

*Les Malabares, CODDEL CAUKA ou SUMMOODRA CAUKY. Raj.*



Il est à peu près de la grosseur de la *Mouette cendrée tachetée*. Sa longueur depuis le bout de la mandibule inférieure jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix-huit pouces. Le demi-bec supérieur a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche trois pouces quatre lignes de long, l'inférieur quatre pouces trois lignes; sa queue quatre pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, neuf lignes; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes; & celui de derrière quatre lignes & demie. Il a trois pieds huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois pouces au-delà du bout de la queue. Le sommet de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre; cependant les scapulaires inférieures sont brunes, & terminées de blanchâtre; & parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui oc-

Cum *Gavia cinerea naevia* crassitie circiter convenit. Ipsi-  
us longitudo ab apice mandibulæ inferioris ad caudam extremam unum pedem septem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues octodecim pollices. Mandibula superior ab ipsius extremitate ad oris angulos usque tres pollices & quatuor lineas longa est, inferior quatuor pollices & tres lineas; cauda quatuor pollices cum octo lineis; pars crurum plumis denudata novem lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus undecim cum semi lineas, intimus decem lineas; posticus autem quatuor cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & octo pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad trium pollicum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Vertex capitis, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, & superiores caudæ teñtrices, sunt fusco-nigricantes; scapulares tamen inferiores fuscæ sunt; candicante terminatæ; & ex superioribus



Superioribus caudæ rectricibus, quæ ad latera positæ sunt, penitus candidæ. Capitis anterior pars, idque ad oculos usque, genæ, guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes alben. Viginti septem remigibus ala conflatur : sex primores nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte griseæ : quatuor proximè sequentes, à septima scilicet ad decimam usque inclusivè, concolorés, sed in latere interiore albo terminantur : tredecim quæ sequuntur, ab undecima scilicet ad vigesimam tertiam usque inclusivè, in latere exteriorè fusco-nigricantes, in latere interiore & extremitate albæ : vigesima quarta ex fusco nigricat, & interiùs albidò marginatur : tres tandem corpori finitimæ sunt penitus fusco-nigricantes. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ sunt fusco-nigricantes : utrinque proximè sequens fusca, albo. exteriorè marginata, margine albâ maximam latitudinem obtinente : quatuor utrinque extremæ candidæ, in ipsarum

*Tom. VI.*

cupent les côtés, sont entièrement blanches. La partie antérieure de la tête jusqu'aux yeux, les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les six premières sont noirâtres, excepté une grande partie de leur côté intérieur, qui est grise : les quatre suivantes, savoir depuis la septième jusqu'à la dixième inclusivement, sont de la même couleur, mais leur côté intérieur est terminé de blanc : les treize qui suivent, savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-troisième inclusivement, sont d'un brun-noirâtre du côté extérieur, & blanches du côté intérieur & à leur bout : la vingt-quatrième est d'un brun noirâtre, & bordée intérieurement de blanchâtre : enfin les trois plus proches du corps sont entièrement d'un brun-noirâtre. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun-noirâtre : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est brune, & bordée extérieurement de blanc, cette bordure étant fort large : les

Ff



quatre plus extérieures de chaque côté sont blanches, & marquées d'un peu de brun dans leur milieu selon la longueur de leur tige : cette dernière couleur occupe d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure ; de sorte que la plus extérieure de chaque côté n'a de brun que sa tige. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus courtes que les latérales, qui vont toutes en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue d'un pouce, que les deux du milieu ; ce qui rend la queue très-fourchue. Les bords du demi - bec inférieur sont tranchants comme un couteau ; son bord supérieur entre, lorsque l'Oiseau ferme le bec, dans une rainure pratiquée dans le dessous du demi-bec supérieur. Ce dernier est obtus à son bout, & l'inférieur est comme coupé quarrément. Le bec est rouge à son origine, & noir dans le reste de sa longueur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges ; & les ongles noirs. Il vole à fleur d'eau, & en y introduisant son demi-bec inférieur, il en tire sa nourriture, qui consiste en *petits Poissons*

medio secundum scapi longitudinem paucò fusco notatæ : qui color fuscus èdminus spatium occupat, quò rectrix fit exterior ; ita ut rectrix utrinque extrema scapo tantummodo fusco donetur. Binæ rectrices intermediæ lateralibus longitudine cedunt ; laterales autem sensim atque sensim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extimam usque binas intermedias unius pollicis longitudine superantem ; unde fit cauda valdè bifurca. Mandibulæ inferioris margines cultratae sunt ; ipsius margo superior, dum Avis rostrum clausum tenet, sulco in mandibulæ superioris parte infima exarato includitur. Mandibula autem superior est apice obtusa, inferior quasi quadratim abscissa. Rostrum in exortu rubrum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri ; ungues verò nigri. Volando aquæ superficiem radit, & in ea mandibulâ inferiore introductâ, ex illa cibum, *Pisciculos* scilicet & *vermes aquaticos*, extrahit. Habitat in *America*. A *Cayana* in



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIII.* 227  
*musæum Reaumurianum* missa & en vers aquatiques. On le  
à D. Artur. trouve en Amérique. Il a été  
envoyé de Cayenne à M. de  
Reaumur par M. Artur.

A. LE BEC-EN-CISEAUX FAUVE.

Rygchopsalia fulva.

Rygchopsalia fulva, rostro nigro. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. VII. sp. 2.*  
Rynchops fulva, rostro nigro. *Rynchops fulva. Linn. Systh. Nat. ed. 10.*  
*Gen. 71. sp. 2.*

Magnitudine & crassitie  
præcedentem æmulator. Ab  
illa solummodo discrepat  
corporis superioris colore  
fulvo in omnibus partibus  
in quibus præcedens ex fusco  
nigricat, & rostro penitus  
nigro. In reliquis cum illa  
perfectè convenit. Habitat  
in Guiana.

Il est de la grandeur & de la  
grosseur du précédent. Il n'en  
diffère que par la couleur du  
dessus de son corps, qui est  
fauve par-tout où celle du pré-  
cédent est d'un brun-noirâtre,  
& par son bec, qui est entière-  
ment noir. Du reste il lui ressem-  
ble parfaitement. On le trouve  
dans la Guiane.











2. Bec - en - ciseaux .









Fig. 1.



Fig. 2.

Echelle de 5. pouces  
pour la 1.<sup>re</sup> Figure.  
Echelle de 6. pouces pour la 2.<sup>de</sup> Figure.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Hirondelle-de-mer brune.

2. Bec-en-ciseaux.









## ORDO XXIV. ORDRE XXIV.

*A V E S*

*LES CISEAUX*

*Digitis quatuor, tribus anterioribus membranis integris inter se connexis, postico soluto: cruribus circa corpus medium & extra abdomen positis, corpore brevioribus: & rostro denticulato præditæ.*

*Qui ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur séparé: les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps: & le bec dentelé.*

**H**UJUS Ordinis Avium aliæ rostro donantur subcylindræo, mandibulæque superioris apice adunco; alteræ rostro superne convexo, infernè planiusculo præditæ sunt. In duas sectiones dividuntur: in prima continentur illæ quæ rostro donantur subcylindræo; mandibulæ superioris apice adunco (*vide Vol. I. Tab. VII. fig. 7*), ut *Merganser*: & in secunda illæ quæ rostrum habent superne convexum, infernè planiusculum (*vide Vol. I. Tab. VII. fig. 8*), ut *Anser*, *Anas*.

**P**ARMI les Oiseaux de cet Ordre, les uns ont le bec presque cylindrique, & la mandibule supérieure crochue vers le bout; les autres ont le bec convexe en-dessus & applati en-dessous. Je les divise en deux sections: dans la première sont ceux qui ont le bec presque cylindrique; & la mandibule supérieure crochue vers le bout (*voyez Tom. I. Pl. VII. fig. 7*), comme l'*Harle*: & dans la seconde ceux dont le bec est convexe en-dessus & applati en-dessous (*voyez Tom. I. Pl. VII. fig. 8*), comme l'*Oye*, le *Canard*.



## SECTION I.

*Ceux dont le bec est presque cylindrique ; & la mandibule supérieure crochue vers le bout.*

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de l'*Harle*.

La dentelure du bec des Oiseaux de ce genre ressemble à celle d'une scie.

## CV.

*Genre de l'Harle.*

Son caractère est d'avoir Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé :

Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

Le bec dentelé *comme une scie*, presque cylindrique :

La mandibule supérieure crochue vers le bout.

Tous les Oiseaux de ce genre ont une petite membrane tout

## SECTIO I.

*Eæ quæ rostro donantur subcylindræo ; mandibulæ superioris apice adunco.*

UNICO genere, *Merganseris* scilicet, constituitur hæc sectio.

Hujus generis Avium rostra sunt, ferræ instar, denticulata.

## CV.

*Genus Merganseris.*

Hujus character est Digiti quatuor, tres scilicet antichi membranis integris inter se connexi, posticus solutus :

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora :

Rostrum, *ferræ instar*, denticulatum, subcylindraceum :

Mandibula superior apice adunca.

Omnium hujus generis Avium digitus intimus per



totam lateris interioris longitudinem membranulâ donatur. Ipsarum quoque crurum pars infima plumis est denudata. le long du côté intérieur du doigt intérieur. Ils ont aussi la partie inférieure des jambes garnie de plumes.

\*\* I. L'HARLE.

*Voyez le mâle Pl. XXII.*

Merganser superne splendide niger, uropygio cinereo (*mas*) cinereus (*fœmina*), infernè albo-fulvescens; capite & collo supremo obscure viridibus, violaceo colore variantibus (*mas*) fordidè rufis (*fœmina*); remigibus decem primoribus cinereo-fuscis; rectricibus cinereis, scapo nigricante donatis . . . . MERGANSER.

Merganser. *Gesn. Avi. pag. 135, in qua hujus icon minimè accurata.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 85, in qua eadem icon.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 285.*

*Jonst. Avi. pag. 89. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 47.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

*Charlet. Exer. pag. 101. N°. 6.*

*Charlet. Onomazt. pag. 95. N°. 6.*

*Marfil. Danub. Tom. V. pag. 78. hujus icon pessima Tab. 37.*

Merganser Gesneri. *Mus. Worm. pag. 300.*

Merganser Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 253. hujus icon minimè accurata Tab. LXIV.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 134. N°. A. 1.*

*Rzac. Auc. Hist. nat. Pol. pag. 392.*

Merganser fœmina. *Willugh. Ornith. pag. 253. hujus capitis icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXIV, sub titulo, Mergus longiroster.*

Mergus. *Moehr. Avi. Gen. 62.*

Mergus cirrhatu sive longiroster major. *Gesn. Avi. pag. 134, in qua hujus icon minùs accurata. (Fœmina).*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 283, in qua hujus capitis icon pessima. (Fœmina).*

Mergus cirrhatu. *Jonst. Avi. pag. 89. (Fœmina).*

Mergus cirratus Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. III. sp. 1. (Fœmina).*

Mergus cirratus longiroster major Gesneri, Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 134. N°. A. 2. (Fœmina).*

Serrator simpliciter. *Klein. Avi. pag. 140. N°. 1.*

Anas raucedula. *Gesn. Avi. pag. 133. (Fœmina).*



*Anas raucedula*, seu *Mergus raucedulus*. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 281. (Fœmina)*.

*Mergus raucedulus*. *Jonst. Avi. pag. 96. (Fœmina)*.

An *Corvus marinus*? *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 375.*

Oye de mer. *Alb. Tom. I. pag. 76*; avec une figure mal coloriée de la femelle *Pl. 87.*

Vautour d'Islande. *Anderf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. pag. 94.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur l'appellent GARGANEY. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, MEER-RACH; WELTSCH-EENT. *Gesn. MEER-RABE. Rzac.*

Ils appellent la femelle MERG; ROGIS. *Gesn. Aldrov.*

Ceux qui habitent les bords du Lac de Constance, appellent la femelle GANN ou GANNER. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, KRUK MORSKI. *Rzac.*

Les Anglois appellent le mâle GOOSANDER. *Willugh. Raj. Sibbald. & la femelle DUN DIVER; SPARLING FOUL. Willugh. Raj.*

Les Islandois, GEIR-FULG. *Anderf. Worm.*

"Il est un peu plus gros que le Canard domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds deux pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce une ligne. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes; l'extérieur est de la même longueur; l'intérieur a deux pouces trois lignes & demie de long; & celui de derrière huit lignes & demie.

*Anatem domesticam paululum crassitie superat. Ipsi-  
lus longitudo ab apice rostri ad  
caudæ extremitatem duos  
pedes & totidem pollices  
explet, & ad extremos  
ungues duos pedes unum  
pollicem cum linea unica.  
Rostrum ab ipsius unco ad  
oris angulos usque duos pol-  
lices & decem lineas longum  
est; cauda quinque pollices;  
pars crurum plumis denuda-  
ta quatuor lineas; pes unum  
pollicem cum decem lineis;  
trium digitorum anticorum  
medius cum ungue duos pol-  
lices & novem lineas; exti-  
mus eâdem longitudine pol-  
let; intimus duos pollices  
& tres cum semi lineas lon-  
gus; posticus autem octo  
cum*



cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & undecim pollicum; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. Caput, guttur & partem colli capiti finitimam tingit color obscure viridis, violaceo colore varians, qui color solis radiis fit valdè splens. Pennæ partem capitis superiorem obtegentes reliquas paululùm longitudine excedunt, & cristæ in modum eriguntur. Reliquum collum superius & ad latera candidum. Dorsi suprema pars nigro tingitur colore, holoserici villosi instar splendens. Dorsum infimum, uropygium & superiores caudæ tectrices sunt eleganter cinereæ, marginibus pennarum albidis. Colli inferioris pars infima, pectus, venter, laterum & crurum pars suprema, inferioresque caudæ tectrices ex albo ad fulvescentem inclinant colorem. Laterum partem infimam vestiunt pennæ candicantes, lineolis cinereis, ipsarum circumferentiæ parallelis, striatæ. Pennæ alas subtus obtegentes albes. Scapulares superiores concolores;

*Tom. VI.*

Il a deux pieds onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont d'un verd sombre, changeant en violet, laquelle couleur est fort brillante au soleil. Les plumes du dessus de la tête sont un peu plus longues que les autres, & se relevent en forme de hupe. Le reste du col est blanc en-dessus & aux côtés. La partie supérieure du dos est d'un noir de velours. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un joli cendré, chaque plume étant bordée de blanchâtre. Le bas de la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant sur le fauve. Le bas des côtés est couvert de plumes blanchâtres, rayées de petites lignes cendrées parallèles à leur circonférence. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les plumes scapulaires supérieures sont de la même couleur; les inférieures sont d'un noir de velours. Les plus petites couvertures du dessus des ailes

G g



les plus proches du corps sont cendrées, & bordées de blancheâtre : les petites qui suivent ces dernières, ainsi que les moyennes, sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps, & les cinq ou six plus proches du corps sont d'un cendré très-foncé : toutes les grandes intermédiaires sont de la même couleur depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; l'autre moitié, qui est la seule qui paroisse lorsque l'aile est pliée, est blanche. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les dix premières sont d'un cendré-brun : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont de la même couleur du côté extérieur, & d'un cendré clair du côté intérieur ; la quinzième est blanche, & marquée d'un peu de cendré sur le côté intérieur vers son extrémité : les six suivantes, sçavoir depuis la seizième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont entièrement blanches : les trois qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la vingt-deuxième jusqu'à la vingt-quatrième inclusivement, sont blanches, & bordées extérieurement de noir de velours : la vingt-cinquième est de la même couleur que

inferiores nigrae, holoserici villosi instar splendentes. Tectrices alarum superiores minimae corpori viciniores cinerae, candicante fimbriatae : minimae proximè sequentes, sicut & mediae, candidae : majores à corpore remotiores & quinque sexve corpori finitimae saturatissime cinerae : majores intermediae omnes ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque concolores ; altera medietate, quae sola, alis complicatis, conspicua, candida. Alam componunt viginti septem remiges : decem primores cinereo-fuscae : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, in latere exteriori concolores, in interiori dilute cinerae : decima quinta albicat, & paucò cinereo in latere interiore versùs ipsius extremitatem insignitur : sex quae proximè sequuntur, à decima sexta scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, sunt penitus candidae : tres has novissimas sequentes, à vigesima secunda scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, candidae, exterius nigro, holoserici villosi inf-



tar splendente, marginatæ : vigesima quinta tribus nuper descriptis concolor; sed in ea margo nigra latus quoque interiùs occupat : vigesima sexta in latere exteriori candida, nigro, holoserici villosi instar splendente, fimbriata, in interiore cinerea, eodem nigro fimbriata, sed tantum versùs extremitatem : vigesima septima tandem cinerea, exteriùs nigro, holoserici villosi instar splendente, marginata. Sex remiges corpori viciniore maximam obtinent longitudinem, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, quartam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Caudam componunt oetodecim rectrices cineræ, scapo nigricante donatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorrem; unde fit cauda acuta. Oculorum irides sanguineo colore tinctæ. Mandibula superior superiùs & ad uncum nigra, ad latera obscurè rubra; inferior penitùs nigra. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, coccinei; ungues verò rubescentes.

ces trois dernières; mais la bordure noire s'étend aussi sur le côté intérieur : la vingt-sixième est blanche & bordée de noir de velours du côté extérieur, tandis que son côté intérieur est cendré, & bordé aussi de noir de velours, mais seulement vers le bout : la vingt-septième est cendrée, & bordée extérieurement de noir de velours. Les six plus proches du corps sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. La queue est composée de dix-huit plumes cendrées, dont la tige est noirâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend la queue pointue. L'iris des yeux est de couleur de sang. Le demi-bec supérieur est noir en-dessus & à son crochet, & d'un rouge obscur sur ses côtés; le demi-bec inférieur est entièrement noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge vif, & les ongles rougeâtres.



La *femelle* est à peu près de la même grandeur & de la même grosseur que le *mâle* ; mais elle en diffère par sa couleur. La tête & la partie du col qui en est la plus voisine, sont d'un roux sale. Les plumes du sommet de la tête sont un peu plus longues que les autres, & forment vers l'occiput une espèce de petite hupe. La gorge est blanche. Le bas de la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un joli cendré. Le bas de la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant un peu sur le fauve. Le bas des côtés est blanchâtre, & varié de petites rayes transversales cendrées. Les ailes & la queue sont colorées à peu près comme celles du *mâle*. Le bec est d'un rouge obscur, excepté son crochet, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges ; & les ongles rougeâtres.

On les trouve sur les bords de la mer. Du cabinet de M. de Reaumur.

*Fœmina* magnitudine & crassitie cum *mare* circiter convenit ; ab illo autem colore discrepat. Caput & pars colli ipsi finitima sordido imbuuntur rufo. Pennæ summum caput vestientes reliquarum longitudinem paululum superant, & versùs occipitium exiguam cristam quodammodo efficiunt. Guttur albet. Colli superioris pars infima, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt eleganter cinerea. Colli inferioris pars infima, pectus, venter, laterum & crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices ex albo ad fulvescentem colorem vergunt. Laterum infima pars candicat, exiguisque taniis transversis cinereis variegatur. Alæ & cauda alis & caudæ *maris* circiter concolores. Rostrum obscure rubrum, attamen ad unicum nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membrana, rubri ; ungues verò rubescentes.

Juxta maris littora versantur. Ex museo Realmuriano.



\*\* 2. L'HARLE HUPÉ.

*Voyez le mâle Pl. XXIII.*

Merganser cristatus, superne splendide niger, uropygio fusco & cinereo-albo transversim & undatim striato (*mas*) cinereus (*fœmina*), infernè albus; capite & collo supremo nigro-violaceis, obscurè viridi colore variantibus (*mas*) sordide rufis (*fœmina*); (torque albo *mas*); collo infimo & pectore supremo rufescente, albo & nigro variegatis; remigibus undecim primoribus fusco-nigricantibus; rectricibus fuscis, exterius ad margines cinereo-albo variegatis.

. . . . MERGANSER CRISTATUS.

Merganser. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 49. sp. 1.*

Mergus cristâ dependente, capite nigro-cœrulescente, collari albo. *Faun. Suec. Linn. N°. 113.*

Mergus cristâ dependente, capite nigro-cœrulescente, collari albo. Merganser. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 62. sp. 2.*

Mergus quem Bellonius gallicè Herle vocat. *Jonst. Avi. pag. 89.*

Mergus cristâ dependente, capite nigro maculis ferrugineis. *Faun. Suec. Linn. N°. 114. (fœmina).*

Mergus cristâ dependente, capite nigro maculis ferrugineis. Serrator. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 62. sp. 3. (fœmina).*

Mergus fuscus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 49. sp. 2. (fœmina).*

Mergus cirratus fuscus. *Willugh. Ornith. pag. 255. hujus icon minimè accurata Tab. LXIV, sub titulo, Mergus cirratus minor. (Fœmina). Raj. Syn. Avi. pag. 135. N°. 4. (fœmina).*

Mergus cirratus fuscus; Anas longirostra Gesneri; Serula Venetorum. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 393. (fœmina).*

*Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 434. (fœmina).*

Mergus longiroster minor. *Gesn. icon. Avi. pag. 86, in qua hujus capitis icon non satis accurata. (fœmina).*

Mergus longirostrus. *Jonst. Avi. pag. 96. hujus capitis icon à Gesnero mutuata Tab. 47. (fœmina).*

*Charlet. Exer. pag. 101. N°. 3. (fœmina).*

*Charlet. Onomazt. pag. 95. N°. 3. (fœmina).*

Mergus longirostrus Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. III. sp. 2. (fœmina).*

Anas longirostra. *Gesn. Avi. pag. 133, in qua hujus capitis icon non satis accurata. (fœmina).*



Anas longirostra, sive Mergus longiroster. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.*

281. *hujus capitis icon à Gesnero mutuata pag. 282. (femina).*

Anas longirostra prima. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 205. (femina).*

Anas longirostra secunda. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 206.*

Anatis species, Herle seu Harle Gallis dicta. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 236.*

Serrator cirratus. *Klein. Avi. pag. 140. N<sup>o</sup>. 2.*

Herle. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 164.*

*Jonst. Avi. pag. 98.*

Harle. *Alb. Tom. II. pag. 65 ; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 101.*

Plongeon à la poitrine rouge. *Edwards. Tom. II. pag. XCV ; avec une figure assez exacte du mâle Pl. 95.*

Les Vénitiens appellent la femelle SERULA. *Willugh. Rzac.*

Les Allemands appellent le mâle GROSSE LANGSCHNAEBLICHTE ; GES-  
CHECKTE STRAUS ENDTE. *Schwenck. & la femelle , LANGSCHNABEL.*  
*Gesn. Aldrov. Schwenck. SCHLUCHT-ENTE. Gesn. Aldrov. WIESELCHEN ;*  
*WEISSE TUCH ENDTE ; SCHLICHT ENDTE ; & quelques-uns TEUCHER.*  
*Schwenck.*

Les Suédois , WARK-FOGEL ; KJOER-FOGEL. *Linn.*

Les Suédois qui habitent la Province de Gothland , ARD. *Linn.*

Les Suédois qui habitent la Province d'Upland , SKRAKA. *Linn.*

Les Polonois appellent la femelle NUREK CZUBATY. *Rzac.*

Les Anglois l'appellent LESSER CORMORANT. *Charlet.*

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces quatre lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces huit lignes de long ; sa queue trois pouces huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes trois lignes & demie ; son pied dix-huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur

Præcedenti paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem decem pollices & sex lineas æquat ; & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices & octo lineas longum est ; cauda tres pollices cum octo lineis ; pars crurum plumis denudata tres cum semi lineas ; pes octodecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum sex lineis, ex-



timus duos pollices & sex cum semi lineas, intimus duos pollices & sesquilineam; posticus autem novem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum septem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Caput, guttur, partemque colli capiti finitimam tingit color nigro-violaceus, viridi obscuro quidem, sed splendente & deaurato, pro vario quo lucis radii incidunt modo, varians. Infra quem colorem tænia extat transversa alba, torquem, collum non penitus ambientem, quodammodo efficiens. Pennæ summum caput vestientes sunt valdè graciles, flexibiles, longissimæ, quibusdam trium pollicum & duarum linearum longitudinem obtinentibus, elegantissimamque cristam retrorsum dependentem efformant. Collum infimum & pectus supremum rufescente, albo & nigro eleganter variegantur. Dorsi suprema pars nigro imbuatur colore, holoserici villosi instar splendente. Dorsum infimum, uropygium,

deux pouces six lignes & demie, l'intérieur deux pouces une ligne & demie; & celui de derriere neuf lignes. Il a deux pieds sept pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont d'un noir-violet, changeant, selon les différentes expositions à la lumière, en un verd sombre, mais brillant & doré. Au dessous de cette couleur est une bande transversale blanche, qui forme une espece de collier, lequel n'entoure pas entièrement le col. Les plumes du sommet de la tête sont très-déliées, flexibles, très-longues, quelques-unes ayant jusqu'à trois pouces deux lignes de longueur, & forment une très-belle hupe, qui retombe en arriere. Le bas du col & le haut de la poitrine sont joliment variés de rouffâtre, de blanc & de noir. La partie supérieure du dos est d'un noir de velours. La partie inférieure du dos, le croupion, les petites couvertures du dessus de la queue & les côtés sont rayés transversalement & en zigzags de brun & de gris-blanc. Les grandes couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun,



& bordées de grisâtre. Le bas de la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & le haut des jambes sont blancs. Sur chacun des côtés de la poitrine sont d'assez grandes plumes blanches, bordées de noir dans toute leur circonférence, qui recouvrent la partie antérieure des ailes, lorsqu'elles sont pliées. Les plus petites couvertures du dessous des ailes sont grises, & bordées de blanc : les moyennes sont blanches : & les grandes sont cendrées. Parmi les plumes scapulaires, les unes sont noires, & les autres blanches. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré-brun : les moyennes sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre ; les suivantes ou celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; & de-là jusqu'à leur extrémité elles sont blanches ; enfin les grandes les plus proches du corps sont brunes. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les onze premières sont d'un brun-noirâtre : les trois suivantes, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont de la même cou-

superiores caudæ tectrices minores & latera fusco & cinereo-albo transversim & undatim striantur. Tectrices caudæ superiores majores sunt griseo-fuscae, griseo fimbriatæ. Pectus infimum, venter, inferiores caudæ tectrices & crurum suprema pars albicant. In pectoris lateribus majusculæ extant pennæ candidæ, in tota circumferentia nigro marginatæ, alarum complicatarum partem anteriorem obtegentes. Inferiores alarum tectrices minimæ sunt griseæ, albo fimbriatæ : mediæ candidæ : majores cinereæ. Ex scapularibus pennis, aliæ sunt nigrae, alteræ albæ. Tectrices alarum superiores minimæ cinereo-fuscae : mediæ candidæ : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes ; sequentes, medium scilicet locum obtinentes, ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque concolores, inde ad extremitatem candidæ ; majores tandem corpori finitimæ fuscae. Vingt septem remigibus ala conflatur : undecim primores ex fusco nigricant : très proximè sequentes, à duodecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, eodem



eodem colore tinguntur; in latere tamen interiore candidante terminantur; qui color eò majus spatium occupat, quò remix fit interior: sex quæ novissimas istas proximè sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in latere exteriori ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque fusco-nigricantes, in reliquis candidæ: quatuor proximè sequentes, à vigesima prima scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, albæ, exterius nigro holoserici villosi instar splendente marginatæ: tres tandem corpori viciniores fuscæ. Cauda octodecim constat rectricibus fuscis, cinereo-albo exterius variegatis & marginatis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorè; unde fit cauda extremitate acuta. Mandibula superior in aliis nigra, in alteris rubescens; inferior rubra. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguisque rubri.

leur; mais leur côté intérieur est terminé de blanchâtre, cette couleur s'étendant d'autant plus loin, que la plume est plus intérieure: les six qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont d'un brun-noirâtre du côté extérieur depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; tout le reste est blanc: les quatre suivantes, sçavoir depuis la vingtunième jusqu'à la vingt-quatrième inclusivement, sont blanches, & bordées extérieurement de noir de velours: enfin les trois plus proches du corps sont brunes. La queue est composée de dix-huit plumes brunes, variées & bordées extérieurement de gris-blanc. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le demi-bec supérieur est noir dans les uns, & rougeâtre dans d'autres; l'inférieur est rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont rouges.



La femelle est à peu près de la grandeur & de la grosseur du mâle; mais elle en diffère par sa couleur. La tête & la partie du col qui en est la plus voisine, sont d'un roux sale. Les plumes du sommet de la tête sont assez longues, & forment une hupe, qui retombe en arrière. La gorge est blanche. Le bas de la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont cendrés. Le bas de la partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont variés de roussâtre, de blanc & de noir. Le bas de la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les ailes & la queue sont colorées à peu près comme celles du mâle. Le demi-bec supérieur est d'un brun-verdâtre en-dessus, & rouge sur les côtés; l'inférieur est entièrement rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont d'un rouge-orangé.

On les trouve sur les bords de la mer. Du cabinet de M. de Reaumur,

*Fœmina* magnitudine & crassitie cum *mare* circiter convenit; ab illo autem colore discrepat. Caput & pars colli ipsi finitima sordido rufo tinguntur. Pennæ summum caput vestientes sunt longiusculæ, & cristam retrorsum dependentem efficiunt. Guttur albicat. Colli superioris partem infimam, dorsum, uropygium, pennas scapulares, superiores caudæ testrices & latera tingit cinereus color. Colli inferioris infima pars, supremumque pectus rufescente, albo & nigro variegantur. Pectus infimum, venter, latera, inferioresque caudæ testrices albescent. Alæ & cauda iisdem ferè coloribus ac in *mare* variegantur. Mandibula superior superne ex fusco viridescit, ad latera rubet; inferior est penitus rubra. Pars crurum plumis denudata, pedes, digitus, sicut & ipsorum membranæ, unguesque rubro-aurantii.

Juxta maris littora versantur. Ex museo Realmuriano,



**\*\* 3. LE PETIT HARLE HUPÉ OU LA PIETTE.**

*Voyez Pl. XXIV. le mâle fig. 1 ; & la femelle fig. 2.*

Merganser cristatus , superne splendide niger , infernè albo-argenteus ; capite & collo candidis ; cristâ partim candidâ partim obscurè viridi-violaceâ ; maculâ per oculos nigro-viridescente ; torque semicirculari in collo superiore nigro ; remigibus decem primoribus nigricantibus ; rectricibus cinereis. ( *Mas* ).

Merganser superne cinereo-fuscus , infernè albo-argenteus ; partibus capitis & colli supremi superioribus fulvis ; gutture albo ; colli inferioris infimâ parte cinereo-albâ ; remigibus decem primoribus nigricantibus ; rectricibus cinereis. ( *Fœmina* ) . . . . Merganser cristatus minor sive Albellus.

Mergus cristâ dependente subtus nigrâ , corpore albo , dorso nigro , alis variegatis. Albellus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 62. sp. 4.*

Mergus varius major , vulgò Mergus Rheni & Monialis alba. *Gesn. icon Avi. pag. 87 , in qua hujus icon non satis accurata.*

Mergus Rhenanus. *Gesn. Avi. pag. 131 , in qua eadem icon.*

Mergus Rhenanus , quibusdam Monialis alba. *Charlet. Exer. pag. 101. N°. 1.*

*Charlet. Onomast. pag. 95. N°. 1.*

Mergus Rhenanus , quibusdam Monialis alba appellatus. *Jonst. Avi. pag. 96. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 47 , sub titulo , Mergus Rheni.*

Mergus Rheni Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 274. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 275.*

Mergus Rheni Gesnero , Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 255. Raj. Syn. Avi. pag. 135. N°. 5.*

Mergus varius. *Gesn. Avi. pag. 132.*

Mergus alius major cirrhatus. *Gesn. Avi. pag. 132. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 276.*

Mergus major cirratus Gesneri. *Raj. Syn. Avi. pag. 135. N°. A. 3.*

Mergus major. *Jonst. Avi. pag. 96.*

Mergus varius , qui Monialis fusca dicitur. *Gesn. Avi. pag. 133. (fœmina).*

Mergus varius , quem circa Argentoratum Germani Monialem fuscâ appellânt. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 282. (fœmina).*

Mergus Argentinenfis. *Gesn. Avi. pag. 133. (fœmina).*



- Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 282. (fœmina).*  
*Mergus mustelaris. Gesn. Avi. pag. 132, in qua hujus capitis icon non satis accurata. (fœmina).*  
*Anas. seu Mergus, quem vulgo Miseni mustelarem appellant. Gesn. icon. Avi. pag. 86, in qua eadem capitis icon. (fœmina).*  
*Anas longirostra quinta. Schwenck. Avi. Sil. pag. 208.*  
*Anas longirostra septima. Schwenck. Avi. Sil. pag. 209.*  
*Anas Albella. Klein. Avi. pag. 135. N°. 30.*  
*Albellus aquaticus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 276. hujus icon minimè accurata pag. 277.*  
*Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 47.*  
*Albellus alter, seu Mergo mustelari leucomelano congener. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 276. hujus icon non satis accurata pag. 278.*  
*Albellus alter Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 254. hujus icon non satis accurata Tab. LXIV, sub titulo, Albellus.*  
*Serrator minimus. Klein. Avi. pag. 140. N°. 4.*  
*Piette. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 171; avec une figure peu exacte pag. 172.*  
*Bel. Portr. d'Ois. pag. 36 a, dans laquelle est la même figure.*  
*Plongeon de mer. Alb. Tom. I. pag. 78; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 89.*  
*Les Italiens aux environs de Belinzone l'appellent GARGANEY. Gesn. Aldrov.*  
*Les Allemands, DAUCHER; WYSSÉ NONN. Gesn. NUNN; RHYN-ENT. Gesn. Aldrov. NONN ENDTE; GESHECKTES ENDTLIN; ELSTER ENDTLIN; NONN ENDTLIN; EYSZ ENDTLIN; NIEDERLENDISCH ENDTLIN. Schwenck. & quelques-uns, YSENTE. Gesn. YSZENTEN. Gesn. Aldrov. EYS ENDTE. Schwenck.*  
*Les Allemands des environs de Strasbourg appellent la femelle MERCH; GRAUWE NUNN. & quelques-uns, WISELGEN. Gesn. Aldrov.*  
*Les Anglois, SMEW. Willugh. WHITE NUN. Raj. WHITE NUN-DIVER. Charlet.*

Il est un peu plus gros qu'une Sarcelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied quatre ponces, & jusqu'à celui des ongles de quinze ponces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa

Crassitie *Querquedula* paululum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & quatuor pollices explet, & ad extremos ungues quidecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque sexde-



cim lineas longum est ; cauda tres pollices & totidem lineas ; pars crurum plumis denudata binas cum semi lineas ; pes duodecim cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue viginti quinque lineas , extimus duos pollices , intimus unum pollicem cum octo lineis ; posticus autem septem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum ; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, guttur & collum sunt candida. In utroque capitis latere majuscula extat macula subrotunda nigra, viridi obscuro colore variante, in qua oculi siti sunt, quæque ad rostri exortum usque protenditur. Pennæ summum caput & occipitium vestientes reliquarum longitudinem excedunt, elegantemque cristam efformant. Quæ pennæ sunt in summo capite candidæ, in occipitio obscurè virides, saturatissimo violaceo colore variantes. In colli exortu, versùs dorsum scilicet, & superne tantum, tania extat transversa nigra, holoserici villosi instar splen-

queue trois pouces trois lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux lignes & demie ; son pied douze lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, vingt-cinq lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce huit lignes ; & celui de derrière sept lignes & demie. Il a deux pieds de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col sont blancs. De chaque côté de la tête est une assez grande tache presque ronde, d'un noir changeant en verd obscur, dans laquelle sont placés les yeux, & qui s'étend jusqu'à l'origine du bec. Les plumes du sommet de la tête, ainsi que celles de l'occiput, sont plus longues que les autres, & forment une belle hupe. Ces plumes sont blanches sur le sommet de la tête, & d'un verd obscur changeant en un violet très-foncé sur l'occiput. A l'origine du col, vers le dos, & en-dessus seulement, est une raye transversale d'un noir de velours, qui descend sur les côtés du col, & forme une espece de collier demi-circulaire. Un peu plus bas, environ au-dessus de l'origine des aîles,



sont deux autres bandes transversales du même noir de velours, sçavoir une de chaque côté. Chacune de ces trois bandes a à peu près la figure d'un arc de cercle. Le dos & le croupion sont d'un noir de velours. Les couvertures du dessus de la queue sont cendrées. La poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-argenté. Le haut des jambes est d'un blanc moins brillant. Les côtés sont couverts de plumes d'un fort joli gris-blanc, varié transversalement & en zigzags de très-petites rayes d'un brun foncé. Les plumes scapulaires supérieures sont blanches, & bordées extérieurement de noir de velours : les inférieures sont d'un cendré foncé. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un cendré-brun, varié d'un peu de blanc : les grandes sont cendrées, & terminées de blanc. Les plus petites du dessus sont d'un brun-noirâtre : les moyennes sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur du côté intérieur, d'un noir-violet du côté extérieur, & bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de vingt-

dens, supra colli latera descendens, & torquem semicircularem quodammodo efficiens. Paulò infra, scilicet supra alarum exortum, binæ aliæ extant tæniæ transversæ eodem nigro, holoserici villosi instar splendentes, imbutæ, utrinque scilicet una. Ex istis autem tribus tæniis, quælibet arcum circuli figurâ circiter æmulatur. Dorsum & uropygium sunt nigra, holoserici villosi instar splendentia. Superiores caudæ rectrices cinereæ. Pectus, venter & pennæ caudam subtus obtegentes albo-argenteo tinguntur. Crurum suprema pars minùs splendidè albicat. Latera cooperiunt pennæ elegantissimè cinereo-albæ, minutissimis tæniis saturatè fuscis transversim & undatim variegatæ. Scapulares superiores candidæ, nigro holoserici villosi instar splendentes exteriùs marginatæ : inferiores saturatè cinereæ. Rectrices alarum inferiores minores cinereo-fuscæ, paucò albo variegatæ : majores cinereæ, candido terminatæ. Superiores minimæ fusconigricantes : mediæ candidæ : majores à corpore remotiores nigricantes : majores



res corpori finitimæ in latere interiore concolores, in exteriorè nigro-violaceæ, albo in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti quinque remiges, omnes subtus cinereæ; superne verò decem primores sunt nigricantes: novem proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, in latere interiore concolores, in exteriorè nigro-violaceæ, albo in apice marginatæ; violaceus color in undecima remige, sicut & in duodecima, est non multum conspicuus: remix vigesima nigricat, & albo in apice fimbriatur: vigesima prima est in latere interiore cinereo-fusca, in exteriorè candida, nigro-violaceo marginata: vigesima secunda interiùs cinerea, exteriùs alba: tres tandem corpori viciniore cinereæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges maximâ longitudine polent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, nonnihil ultra caudæ exortum protenduntur. Caudam componunt sexdecim rectrices cinereæ, scapo superne fusco præditæ. Quatuor intermediæ lateralium longitudinem nonnihil superant; laterales

cinq plumes, toutes cendrées en-dessous; mais en-dessus les dix premières sont noirâtres: les neuf suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont de la même couleur du côté intérieur, d'un noir-violet du côté extérieur, & bordées de blanc par le bout; le violet est fort peu apparent sur les onzième & douzième plumes: la vingtième est noirâtre, & bordée de blanc par le bout: la vingt-unième est d'un cendré brun du côté intérieur, blanche & bordée de noir-violet du côté extérieur: la vingt-deuxième est cendrée du côté intérieur, & blanche du côté extérieur: enfin les trois plus proches du corps sont cendrées. Ces quatre dernières plumes sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent lorsque l'aile est pliée, un peu au-delà de l'origine de la queue. La queue est composée de seize plumes cendrées, dont la tige est brune en-dessus. Les quatre du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec, la partie des jambes



qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb-verdâtre; & les ongles noirâtres.

La femelle est un peu plus petite que le mâle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces huit lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux lignes & demie; son pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce onze lignes, l'intérieur un pouce sept lignes; & celui de derrière cinq lignes & demie. Elle a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Le dessus de la tête, la partie supérieure du col qui en est la plus voi-

verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum; unde fit cauda apice rotundata. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, ex plumbeo colore viridescunt; ungues verò nigricant.

*Fœmina* crassitie paululum mari cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata binas cum semi lineas; pes duodecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue pollices binos; extimus unum pollicem & undecim lineas, intimus unum pollicem cum septem lineis; posticus autem quinque cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ tertiam circiter longitudinis caudæ partem



partem attingunt. Caput superius, pars colli superioris illi finitima, genæque fulvo tinguntur colore, in capitis vertice paululùm fufcescente. Guttur, collique inferioris suprema pars & latera albicant. Colli inferioris pars infima ex cinereo albet. Colli superioris ima pars, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices sunt cinereo - fuscæ. Pectus, venter & pennæ caudam subtus obtegentes albo-argenteo tinguntur. Crurum suprema pars dilutè cinerascit. Latera cinereo imbuuntur colore paulò minùs quàm qui dorsum tingit, saturato, quique attentè intuenti tæniis obscuriore colore imbutis transversim & undatim striatus videtur. Alæ alis *maris* concolores, coloribus tamen non ità vividis imbutæ : attamen excipiendæ sunt quatuor remiges corpori viciniore cinereo-fuscæ. Cauda sexdecim conflatur rectricibus cinereis. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, plumbeo colore imbuti ; ungues verò nigricantes.

Juxta maris littora ver-  
*Tom. VI.*

sine, & les joues sont d'un fauve qui est un peu rembruni sur le sommet de la tête. La gorge, & le haut de la partie inférieure & des côtés du col sont blancs. Le bas de la partie inférieure du col est d'un gris-blanc. Le bas de sa partie supérieure, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun. La poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-argenté. Le haut des jambes est d'un cendré clair. Les côtés sont d'un cendré un peu moins foncé que celui du dos, & qui, regardé attentivement, paroît rayé transversalement & en zigzags de bandes d'une couleur plus obscure. Les ailes sont colorées comme celles du mâle, mais les couleurs ne sont pas si vives : il faut cependant excepter les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, qui sont d'un cendré-brun. La queue est composée de seize plumes cendrées. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb ; & les ongles noirâtres.

On les trouve sur les bords



de la mer, sur les rivières & les étangs. Ils se nourrissent de Poissons & d'Insectes aquatiques. Du cabinet de M. de Reaumur.

fantur; fluviisque & piscinas frequentant. *Piscibus & Insectis aquaticis vescuntur.* Ex museo Realmuriano.

## 4. L'HARLE BLANC ET NOIR.

Merganser superne niger, inferne albus; remigibus majoribus nigris; rectricibus fuscis . . . , MERGANSER LEUCOMELANUS.

*Mergus alter.* Aldrov. *Avi.* Tom. III. pag. 276.

*Aliud Mergi genus.* Gesn. *Avi.* pag. 132.

*Anas longirostra sexta.* Schwenck. *Avi. Sil.* pag. 208.

*Tiers. Bel. Hist. Nat. des Ois.* pag. 165.

*Les Italiens l'appellent MERGON; quelques-uns, GARGANELLO; & d'autres POLONO.* Gesn. Aldrov.

*Les Italiens aux environs de Belinzone,* GYVEN. Gesn. Aldrov.

*Les Italiens aux environs du Lac Majeur,* GYVEN. Gesn. Aldrov.

*Les Allemands, WISSE TUCH-ENT.* Gesn. Aldrov. GROSSE GESCHECKTE ENDTE. Schwenck.

Il est à peu près de la grosseur de l'Harle hupé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de long. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont brunes. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont

*Cum Mergansere cristato crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem decem pollices & sex lineas explet. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos quatuor pollices longum est. Caput, collum superius, dorsum & uropygium nigra sunt. Scapulares pennas tingit idem color. Superiores caudæ rectrices sunt fuscae. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtrus obtegentes eleganter albi-*



cant. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniore, eodem imbuuntur colore : majores à corpore remotiores sunt nigræ. Remiges alarum majores nigro quoque tinguntur : minores sunt candidæ. Caudam componunt tectrices fuscæ. Rostrum, pars crurum plumis denuadata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri. Habitat in *Germania*, ibique piscinas frequentat.

d'un beau blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur : les moyennes sont blanches. La queue est composée de plumes brunes. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges. On le trouve en *Allemagne* sur les étangs.

# 5. L' HARLE NOIR.

Merganser superne niger, infernè albus ; collo spadiceo ; tæniâ transversâ in alis candidâ ; remigibus majoribus, reatricibusque nigris . . . . MERGANSER NIGER.

Mergus niger. *Gesn. Avi. pag. 133.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 281.*

*Jonst. Avi. pag. 96.*

Mergus niger Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. III. sp. 4.*

Anas longirostra tertia. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 207.*

Les Allemands l'appellent SCHWARTZER TEUCHER. *Gesn. Aldrov.*

*Schwenck. GROSSER TEUCHER ; TAUCH ENDTE ; & quelques-uns,*

*RACHE. Schwenck.*

Magnitudine & crassitie *Anatem domesticam* circiter æmulatur. Caput, dorsum & uropygium tingit color niger. Pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices eo-

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur du *Canard domestique*. La tête, le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue



sont de la même couleur. Le col est d'un rouge-bai. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Tout le dessus des aîles est noir, & marqué d'une bande transversale blanche. La queue est composée de plumes noires. Le bec, la partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. On le trouve en *Allemagne* sur les rivières & les étangs.

dem imbuuntur colore. Collum spadiceum. Pectus, vent- ter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ rectrices al- bent. Alæ in tota superficie superiore nigræ, taniâ transversâ candidâ insignitæ. Rectricibus nigris cauda conflatur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigri. Habitat in *Germania*, ibique flumina & piscinas frequentat.

#### 6. L'HARLE ÉTOILÉ.

Merganser superne fusco-nigricans, infernè albus; capite superiore spadiceo; maculâ per oculos nigrâ, infra oculos stellatâ candidâ; rectricibus alarum superioribus albis; renigibus quatuordecim primoribus nigris; rectricibus fusco-nigricantibus . . . Merganser stellatus.

Mergus capite griseo, crista destituto. *Faun. Suec. Linn. N°. 115.*

Mergus capite griseo lævi. Mergus minutus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 62. sp. 5.*

Mergus melanoleucus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 49. sp. 3.*

Mergus albus. *Gesn. Avi. pag. 133.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 282.*

*Jonst. Avi. pag. 89.*

Alterum Mergi varii Genus. *Gesn. Avi. pag. 132.*

Tertium Mergi varii Genus, seu Mergus Glacialis. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 279. hujus icon non satis accurata pag. 280.*

Mergus Glacialis. *Jonst. Avi. pag. 96. hujus icon ab Aldrovando mutuatâ Tab. 47.*

*Willugh. Ornith. pag. 254.*

*Charlet. Exer. pag. 101. N°. 2.*

*Charlet. Onomazt. pag. 95. N°. 2.*



*Mergus Glacialis* Gesnero. *Raj. Syn. Avi. pag. 135.*

*Anas stellata.* Klein. *Avi. pag. 135. N<sup>o</sup>. 29.*

Râle d'eau. *Alb. Tom. I. pag. 77 ; avec une figure mal coloriée Pl. 88.*

Les Allemands l'appellent YSENTLE. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, WYSSSE MERCH. *Gesn. Aldrov.*

Les Hollandois , PYLSTERT. *Gesn. Aldrov.*

Les Anglois , WEAZEL-COOT. *Alb.*

Cum *Querquedula* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem & extremos ungues sexdecim circiter pollices æquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum circiter pedum ; alæ verò complicatæ versùs tertiam longitudinis caudæ partem usque protenduntur. Caput superius est spadiceum. In utroque capitis latere majuscula extat macula nigra , subrotunda, ad rostri exortum usque producta, in qua siti sunt oculi. Infra utrumque oculum altera adest macula candida, figurâ suâ stellam æmulans. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices ex fusco nigricant. Collum inferius, pectus, venter, latera, crurum suprema pars. & pennæ caudam subtus obtegentes albescent. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt

Il est à peu près de la grosseur d'une *Sarcelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue & des ongles est d'environ seize pouces. Il a environ deux pieds de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusque vers le tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un rouge-bai. De chaque côté de la tête est une assez grande tache noire, presque ronde, qui s'étend jusqu'à l'origine du bec, & dans laquelle sont placés les yeux. Au-dessous de chacun des yeux est une autre tache blanche, qui a la figure d'une étoile. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus



proches du corps, sont de cette dernière couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle est composée de vingt-trois plumes : les quatorze premières sont noires : les sept suivantes, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la vingt - unième inclusivement, sont blanches : la vingt-deuxième est de la même couleur du côté extérieur, & noire du côté intérieur : la plus proche du corps est entièrement noire. La queue est composée de seize plumes d'un brun-noirâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont noirs dans les uns, & d'un orangé pâle dans d'autres ; & les ongles sont noirs. On le trouve sur les rivières & les étangs.

simili albo imbutæ : majores à corpore remotiores nigra. Viginti tribus remigibus ala conflatur : quatuordecim primores nigra : septem proximè sequentes , à decima quinta scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè , candida : vigesima secunda in latere exteriori concolor , in interiori nigra : corpori tandem vicinior penitus nigra. Caudam componunt sexdecim rectrices fusco-nigricantes. Binæ intermedie lateralium longitudinem nonnihil excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorè ; unde fit cauda apice rotundata. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata , pedes & digiti , sicut & ipsorum membrana , in aliis nigri ; in alteris pallidè aurantii ; ungues verò nigri. Flumina & piscinas frequentat.

\*\* 7. L'HARLE CENDRÉ OU LE BIÉVRE.

*Voyez le mâle Pl. XXV.*

Merganser cristatus , superne cinereus , pennis colli & uropygii cinereo-albo in apice marginatis , infernè albo-fulves-



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIV.* 255

cens; capite & collo supremo spadiceis; gutturo albo; remigibus decem primoribus cinereo-fuscis; rectricibus cinereis . . . . MERGANSER CINEREUS.

Mergus vertice & collo rubentibus. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. III. sp. 3.*

Mergus ruber. *Gesn. Avi. pag. 133.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 281.*

*Jonst. Avi. pag. 96.*

*Charlet. Exer. pag. 101. N<sup>o</sup>. 4.*

*Charlet. Onomazt. pag. 95. N<sup>o</sup>. 4.*

Castor seu Fiber Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 285. hujus icon à Bellonio mutuata Tab. 284.*

Bièvre Oiseau. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 163, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Bièvre. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 33 a, dans laquelle est la même figure.*

Les Grecs l'appellent *Κασοργς* *Ορνις*. *Bel.*

Les Allemands *ROTER TEUCHER*. *Gesn. Aldrov.*

Les Anglois, *RED-HEADED DIVER*. *Charlet.*

*Craffitie Anatem domestica* paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & decem pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem novem pollices cum linea unica. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices & quatuor cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes unum pollicem cum septem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum quinque lineis, intimus viginti quinque li-

Il est un peu plus gros qu'un Canard domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces une ligne. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces quatre lignes & demie de long; sa queue quatre pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied un pouce sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces cinq lignes, l'intérieur vingt-cinq lignes, & celui de derrière sept lignes. Il a deux pieds



six pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête & la partie du col qui en est la plus voisine , sont d'un rouge-bai. Toutes les plumes du dessus de la tête sont déliées , très-longues , quelques-unes ayant jusqu'à deux pouces cinq lignes de long , & forment une belle hupe. La gorge est blanche. Le bas de la partie supérieure du col , le croupion & les côtés sont couverts de plumes cendrées , bordées de gris-blanc par le bout. Celles qui couvrent le dos , ainsi que les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue , sont cendrées & sans bordures. Le bas de la partie inférieure du col , la poitrine & le ventre sont d'un blanc tirant un peu sur le fauve. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur , mais chacune d'elles est marquée dans son milieu d'une tache oblongue cendrée. Le haut des jambes est d'un gris clair. Les plus petites couvertures du dessous des ailes sont blanches : les moyennes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont cendrées dans leur milieu , & blanches sur leurs bords : les grandes les plus éloignées du

neas ; posticus autem septem lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum duorum pedum & sex pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ tertiam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Caput & pars colli ipsi finitima spadiceo colore tinguntur. Pennæ omnes caput superius obtegentes sunt graciles , longissimæ , quædam enim duorum pollicum & quinque linearum longitudinem obtinent , elegantemque cristam efficiunt. Guttur albicat. Colli superioris partem infimam , uropygium & latera vestiunt pennæ cineræ , cinereo-albo in apice marginatæ. Quæ dorsum cooperiunt , sicut & scapulares , superioresque caudæ teatrices cineræ quidem , sed marginibus destitutæ. Colli inferioris pars infima , pectus & venter ex albo ad fulvescentem inclinant colorem. Pennæ caudam subtus obtegentes concolores , quælibet autem maculâ oblongâ cinereâ in medio insignitur. Crurum suprema pars dilutè grisea. Teatrices alarum inferiores minimæ candidæ : mediæ , sicut & majores corpori viciniore , in medio cineræ ;

ad



ad margines candidæ : majores à corpore remotiores dilutè cinereæ. Margines alarum, infra articulum carpo humano respondentem, vestiunt plumulæ cinereæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum testrices minores sunt cinereæ : majores corpori finitimæ concolores : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum obtinent, ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque cinereo-fuscæ, in reliqua longitudine candidæ, cinereo terminatæ : majores à corpore remotiores cinereo-fuscæ. Ala notha cinereo-fusco similiter imbuta. Alam componunt viginti sex remiges, quarum decem primores cinereo-fuscæ : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, in latere exteriori concolores, in interiori albidæ : sex quæ nuper descriptas proximè sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, minutâ maculâ cinereâ versus ipsarum extremitatem insignitæ ; quæ macula in decima octava remige non multum conspicua, in decima nona verò & vigesima majuscula ; sex cor-

corps sont d'un cendré clair. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes cendrées, & bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes sont cendrées : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont d'un cendré-brun depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; le reste est blanc, & terminé de cendré : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun. L'aile bâtarde est de cette dernière couleur. L'aile est composée de vingt-six plumes : les dix premières sont d'un cendré-brun : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont de la même couleur du côté extérieur, & blanchâtres du côté intérieur : les six qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont blanches, & marquées vers leur extrémité d'une petite tache cendrée ; cette tache est fort peu apparente sur la dix-huitième plume, & elle est assez grande sur la dix-neuvième & la vingtième : les six plus proches du corps sont cendrées. Ces dernières sont fort



longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusque vers l'origine de la queue. La queue est composée de vingt plumes cendrées. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est rouge. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont rougeâtres. Il se nourrit de *Poissons*. On le trouve sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

pori viciniore cinerea. Quæ novissimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, versùs caudæ exortum usque protenduntur. Viginti rectricibus cinereis cauda constat. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē; unde fit cauda apice rotundata. Mandibula superior fusca, inferior rubra. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque rubescentes. *Piscibus* vescitur. Fluvios, piscinasque frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

### 8. L'HARLE HUPÉ DE VIRGINIE.

Merganser cristatus superne nigricans, infernè albus, imo ventre fusco; capite & collo nigris; cristâ orbiculari nigrâ, utrinque in medio candidâ; remigibus majoribus, rectricibusque fuscis. (*Mas*).

Merganser cristatus, in toto corpore fuscus; cristâ orbiculari. (*Fœmina*) . . . . . MERGANSER VIRGINIANUS CRISTATUS.

Mergus crista globosa utrinque alba, corpore supra fusco, subtus albo.

Mergus cucullatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 62. sp. 1.*

Serrator cucullatus. *Klein. Avi. pag. 140. N°. 3.*

Ecatototl seu Avis venti. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 24. cap. XLVI: Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 33. Cap. XCV.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 175.*



Altera Ecatototl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 24. cap. XLVII.*

Ecatototl altera. *Raj. Syn. Avi. pag. 175.*

Avis venti. *Euf. Nieremb. pag. 222.*

Avis venti, Heatotolt. *Willugh. Ornith. pag. 301.*

Heatototl, seu Avis venti. *Jonst. Avi. pag. 128.*

Heatototl altera. *Euf. Nieremb. pag. 222.*

*Jonst. Avi. pag. 128.*

*Willugh. Ornith. pag. 301.*

Canard hupé. *Catesb. Tom. I. pag. 94 ; avec une figure exacte Pl. 94.*

Les Anglois l'appellent ROUND-CRESTED DUCK. *Catesb.*

Les Mexiquains, ECATOTOTL. *Fern. Raj.*

*Anati domesticæ paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem sexdecim pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues quindecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices & totidem lineas longum est; cauda quatuor pollices; pars crurum plumis denudata tres cum semi lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue viginti quinque lineas, extimus duos pollices, intimus unum pollicem cum octo lineis; posticus autem sex cum semi lineas. Alæ complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur & collum nigra sunt. Pennæ partem capitis superiorem obtegentes maximâ longitudine pollent, & crassam ef-*

Il n'est pas tout-à-fait si gros qu'un *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ seize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces deux lignes de long; sa queue quatre pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes & demie; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, vingt-cinq lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce huit lignes; & celui de derriere six lignes & demie. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col sont noirs. Les plumes de la partie supérieure de la tête sont fort longues, & forment une grosse hupe or-



biculaire noire, & dont le milieu de chacun des côtés est blanc. Cette hupe a près de deux pouces six lignes de hauteur. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont noirâtres. La poitrine & le haut du ventre sont blancs. Le bas-ventre, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, le haut des jambes & les côtés sont bruns. Les couvertures du dessus des ailes sont noirâtres, mais les grandes intermédiaires, ou celles qui occupent le milieu, sont terminées de blanc. Les grandes plumes de l'aile sont brunes : les moyennes sont noirâtres, & bordées extérieurement de blanc. La queue est composée de plumes brunes. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est jaune. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un gris-brun ; & les ongles noirâtres.

La femelle diffère du mâle par sa couleur, qui est brune par tout le corps. Sa hupe est plus

ficiunt cristam orbicularem nigram quidem, sed in utriusque lateris medio candidam. Quæ crista duorum pollicum & sex ferè linearum altitudinem obtinet. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ nigricant. Pectus & venter supremus albet. Imum ventrem, tectrices caudæ superiores & inferiores, crurum partem supremam & latera tingit color fuscus. Superiores alarum tectrices nigricantes, majores tamen intermediae, istæ scilicet quæ medium locum tenent, albo terminatæ. Remiges majores fuscæ : minores nigricantes, exterius albo-marginatæ. Rectricibus fuscis cauda confiat. Intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculorum irides luteæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, griseofusci ; ungues verò nigricantes.

Fœmina à mâle discrepat colore in universo corpore fusco. Cristam gerit maris





Ardele, mâle.










Designé et Gravé par Martinet.

*Harle, mâle.*









le hupé, mâle.









Dessiné et Gravé par Martinet.

*Harle hupé, mâle.*









2. Petit Harle hupé, ou Piette, femelle.









1. Petit Harle hupé, ou Piette, mâle.

2. Petit Harle hupé, ou Piette, femelle.









*cendré ou Bécasse, mâle.*









Destiné et Gravé par Martinet.

*Harle cendré ou Bécasse, mâle.*







*criftâ minorem & penitus fufcam.*

Habitant in *Virginia*, *Carolina* & *Mexico*; flumina- que & ftagna frequentant.

petite que celle du *mâle*, & entièrement brune.

On les trouve fur les rivières & les étangs de *Virginie*, de la *Caroline* & du *Mexique*.

SECTION II.

*Ea quæ roftro donantur fuperne convexo, infernè planiusculo.*

**D**UO in illa fectione continentur genera Avium, latitudine roftri refpectivè ad ipsius crassitiem à se invicem discrepantium. In aliis enim roftri crassities latitudinem æquat, ut in *Anfere*: in alteris roftri latitudo crassitiem superat, ut in *Anate*.

In omnibus hujus fectionis Avibus roftri apex unguiculatus est & obtusus. Ipsarum rostra sunt, limæ infar, denticulata.

CVI.

*Genus Anserinum.*

Hujus caractere est  
Digiti quatuor, tres scilicet anticî membranîs integris inter se connexi, posticus solutus :

SECTION II.

*Ceux dont le bec est convexe en-deffus & applati en-deffous.*

**C**ETTE fection contient deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la largeur de leur bec respectivement à son épaisseur. Les uns ont le bec aussi épais que large, comme l'*Oye*: les autres ont le bec plus large qu'épais, comme le *Canard*.

Tous les Oiseaux de cette fection ont le bout du bec onguiculé & obtus. La dentelure de leur bec ressemble à celle d'une lime.

CVI.

*Genre de l'Oye.*

Son caractere est d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé :



Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

Le bec dentelé *comme une lime*, convexe en-dessus & applati en-dessous, aussi épais que large ; ayant le bout onguiculé & obtus.

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora :

Rostrum, *limæ instar*, denticulatum, superne convexum, infernè planiusculum, ipsius crassities latitudinem æquans ; ipsius apex unguiculatus, obtusus.

Tous les Oiseaux de ce genre ont une petite membrane tout le long du côté intérieur du doigt intérieur. Ils ont aussi la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes.

Omnium hujus generis Avium digitus intimus per totam lateris interioris longitudinem membranulâ donatur. Ipsarum crurum pars infima plumis denudatur.

## \*\* I. L'OYE DOMESTIQUE.

Anser versicolor . . . . ANSER DOMESTICUS.

Anser versicolor non cirratus. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. II. sp. 2.*

Anser. *Gesn. icon. Avi. pag. 73, in qua hujus icon non satis accurata.*

*Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 300.*

*Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 432.*

*Charlet. Exer. pag. 103. N°. XI.*

*Charlet. Onomazt. pag. 98. N°. XI.*

*Frisch. hujus icon accurata Tab. 157.*

Anser domesticus. *Gesn. Avi. pag. 141, in qua hujus icon non satis accurata.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 99. hujus icon non satis accurata pag. 102 ;*

*& Pulli icon non satis accurata pag. 103.*

*Schwenck. Avi. Sil. pag. 209.*

*Jonst. Avi. pag. 92. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48.*

*Willugh. Ornith. pag. 273. hujus icon non satis accurata Tab. LXXV.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 136. N°. A. 3.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 191. N°. 8.*

*Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 323. N°. V.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.*

*Prosper. Alp. Egypt. Vol. I. pag. 199.*



Anser domesticus, rusticus. *Klein. Avi. pag. 129. N<sup>o</sup>. 2.*

Anser vulgaris. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 4.*

Anas rostro semicylindrico ; corpore supra cinereo , subtus albidus ; rectricibus margine albis. *Faun. Suec. Linn. N<sup>o</sup>. 90.*

Anas rostro semicylindrico , corpore supra cinereo subtus pallidiore , collo striato. Anser domesticus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 7. var. 2.*

Anas. *Moehr. Avi. Gen. 61.*

Cygnus subcinereus subtus albidus , rostro recto latiusculo. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 480.*

Oye privée. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 156 ; avec une figure peu exacte pag. 157.*

Oye, Jars. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 31 a.*

Les François appellent le mâle JARS ; la femelle , OYE ; & le jeune OYSON.

Les Arabes , AVAZ ou ANAZ ; KAKI. *Gesn. Aldrov. OUZE ; UZE. Aldrov.*

Les Sarazins , le mâle , OCHE ; & la femelle , WOSZHE. *Gesn. Aldrov.*

Les Grecs , *Χλωίη*. *Eel. Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet. Ils appellent le jeune Χλωίδης. Schwenck.*

Les Grecs modernes , *Χίβα*. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet.*

Les Espagnols , GANSO ; PATO. Ils appellent le mâle ANSARON. *Gesn. Aldrov. ANSAR , & quelques-uns , BIVAR ; & le jeune , PATICO ; HIJO DE PATO. Aldrov.*

Les Catalans , HOCA. *Barr.*

Les Italiens , OCA. *Gesn. Aldrov. OCHA ; OCHO. Bel. PAPARA. Bel. Gesn. Aldrov. PAVARA ; & le jeune , PAPERÀ. Aldrov.*

Les Frisons , GUSZ. *Gesn.*

Les Suisses , GANSS. *Aldrov.*

Les Allemands , ZAME GANS. *Schwenck. GANSS. Ils appellent le mâle GANSERICH. Gesn. Aldrov. Schwenck. GANSER. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. & le jeune , JUNGE GANS ; GAENSELIN. Schwenck.*

Les Illyriens , GANSY ou HUS. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois , GES ; GASIOR. *Rzac.*

Les Suédois , GOAS. *Linn.*

Les Flamands , GANS. Ils appellent la femelle GOES. *Aldrov.*

Les Anglois , GOSE. *Gesn. Aldrov. GOOSE. Gesn. Aldrov. Charlet. TAME GOOSE. Willugh. Raj. Sloane. Browne.*

Ad Gallo-pavonis crassitiem accedit. Ipsi-  
us longitudo ab apice rostri ad cau-  
dæ extremitatem duos pedes  
novem pollices & tres lineas  
æquat , & ad extremos un-

Elle approche de la gros-  
seur d'un Dindon. Sa longueur  
depuis le bout du bec jusqu'à  
celui de la queue est de deux  
pieds neuf pouces trois lignes ,  
& jusqu'à celui des ongles de



deux pieds dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces sept lignes de long; sa queue six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied trois pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces dix lignes, l'extérieur trois pouces sept lignes, l'intérieur trois pouces; & celui de derrière dix lignes seulement. Elle a cinq pieds huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Ses couleurs varient comme celles des autres *Oiseaux domestiques*. Les unes sont entièrement blanches: d'autres ont tout le dessus du corps cendré: d'autres d'un cendré-brun: d'autres variés de blanc, de cendré, &c. tandis que tout le dessous de leur corps est blanc. L'aîle est composée de vingt-sept plumes, ou entièrement blanches, ou variées des précédentes couleurs. Les cinq ou six plus proches du corps sont fort longues, se terminent un peu en pointe, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée

gues duos pedes decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & septem lineas longum est; cauda sex pollices; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes tres pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & decem lineas, extimus tres pollices cum septem lineis, intimus tres pollices; posticus autem decem tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & octo pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ tres quartas longitudinis caudæ partes attingunt. Color in illo ut in reliquis *Avibus domesticis* varius. Alii enim sunt penitus candidi: alii in universo corpore superiore cinerei: alii cinereo-fusci: alteri albo, cinereo, &c. variegati; in toto autem corpore inferiore candidi. Alam componunt viginti septem remiges, sive penitus albæ, sive præcedentibus coloribus variæ. Quinque scilicet corpori viciniore maximam obtinent longitudinem, paululum in acumen desinunt, & dum ala complicatur, mediam circiter



*circiter caudæ longitudinem attingunt. Octodecim rectricibus cauda conflatur. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē; unde fit cauda apice rotundata. Oculorum irides rubescentes. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, in junioribus lutei, in adultis rubri; ungues verò nigricantes. Ex museo Reaumuriano.*

de dix-huit plumes. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. L'iris des yeux est rougeâtre. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont jaunes dans les jeunes, & rouges dans les adultes; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Hujus speciei varietas est

Une variété de cette espèce est

**\*\* A. L'OYE HUPÉE.**

*Anser cristatus.*

*Anser versicolor cirratus. Barr. Ornith. Class. I. Gen. II. sp. 1.*

A précédente non diffère pat nisi pennis summum caput vestientibus reliquis longioribus, & cristam efficientibus.

Elle ne diffère de la précédente qu'en ce que les plumes du sommet de sa tête sont plus longues que les autres, & forment une hupe.

**\*\* 2. L'OYE SAUVAGE.**

*Anser superne cinereo-fuscus, marginibus pennarum dilutioribus, infernè albidus, imo ventre niveo; rectricibus nigricantibus, exterius & apice albo fimbriatis, utrinque extremâ penitus candidâ . . . ANSER SYLVESTRIS.*

*Tom. VI.*

**L I**



- Anser cinereus* corpore subrotundo. Barr. Ornith. Class. I. Gen. II. sp. 3.
- Anser sylvestris*. Frisch. hujus icon accurata Tab. 155.  
Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.
- Anser ferus sylvestris* vel immanluetus. Gesn. Avi. pag. 158, in qua hujus icon non satis accurata.
- Anser ferus*. Gesn. icon. Avi. pag. 72, in qua eadem icon.  
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 147. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 150;  
& insuper altera icon minimè accurata pag. 151.
- Schwenck. Avi. Sil. pag. 212.
- Jonst. Avi. pag. 93. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48.
- Willugh. Ornith. pag. 274. hujus icon minimè accurata Tab. LXIX.
- Raj. Syn. Avi. pag. 136. N<sup>o</sup>. A. 4.
- Charlet. Exer. pag. 103. N<sup>o</sup>. 1.
- Charlet. Onomazt. pag. 98. N<sup>o</sup>. 1.
- Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.
- Rzac. Hist. Nat. Pol. pag. 269.
- Rzac. Auch. Hist. nat. Pol. pag. 359.
- Marfil. Danub. Tom. V. pag. 100. faminæ icon non satis accurata Tab. 48.
- Anser ferus* sympliciter. Klein. Avi. pag. 129. N<sup>o</sup>. 3.
- Anser ferus* alius sive tertius sylvestris. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 155. hujus icon pessima pag. 153.
- Anser ferus* alius sive Flandricus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 155. hujus icon non satis accurata pag. 152.
- Anser palustris* noster, Grey Lagg dictus. Raj. Syn. Avi. pag. 138. N<sup>o</sup>. A. 3.
- Anser vulgaris*. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 4.
- Anas* rostro semicylindrico; corpore supra cinereo, subtus albido; reetricibus margine albis. Faun. Suec. Linn. N<sup>o</sup>. 90.
- Anas* rostro semicylindrico, corpore supra cinereo subtus pallidiore, collo striato. *Anser ferus*. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 7. var. 1.
- Tlalacatl, seu *Anser montanus*. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 34. cap. XCVIII.
- Oye sauvage. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 158.  
Alb. Tom. 1. pag. 79; avec une figure mal coloriée Pl. 90.  
Kolbe. Descrip. du C de B. Esp. Tom. III. pag. 143.
- Les Grecs l'appellent *χλωὸν ὄρνις*; *χλωὸν ὄρνις* Schwenck.
- Les Espagnols, ANSAR BRAVO. Gesn. Aldrov.
- Les Italiens, OCA SALVATICA. Gesn. Aldrov.
- Les Allemands, WILDE GANSS. Gesn. Aldrov. Rzac. WILDE GANS;  
GRAWÉ GANS. Schwenck. SCHNEE GANSS. Gesn. Aldrov.
- Les Polonois, GES; GES DZIKA. Rzac.



*Les Suédois*, WILL GOAS. Linn.

*Les Anglois*, WILD GOOSE. Willugh. Charlet. COMMON WILD GOOSE.

Willugh. Sibbald. GREY LAGG. Willugh.

*Les Mexiquains*, TLALACATL. Fern.

Præcedenti paululùm craf-  
fitie cedit. Ipfius longitu-  
do ab apice roftri ad cau-  
dam extremam duos pedes  
octo pollices & ſex lineas ex-  
plet, & ad extremos ungues  
duos pedes novem pollices  
& ſex lineas. Roſtrum ab ip-  
ſius apice ad oris angulos uf-  
que duos pollices & ſex li-  
neas longum eſt; cauda quin-  
que pollices & novem li-  
neas; pars crurum plumis  
denudata ſeptem lineas; pes  
tres pollices cum quinque  
lineis; trium digitorum anti-  
corum medius cum ungue  
tres pollices & novem li-  
neas, extimus tres pollices  
cum ſex lineis, intimus tres  
pollices; poſticus autem no-  
vem ſolummodo lineas. Ab  
extremo ad extremum ala-  
rum extenſarum diſtantia eſt  
quinque pedum & ſeptem  
pollicum; alæ verò complica-  
tæ ad tres quartas longi-  
tudinis caudæ partes ex-  
tenduntur. Capitis ſuperior  
pars eſt cinereo-fuſca. Col-  
lum ſuperius, dorſum, uro-  
pygium & ſcapulares pen-  
næ concolores, margini-  
bus tamen pennarum dilu-

Elle n'eſt pas tout-à-fait ſi  
groſſe que la précédente. Sa  
longueur depuis le bout du bec  
juſqu'à celui de la queue eſt de  
deux pieds huit pouces ſix lig-  
nes, & juſqu'à celui des ongles  
de deux pieds neuf pouces ſix  
lignes. Son bec depuis ſon bout  
juſqu'aux coins de la bouche a  
deux pouces ſix lignes de long;  
ſa queue cinq pouces neuf lig-  
nes; la partie de ſes jambes qui  
eſt dégarnie de plumes, ſept  
lignes; ſon pied trois pouces  
cinq lignes; celui du milieu  
des trois doigts antérieurs, joint  
avec l'ongle, trois pouces neuf  
lignes, l'extérieur trois pouces  
ſix lignes, l'intérieur trois pou-  
ces; & celui de derrière neuf  
lignes ſeulement. Elle a cinq  
pieds ſept pouces de vol; & ſes  
aîles, lorsqu'elles ſont pliées,  
s'étendent juſqu'aux trois quarts  
de la longueur de la queue. La  
partie ſupérieure de la tête eſt  
d'un cendré-brun. Le deſſus du  
col, le dos, le croupion & les  
plumes ſcapulaires ſont de la  
même couleur; mais les bords  
de chaque plume ſont d'une  
couleur un peu plus claire. Les  
joues, la gorge, la partie in-  
férieure du col, la poitrine &



le haut du ventre sont blanchâtres. Le bas-ventre, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc de neige. Les côtés sont couverts de plumes cendrées, bordées de blanchâtre. Celles qui couvrent la partie extérieure du haut des jambes, sont de la même couleur, tandis que celles qui en couvrent la partie intérieure, sont blanches. Les petites couvertures du dessous des ailes sont cendrées, & bordées de blanchâtre : les grandes sont d'un cendré-brun & sans bordure. Les plus petites du dessus, ainsi que les grandes les plus éloignées du corps, sont d'un cendré clair : les moyennes, & les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré-brun, bordées de blanchâtre. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les dix premières sont grises du côté extérieur depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur ; le reste est noirâtre, ainsi que tout leur côté intérieur : les onze suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt - unième inclusivement, sont grises du côté extérieur, & brunes du côté intérieur : enfin les six plus proches du corps sont de la même couleur que les scapulaires. Ces six dernie-

tiore imbutis colore. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus & venter supremus candicans. Venter imus, teñtricesque caudæ superiores & inferiores niveo candore nitent. Latera cooperiunt pennæ cineræ, albedo fimbriatæ. Quæ crurum partem supremam in latere exteriori vestiunt, eodem colore tinguntur ; quæ verò eandem partem interioriùs obtegunt, sunt candidæ. Teñtrices alarum inferiores minores cineræ, albedo marginatæ : majores cinereo-fuscæ, marginibus albidis destitutæ. Superiores minimæ, sicut & majores à corpore remotiores, dilutè cineræ : mediæ, & majores corpori finitimæ cinereo-fuscæ, candicante fimbriatæ. Alarum componunt viginti septem remiges, quarum decem primores in latere exteriori ab ipsarum exortu versus duas tertias longitudinis partes usque griseæ, in reliqua longitudine & in toto latere interiori nigricantes : undecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, exterius griseæ, interioriùs fuscæ : sex tandem corpori viciniore scapularibus con-



colores. Quæ sex novissimè dictæ maximâ longitudine pollent, paululùm in acumen desinunt, & dum ala complicatur, ad mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Octodecim rectricibus cauda constat : sexdecim intermediæ nigricantes, albo exterius & apice fimbriatæ : utrinque extrema penitus candida. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorẽ ; unde fit cauda apice rotundata. Oculorum irides rubescentes. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque nigricans, deinde croceum, & tandem extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, luteo-aurantii ; ungues verò nigricantes. Stagna & paludes frequentat.

res sont fort longues, se terminent un peu en pointe, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de dix-huit plumes : les seize du milieu sont noirâtres, bordées de blanc extérieurement & par le bout : la plus extérieure de chaque côté est entièrement blanche. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue arrondi. L'iris des yeux est rougeâtre. Le bec est noirâtre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur ; ensuite il est d'un jaune de safran ; & son extrémité est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes ; les pieds & les doigts ; ainsi que leurs membranes, sont d'un jaune-orangé ; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les étangs & dans les marais.

### 3. L'OYE SAUVAGE DU NORD.

Anser superne griseo-fuscus, marginibus pennarum dilutioribus, infernè albus, maculis nigris varius ; plumulis basim mandibulæ superioris ambientibus albis ; rectricibus griseofuscis, dilutiore colore fimbriatis . . . . ANSER SEPTENTRIONALIS SYLVESTRIS.



Anser erythropus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 5.*

Anas cinerea fronte alba. *Faun. Suec. Linn. N°. 92.*

Anas cinerea fronte alba. Anser erythropus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 8.*

Anas rostro semicylindrico, corpore supra cinereo, subtus pallidiore, collo striato. Anser Canadensis fuscus maculatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 7. var. 3.*

An Anserinum genus aliud? *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 102. hujus icon non satis accurata Tab. 49.*

Oie moqueuse. *Edwards. Tom. III. pag. CLIII; avec une figure exacte Pl. 153.*

Les Anglois l'appellent LAUGHING-GOOSE. *Edwards.*

Elle est à peu près de la grosseur de la nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a environ deux pouces trois lignes de long; sa queue six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces quatre lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces onze lignes; & celui de derrière dix lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La base du demi-bec supérieur est entourée de petites plumes blanches. Les parties supérieures de la tête & du col

Cum nostrate crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & septem circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres circiter lineas longum est; cauda sex pollices; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & quatuor lineas, extremus tres pollices, intimus duos pollices cum undecim lineis; posticus autem decem lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Basim mandibulæ superioris ambiunt plumulæ albæ. Partes capitis & colli superiores sunt fusæ: quæ



color in summo capite fit saturatior, & nonnihil ad nigrum inclinat. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt griseo-fuscæ, marginibus pennarum colore nonnihil dilutiore imbutis. Caput ad latera, guttur, & partem colli inferiorem tingit color griseo-fuscus nonnihil quàm in dorso dilutior. Pectus & venter albicant, maculisque nigris variegantur. Crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores similiter albet, sed maculis destituuntur. Latera & pennæ alas subtus obtegentes sunt obscurè fuscæ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ corpori viciniore griseo-fuscæ, colore dilutiore fimbriatæ: minimæ, mediæ & majores à corpore remotiores cineræ: majores tandem corpori finitimæ cinereo similiter imbutæ, sed apicibus albis præditæ. Remiges majores sunt nigricantes: minores concolores, griseo marginatæ. Caudam componunt octodecim rectrices griseo-fuscæ, colore nonnihil dilutiore fimbriatæ. Binæ intermedia lateraliū longitudinem paululum superant; laterales vero sensim atque sensim lon-

sont brunes : cette couleur est plus foncée sur le sommet de la tête, & tire un peu sur le noir. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun, les bords de chaque plume étant d'une couleur un peu plus claire. Les côtés de la tête, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un gris-brun, un peu plus clair que celui du dos. La poitrine & le ventre sont d'un blanc varié de taches noires. Le haut des jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc sans taches. Les côtés & les couvertures du dessous des ailes sont d'un brun sombre. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, bordées d'une couleur plus claire : les petites, les moyennes & les grandes les plus éloignées du corps sont cendrées : enfin les grandes les plus proches du corps sont de cette dernière couleur, & terminées de blanc. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les moyennes sont de la même couleur, & bordées de grisâtre du côté extérieur & à leur bout. La queue est composée de dix-huit plumes d'un gris-brun, dont les bords sont d'une couleur



un peu plus claire. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges; & les ongles noirs. On la trouve dans les pays *Septentrionaux*.

gitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum, unde fit cauda apice rotundata. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipforum membranæ, rubri; ungues verò nigri. In *Septentrionalibus* regionibus habitat.

**\*\* 4. L'OYE SAUVAGE DE CANADA;**

*Voyez Pl. XXVI.*

Anser superne griseus, marginibus pennarum dilutioribus; infernè cinereo-illus, imo ventre candido; capite & collo nigris, ad violaceum vergentibus; genis & gutture albis; uropygio, rectricibusque nigricantibus . . . . ANSER CANADENSIS SYLVESTRIS.

Anser Canadensis. *Willugh. Ornith. pag. 276. hujus icon non satis accurata Tab. LXX; & insuper altera icon nequaquam accuratior Tab. LXXI, sub titulo, Anser Cygnoides.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 139. N°. 10.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 191. N°. 9.*

*Klein. Avi. pag. 129. N°. 6.*

Anser Canadensis Willughbeyi. *Sloane. Voy. of Jamaic. Tom. II. pag. 323. N°. VI.*

Anas fusca, capite colloque nigro, gula alba. Anser Canadensis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 9.*

Oye de Canada. *Catesb. Tom. I. pag. 92; avec une figure exacte de la tête & du col Pl. 92.*

Oie de Canada. *Edwards. Tom. III. pag. CLI; avec une figure exacte Pl. 151.*

Les Anglois l'appellent CANADA GOOSE. *Willugh. Raj. Edwards.*

*Anserem*



*Anserem domesticum* paululum crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes quinque pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues tres pedes quatuor pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda septem pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes tres pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & decem lineas, extimus tres pollices cum septem lineis, intimus tres pollices; & posticus unum pollicem. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput & tota ferè colli longitudo nigro tinguntur colore nonnihil ad violaceum vergente. Guttur albicat: quæ albedo utrinque supra genas & ponè oculos versùs occipitium usque protenditur, ibique tæniam octodecim circiter lineas latam efficit. Dorsi suprema pars

Elle est un peu plus grosse que l'Oye domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds cinq pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds quatre pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue sept pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces dix lignes, l'extérieur trois pouces sept lignes, l'intérieur trois pouces; & celui de derriere un pouce. Elle a cinq pieds six pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, & le col dans presque toute sa longueur sont d'un noir tirant un peu sur le violet. La gorge est blanche: cette couleur remonte de chaque côté sur les joues & par derriere les yeux jusque vers l'occiput, & y forme une bande large d'environ dix-huit lignes. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont grises, chaque plume étant bordée d'un gris très-clair ou blan-



châtre. La partie inférieure du dos est couverte de plumes grises & sans bordures. Celles qui couvrent le croupion, sont noirâtres. Le bas de la partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un gris-blanc. Le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes grises, bordées d'un gris très-clair ou blanchâtre. Le bas-ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessus & du dessous de la queue. Les petites couvertures du dessous des ailes sont grises, & bordées de blanchâtre: les grandes sont grises & sans bordures. Les petites & les moyennes du dessus des ailes sont de la même couleur que les scapulaires: les grandes les plus proches du corps sont grises: les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur, & brunes du côté intérieur & à leur bout. L'aile est composée de vingt-cinq plumes: les dix premières sont grises du côté extérieur depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur; le reste est noirâtre, ainsi que tout leur côté intérieur: les dix suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingtième inclusive-ment, sont grises du côté extérieur, & brunes du côté inté-

& scapulares pennæ sunt griseæ, marginibus pennarum dilutissimè griseis aut griseo-candicantibus. Dorsum infimum vestiunt pennæ similiter griseæ, sed marginibus destitutæ. Quæ uropygium obtegunt, sunt nigricantes. Colli inferioris pars infima, pectus & venter supremus ex cinereo alben. Crurum partem supremam & latera cooperiunt pennæ griseæ; dilutissimo griseo aut griseo-candicante fimbriatæ. Venter imus & tectrices caudæ superiores & inferiores albicant. Inferiores alarum tectrices minores griseæ, albedo marginatæ: majores griseæ, marginibus albidis destitutæ. Tectrices alarum superiores minores & mediæ scapularibus concolores: majores corpori viciniore griseæ: majores à corpore remotiores in latere exteriore concolores, in latere interiore & extremitate fuscæ. Alam componunt viginti quinque remiges, quarum decem primores in latere exteriore ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque griseæ, in reliqua longitudine & in toto latere interiore nigricantes: decem



proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, exterius griseæ, interiùs fuscæ : quinque tandem corpori viciniore penitus griseæ. Quæ quinque novissimæ remiges maximâ longitudine pollent, paululùm in acumen desinunt, & dum ala complicatur, tertiam longitudinis caudæ partem attingunt. Remix tertia reliquarum omnium longitudinem excedit. Octodecim rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Oculorum irides avellanæ : palpebræ ad margines candidæ. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, plumbeo colore saturato imbuti; ungues verò nigricantes. Habitat in *Americæ Septentrionali* regione. *Ex museo Realmuriano.*

rieur: enfin les cinq plus proches du corps sont entièrement grises. Ces cinq dernières sont fort longues, se terminent un peu en pointe, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La troisième plume de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de dix-huit plumes noirâtres. L'iris des yeux est de couleur de noisette : les bords des paupières sont blancs. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb foncé; & les ongles noirâtres. On la trouve dans la partie Septentrionale de l'*Amérique*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

# 5. L'OYE SAUVAGE DE LA BAYE DE HUDSON.

Anser superne obscurè fuscus, pectore concolore, infernè albus, fusco adumbratus; capite & collo candidis, vertice rufescente, collo superiore nigricante maculato; uropygio dilutè cinereo-cœrulescente; rectricibus obscurè fuscis, cinereo fimbriatis . . . . ANSER SYLVESTRIS Freti HUDSONIS.

Anas grisea, subtus alba, rectricibus alarum dorsoque postico cœrulescentibus. Anser cœrulescens. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61, sp. 10.*



Oie aux ailes bleues. *Edwards. Tom. III. pag. CLII ; avec une figure exacte Pl. 152.*

*Les Anglois l'appellent BLUE-WINGED GOOSE. Edwards.*

Elle est à peu près de la grosseur de la nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long ; sa queue cinq pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, sept lignes ; son pied trois pouces : celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, est de la même longueur ; l'extérieur a deux pouces dix lignes de long, l'intérieur deux pouces neuf lignes ; & celui de derrière neuf lignes seulement. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La tête, & le col dans presque toute sa longueur sont blancs ; le sommet de la tête est cependant roussâtre ; & la partie supérieure du col est variée de taches noirâtres. Le bas du col, la partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, la poitrine, & les côtés sont d'un brun som-

*Nostratem* crassitie circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & septem circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum est ; cauda quinque pollices & sex lineas ; pars crurum plumis denudata septem lineas ; pes tres pollices : trium digitorum anticorum medius cum ungue eadem longitudine pollet ; extimus duos pollices & decem lineas longus, intimus duos pollices cum novem lineis ; posticus autem novem solummodo lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, collumque per totam ferè longitudinem albescent ; capitis tamen vertex rufescit ; & partem colli superiorem variegant maculæ nigricantes. Collum infimum, dorsi suprema pars, pennæ scapulares, pectus & latera obscurè fuscescunt. Dorsum infimum, uropy-



gium, superioresque caudæ rectrices sunt dilutè cinereo-cœrulescentes. Venter, crurum suprema pars & inferiores caudæ rectrices albicant quidem, sed pauco adumbrantur fusco. Rectrices alarum superiores omnes ex cinereo cœrulescunt. Remiges majores nigricant : minores eodem colore tinguntur, sed cinereo in latere exteriori & apice marginantur. Caudam componunt octodecim rectrices obscure fuscæ, cinereo fimbriatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē; unde fit cauda extremitate rotundata. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri; ungues verò nigri. Habitat in *Freto Hudsonis*.

bre. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-bleuâtre assez clair. Le ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc un peu nuancé de brun. Toutes les couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré-bleuâtre. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les moyennes sont de la même couleur, mais elles sont bordées de cendré du côté extérieur & à leur bout. La queue est composée de dix-huit plumes d'un brun obscur, bordées de cendré. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges; & les ongles noirs. On la trouve à la *Baye de Hudson*.

## 6. L'OYE DE MOSCOVIE.

Anser superne obscurè fuscus, marginibus pennarum dilutionibus, infernè albus; tuberculo in exortu rostri carnosio, aurantio; paleari in gutture pendulo; (capite & collo

Mm iij



supremo fuscis *mas*) ; ( capite , collo & pectore fulvis *fœmina* ) ; rectricibus obscurè fuscis , albido fimbriatis . . .  
ANSER MOSCOVITICUS.

Anser Russicus. *Klein. Avi. pag. 129. N°. 5.*

Anser rostro semicylindrico atro basi gibbo , minor. Cygnoides Orientalis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 2. var. 1.*

Oye de Moscovie. *Alb. Tom. II. pag. 58 ; avec des figures mal coloriées , du mâle Pl. 91 , & de la femelle Pl. 92.*

Les Anglois l'appellent MUSCOVIAN GANDER. *Alb.*

Elle est plus grosse que l'Oye domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ trois pieds trois pouces six lignes. Elle a cinq pieds sept pouces six lignes de vol. Sa tête & le haut du col sont d'un brun plus foncé sur la partie supérieure de la tête & le dessus du col que sur les côtés de la tête & la partie inférieure du col. Le dos est d'un brun sombre , les bords de chaque plume étant d'une couleur plus claire. Le bas du col , la poitrine , le ventre , le haut des jambes , le croupion , les couvertures du dessus & du dessous de la queue , celles du dessus & du dessous des ailes , & les côtés sont blancs. Toutes les plumes de l'aile sont de la même couleur. La queue est composée de plumes d'un brun obscur , bordées de blanchâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en di-

*Anserem domesticum* crassitie superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes totidem pollices & sex lineas explet. Alis expansis , extremitates majorum remigum quinque pedum septem pollicum & sex linearum intervallo distant. Caput & collum supremum fusca sunt ; in partibus capitis & colli superioribus saturatiùs quàm in capitis lateribus & collo inferiore. Dorsum vestiunt pennæ obscurè fuscæ , dilutior colore marginatæ. Collum infimum , pectus , venter , latera , crurum suprema pars , uropygium , pennæ caudam superne & infernè cooperientes , alarumque rectrices superiores & inferiores albescent. Remiges omnes concolores. Caudam componunt rectrices obscurè fuscæ , albido fimbriatæ. Binæ intermediae lateralium



longitudinem nonnihil excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum; unde fit cauda apice rotundata. Oculorum irides eleganter luteæ. Rostrum aurantium. Supra mandibulæ superioris exortum tuberculum attollitur rotundum, carnosum, eodem aurantio ac rostrum imbutum, attamen in ipsius exortu nigrum, albo marginatum. Palmar quoque extat sub gutture pendulum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membrana, eleganter aurantii; ungues verò nigri.

*Fœmina* magnitudine paululum *mari* cedit. Ab illo coloribus quoque discrepat. Caput, guttur, collum & pectus tingit color fulvus, in partibus capitis & colli superioribus dilutior quàm in reliquis prædictis locis. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superiores alarum rectrices & pennæ caudam superne cooperientes sunt obscurè fusæ, marginibus pennarum dilutiore colore tinctis. Venter, latera & rectrices caudæ inferiores albicant. Pennæ cru-

minuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue arrondi. L'iris des yeux est d'un beau jaune. Le bec est orangé. Sur l'origine du demi-bec supérieur s'élève un tubercule rond & charnu, du même orangé que le bec, excepté son origine, qui est noire & bordée de blanc. Sous la gorge pend aussi une espèce de membrane charnue. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un bel orangé; & les ongles noirs.

La *femelle* n'est pas tout-à-fait si grande que le *mâle*. Elle en diffère encore par ses couleurs. La tête, la gorge, le col & la poitrine sont fauves, cette couleur étant plus foncée sur les parties supérieures de la tête & du col qu'ailleurs. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun sombre, chaque plume étant bordée d'une couleur plus claire. Le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les plumes



qui couvrent le côté extérieur du haut des jambes, sont de la même couleur que celles du dos; celles qui en couvrent le côté intérieur, sont blanches. Les plumes de l'aile & celles de la queue sont d'un brun sombre, & bordées de blanchâtre. Le reste est comme dans le mâle, excepté que le tubercule charnu qui est sur l'origine du demi-bec supérieur, n'est pas si gros.

On les trouve en *Moscovie*.

rum partem supremam exterius cooperientes pennis dorsum vestientibus concoloribus: quæ eandam partem interiorius obtegunt, alben. Alarum remiges, sicut & caudæ rectrices, sunt obscurè fuscæ, albido fimbriatæ. In reliquis cum mare convenit; tuberculum tamen carnosum, in mandibulæ superioris exortu positum, non tantam crassitiem obtinet.

Habitant in *Moscovia*.

## \*\* 7. L'OYE DE GUINÉE.

Anser superne griseo-fuscus, marginibus pennarum dilutionibus, infernè albus; tuberculo in exortu rostri carnosoluteo-aurantio; paleari in gutture pendulo; taniâ à capite ad dorsum per summum collum fuscâ; collo inferiore & pectore fulvis; rectricibus griseo-fuscis, albido fimbriatis...  
ANSER GUINEENSIS.

Anser Hispanicus, an potius Guineensis. *Willugh. Ornith. pag. 275.*

*Klein. Avi. pag. 129. N°. 4.*

Anser Hispanicus seu Cygnoides. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 104. hujus icon minùs accurata Tab. 50.*

Anser cygneus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 3.*

Anser cygneus Guineensis. *Raj. Syn. Avi. pag. 138. N°. 8.*

Anser Chinesiensis. *Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 153; & insuper capitis icon accurata Tab. 154.*

Cygnus subfuscus, collo longiori, rostro latiori basi gibbo. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 480.*

Anas rostro semicylindrico, basi gibbo. *Faun. Suec. Linn. N°. 89.*

Anas rostro semicylindrico basi gibbo. *Cygnoides australis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 2.*

Oye d'Espagne. *Alb. Tom. I. pag. 79; avec une figure mal coloriée Pl. 91.*

Les Suédois l'appellent TURCKISK GOAS; SIBERISK GOAS. *Linn.*

Les Anglois, SWAN-GOOSE. *Willugh. Raj. SPANISH GOOSE. Alb.*

Les Anglois de la Jamaïque, CHINA GOOSE. *Browne.*

Cum



Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes quatuor pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes totidem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque tres pollices longum est; cauda septem pollices; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes tres pollices cum lineis binis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices & sex lineas, intimus duos pollices cum undecim lineis; posticus autem decem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum sex pollicum & totidem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Rostrum inter & oculos tænia extat candida, basim rostri ambiens. In parte colli superiore tænia extenditur longitudinalis fusca, à capite ad dorsum usque producta. Reliquum collum superius, caputque superius sunt grisea. Dorsum

Elle est à peu près de la longueur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds quatre pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds trois pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; sa queue sept pouces; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, huit lignes; son pied trois pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces six lignes, l'intérieur deux pouces onze lignes; & celui de derrière dix lignes. Elle a cinq pieds six pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Entre le bec & les yeux est une bande blanche, qui entoure la bête du bec. Sur la partie supérieure du col est une bande longitudinale brune, qui s'étend depuis la tête jusqu'au dos. La partie supérieure de la tête & le reste du dessus du col sont gris. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun; les bords de chaque plume étant d'une couleur un peu plus claire. La gorge, la partie inférieure.



rière & les côtés du col, & la poitrine sont fauves. Le ventre, le haut des jambes, le croupion, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont blanchâtres. Les côtés sont couverts de plumes grises, bordées de blanchâtre. Les petites couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur : les grandes sont d'un gris-brun. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun-noirâtre : les moyennes sont grises, & bordées de blanchâtre extérieurement & par le bout. La queue est composée de dix-huit plumes d'un gris-brun, bordées de blanchâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue arrondi. L'iris des yeux est rougeâtre. Le bec est d'un jaune-orangé. Sur l'origine du demi-bec supérieur s'élève un assez gros tubercule charnu, du même jaune-orangé que le bec. Sous la gorge pend aussi une espece

& scapulares pennæ griseo-fuscæ, marginibus pennarum nonnihil dilutioribus. Guttur, collum inferius & ad latera, pectusque fulva. Venter, crurum suprema pars, uropygium, testricisque caudæ superiores & inferiores candicant. Latera cooperiunt pennæ griseæ, albido marginatæ. Inferiores alarum testrices minores concolores : majores griseo-fuscæ. Superiores minores, sicut & majores corpori viciniore, pennis dorsum vestientibus concolores : majores à corpore remotiores fuscæ. Remiges majores ex fusco nigricant : minores sunt griseæ, albido exterius & apice marginatæ. Cauda octodecim constat rectricibus griseo-fuscis, albido fimbriatis. Binæ intermedia lateraliū longitudinem paululum superant ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē ; unde fit cauda apice rotundata. Oculorum irides rubescunt. Rostrum luteo-aurantium. Supra mandibulæ superioris exortum crassiusculum attollitur tuberculum carnosum, eodem luteo-aurantio colore ac ros-



trum imbutum. Palear quoque extat sub gutturo pendulum. (In quibusdam individuus rostrum, tuberculumque carnosum nigricant.) Pars crurum plumis nudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, aurantii; ungues verò nigricantes. Habitat in Guinea. In Vivario Regio vivum observavi.

de membrane charnue. (Dans quelques-uns le bec & le tubercule charnu sont noirâtres.) La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont orangés; & les ongles noirâtres. On la trouve en Guinée. Je l'ai vue vivante à la Ménagerie du Roi.

### 8. L'OYE DE GAMBIE.

Anser superne obscurè purpureus, infernè albus; tuberculo in exortu rostri carnosio rubro; alis in anteriore parte calcari præditis . . . . ANSER GAMBENSIS.

Anser Gambensis. Willugh. Ornith. pag. 275. hujus icon minimè accurata Tab. LXXI.

Raj. Syn. Avi. pag. 138. N°. 9.

Anser Chilensis. Klein. Avi. pag. 129. N°. 7.

Les Anglois l'appellent GAMBO - GOOSE. Willugh. Raj. SPUR-WINGED GOOSE. Raj.

Crassitie *Anatem moschatam* adæquat; sed cruribus donatur magis elongatis. In corpore superiore est obscurè quidem, sed splendide, purpureus; in corpore inferiore albus. Ab aliis autem hujus generis speciebus præcipuè differt calcari quodam in utriusque alæ anteriori parte, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, posito. Rostrum rubrum. Supra mandibulæ su-

Elle est de la grosseur du *Canard musqué*; mais elle a les jambes plus allongées. Le dessus de son corps est d'un pourpre sombre, mais brillant; & le dessous est blanc. Ce qui la distingue le plus des autres espèces de ce genre, est une espèce d'éperon qu'elle a à la partie antérieure de chaque aîle, placé vers le pli qui répond à celui du poignet. Le bec est rouge. Sur l'origine du demi-bec supérieur s'élève un tubercule



charnu, du même rouge que le bec. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rougeâtres. On la trouve dans le Royaume de *Gambie*.

perioris exortum tuberculum attollitur carnosum, eodem rubro ac rostrum imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubescunt. Habitat in *Gambensi* regno.

\*\* 9. L'OYE D'EGYPTE.

Voyez Pl. XXVII.

Anser superne obscurè, infernè dilutè rufescens, fusco transversim & undatim striatus; vertice albo; maculâ per oculos dilutè castaneâ; maculâ in pectore infimo castaneâ; uropygio splendidè nigro; ventre sordidè albo; tectricibus alarum superioribus albis, majoribus taniâ transversâ nigrâ notatis; rectricibus nigris, exterius superne viridi colore variantibus . . . . ANSER ÆGYPTIACUS.

Anser Hispanicus parvus. *Raj. Syn. Avi. pag. 138. N°. A. 1.*

Ganser des Anglois. *Alb. Tom. II. pag. 59; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 93.*

Elle n'est guères plus grosse que le *Canard musqué*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds deux pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds trois pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a vingt-cinq lignes de long; sa queue cinq pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, neuf lignes; son pied trois pouces; celui du mi-

*Anatem moschatam* crassitie non multum excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes totidem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues duos pedes & tres pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque viginti quinque lineas longum est; cauda quinque pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata novem lineas; pes tres polli-



tes; trium digitorum anticorum medius cum ungues tres pollices cum linea una, extimus duos pollices & decem lineas; intimus duos pollices cum sex lineis; posticus autem tredecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum & duorum pollicum; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè pertingunt. Basim mandibulæ superioris ambiunt plumulæ dilutè castaneæ. Capitis vertex albicat. In utroque capitis latere majuscula extat macula dilutè castanea, in qua oculi siti sunt. Occipitium & collum superius sunt dilutè fulva: qui color, descendendo, magis magisque fit saturatior, ita ut mediam versùs colli longitudinem ad castaneum accedat. Genarum pars infima sordidè albicat. Guttur eodem imbuitur colore, & maculis castaneis variegatur. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt obscurè rufescentes, tæniis transversis & undatis saturatè fuscis striatæ: scapularium tamen maxima pars eleganti castaneo tingitur. Dorsum infimum, uropygium & superiores caudæ tectrices sunt

lieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces une ligne, l'extérieur deux pouces dix lignes, l'intérieur deux pouces six lignes; & celui de derrière treize lignes. Elle a quatre pieds deux pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La bête du demi-bec supérieur est entourée de petites plumes d'un marron clair. Le sommet de la tête est blanc. De chaque côté de la tête est une grande tache d'un marron clair, dans laquelle sont placés les yeux. L'occiput & la partie supérieure du col sont d'un fauve clair: cette couleur, en descendant, devient de plus en plus foncée, de façon que vers la moitié de la longueur du col elle approche du marron. Le bas des joues est d'un blanc sale. La gorge est de la même couleur, & tachetée de marron. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un roussâtre obscur, varié de rayes transversales & en zigzags d'un brun foncé: la plus grande partie des scapulaires est cependant d'un beau marron. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-brillant. Le haut de la partie inférieure



du col est d'un marron clair. Le bas de la partie inférieure du col, la poitrine, le haut des jambes & les côtés sont d'un rouffâtre clair, rayé de brun transversalement & en zigzags : sur le haut des jambes & les côtés le rouffâtre est beaucoup plus clair qu'ailleurs : & au bas de la poitrine est une assez grande tache de marron. Le ventre est d'un blanc sale. Les couvertures du dessous de la queue sont fauves. Parmi celles du dessous des aîles, les plus proches du corps sont blanches : les plus éloignées du corps sont noirâtres, & variées de rayes transversales & en zigzags blanchâtres. Les petites couvertures du dessus des aîles sont blanches : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur, & marquées vers leur extrémité d'une bande transversale noire : les grandes les plus éloignées du corps sont entièrement noires. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les cinq premières sont noires : les treize suivantes, sçavoir depuis la sixième jusqu'à la dix-huitième inclusive-ment, sont de la même couleur du côté intérieur ; mais leur côté extérieur est d'un verd-doré changeant en un violet éclatant ; la sixième est de plus

splendide nigræ. Colli inferioris pars suprema est dilutè castanea. Colli inferioris pars infima, pectus, crurum suprema pars & latera dilutè rufescunt, & fusco transversim & undatim striantur : crurum autem suprema pars & latera multò dilutius rufescunt quàm reliquæ prædictæ partes : & pectus infimum majusculâ insignitur maculâ castaneo colore imbutâ. Venter sordide albicat. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt fulvæ. Ex inferioribus alarum tectricibus, corpori viciniore albescent : à corpore remotiores nigricant, tamenque transversis & undatis candicantibus striantur. Superiores alarum tectrices minores sunt albæ : majores corpori finitimæ concolores, tamen transversâ nigrâ versùs ipsarum extremitatem notatæ : majores à corpore remotiores penitus nigræ. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : quinque primores nigræ : tredecim proximè sequentes, à sexta scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, in latere interiore concolores, in latere verò exteriori viridi-aureæ, violaceo colore splendido variantes ; sexta



maculâ infuper insignitur candidâ, in latere exteriore versùs ipsius extremitatem collocatâ : quinque istas novissimas proximè sequentes, à decima nona scilicet ad vigesimam tertiam usque inclusivè, in latere exteriore eleganter castaneæ, in interiore griseo-fuscæ : vigesima quarta interiùs quoque griseo-fusca ; sed in latere exteriore ex griseo rufescit. Cauda quatuordecim conflatur rectricibus, omnibus subtus nigris ; superne verò binæ intermediæ sunt nigræ, viridi colore variantes : laterales omnes in latere exteriore concolores, in interiore penitus nigræ. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; unde fit cauda in extremitate obtusa. Oculorum irides albidæ : palpebræ rubescentes. Rostrum rubrum, exceptis tamen ipsius extremitate, narium ambitu & mandibulæ superioris superiore parte, sed solummodo in exortu, nigris. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri ; ungues verò nigricantes. Piscinas frequentat. *Ex museo Reaumuriano, in quem ab Illuf-*

marquée d'une tache blanche, placée sur son côté extérieur vers son extrémité : les cinq qui suivent ces dernières, savoir depuis la dix-neuvième jusqu'à la vingt-troisième inclusivement, sont d'un beau marron du côté extérieur, & d'un gris-brun du côté intérieur : la vingt-quatrième est aussi d'un gris-brun du côté intérieur ; mais son côté extérieur est d'un gris-roussâtre. La queue est composée de quatorze plumes, toutes noires en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un noir changeant en verd : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & noires du côté intérieur. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales ; ce qui rend le bout de la queue obtus. L'iris des yeux est blanchâtre : les paupières sont rougeâtres. Le bec est rouge, excepté son bout qui est noir, ainsi que le tour des narines & le dessus du demi-bec supérieur, mais seulement à son origine. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges ; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur, à qui elle a été don-*



née par *Monseigneur l'Evêque trissimo Silvanedensi Episcopo*  
*de Sentis.* milus est.

## 10. L'OYE DE NEIGE,

Anser in toto corpore albus; remigibus quatuor vel quinque  
 primoribus nigris; reëtricibus candidis . . . . ANSER  
 NIVEUS.

Anser grandinis. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 213.*

Anser grandinis, nivis, hibernus, *Schwenckfeldii. Klein. Avi. pag. 130,*  
*Nº. 11.*

*Les Allemands l'appellent SCHNEE GANS; HAGEL GANS. Schwenck.*

Elle est à peu près de la grandeur & de la grosseur de l'Oye sauvage. Tout son corps est couvert de plumes blanches. Les quatre ou cinq premières plumes de l'aile sont noires : toutes les autres sont blanches. La queue est composée de plumes de cette dernière couleur. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On ne voit jamais cette espèce en été ; mais en hyver elle s'assemble par troupe.

*Cum Anser sylvestri magnitudine & crassitie circiter convenit. Universum corpus vestiunt pennæ albæ. Remiges alarum quatuor vel quinque primores sunt nigre : reliquæ omnes candidæ. Caudam componunt rectrices concolores. Cujus coloris sint rostrum & pedes prorsus me latet. Æstate nunquam in conspectum veniunt hujus speciei Anseres; hyeme autem gregatim volant.*

## \*\* 11. LE CYGNE.

Anser in toto corpore albus; tuberculo in exortu rostri car-  
 noso nigro; remigibus, reëtricibusque candidis . . . .  
 CYGNUS.

Anser Cygnus. *Klein. Avi. pag. 128. Nº. 1.*

*Cygnus. Gesn. Avi. pag. 371. hujus icon non satis accurata pag. 372.*  
*Mus. Worm. pag. 299.*

*Jonst.*



Jonst. Avi. pag. 90. hujus duæ icones non satis accurata Tab. 48.

Charlet. Exer. pag. 103. N<sup>o</sup>. X.

Charlet. Onomazt. pag. 97. N<sup>o</sup>. X.

Frisch. hujus icon accurata Tab. 152.

Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 2.

Cygnus, Cynus, Olor. Gesn. icon. Avi. pag. 81, in qua hujus icon non satis accurata.

Cygnus sive Olor. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 278.

Rzac. Autt. Hist. Nat. Pol. pag. 377.

Cygnus mansuetus. Willugh. Ornith. pag. 271. hujus icon non satis accurata Tab. LXIX.

Raj. Syn. Avi. pag. 136. N<sup>o</sup>. A. 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.

Marfil. Danub. Tom. V. pag. 98. hujus icon satis accurata Tab. 47.

Cignus. Gaz. Rup. Best. hujus capitis icon satis accurata Tab 20.

Cynus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 1.

Olor. Schwenck. Avi. Sil. pag. 310.

Anas rostro semicylindrico ; cera flava ; corpore albo. Faun. Suec. Linn. N<sup>o</sup>. 88.

Anas rostro semicylindrico atro , cera flava , corpore albo. Cygnus mansuetus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 1. var. 1.

Cygne. Alb. Tom. III. pag. 40 ; avec une figure mal coloriée Pl. 96.

Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 151 ; avec une figure peu exacte pag. 152.

Cyne, Cygne. Bel. Portr. d'Ois. pag. 30 a , dans laquelle est la même figure.

Les Hébreux l'appellent TINSCHMET. Aldrov.

Les Arabes , BASKAK ; CINNANA , ou plutôt CINNARIA. Aldrov.

Les Grecs , Κύνος. Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet. Κύνος.

Aldrov. Jonst. Πύων ; Οΐσυν. Aldrov.

Les Espagnols , CISNE. Gesn. Aldrov.

Les Italiens , CINO ; CIGNO. Bel. Gesn. Aldrov.

Les Vénitiens , CESANO. Bel. Gesn. Aldrov.

Les Ferrarois , CISANO. Aldrov.

Les Suisses , OELB. Gesn. Aldrov. Schwenck. OELBS. Schwenck. ELBS. ou ELPS ; OELBSCH. Gesn. Aldrov.

Les Saxons , OELB. Gesn. Aldrov. Schwenck. OELBS. Schwenck. ELBS ou ELPS ; OELBSCH. Gesn. Aldrov.

Les Allemands , SCHWAN. Gesn. Schwenck. Rzac.

Les Illyriens , LABUT. Gesn. Aldrov.

Les Polonois , LABEC. Rzac. LABESC. Gesn.

Les Suédois , SWAN. Linn.

Les Anglois , SWAN. Gesn. Aldrov. Willugh. Charlet. TAME SWAN.

Willugh. Raj. Ils appellent le jeune CYGNET. Charlet.

Tom. VI.

O o



C'est la plus grosse espece de ce genre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pieds trois pouces sept lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pieds cinq pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long; sa queue sept pouces cinq lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix-huit lignes; son pied quatre pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq pouces neuf lignes, l'extérieur cinq pouces trois lignes, l'intérieur quatre pouces trois lignes; & celui de derrière treize lignes. Il a sept pieds deux pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un blanc de neige. Celles des aîles & de la queue sont de la même couleur. Celles du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue obtus. Le

Hæc est hujus generis maxima species. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pedes tres pollices & septem lineas explet, & ad extremos unguis quatuor pedes quinque pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque tres pollices & sex lineas longum est; cauda septem pollices & quinque lineas; pars crurum plumis denudata octodecim lineas; pes quatuor pollices cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque pollices & novem lineas, extremus quinque pollices cum tribus lineis, intimus quatuor pollices & tres lineas; posticus autem tredecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pedum duorum pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Per universum corpus pennis vestitur niveo candore nitentibus. Alarum remiges, sicut & caudæ rectrices, concolores. Rectrices intermediae lateralium longitudinem paululum ex-



cedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum; unde fit cauda in extremitate obtusa. Rostrum rubrum, exceptâ mandibulæ superioris extremitate nigrâ. Supra mandibulæ superioris exortum tuberculum attollitur crassiusculum, carnosum, nigrum, antrorsum inflexum. In utroque capitis latere, rostrum inter & oculum, spatium extat triangulare, eodem nigro ac tuberculum imbutum, & plumis destitutum. Quod spatium triangulum quodammodo refert isocellum, cujus basis rostrum, vertex verò oculos spectat. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, plumbeo colore imbuti; ungues verò nigri.

*Fœmina à mâle differt magnitudine quâ paululùm ei cedit, & tuberculo carnosum, supra mandibulæ superioris exortum posito, non ita crasso. In reliquis cum illo perfectè convenit. Ex museo Realmuriano.*

Hujus speciei juniores multùm grisei admixtum habent. Ipsorum rostrum plumbeo colore imbutur, ex-

bec est rouge, excepté le bout du demi-bec supérieur, qui est noir. Sur l'origine du demi-bec supérieur s'élève un assez gros tubercule charnu, d'un très-beau noir, & qui retombe en avant. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est un espace triangulaire du même noir que le tubercule, & dégarni de plumes. Cet espace représente à peu près un triangle isocelle, dont la bête est appuyée sur le bec, & le sommet tourné vers les yeux. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb; & les ongles noirs.

*La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est un peu plus petite, & que le tubercule charnu qu'elle a sur l'origine du demi-bec supérieur, n'est pas si gros. Du reste elle lui ressemble parfaitement. Du cabinet de M. de Reaumur.*

Les jeunes de cette espèce sont mêlés de beaucoup de gris. Leur bec est de couleur de plomb, excepté le bout du de-



mi-bec supérieur, qui est noir. Il y a aussi de chaque côté une raye noire, qui s'étend depuis les narines jusqu'à la tête.

cepto mandibulæ superioris apice nigro. In utroque rostri latere tænia quoque extat nigra, à naribus ad caput usque protensa.

## \*\* 12. LE CYGNE SAUVAGE.

Voyez Pl. XXVIII.

Anser in toto corpore albus; rostro in exortu luteo; remigibus, rectricibusque candidis . . . . CYGNUS FERUS.

Anser candidus, pedibus nigris, rostro luteo, cervice longiori. Barr. *Ornith. Class. I. Gen. II. sp. 5.*

Anser Cygnus. Klein. *Avi. pag. 128. N°. 1.*

Cygnus ferus. Willugh. *Ornith. pag. 272. hujus capitis icon satis accurata Tab. LXIX.*

Raj. *Syn. Avi. pag. 136. N°. A. 2.*

Charlet. *Exer. pag. 103. N°. X.*

Charlet. *Onomast. pag. 97. N°. X.*

Sibbald. *Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.*

Marsil. *Danub. Tom. V. pag. 98.*

Cygnus. Linn. *Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 2.*

Cygnus. Aldrov. *Avi. Tom. III. pag. 10. hujus icon non satis accurata pag. 8; & insuper pulli icon nequaquam accuratior pag. 9.*

Olor. Schwenck. *Avi. Sil. pag. 310.*

Anas rostro semicylindrico; cera flava; corpore albo. Faun. Suec. Linn. N°. 88.

Anas rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo. Cygnus. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 1.*

Cigne sauvage. Edwards. *Tom. III. pag. CL; avec une figure exacte Pl. 150.*

Les Catalans l'appellent SIGNE. Barr.

Les Anglois, WILD SWAN. Willugh. Raj. Edwards. ELK. Willugh. Raj. Charlet. & quelques-uns, HOOPER. Willugh. Raj.

Il est beaucoup moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds dix pouces six lignes, &

Præcedenti multum cressitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tres pedes decem pollices & sex lineas æquat, &



ad extremos ungues tres pedes decem pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & undecim lineas longum est; cauda septem pollices; pars crurum plumis denudata sexdecim lineas; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & totidem lineas, extimus quatuor pollices, intimus tres pollices cum lineis binis; posticus autem novem tantummodo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est sex pedum & trium pollicum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Per universum corpus pennis vestitur albis. Caudam componunt viginti rectrices concolores, quarum intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē; unde fit cauda apice obtusa. Rostrum ab ipsius extremitate ad nares usque nigrum, inde ad exortum usque luteum: color autem luteus ad oculos usque protenditur; quod spatium plumis denudatur.

jusqu'à celui des ongles de trois pieds dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces onze lignes de long; sa queue sept pouces; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, seize lignes; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces quatre lignes, l'extérieur quatre pouces, l'intérieur trois pouces deux lignes; & celui de derrière neuf lignes seulement. Il a six pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes blanches. Sa queue est composée de vingt plumes de la même couleur, dont celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue obtus. Le bec est noir depuis son bout jusqu'aux narines; & de là jusqu'à son origine il est jaune: cette couleur continue jusqu'aux yeux, lequel espace est dé-garni de plumes. Les paupières sont pareillement jaunes.



La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un gris-brun; & les ongles bruns. On le trouve sur les rivières, les lacs & les étangs. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

Palpebræ similiter luteæ. Pars crurum plumis denu-data, pedes & digiti, sicut & ipforum membranæ, gri-seo-fusci; ungues verò fusci. Fluvios, lacus & stagna fre-quentat. *Ex museo D. de Bandeville.*

**\*\* 13. L'OYE A DUVET OU L'EIDER.**

*Voyez le mâle Pl. XXIX, & la femelle Pl. XXX.*

Anser superne albus, collo & pectore supremo concoloribus; infernè niger, medio uropygio concolore; summo capite splendide nigro, taniâ longitudinali in occipite candidâ; colli superioris parte supremâ dilutè viridi; rectricibus nigricantibus utrinque extimâ albedo terminatâ. (*Mas*).

Anser fusco-rufescens, maculis transversis nigricantibus varius; ventre fusco; capite & collo supremo maculis longitudinalibus nigricantibus variegatis; rectricibus fuscis. (*Fœmina*) . . . . ANSER LANUGINOSUS SIVE EIDER.

Anser plumis mollissimis Willughbeji. *Klein. Avi. pag. 130. N°. 10.*

Anas plumis mollissimis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 8.*

Anas rostro semicylindrico: ungue obtuso; cera superne bifida rugosa. *Faun. Suec. Linn. N°. 94.*

Anas rostro cylindrico, cera posticè bifida rugosa. Anas mollissima. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 12.*

Anas S. Cutberti, seu Farnensis. *Willugh. Ornith. pag. 278. hujus icon non satis accurata Tab. LXXVI. (fœmina).*

*Raj. Syn. Avi. pag. 141. N°. A. 3. (fœmina).*

Eider, Anas plumis mollissimis. *Mus. Worm. pag. 302.*

*Mus. Worm. pag. 310.*

Eider, Anas plumis mollissimis Wormii. *Willugh. Ornith. pag. 277. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.*

Avis inter Anserem & Anatem feram media. *Mus. Best. pag. 36. N°. 6. fœminæ icon pessima Tab. IX. N°. 6.*

Berg-Ente. *Klein. Avi. pag. 169. N°. IX.*

Canard à duvet. *Anderf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. pag. 90.*

*Anderf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. pag. 68.*



Grand Canard noir & blanc. *Edwards. Tom. II. pag. XCVIII; avec des figures exactes du mâle & de la femelle Pl. 98.*

Les Allemands l'appellent EYDER-ENTE. *Andersf.*

Les Suédois, AED; AEDA; EIDER; GUDUNGE. *Linn.*

Les Norvégeois, EDDER ou EDDER-FUGL.

Les Islandois, AEDDER ou AEDER-FUGL. *Andersf.*

Les Habitans de l'Isle Ferroë, EIDER. *Worm. EDER-VOGEL.*

Les Anglois appellent la femelle CUTBERT-DUCK. *Willugh. Raj.*

*Anseri Ægyptiaco* nonnihil crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem decem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quinque lineas longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata septem lineas; pes unum pollicem & septem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum octo lineis; extimus eadem longitudine pollet; intimus duos pollices & totidem lineas longus; posticus autem decem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & octo pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Summum caput nigro

Il n'est pas tout-à-fait si gros que l'Oye d'Egypte. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces cinq lignes de long; sa queue trois pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, sept lignes; son pied un pouce sept lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle; deux pouces huit lignes; l'extérieur est de la même longueur; l'intérieur a deux pouces deux lignes de long; & celui de derrière dix lignes. Il a deux pieds huit pouces de vol; & ses aîles lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est d'un noir de velours: cette couleur s'étend sur le demi-bec supérieur, & forme trois poin-



tes assez aiguës , dont une est placée au milieu & est la plus courte , & une autre de chaque côté qui s'étend presque jusqu'aux narines : ce même noir descend aussi sur l'occiput , & forme deux bandes assez larges , dont le bout est arrondi , & qui sont séparées l'une de l'autre par une bande blanche fort étroite. Au-dessous de ces bandes la partie supérieure du col est teinte d'un verd très-clair , & cela dans l'espace d'environ deux pouces. Les côtés de la tête , la gorge , le reste du col , le dos , les plumes scapulaires & les côtés du croupion sont blancs. Le haut de la poitrine est dans les uns d'un blanc tirant sur le fauve-vineux , & dans d'autres il est tout-à-fait blanc. Le bas de la poitrine , le ventre , les côtés , le haut des jambes , le milieu du croupion , & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un beau noir. Les plus petites couvertures du dessous des ailes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont blanches : les moyennes , & les grandes les plus éloignées du corps sont cendrées , & terminées de blanc. Le bord de l'aile , au-dessous du pli qui répond à celui du poignet , est couvert de petites plumes qui sont en

imbuitur colore , holoserici villosi instar splendente : qui color supra mandibulam superiorem protenditur , ibique tres efformat cuspides quarum una in medio posita & omnium brevissima , in utroque latere altera ferè ad nares usque producta : idem color niger per occipitium ducitur , & in eo binas efficit tænias latiusculas , extremitate rotundatas , quasque alteram ab altera distinguit strictissima tænia candida. Infra tænias istas partem colli superiorem per duorum circiter pollicum spatium tingit color dilutissimè viridis. Caput ad latera , guttur , reliquum collum , dorsum , pennæ scapulares & uropygii latera albicant. Summum pectus in aliis ex albo ad fulvo-vinaceum vergit , in alteris penitus albet. Imum pectus , ventrem , latera , crurum partem supremam , medium uropygium , tectricesque caudæ superiores & inferiores tingit color niger elegans. Tectrices alarum inferiores minimæ , sicut & majores corpori viciniore , sunt candidæ : mediæ , & majores à corpore remotiores cineræ , albo terminatæ. Alarum margines , infra articulum



ticulum carpo humano respondentem, cooperiunt plumula partim fusca partim candida. Tectrices alarum superiores minima & media alba sunt : majores à corpore remotiores nigricantes : majores medium locum obtinentes splendide nigra : majores corpori finitima candida. Alam componunt viginti septem remiges, quarum decem primores nigricant : decem proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in latere interiore eodem imbuta colore, in latere exteriori splendido nigro tincta : septem corpori viciniore candida ; ex istis tamen prior vigesima prima scilicet, nigro splendenti exterius marginatur. Quæ septem novissimè dicta remiges in acutissimum mucronem desinunt. Cauda sexdecim conflatur rectricibus nigricantibus ; utrinque tamen extrema albido terminatur, & scapo albo prædita est. Omnes autem rectrices in acumen desinunt. Binæ intermediae sunt longiores : laterales omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque duabus intermediis unius

partie brunes & en partie blanches. Les plus petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres : celles qui occupent le milieu, sont d'un noir brillant : & les plus proches du corps sont blanches. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les dix premières sont noirâtres : les dix suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont de la même couleur du côté intérieur, & d'un noir brillant du côté extérieur : les sept plus proches du corps sont blanches ; cependant la première de celles-ci, sçavoir la vingt - unième, est bordée extérieurement de noir brillant. Ces sept dernières plumes se terminent en une pointe très-aiguë. La queue est composée de seize plumes noirâtres ; la plus extérieure de chaque côté est cependant terminée de blanchâtre, & a sa tige blanche. Toutes ces plumes se terminent en pointe. Les deux du milieu sont les plus longues : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte que les deux du milieu d'un pouce cinq lignes. Le bec



est noirâtre, excepté son bout, qui s'éclaircit un peu. Les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirâtres.

La femelle est à peu près de la même grandeur & de la même grosseur que le mâle, mais elle en diffère beaucoup par sa couleur. La tête, la gorge & la partie du col qui est la plus voisine de la tête sont couvertes de plumes d'un brun-rouffâtre sur leurs bords, & noirâtres dans leur milieu selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent la partie du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine, les côtés & le haut des jambes, ainsi que les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue, sont d'un brun-rouffâtre marqué de taches transversales noirâtres. Le ventre est brun. Les plus petites & les moyennes couvertures du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont grises, quelques-unes étant variées d'un peu de blanchâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun. Les plus petites du dessus sont brunes, & bordées d'un gris-

pollicis & quinque linearum longitudine cedentem. Rostrum nigricat, nonnihil tamen in extremitate dilutius. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigricantes.

*Fœmina* magnitudine & crassitie cum *mare* circiter convenit; ab illo autem multum colore differt. Caput, guttur & partem colli capiti finitimam vestiunt pennæ ad margines fusco-rufescentes, in medio verò secundum ipsarum scapi longitudinem nigricantes. Quæ partem colli corpori viciniorum, dorsum, uropygium, pectus, latera & crurum partem supremam obtegunt, sicut & pennæ scapulares, tectricesque caudæ superiores & inferiores, ex fusco-rufescunt, & maculis transversis nigricantibus insigniuntur. Venter fusco tingitur colore. Tectrices alarum inferiores minimæ & mediæ, sicut & majores corpori viciniores, sunt griseæ, quibusdam paucis albido variegatis : majores à corpore remotiores cinereo-fusæ. Superiores minimæ fusæ, griseo-rufescente fimbriatæ : mediæ nigricantes, marginibus fusco-rufescentibus præditæ ;



maiores à corpore remotiores fusca : majores medium locum obtinentes eodem imbuta colore, sed candido terminata : majores corpori finitimæ nigricantes, fusco-rufescente marginata. Viginti septem remigibus ala conflatur : undecim primores fusca : novem proximè sequentes, à duodecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, concolores, albo in extremitate fimbriata, sed tantum in latere exteriori ; ex quo, & simul exteetricum alarum albedine, binæ in utraque ala fiunt exiguatæ transversæ candidæ : septem tandem remiges corpori finitimæ nigricantes, fusco-rufescente exteriori fimbriata. Caudæ rectrices fusca. Rostrum, pedes & digit, sicut & ipsorum membrana, unguisque eodem ac in mare colore imbuti.

In *Septentrionalibus* regionibus habitant. Quinque sexve ova ponunt in nido musco & ipsarum lanugine, ab ipsismet arreptâ, conflato. Pretiosè autem colligitur ista lanugo, quam gallicè *Ederdon* vocamus, & ex

rouffâtre : les moyennes sont noirâtres, & bordées d'un brun-rouffâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes : celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur, & terminées de blanc : & les plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de brun-rouffâtre. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les onze premières sont brunes : les neuf suivantes, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont de la même couleur, & bordées de blanc par le bout du côté extérieur seulement ; ce qui, avec le blanc des couvertures, forme sur chaque aile deux petites bandes transversales blanches : enfin les sept plus proches du corps sont noirâtres, & bordées extérieurement de brun-rouffâtre. Les plumes de la queue sont brunes. Le bec, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont de la même couleur que dans le mâle.

On les trouve dans les pays *Septentrionaux*. Ils pondent cinq à six œufs, qu'ils déposent sur un nid composé de mousse & de leur duvet, qu'ils s'arrachent eux-mêmes. On ramasse précieusement ce duvet, que nous appelons en françois *Ederdon*,



& l'on en fait des *couvre-pieds*. Il s'étend prodigieusement, & est extrêmement chaud. Si l'on enlève le nid avant que la femelle ait fini de couvrir, elle en fait un second, & y pond trois œufs; si ce second est encore enlevé, elle en fait un troisième, & n'y pond plus qu'un œuf. Le mâle & la femelle ont été envoyés de *Lauenmark* à *M. de Reaumur*.

illa *pedum tegumenta* conficiuntur. Maximum volumen acquirit, maximamque calorem producit. Si ante perfectam incubationem nidus arripiatur, *fœmina* alterum construit, ibique tria ova ponit; si secundus nidus iterum arripiatur, tertium adificat, & in eo ovum unicum ponit. *Mas* & *fœmina* à *Dania* in *museum Realmuriani* missi sunt.

#### 14. LA BERNACHE.

Anser superne niger, marginibus pennarum cinereis, infernè allus, cinereo mixtus, vertice & collo nigris; capite anteciente & gutture albis; taniâ utrinque rostrum inter & oculos nigricante; rectricibus nigris . . . BERNICLA.

Anser Brenta. *Klein. Avi. pag. 130. N°. 8.*

Anser arborum *Gesn. icon. Avi. pag. 86, in qua hujus icon pessima.*

Anser arboreus *Gesneri. Schwenck. Avi. Sil. pag. 213.*

Anser arboreus *Gesneri, Anas arborea Schwenckfeldii. Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 359.*

Bernicla. *Charlét. Exer. pag. 103. N°. 4.*

*Charlét. Onomast. pag. 98. N°. 4.*

Bernicla seu Bernacla. *Raj. Syn. Avi. pag. 137. N°. A. 5.*

Bernicla sive Bernacla. *Willugh. Ornith. pag. 274.*

Bernicla sive Bernacla, or Clakis. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.*

Bernicla vel Branta Anglorum. *Gesn. icon. Avi. pag. 135, in qua hujus icon non satis accurata.*

Branta vel Bernicla. *Gesn. Avi. pag. 109. eadem icon pag. 110. Gesn. Avi. pag. 805.*

Branta seu Bernicla. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 165. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 167.*

Branta seu Berniclâ & Bernichia. *Jonst. Avi. pag. 94.*

Bernicula *Linn. Systh. Nat. ed 6. Gen. 43. sp. 6.*

Bernacle. *Clus. Exot. Austuar. pag. 368.*

Anas capite colloque nigris. *Faun. Suec. Linn. N°. 91.*



*Anas fusca*, capite, collo, pectoreque nigris, collari albo. Bernicla.

*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 11.*

Baum-Gansz. *Gesn. Avi. pag. 112. hujus icon pessima. pag. 111.*

Rott-Gans. *Klein. Avi. pag. 170. N°. XII.*

Clakis. *Gesn. Avi. pag. 112, in qua maris & feminae icones pessimæ.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 166. icones à Gesnero mutuatae, maris pag. 169-, & feminae pag. 170.*

Oye nonnette ou Cravant. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 158; avec une mauvaise figure pag. 159.*

Oye nonnette, Cravant. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 31 b, dans laquelle est la même figure.*

Les Allemands l'appellent BAUM-GANSS. *Gesn. Aldrov. BAUM-GANS. Schwenck, Rzac. BAUM ENDTLE. Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, BAUM-GANSZ. *Gesn.*

Les Polonois, GES; KACZKA DRZEWNA. *Rzac.*

Les Ecoissois, CLAKIS. *Gesn. Aldrov. Clus. CLAK-GUSE. Jonst.*

Les Habitans des Orcades, ROD-GANS. *Clus.*

Les Anglois, BERNACLE. *Aldrov. Clus. Willugh. Raj. Charlet. CLAKIS. Willugh. Raj. CLAKE-GUSE; SCOTCH-GOOSE. Charlet.*

*Anseri domestico* multum crassitie cedit. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem & extremos ungues duos pedes & quinque circiter pollices æquat. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque sexdecim circiter lineas longum est. Caput antérieur & guttur albescent; attamen in utroque capitis latere tænia extat nigricans, rostrum inter & oculum posita. Reliquum caput, collique tota longitudo nigro tinguntur colore. Pennæ dorsum vestientes, sicut & scapulares, sunt nigrae, cinereo marginatae. Quæ uropygium obte-

Elle est beaucoup plus petite que l'Oye domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue & celui des ongles est d'environ deux pieds cinq pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a environ seize lignes de long. La partie antérieure de la tête & la gorge sont blanches; il y a cependant de chaque côté de la tête une bande noirâtre, placée entre le bec & l'œil. Le reste de la tête, & le col dans toute sa longueur sont noirs. Les plumes qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont noires, & bordées de cendré. Celles qui couvrent le crou-



pion, sont noires & sans bordure. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc mêlé d'un peu de cendré; cependant parmi les plumes qui couvrent le haut des jambes, les plus inférieures sont noires. Les couvertures du dessus des ailes sont cendrées à leur origine, ensuite noires, & enfin bordées de blanc par le bout. Les plumes de l'aile sont d'un cendré-noirâtre. La queue est composée de plumes noires. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont bruns; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les bords de la mer.

gunt, similiter nigræ; sed marginibus destitutæ. Superiores caudæ rectrices candidæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus cooperientes albicant, & aliquid cinerei admixtum habent; ex pennis tamen crurum partem supremam vestientibus, infimæ sunt nigræ. Superiores alarum rectrices in exortu cinereæ, deinde nigræ, & tandem albo in apice fimbriatæ. Alarum remiges sunt cinereo-nigricantes. Cauda rectricibus conflatur nigris. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipforum membranæ, fusci; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora versatur,

#### 15. LA PETITE BERNACHE.

Anser superne obscurè cinereus, marginibus pennarum albidis, infernè albus; vertice & collo superiore nigricantibus; capite anteriore & gutture fulvis; collo inferiore & pectore fuscis; uropygio candido; rectricibus intermediis nigris, utrinque extimis albis . . . . BERNICLA MINOR.

Anser Brenta. *Klein. Avi. pag. 130. N<sup>o</sup>. 8.*



*Brentus. Gesn. Avi. pag. 109.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 248.*

*Jonst. Avi. pag. 90.*

*Willugh. Ornith. pag. 276. hujus icon satis accurata Tab. LXXVI, sub titulo, Brenta seu Bernicla minor.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 137. N<sup>o</sup>. A. 7.*

*An Anser sive Anas montana Spitzbergenfis Friderici Martensii. Raj.*

*Syn. Avi. pag. 139. N<sup>o</sup>. 11.*

*Oye de Canada. Alb. Tom. I. pag. 80; avec une figure mal coloriée Pl. 92.*

*Les Grecs l'appellent Βρεντος. Gesn. Aldrov.*

*Les Anglois, RAT-GOOSE ou ROAD-GOOSE. Willugh. Raj.*

A præcedente multum crassitie superatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos circiter pedes explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum trium pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput anterius & guttur tingit color fulvus. Vertex capitis & pars colli superior nigricant. Pennæ dorsum vestientes, sicut & scapulares, sunt obscurè cineræ, albido marginatæ. Pars colli inferior & pectus fusco zinguntur. Venter, latera, crurum suprema pars, uropygium, & pennæ caudam superne & infernè cooperientes eleganter albicant. Superiores alarum teatrices pen- nis dorsum vestientibus con-

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long. Elle a quatre pieds trois pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête & la gorge sont fauves. Le sommet de la tête & la partie supérieure du col sont noirâtres. Les plumes qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un cendré obscur, & bordées de blanchâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont brunes. Le ventre, les côtés, le haut des jambes, le croupion, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que



les plumes du dos. Les plumes de l'aile sont noires. Celles du milieu de la queue sont de la même couleur : quelques-unes des plus extérieures de chaque côté sont blanches. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. On la trouve sur les bords de la mer & à l'embouchure des rivières.

colores. Alarum remiges nigra. Caudæ rectrices intermediae eodem imbutæ colore : ex utrinque extimis quædam candidæ. Oculorum irides avellanæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, digitus, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigri. Juxta maris littora versatur, & fluminum ostia frequentat.

\*\* 16. LE CRAVANT.

Voyez Pl. XXXI.

Anser cinereo-fuscus, pennis griseo in apice marginatis; capite, collo & pectore supremo nigricantibus, collo ad latera albo variegato; imo ventre candido; rectricibus binis intermediis cinereo-nigricantibus, lateralibus nigricantibus . . . . BRENTA.

Anser Brenta. Klein. Avi. pag. 130. N<sup>o</sup>. 8.

Brenta. Willugh. Ornith. pag. 275. hujus icon non satis accurata Tab. LXIX.

Raj. Syn. Avi. pag. 137. N<sup>o</sup>. A. 6.

Branta. Charlet. Exer. pag. 103. N<sup>o</sup>. 3.

Charlet. Onomast. pag. 98. N<sup>o</sup>. 3.

Bernicla authoris. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 166. hujus icon non satis accurata pag. 168.

Bernicla, Brenta. Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48.

Bernicula. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 6.

Anas capite colloque nigris. Faun. Suec. Linn. N<sup>o</sup>. 91.

Anas fulca, capite, collo, pectoreque nigris, collari albo. Bernicla. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 11.

Anas torquata Bellonii. Jonst. Avi. pag. 97.

Anas torquata Bellonii, Cane de mer gallicé dicta. Aldrov. Avi. Tom III. pag. 213. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 214.

Glaucius



*Glaucius. Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 156.*

*Νηττα περιζωμενα Aristophanis. Bel. Aldrov.*

Oye de Brenta. *Alb. Tom. I. pag. 80 ; avec une figure mal coloriée Pl. 93.*

Cane de mer. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 166 ; avec une mauvaise figure pag. 167.*

Cane au colier blanc, Cane de mer. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 34 a , dans laquelle est la même figure.*

*Les Italiens l'appellent CASON. Bel.*

*Les Flamands , RAT-GANS ou ROT-GANS. Linn.*

*Les Anglois , BRENT-GOOSE. Willugh. Raj. BRAND-GOOSE. Charlet.*

Cum *Anate moschata* craf-  
sitie circiter convenit. Ipsi-  
us longitudo ab apice rostri ad  
caudam extremam unum pe-  
dem undecim pollices & sep-  
tem lineas æquat , & ad ex-  
tremos ungues unum pedem  
decem pollices & sex lineas.  
Rostrum ab ipsius extremi-  
tate ad oris angulos usque  
octodecim lineas longum est ;  
cauda quatuor pollices cum  
sex lineis ; pars crurum plu-  
mis denudata octo lineas ;  
pes unum pollicem & unde-  
cim lineas ; trium digitorum  
anticorum medius cum un-  
gue duos pollices cum linea  
unica , extimus viginti tres  
lineas , intimus unum polli-  
cem & septem cum semi li-  
neas ; posticus autem sex li-  
neas. Alis expansis , extre-  
mitates majorum remigum  
trium pedum & quinque pol-  
licum intervallo distant ; alæ  
verò complicatæ nonnihil ul-  
tra tres quartas longitudinis

Il est à peu près de la gros-  
seur du *Canard musqué*. Sa lon-  
gueur depuis le bout du bec  
jusqu'à celui de la queue est  
d'un pied onze pouces sept lig-  
nes , & jusqu'à celui des on-  
gles d'un pied dix pouces six  
lignes. Son bec depuis son bout  
jusqu'aux coins de la bouche a  
dix-huit lignes de long ; sa  
queue quatre pouces six lignes ;  
la partie de ses jambes qui est  
dégarnie de plumes , huit lig-  
nes ; son pied un pouce onze  
lignes ; celui du milieu des trois  
doigts antérieurs , joint avec  
l'ongle , deux pouces une lig-  
ne , l'extérieur vingt-trois lig-  
nes , l'intérieur un pouce sept  
lignes & demie ; & celui de  
derrière six lignes. Il a trois  
pieds cinq pouces de vol ; &  
ses ailes , lorsqu'elles sont  
pliées , s'étendent un peu au-  
delà des trois quarts de la lon-  
gueur de la queue. La tête , la  
gorge , le col & le haut de la  
poitrine sont noirâtres. Chaque



côté du col, vers la tête, est varié de taches blanches; c'est-à-dire, que le bout de chaque plume est blanc, & terminé de noirâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, le bas de la poitrine, le haut du ventre & le haut des jambes sont d'un cendré-brun, le bout de chaque plume étant bordé de gris. Les plumes qui couvrent les côtés, sont pareillement d'un cendré-brun, mais leur bout est bordé de blanchâtre. Le bas-ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Parmi celles du dessus, celles du milieu sont d'un cendré-brun; les latérales sont blanches. Toutes les couvertures du dessus & du dessous des ailes sont entièrement d'un cendré-brun. L'aile est composée de vingt-sept plumes noirâtres en-dessus, & cendrées en-dessous. La seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de dix-huit plumes: les deux du milieu sont d'un cendré-noirâtre: toutes les latérales sont noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette.

caudæ partes extenduntur. Caput, guttur, collum & pectus supremum nigricant. Utrumque colli latus, scilicet versus caput, variegant maculæ albæ; quælibet scilicet penna est apice alba, nigricante terminata. Pennæ dorsum, uropygium, imum pectus, ventrem supremum, crurumque supremam partem vestientes, sicut & scapulares, sunt cinereo-fusæ, griseo in apice marginatæ. Quæ latera cooperiunt, sunt simili cinereo-fusco imbutæ, sed albido in apice marginantur. Venter imus candidus. Pennæ caudam subtus obtegentes concolores. Ex rectricibus caudæ superioribus, intermediæ sunt cinereo-fusæ; laterales candidæ. Omnes alarum rectrices superiores & inferiores penitus cinereo-fusæ. Alarum component viginti septem remiges superne nigricantes, inferne cinereæ, quarum secunda reliquas omnes longitudine superat. Octodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ ex cinereo nigricant: laterales omnes sunt nigricantes. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim





de Canada.









Desiné et Gravé par Martinet.

*Oye Sauvage de Canada.*


















*Oye d'Egipte.*

















Dessiné et Gravé par Martinet.

*Cigne Sauvage.*









*duvet ou Eider, mâle.*









Desiné et Gravé par Martinet.

*Oye à duvet ou Eider, mâle.*










*duvet ou Eider, femelle .*










Desiné et Gravé par Martinet.

*Oye à duvet ou Eider, femelle .*









ant.









Designé et Gravé par Martinet.

*Crawant.*







LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIV.* 307

longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque sunt fusco-nigricantes, nonnihil ad obscurè rubescentem colorem vergentes. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont d'un brun-noirâtre tirant tant soit peu sur le rougeâtre obscur. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

CVII.

*Genus Anatinum.*

Hujus character est  
Digiti quatuor, tres scilicet antiqui membranis integris inter se connexi, posticus solutus :

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora :

Rostrum, *limæ instar*, denticulatum, superne convexum, infernè planiusculum, ipsius latitudo crassitiem superans ; ipsius apex unguiculatus, obtusus.

Omnium hujus generis Avium digitus intimus per totam lateris interioris longitudinem membranulâ do-

CVII.

*Genre du Canard.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé :

Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

Le bec dentelé *comme une lime*, convexe en-dessus & applati en-dessous, plus large qu'épais ; ayant le bout onguiculé & obtus.

Tous les Oiseaux de ce genre ont une petite membrane tout le long du côté intérieur du doigt intérieur. Ils ont aussi la



partie inférieure des jambes dé-  
garnie de plumes.

natur. Ipsarum crurum pars  
infima plumis est denudata.

**\*\* I. LE CANARD DOMESTIQUE.**

*Anas versicolor*; rostro recto; reſtricibus quatuor intermediis  
in mare ſurſum reflexis . . . . *ANAS DOMESTICA.*

*Anas versicolor*, cauda brevi, acuta, ſurſum reflexa. *Barr. Ornith.*  
*Claff. I. Gen. I. ſp. 1.*

*Anas* caudæ reſtricibus intermediis recurvis. *Faun. Succ. Linn. N°. 97.*

*Anas* reſtricibus intermediis (maris) recurvatis, roſtro recto. *Anas*  
*domestica. Linn. Syſth. Nat. ed. 10. Gen. 61. ſp. 34. var. 1.*

*Anas. Gefn. icon. Avi. pag. 73, in qua hujus icon non ſatis accurata.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 174.*

*Rzac. Hiſt. Nat. Pol. pag. 300.*

*Moehr. Avi. Gen. 61.*

*Anas cicur. Gefn. Avi. pag. 96, in qua hujus icon non ſatis accurata.*

*Anas domestica. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 188. icones non ſatis accu-  
ratae, maris pag. 189, & pulli pag. 188.*

*Schwenck. Avi. Sil. pag. 195.*

*Jonſt. Avi. pag. 95. hujus duæ icones Tab. 49, una non ſatis accurata,  
ſub titulo, Anas; & altera ab Aldrovando mutuata, ſub titulo,  
Anas domesticus.*

*Charlet. Exer. pag. 104. N°. 1.*

*Charlet. Onomart. pag. 99. N°. 1.*

*Proſp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.*

*Anas domestica vulgaris. Willugh. Ornith. pag. 293. hujus icon minùs  
accurata Tab. LXXV.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 150. N°. 1.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 191. N°. 10.*

*Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 323. N°. VII.*

*Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 21.*

*Kl in. Avi. pag. 131. N°. 1.*

*Anas domestica variè variegata, pennis uropygii ſurſum recurvis.*

*Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag. 480.*

*Anas aurantia, Turcica quibuſdam dicta. Marſil. Danub. Tom. V.  
pag. 112. hujus icon non ſatis accurata Tab. 54.*

*Boſchas. Linn. Syſth. Nat. ed. 6. Gen. 48. ſp. 17.*

*Canard, Cane. Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag. 160, dans laquelle eſt une  
mauvaiſe figure.*

*Bel. Portr. d'Oiſ. pag. 32 a, dans laquelle eſt la même figure.*



Canard de Madagascar. *Alb. Tom. III. pag. 41; avec une figure mal coloriée Pl. 99.*

Les François appellent le mâle CANARD; la femelle, CANE; & le jeune, CANETON.

Les Grecs, Νῆσσα. *Bel. Gesn. Jonst. Willugh. Charlet. Νῆσσα χαρτοκίστες. Gesn. Νῆσσα. Aldrov. Schwenck. Νῆσσα. Bel. Aldrov. Schwenck. Jonst. Willugh. Charlet. Νῆσσα οἰκιστὴς; Νῆσσα ματοκίστες. Aldrov. Jonst.*

Les Grecs modernes, Χλωα; & d'autres Πανίζα. *Aldrov. Jonst. Πανίζα. Schwenck.*

Les Portugais, ADEN. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols, ANADE. *Gesn. Aldrov. ANADE DE CALLE. Aldrov.*

Les Catalans, ANECH. *Barr.*

Les Italiens, ANATRE. *Bel. Gesn. ANADRA; ANITRA. Bel. Gesn. Aldrov. ANITRA DOMESTICA; ANIDRA. Aldrov.*

Les Habitans de Parme, SASSA. *Aldrov.*

Les Génois, ANIA. *Aldrov.*

Les Allemands, ENT; ENDT; ANT; ANT-VOGEL. *Gesn. Aldrov. HAUS-ENDT. Aldrov. HAUS-ENDTE; ZAM ENDTE. Schwenck. Ils appellent le mâle ENTRICH; ENTRACH. Gesn. Aldrov. ENDTRACH; & la femelle ENDTE. Schwenck.*

Les Silésiens, RAETSCH; HATSCH. *Schwenck.*

Les Illyriens, KACZIER. *Gesn. KÆCZIER. Aldrov.*

Les Polonois, KACZKA. *Gesn. Aldrov. Rzac.*

Les Suédois, ANCKA. *Linn.*

Les Hollandois, le mâle, WOORDT ou WAERDT; & la femelle EENDT. *Aldrov.*

Les Flamands, AENTE ou AENDE. *Gesn. Aldrov. TAMME END-VOGEL. Aldrov.*

Les Anglois, DUCK. *Gesn. Aldrov. Browne. COMMON TAME DUCK. Willugh. Raj. Sloane. Charlet.*

Les Indiens Orientaux, BEBE. *Aldrov.*

Ad *Gallinæ* crassitiem accedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem novem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos

Il approche de la grosseur d'une Poule. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue



trois pouces trois lignes ; la partie de ses jambes qui est dégar-  
nie de plumes , huit lignes ;  
son pied un pouce neuf lignes ;  
celui du milieu des trois doigts  
antérieurs , joint avec l'ongle ,  
deux pouces six lignes , l'exté-  
rieur deux pouces cinq lignes ,  
l'intérieur deux pouces ; & ce-  
lui de derriere huit lignes. Il a  
deux pieds dix pouces trois lig-  
nes de vol , & ses ailes , lorf-  
qu'elles font pliées , s'étendent  
environ jusqu'à la moitié de la  
longueur de la queue. Il varie  
en couleur , comme tous les au-  
tres Oiseaux domestiques. Les  
uns font variés de même & des  
mêmes couleurs que les *Canards sauvages* : d'autres font  
variés de noir & de blanc : d'au-  
tres font entièrement blancs ,  
&c. La queue est composée de  
vingt plumes , dont les quatre  
du milieu font recourbées cir-  
culairement en en-haut. Tou-  
tes les plumes de la queue se  
terminent en pointe : celles du  
milieu font un peu plus lon-  
gues que les latérales , qui vont  
toutes en diminuant de lon-  
gueur par degrés jusqu'à la plus  
extérieure de chaque côté , qui  
est la plus courte ; ce qui rend  
le bout de la queue pointu. Le  
bec est verdâtre dans les uns ,  
& noirâtre dans d'autres. La  
partie des jambes qui est dé-

pollices & sex lineas longum  
est ; cauda tres pollices &  
toridem lineas ; pars cru-  
rum plumis denudata octo  
lineas ; pes unum pollicem  
cum novem lineis ; trium  
digitorum anticorum medius  
cum ungue duos pollices  
& sex lineas , extimus duos  
pollices cum quinque lineis ,  
intimus duos pollices ; pos-  
ticus autem octo lineas. Alis  
expansis , extremitates ma-  
jorum remigum duorum pe-  
dum decem pollicum &  
trium linearum intervallo  
distant ; alæ verò complica-  
tæ mediam circiter caudæ  
longitudinem attingunt. Re-  
liquarum omnium domesti-  
carum Avium instar , co-  
lore variat. Aliæ enim iis-  
dem coloribus & simili mo-  
do variegantur ac *Boscades* :  
aliæ albo & nigro sunt va-  
riegatæ : aliæ penitus candi-  
dæ , &c. Caudam compo-  
nunt viginti rectrices , qua-  
rum quatuor intermediae sur-  
sum circulariter reflectun-  
tur. Omnes autem rectrices  
in acumen desinunt : inter-  
mediae lateralium longitu-  
dinem nonnihil antecellunt ;  
laterales autem gradatim  
longitudine minuuntur ad  
utrinque extimam usque bre-  
viorum ; unde fit cauda ex-



tremitate acuta. Rostrum in aliis viridescens, in alteris nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubro-aurantii; ungues verò nigricantes.

*Fœmina* magnitudine paululum *maris* cedit. Illius instar, colore variat. Ab illo solummodo differt quatuor caudæ reëtricibus intermediis nequaquam sursum reflexis.

*Ex museo Realmuriano.*

garnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge-orangé; & les ongles noirâtres.

La femelle est un peu plus petite que le mâle. Elle varie en couleur, comme lui. Elle en diffère seulement en ce que les quatre plumes du milieu de sa queue ne sont pas recourbées en en-haut.

*Du cabinet de M. de Reaumur.*

\*\* 2. LE CANARD A BEC COURBÉ.

*Anas versicolor*; rostro incurvato; reëtricibus quatuor intermediis in mare rursùm reflexis . . . . *ANAS ROSTRO INCURVO.*

*Anas reëtricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro incurvato.*

*Anas adunca. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 35.*

*Anas adunco rostro. Klein. Avi. pag. 133. N°. 17.*

*Anas rostro adunco. Willugh. Ornith. pag. 294. hujus icon non satis accurata Tab. LXXV.*

*Anas domestica rostro adunco. Raj. Syn. Avi. pag. 150. N°. 2.*

Canard à bec crochu. *Alb. Tom. II. pag 61; avec des figures mal coloriées, du mâle Pl. 97, & de la femelle Pl. 96.*

Canard à tête élevée. *Alb. Tom. III. pag. 42; avec une figure mal coloriée Pl. 100. (c'est un Bâtard de cette espece).*

*Les Anglois l'appellent HOOK BILL'D DUCK. Willugh. Raj.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes explet, & ad extre-

Il est à peu près de la même grosseur que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds, & jusqu'à celui



des ongles de vingt-quatre pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces neuf lignes de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégar- nie de plumes, sept lignes; son pied un pouce neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'exté- rieur deux pouces cinq lignes, l'intérieur deux pouces; & ce- lui de derrière sept lignes & demie. Il a deux pieds onze pou- ces de vol; & ses aîles, lorf- qu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Il varie en couleur, comme le précé- dent; il en diffère seulement en ce que son bec est un peu plus allongé & recourbé en en-bas. Sa queue est composée de vingt plumes, dont les quatre du milieu sont recourbées cir- culairement en en-haut. Toutes les plumes de la queue se termi- nent en pointe: celles du mi- lieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont tou- tes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus exté- rieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue pointu. Les uns ont le bec verdâtre: d'au-

mos ungues viginti quatuor pollices & tres lineas. Ros- trum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices & novem lineas longum est; cauda tres pol- lices & sex lineas; pars cru- rum plumis denudata sep- tem lineas; pes unum pol- licem cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pol- lices & sex lineas, extimus duos pollices cum quinque lineis, intimus duos pol- lices; posticus autem sep- tem cum semi lineas. Ab ex- tremo ad extremum alarum extensarum distantia est duo- rum pedum & undecim pol- licum; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. Præcedentis instar, colore va- riat; ab illa solummodo dif- crepat rostro paulò magis elongato, deorsum incurva- to. Cauda viginti constat rec- tricibus, quarum quatuor in- termediæ sursum circulariter reflectuntur. Omnes autem rectrices in acumen desi- nunt: intermediæ lateralium longitudinem nonnihil exce- dunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine mi- nuuntur ad utrinque exti- mam usque breviorē; unde  
fit



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIV.* 313

fit cauda extremitate acuta. In aliis rostrum viridescit: in aliis flavicat; in alteris nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, aurantii; ungues verò nigricantes.

*Fœmina* magnitudine paululùm *mari* cedit. Illius instar, colore variat. Ab illo solummodo differt quatuor caudæ rectricibus intermediis nequaquam sursum reflexis.

*Ex museo Realmuriano.*

tres l'ont jaunâtre; & d'autres noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont orangés; & les ongles noirâtres.

La *femelle* est un peu plus petite que le *mâle*. Elle varie en couleur, comme lui. Elle en diffère seulement en ce que les quatre plumes du milieu de sa queue ne sont pas recourbées en en-haut.

*Du cabinet de M. de Reaumur.*

\*\* 3. LE CANARD MUSQUÉ.

*Anas versicolor* capite papilloso . . . . *ANAS MOSCHATA.*

*Anas facie nuda papillosa. Faun. Suec. Linn. N°. 98.*

*Anas facie nuda papillosa. Anas moschata. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 13.*

*Anas maxima, capite cera interrupta obducto. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 480.*

*Anas moschata. Willugh. Ornith. pag. 294. hujus icon non satis accurata Tab. LXXV.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 150. N°. 3.*

*Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 324. N°. VIII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 191. N°. 11.*

*Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 11.*

*Anas Americana moschata. Barr. Ornith. Class. I. Gen. I. sp. 14.*

*Anas moscata Cairina Aldrovandi. Marsil. Danub. Tom. V. mas pag. 116, & femina pag. 118. icones satis accuratæ, maris Tab. 56, & femina Tab. 57.*

*Anas Cairina. Aldrov. Avi. Tom III. pag. 199. icones minus accuratæ, maris pag. 200, & femina pag. 201.*

*Jonst. Avi. pag. 96. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 49.*

*Charlet. Exer. pag. 104. N°. 5.*

*Charlet. Onomazt. pag. 99. N°. 5.*

*Tom. VI.*

R r



*Anas Cairina Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 294.*

*Anas peregrina. Schwenck. Avi. Sil. pag. 196.*

*Anas Mulcovitica. Charlet. Exer. pag. 104. N<sup>o</sup>. 4.*

*Charlet. Onomazt. pag. 99. N<sup>o</sup>. 4.*

*Anas Indica. Gesn. Avi. pag. 122, in qua maris icon non satis accurata.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 73, in qua maris eadem icon.*

*Gesn. Avi. pag. 803, in qua hujus icon pessima.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 192. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 193.*

*Charlet. Exer. pag. 104. N<sup>o</sup>. 2.*

*Charlet. Onomazt. pag. 99. N<sup>o</sup>. 2.*

*Anas Indica Gesneri. Klein. Avi. pag. 131. N<sup>o</sup>. 2.*

*Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 123.*

*Anas Indica Gesneri, Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 295.*

*Anas Indica prima. Jonst. Avi. pag. 96. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 49.*

*Anatis Indicæ rara quædam species. Gesn. icon. Avi. pag. 133, in qua hujus icon pessima.*

*Anas Indica alia. Gesn. Avi. pag. 803. hujus icon non satis accurata pag. 804.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 134, in qua eadem icon.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 192. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 194.*

*Anas Indica altera. Jonst. Avi. pag. 96.*

*Anas Indica tertia. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 192. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 195.*

*Jonst. Avi. pag. 96.*

*Anas Lybica. Jonst. Avi. pag. 96. hujus icon à Bellonio mutuata Tab. 49.*

*Charlet. Exer. pag. 104. N<sup>o</sup>. 3.*

*Charlet. Onomazt. pag. 99. N<sup>o</sup>. 3.*

*Anas Lybica Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 196. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 197.*

*Anas Lybica alia. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 196. femina icon non satis accurata pag. 198.*

*Anas Lybica Aldrovandi. Jonst. Avi. pag. 96.*

*Anas Lybica Aldrovandi, Bellonii. Willugh. Ornith. pag. 294.*

*Anas sylvestris magnitudine Anseris. Marcgr. Hist. Br. pag. 213.*

*Jonst. Avi. pag. 146.*

*Anas sylvestris Brasiliensis magnitudine Anseris Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 292.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 148. N<sup>o</sup>. 1.*

*Anas sylvestris Brasiliensis Apeca Apoa dicta. Raj. Syn. Avi. pag. 148. N<sup>o</sup>. 2.*

*Anas sylvestris Brasiliensibus Ipecati Apoa dicta Marggravii. Willugh. Ornith. pag. 292. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LXXV.*



*Ipecati Apoa. Pison. Hist. Nat. pag. 82, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

*Ipecati Apoa Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 218, in qua hujus icon pessima.*

*Jonst. Avi. pag. 149. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 60.*

*Ipeca-Guacu. Pison. Hist. Nat. pag. 83, in qua hujus icon non satis accurata.*

*Ipeca-Guacu Brasiliensium Pisoni. Willugh. Ornith. pag. 292. hujus icon à Pisoni mutuata Tab. LXII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 149. N<sup>o</sup>. 3.*

*An Espece de Poule d'eau, ou Fulica varia calyptrata ? Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 392. (ed. 1725).*

*Canard de Moscovie. Alb Tom. III. pag. 41 ; avec des figures mauvaises & mal coloriées, Pl. 97 & 98.*

*Grosse Cane de la Guinée. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 176, dans laquelle est une très-mauvaise figure.*

*Cane de la Guinée. Bel. Portr. d'Ois. pag. 37 a, dans laquelle est la même figure.*

*Les François de la Guiane l'appellent CANARD FRANC. Barr.*

*Les Grecs Νήτα λεβίη. Bel.*

*Les Portugais, PATA. Marcgr. Jonst. Willugh.*

*Les Italiens, ANATRE D'INDIA. Gesn. ANATRE DEL LYBIA. Bel.*

*Les Allemands, ENDIANISCHER ENTRACH. Gesn. INDIANISCHER ENTRACH ; TEURCKISCH ENDTE ; FREMBDE ENDTE. Schwenck.*

*Les Anglois, GUINY-DUCK. Willugh. MUSCOVY-DUCK. Raj. Sloane. MUSCOVIAN-DUCK ; INDIAN-DUCK ; AFRICAN-DUCK ; EGYPTIAN-DUCK. Charlet.*

*Les Anglois de la Jamaïque, MUSCOVITE DUCK. Browne.*

*Les Brasiiliens, IPECATI APOA. Marcgr. Jonst. Willugh. IPECA-GUACU. Pison. Willugh. Raj.*

*Crassitie Anatem domesticam multum antecellit. Ipsi-  
us longitudo à rostri apice  
ad caudæ extremitatem duos  
pedes & sesquipollicem æ-  
quat, & ad extremos ungues  
unum pedem decem pollices  
& novem lineas. Rostrum ab  
ipsius apice ad oris angulos  
usque duos pollices longum  
est ; cauda sex pollices &*

*Il est beaucoup plus gros que  
le Canard domestique. Sa lon-  
gueur depuis le bout du bec  
jusqu'à celui de la queue est de  
deux pieds un pouce six lignes,  
& jusqu'à celui des ongles d'un  
pied dix pouces neuf lignes. Son  
bec depuis son bout jusqu'aux  
coins de la bouche a deux pou-  
ces de long ; sa queue six pou-  
ces quatre lignes ; la partie de*



ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied un pouce sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces; & celui de derrière dix lignes seulement. Il a deux pieds onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Le sommet de la tête & le dessus du col sont noirâtres. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col sont blancs, & variés de taches noirâtres. La partie du col la plus voisine du corps, la poitrine, les côtés, le bas-ventre & le haut des jambes sont d'un brun brillant, & mêlé d'un peu de blanc. Le dos, le croupion & les petites couvertures du dessus de la queue sont d'un brun changeant en verd-doré & en couleur de cuivre de rosette. Les grandes couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un verd-doré changeant de même en couleur de cuivre de rosette. Le haut du ventre est blanc. Les couvertures du dessous de la queue, toutes celles du dessous des ailes, les petites &

quatuor lineas; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes unum pollicem cum septem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis, intimus duos pollices; posticus autem decem tantum lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & undecim pollicum; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protrahuntur. Summum caput & pars colli superior nigricant. Caput ad latera; guttur, collumque inferius & ad latera albicant, & maculis nigricantibus variegantur. Pars colli corpori finitima, pectus, latera, venter imus & crurum pars suprema fusco tinguntur splendido, & aliquid albi admixtum habent. Dorsum; uropygium, superioresque caudæ tectrices minores fusca sunt, viridi-aureo & cupri puri colore variantes. Tectrices caudæ superiores majores & scapulares pennæ viridi-aureæ, cupri puri colore similiter variantes. Venter supremus albus. Pennæ caudam subtus obtegentes,



testrices alarum inferiores omnes, sicut & superiores minimæ & mediæ similiter candidæ : ex majoribus à corpore remotioribus aliæ albæ, alteræ fusco-nigræ. Alarum componunt viginti quinque remiges : tres primores candidæ : novem proximè sequentes, à quarta scilicet ad duodecimam usque inclusive, fusco-nigræ : reliquæ omnes in latere exteriori & apice viridi-aureæ, in latere interiore fuscæ. Remiges corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda viginti constat rectricibus, quarum octodecim intermediae sunt viridi-aureæ : utrinque extrema candida. Intermediae lateralium longitudinem paululum superant ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevioribus ; unde fit cauda extremitate acuta. Oculos circumdat cutis nuda, exiguis papillis carnis coccineis, punctulis candidis aspersis, obsita. Rostrum coccineum, excepto mandibulæ superioris exortu circa nares fusco, sicut & unguiculo

les moyennes du dessus sont de la même couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont les unes blanches & les autres d'un brun-noirâtre. L'aile est composée de vingt-cinq plumes : les trois premières sont blanches : les neuf suivantes, sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la douzième inclusive, sont d'un brun-noirâtre : toutes les autres sont d'un verd-doré du côté extérieur & à leur bout, & brunes du côté intérieur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de vingt plumes : les dix-huit du milieu sont d'un verd-doré : la plus extérieure de chaque côté est blanche. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. Les yeux sont entourés d'une peau nue, garnie de petits mammelons charnus d'un rouge très-vif, & marqués de petits points blancs. Le bec est d'un rouge-vif, si l'on en excepte l'origine du demi-bec supérieur tout autour



des narines, qui est brune, ainsi que l'onglet du bout du bec. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs mem-branes, sont rouges; & les on-gles blanchâtres.

La femelle est beaucoup plus petite que le mâle: elle en dif-fère aussi par ses couleurs. En général ces Oiseaux varient au-tant en couleur que nos Canards domestiques.

Du cabinet de M. de Reau-mur.

in extremitate rostri posito: Pars crurum plumis denuda-ta, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri; ungues verò candicantes.

*Fœmina* magnitudine mul-tum mari cedit: ab illo quoque coloribus discrepat. Præterea Aves istæ non mi-nus colore variant quàm *Anates domesticæ nostrates.*

*Ex museo Realmuriano.*

#### \*\* 4. LE CANARD SAUVAGE.

*Anas cinereo-albo & cinereo-fusco transversim & undatim striata; capite & collo supremo viridi-aureis, violaceo colore variantibus; torque albo; pectore saturatè castaneo; uropygio nigro-viridescente; macula alarum viridi-viola-cea, taniâ primùm nigrâ dein albâ utrinque donata; rec-tricibus quatuor intermediis nigro-virescentibus, sursum reflexis. (Mas).*

*Anas superne fusca, marginibus pennarum rufescentibus, in-fernè dilutè fulva, fusco maculata; gutture rufescente; macula alarum viridi-violacea, taniâ primùm nigrâ dein albâ utrinque donata; rectricibus albo-rufescentibus, tæ-niis obliquis cinereo-fuscis insignitis. (Fœmina) . . . .*

**ANAS FERA.**

*Anas caudæ rectricibus intermediis recurvis. Faun. Suec. Linn. N°. 97:*

*Anas rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto. Boschas.*

*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 34.*

*Anas fera. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 202.*

*Charlet. Exer. pag. 104. N°. 6.*

*Charlet. Onomazt. pag. 99. N°. 6.*

*Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 269.*

*Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 355.*



Anas fera torquata minor. *Gesn. Avi. pag. 113. hujus icon non satis accurata pag. 114.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 75, in qua eadem icon.*

Anas fera prima, feu torquata minor. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 197.*

Anas fera, sive torquata, mas. *Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 158.*

Anas fera, femella. *Frisch. hujus icon satis accurata. Tab. 159.*

Anas tera oblongo & crasso corpore. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. I. sp. 2.*

Anas torquata minor Aldrovandi ; Boschas major. *Raj. Syn. Avi. pag. 145. N°. A. I.*

Anas sylvestris. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.*

Anas sylvestris vera, Alberti. *Klein. Avi. pag. 131. N°. 3.*

Anas sylvestris major, Peuceri. *Klein.*

Boschas. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 17.*

Boschas major. *Willugh. Ornith. pag. 284. hujus icon minimè accurata Tab. LXXII.*

Boschas major. *Jonst. Avi. pag. 97. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 49 ; & insuper altera icon à Gesnero mutuata eâdem Tab. sub titulo, Anas fera.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II, Lib. III. pag. 21.*

Boschas major, sive Anas torquata minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 211. maris icon non satis accurata pag. 212.*

Metzcanauhtli, feu Anas Lunaris. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 45. cap. CLII.*

Metzcanauhtli. *Raj. Syn. Avi. pag. 175.*

Canard sauvage. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 160.*

*Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 146.*

*Alb. Tom. II. pag. 64 ; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 100.*

*Alb. Tom. I. pag. 85 ; avec une figure mal coloriée de la femelle Pl. 99.*

Les Grecs l'appellent Νῆσσα ἀγρία. *Aldrov. Schwenck. Νῆσσα ἀγρία. Aldrov.*

Les Espagnols, ANADE SILVESTRE. *Aldrov.*

Les Italiens, ANITRA SALVATICA. *Aldrov. Cesone. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, WILD ENDTE ; WILDE BLAW ENDTE ; MERTZ ENDTE ; GROS ENDTE. *Schwenck. ENDTE ; WILDE ENDE. Rzac. WILD-BLAUW. EENT ; HAG-ENT ; GROSZ-ENT. Gesn. Aldrov. WILDE ENTEN. Aldrov.*

Les Allemands aux environs du Lac de Constance, BLASS-ENT. *Gesn. Aldrov. BLAS ENDTE. Schwenck.*

Ceux qui habitent aux environs du Lac Majeur, SPIEGEL-ENT. *Gesn. Aldrov. SPIEGEL ENDTE. Schwenck.*

Les Silésiens, WILD HATSCHÉ ; RAETSCH ENDTE. *Schwenck. RETSCH-ENT. Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, KACZKA DZIKA. *Rzac.*

Les Suédois, GRAES-AND ; BLAONACKÉ. *Linn.*



*Les Flamands*, WILDE EENDE. *Aldrov.*

*Les Anglois*, WILD-DUCK. *Willugh. Charlet. COMMON WILD DUCK.*

*Willugh. Raj. Sibbald. MALLARD. Willugh. Alb.*

*Les Mexiquains*, METZCANAUHTLI. *Fern.*

Il est à peu près de la grosseur du *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, huit lignes; son pied un pouce neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces cinq lignes, l'intérieur deux pouces; & celui de derrière sept lignes & demie. Il a deux pieds dix pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont plées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, & le col dans environ la moitié de sa longueur la plus voisine de la tête sont d'un verd-doré très-brillant, changeant en un violet éclatant. Au-dessous de cette couleur est une étroite bande blanche, qui entoure presque entièrement le col, & forme une espece de collier. Le bas

Cum *Anate domestica* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem novem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem & decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes unum pollicem cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum quinque lineis, intimus duos pollices; posticus autem septem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & decem pollicum; alæ verò complicatæ ad mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Caput, guttur, & collum per mediam circiter longitudinem capiti finitimam tingit color viridi-aureus splendidissimus, violaceo splendido colore varians. Infra quem



quem colorem stricta extat  
tania alba, collum penitus  
ferè circumdans, & torquem  
quodammodo efficiens. Col-  
lum infimum inferius & ad  
latera, pectusque sunt satu-  
ratissimè castanea; color au-  
tem castaneus, versùs pec-  
toris partem infimam proce-  
dendo, nonnihil fit dilutior.  
Colli superioris infima pars,  
dorsum supremum, pennæ  
scapulares, venter, latera,  
crurumque pars suprema li-  
neolis alternatim cinereo-al-  
bis & cinereo-fuscis transver-  
sim & undatim striantur; qui  
colores in dorso & lateribus  
multò sunt quàm in reliquis  
partibus conspicui. Dorsum  
infimum fusco imbuitur satu-  
rato. Uropygium & superio-  
res caudæ tectrices sunt ni-  
græ, viridi saturato varian-  
tes. Pennæ caudam sub-  
tus obtegentes penitus ni-  
græ. Quæ alas infernè coope-  
riunt, candidæ. Superiores  
alarum tectrices cinereo-fus-  
cæ; majores tamen medium  
locum obtinentes versùs ex-  
tremitatem albæ, nigro ter-  
minatæ; unde fiunt in utra-  
que ala exiguæ binæ taniæ  
transversæ, quarum superior  
alba, inferior verò nigra.  
Viginti quatuor remigibus  
ala conflatur: decem primo-

de la partie inférieure & des  
côtés du col, & la poitrine sont  
d'un marron très-foncé; cette  
couleur s'affoiblit cependant un  
peu vers le bas de la poitrine.  
Le bas du dessus du col, la par-  
tie supérieure du dos, les plu-  
mes scapulaires, le ventre, le  
haut des jambes & les côtés  
sont rayés transversalement &  
en zigzags de petites lignes, al-  
ternativement d'un gris-blanc  
& d'un cendré-brun; ce qui est  
beaucoup plus sensible sur le dos  
& les côtés qu'ailleurs. La partie  
inférieure du dos est d'un brun  
foncé. Le croupion & les cou-  
vertures du dessus de la queue  
sont d'un noir changeant en verd  
foncé. Les couvertures du des-  
sous de la queue sont noires.  
Celles du dessous des ailes sont  
blanches. Celles du dessus sont  
d'un cendré-brun; cependant  
les grandes qui occupent le  
milieu, sont blanches vers leur  
bout, & terminées de noir; ce  
qui forme sur chaque aile deux  
petites bandes transversales,  
dont la supérieure est blanche,  
& l'inférieure est noire. L'aile  
est composée de vingt-quatre  
plumes: les dix premières sont  
d'un gris-brun: l'onzième est de  
la même couleur, mais elle est  
bordée extérieurement & ter-  
minée de blanc: la douzième  
est encore d'un gris-brun, mais



elle est marquée sur son côté extérieur d'un peu de violet changeant en verd-doré : les huit suivantes, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingtième inclusivement, ont leur côté intérieur d'un gris-brun terminé de blanc, tandis que leur côté extérieur est d'un gris-brun seulement à son origine, ensuite & dans la plus grande partie de sa longueur d'un violet changeant en verd-doré, & enfin noir & terminé de blanc ; ce qui avec les deux bandes produites par les couvertures du dessus des ailes, & dont nous avons parlé ci-dessus, forme sur chaque aile cinq bandes transversales, dont la plus large, qui est celle du milieu, est d'un violet changeant en verd-doré, & suivie de chaque côté de deux autres, dont la plus proche est noire, & l'autre blanche : la vingt-unième est d'un gris-brun, & bordée de blanc par le bout ; le gris-brun tire un peu sur le noirâtre du côté extérieur de la plume vers son origine seulement : la vingt-deuxième & la vingt-troisième sont d'un gris-blanc, excepté vers leur origine, où elles sont brunes sur une grande partie de leur côté extérieur : enfin la vingt-quatrième est d'un gris-blanc du côté extérieur, &

res griseo-fusca : undecima eodem imbuta colore, sed albo terminata & exterius fimbriata : duodecima similiter griseo-fusca, sed in latere exteriori pauco insignita violaceo viridi-aureo colore variante : octo proximè sequentes, à decima tertia scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sunt interius griseo-fusca, albo terminata, exterius verò griseo-fusca quidem, sed in exortu tantum, deinde, idque per majorem longitudinis partem, violacea, viridi-aureo colore variantes, & tandem nigra, albo terminata ; unde fiunt simul cum binis suprà dictis taniis, à tectricibus alarum superioribus productis, in utraque ala quinque taniæ transversæ, quarum latior, quæ medium locum tenet, violacea, viridi-aureo colore varians, eamque utrinque sequuntur binæ altera taniæ, quarum vicinior nigra, remotior verò alba : vigesima prima griseo-fusca, albo in extremitate marginata ; color autem griseo-fuscus in remigis exteriori latere & versùs ipsius exortum tantum nonnihil ad nigricantem vergit colorem : vigesima secunda & vigesima ter-



tiâ cinereo-albâ, attamen  
versus exortum in lateris  
exterioris maxima parte fus-  
câ : vigesima quarta tandem  
exteriùs cinereo-alba, inte-  
riùs griseo-fusca. Quæ tres  
novissimè dictæ remiges ma-  
ximâ longitudine pollent,  
in acumen desinunt, & dum  
ala complicatur, majorum  
remigum extremitates ferè  
pertingunt. Caudam compo-  
nunt viginti rectrices, qua-  
rum quatuor intermediæ ni-  
gro-virescentes, & sursum  
circulariter reflexæ : octo  
utrinque extimæ griseo-fus-  
cæ, albedo in tota circum-  
ferentia marginatæ : quæ mar-  
go eò in latere exteriori la-  
tior fit, quò rectrix est exte-  
rior ; ita ut in quatuor rec-  
tricibus utrinque extimis ferè  
ad scapum usque protenda-  
tur. Omnes caudæ rectrices  
in acumen desinunt : inter-  
mediæ lateralium longitudi-  
nem paululùm excedunt ; la-  
terales autem sensim atque  
sensim longitudine minuun-  
tur ad utrinque extimam us-  
que breviorè ; unde fit  
cauda extremitate acuta.  
Rostrum ex viridi flavicat.  
Pars crurum plumis de-  
nudata, pedes & digiti,  
sicut & ipsorum membra-  
næ, auranti ; ungues di-

d'un gris-brun du côté inté-  
rieur. Ces trois dernières plu-  
mes sont fort longues, se ter-  
minent en pointe, & s'éten-  
dent, lorsque l'aîle est pliée,  
presqu'aussi loin que les plus  
grandes plumes de l'aîle. La  
queue est composée de vingt  
plumes : les quatre du milieu  
sont d'un noir changeant en  
verd, & recourbées circulai-  
rement en en-haut : les huit  
plus extérieures de chaque côté  
sont d'un gris-brun, & bordées  
tout autour de blanchâtre :  
cette bordure est d'autant plus  
large sur le côté extérieur, que  
la plume est plus extérieure ; de  
sorte qu'elle s'étend presque  
jusqu'à la tige des quatre plu-  
mes les plus extérieures de cha-  
que côté. Toutes les plumes de  
la queue se terminent en poin-  
te : celles du milieu sont un  
peu plus longues que les laté-  
rales, qui vont toutes en dimi-  
nuant de longueur par degrés  
jusqu'à la plus extérieure de  
chaque côté, qui est la plus  
courte ; ce qui rend le bout de  
la queue pointu. Le bec est  
d'un verd-jaunâtre. La partie  
des jambes qui est dégarnie  
de plumes, les pieds & les  
doigts, ainsi que leurs mem-  
branes, sont orangés ; les on-  
gles des trois doigts antérieurs  
sont noirâtres ; & celui du



doigt postérieur est un peu rougeâtre.

La *femelle* est un peu plus petite que le *mâle*. Elle en diffère encore par ses couleurs. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de petites plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & d'un gris-roussâtre sur les côtés. Celles qui couvrent le dos & le croupion, sont brunes, & ont dans toute leur circonférence une large bordure roussâtre. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur & bordées de même, mais elles ont aussi des bandes roussâtres parallèles à leur bordure. La gorge est de cette dernière couleur. Le dessous du col & le haut de la poitrine sont couverts de plumes roussâtres, marquées chacune d'une tache brune, qui a à peu près la figure d'un fer à cheval, & dont la convexité est tournée en en-bas. Le bas de la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un fauve-clair, tacheté de brun. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les plus petites du

gitorum trium anticorum nigricantes; unguis autem postici digiti paululum rubescens.

*Fœmina* magnitudine non nihil *mari* cedit. Ab illo quoque coloribus discrepat. Caput & partem colli superiorem vestiunt plumulæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscæ, ad latera griseo-rufescentes. Quæ dorsum & uropygium obtegunt, sunt fuscæ quidem, sed in tota circumferentia latâ donantur margine rufescente. Pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices concolores & simili margine præditæ, sed taniis insuper rufescentibus, ipsarum margini parallelis, insignitæ. Guttur similiter rufescit. Collum inferius & pectoris partem supremam cooperiunt pennæ rufescentes, maculâ notatæ fuscâ, ferri equini figuram circiter æmulante, & cujus pars convexa deorsum vertitur. Pectus infimum, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices diluto imbuuntur fulvo, fuscis maculis vario. Pennæ alas subtus obtegentes sunt candidæ. Superiores alarum tectrices minimæ griseo-fus-



*ca*, griseo-fimbriatæ : mediæ pariter griseo-fuscæ, sed rufescente marginatæ : majores adhuc griseo-fuscæ, sed marginibus destitutæ ; quæ tamen medium locum obtinent, versùs extremitatem albæ, nigro terminatæ ; unde fiunt, sicut in *mare*, in utraque ala binæ tæniæ transversæ. Alarum remiges remigibus *maris* concolores. Caudæ rectrices albo-rufescentes, tæniis insignitæ cinereo-fuscis, in utroque latere obliquè positæ, quarum quædam, prope rectricis scapum sese pertingentes, ferri equini figuram, cujus convexitas rectricis extremitatem spectat, simul circiter æmulantur. Mandibula superior est rubescens, nigro maculata ; inferior penitus rubescit. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, aurantii ; ungues verò nigricantes.

dessus sont d'un gris-brun, & bordées de gris : les moyennes sont d'un gris-brun, & bordées de roussâtre : les grandes sont du même gris-brun, mais sans bordure ; cependant celles qui occupent le milieu, sont blanches vers leur bout, & terminées de noir ; ce qui forme sur chaque aîle deux bandes transversales, comme dans le *mâle*. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur que celles du *mâle*. Celles de la queue sont d'un blanc-roussâtre, & marquées de bandes de cendré-brun, placées obliquement sur chacun de leurs côtés, & dont quelques-unes, se touchant près de la tige de la plume, ont ensemble à peu près la figure d'un fer à cheval, dont la convexité est tournée vers le bout de la plume. Le demi-bec supérieur est rougeâtre, & tacheté de noir ; l'inférieur est entièrement rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont orangés ; & les ongles noirâtres.

On les trouve dans les marais. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Les variétés de cette espece sont

Paludes frequentant. *Ex museo Realmuriano.*

Hujus speciei varietates sunt



## A. LE GRAND CANARD SAUVAGE.

Boschas major.

*Anas torquata major. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 213.*

*Jonst. Avi. pag. 97.*

*Anas fera torquata major. Gesn. Avi. pag. 114. hujus icon satis accurata pag. 115.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 75, in qua eadem icon.*

*Anas fera, torquata, viridis, rostro croceo. Barr. Ornith. Class. I. Gen. I. sp. 3.*

*Anas fera torquata, viridis, rostro carneo. Barr. Ornith. Class. I. Gen. I. sp. 4.*

*Anas fera secunda, seu torquata major. Schwenck. Avi. Sil. pag. 198.*

*Anas fera secunda, seu torquata major Schwenckfeldii. Klein. Avi. pag. 131. N<sup>o</sup>. 3.*

*Boschas major Athenæi. Gesn.*

*Les Catalans l'appellent ANECH COLL VERT. Barr.*

*Les Allemands, STOR-ENT; STORTZ-ENT; MERTZ-ENT; GROSSE ENTE. Gesn. Aldrov. STOR ENDTE; STERTZ ENDTE; GROSSE WILD ENDTE. Schwenck; & en quelques endroits, MUGG-ENT. Gesn. MOUR-ENT; MOSS-ENT. Gesn. Aldrov.*

Il est un peu plus grand que le précédent; car sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds six pouces: & il a près de trois pieds neuf pouces de vol. Il lui ressemble assez par ses couleurs, si ce n'est que son dos est de couleur de suie. On le trouve sur les étangs & dans les marais.

Magnitudine præcedentem paululum antecellit; ipsius enim longitudo à rostri apice ad caudam extremam usque duos pedes & sex pollices explet: alis autem expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & novem ferè pollicum intervallo distant. Cum illa coloribus satis benè convenit, excepto tamen dorso fuliginoso. Stagna & paludes frequentat.

## B. LE GRAND CANARD SAUVAGE GRIS.

Boschas major grisea.



*Anas fera quarta, seu juncea. Schwenck. Avi. Sil. pag. 199.*

*Les Allemands l'appellent SCHMAEL ENDTE; SCHMIL ENDTE; SCHMELTCHEN. Schwenck.*

Magnitudine & formâ satis præcedenti similis; sed cinereo colore tingitur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranae, unguisque nigri. Piscinas frequentat.

Il ressemble assez au précédent pour la forme & la grandeur; mais sa couleur est cendrée. Son bec, la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, ses pieds, ses doigts, ainsi que leurs membranes, & ses ongles sont noirs. On le trouve sur les étangs.

#### C. LE GRAND CANARD SAUVAGE TACHETÉ.

*Boschas major nævia.*

*Anas fera tertia, seu major. Schwenck. Avi. Sil. pag. 199.*

*Les Allemands l'appellent ROSZ ENDTE; MERTZ ENDTE; GROSSE WILDE ENDTE. Schwenck.*

Cum præcedentibus adhuc magnitudine convenit. Coloribus *Boschadem majorem* satis benè æmulatur; ab illa solummodo discrepat dorso nigro, flavicante maculato. Stagna & paludes frequentat.

Il est encore de la même grandeur que les précédens. Par ses couleurs, il ressemble assez au *grand Canard sauvage*; il en diffère seulement en ce que son dos est d'un noir tacheté de jaunâtre. On le trouve sur les étangs & dans les marais.

#### 5. LE CANARD SAUVAGE DU MEXIQUE.

*Anas superne nigro-viridescens, tæniis arcuatis fordidè albis varia, infernè fulva, maculis binis in imo ventre candidis; capite & collo supremo viridi-aureis, nigro-violaceo colore variantibus; rectricibus alarum superioribus minimis cyaneis, mediis candidis, majoribus viridi-aureis; rectricibus intermediis nigro-virescentibus, violaceo colore variantibus.* . . . ANAS FERA SIVE BOSCHAS MEXICANA.



Genus quoddam Anatis feræ. *Jonst. Avi. pag. 159.*

Avis latirostra. *Euf. Nieremb. pag. 217.*

Avis latirostra, seu Tempatlahoac. *Willugh. Ornith. pag. 299.*

Tempatlahoac. *Raj. Syn. Avi. pag. 176.*

Tempatlahoac altera, seu Avis lati rostri. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 30. cap. LXXVIII.*

Les Mexiquains l'appellent TEMPATLAHOAC. *Fern. Nieremb. Jonst. Willugh. Raj.*

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur du *Canard domestique*. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont d'un verd-doré changeant en un noir-violet très-brillant. Le bas de la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-vert fort brillant, varié de bandes d'un blanc sale, formées en arc de cercle. Le bas de la partie inférieure du col est blanc, ainsi que la poitrine. Le ventre, le haut des jambes & les côtés sont fauves; le bas-ventre est cependant marqué de deux taches blanches, placées vers la queue, savoir une de chaque côté. Les couvertures du dessous de la queue sont noires. Les plus petites du dessus des ailes sont d'un beau bleu: les moyennes sont blanches; & les grandes sont d'un verd-doré brillant. Les grandes plumes de l'aile sont fauves; les moyennes sont

Magnitudine & crassitie cum *Anate domestica* circiter convenit. Caput, guttur & partem colli capitè finitimam tingit color viridi-aureus, splendidissimo nigro-violaceo colore varians. Colli superioris pars infima, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ teatrices splendidissimo imbuuntur nigro-viridescente, tæniis arcuatis fordidè albis vario. Colli inferioris pars infima & pectus alben. Venter, crurum suprema pars & latera fulvo tinguntur; venter imus binis tamen insignitur maculis candidis, versùs caudam, utrinque scilicet unâ, positis. Pennæ caudam subtrus obtegentes sunt nigræ. Superiores alarum teatrices minimæ eleganter cyanæ: mediæ candidæ: majores splendidè viridi-aureæ. Remiges alarum majores fulvæ: minores splendidè virides. Rectrices intermedie sunt nigro-viridescentes.



viridescentes, violaceo colore splendido variantes : utrinque extimæ fulvæ, albedo fimbriatæ. Rectrices intermedix lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē ; unde fit cauda extremitate acuta. Oculi sunt nigri : ipsorum irides pallidè flavæ. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, pallidè rubri. Habitat in *Mexico*, ibique lacus frequentat.

d'un verd brillant. Les plumes du milieu de la queue sont d'un noir-verd changeant en violet brillant : les plus extérieures de chaque côté sont fauves, & bordées de blanchâtre. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. Les yeux sont noirs : leur iris est d'un jaune pâle. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge pâle. On le trouve au *Mexique*, où il se tient sur les lacs.

\*\* 6. LE SOUCHET.

*Voyez le mâle Pl. XXXII. Fig. 1.*

*Anas* superne nigro-viridescens, infernè castanea ; capite & collo viridi-aureis, violaceo colore variantibus ; pectore supremo albo, maculis lunulatis nigricantibus vario ; rectricibus alarum superioribus cinereo-cœruleis ; macula alarum viridi-aurea, cupri puri colore variante, tæniâ candidâ superius donata ; rectricibus octo intermediis in medio fuscis, ad margines candicantibus. (*Mas*).

*Anas* superne fusca marginibus pennarum rufescentibus, infernè fulva, fusco maculata ; macula alarum viridi-aurea, cupri puri colore variante, tæniâ candidâ superius donata ; rectricibus octo intermediis in medio fuscis, ad margines candicantibus. (*Fœmina*) . . . . *ANAS CLYPEATA.*



*Anas rostri extremo dilatato rotundatoque; ungue incurvo. Faun. Suec. Linn. N°. 102.*

*Anas rostri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo. Anas clypeata. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 16.*

*Anas macula alarum purpurea utrinque nigra albaque; pectore rufescente. Faun. Suec. Linn. N°. 103. (fæmina).*

*Anas macula alari purpurea utrinque nigra albaque, pectore rufescente. Anas platyrhynchos. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 17. (fæmina).*

*Anas rostro latiori, clypeato, pedibus rubris. Barr. Ornith. Class. I. Gen. I. sp. 6.*

*Anas latirostra. Schwenck. Avi. Sil. pag. 205.*

*Anas latirostra major. Gesn. Avi. pag. 120, in qua hujus capitis icon non satis accurata.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 80, in qua eadem capitis icon.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 227. hujus capitis icon à Gesnero mutuata pag. 230.*

*Anas latirostra major Gesneri, Anas platyrinchos, Anas schellaria, Clangula Fabricii. Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 356.*

*Anas latirostra Schwenckfeldii. Klein. Avi. pag. 132. N°. 10.*

*Anas latirostra sive clypeata. Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 161. (mas).*

*Anas latirostra tertia fusca. Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 163. (fæmina).*

*Anas latirostra Americana. Klein. Avi. pag. 134. N°. 20.*

*Anas clypeata. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 12.*

*Anas platyrhynchos. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 13. (fæmina).*

*Anas platyrhynchos altera sive clypeata Germanica. Raj. Syn. Avi. pag. 143. N°. A. 9.*

*Anas platyrhynchos altera, sive clypeata Germanis dicta. Willugh. Ornith. pag. 283, hujus icon pessima Tab. LXXIV.*

*Anas platyrhynchos erythropus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 230. hujus icon non satis accurata pag. 231. (fæmina).*

*Anas platyrhynchos erythropus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 283. (fæmina).*

*Anas platyrhynchos pedibus rubris. Jonst. Avi. pag. 97. hujus icon à Aldrovando mutuata Tab. 49.*

*Anas platyrhynchos pedibus luteis. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 230. hujus icon pessima pag. 232. (fæmina).*

*Jonst. Avi. pag. 97. (fæmina).*

*Anas platyrhynchos pedibus luteis Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 284. (fæmina).*

*Raj. Syn. Avi. pag. 144. N°. 13. (fæmina).*

*Alterum genus platyrhynchi Anatis. Gesn. Avi. pag. 119.*



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIV.* 331

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 224. hujus icon non satis accurata pag. 226.*

*Anas virescens*, seu capite virescente. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 120. hujus icon non satis accurata Tab. 58.*

*Klein. Avi. pag. 135. N°. 28.*

*Phasianus marinus*. *Charlet. Exer. pag. 104. N°. 8. hujus icon minimè accurata pag. 105.*

*Canard d'Amérique au grand bec*. *Catesb. Tom. I. pag. 96 ; avec une figure passable de la femelle Pl. 96.*

*Pélican d'Allemagne*. *Alb. Tom. I. pag. 84 ; avec des figures mal coloriées du mâle Pl. 97 , & de la femelle Pl. 98.*

*Les Catalans l'appellent* COLLIER. *Barr.*

*Les Allemands* , BREIT-SCHNABEL. *Gefn. Aldrov. Schwenck. Rzac. Willugh. BREIT-SCHNAEBLICHTE WILD ENDTLE ; SCHALL ENDTLE ; SCHILD ENDTLE. Schwenck. SCHELL-ENT ; & quelques-uns , TAESCHENMUL. Gefn. Aldrov. Willugh.*

*Les Silésiens* , LOEFFEL ENDTLE. *Schwenck,*

*Les Anglois* , SHOVELER. *Willugh. Raj.*

*Anati domesticæ* paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & septem pollices æquat , & ad extremos ungues unum pedem sex pollices & quinze lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices & decem lineas longum est ; cauda tres pollices & sex lineas ; pars crurum plumis denudata quinque lineas ; pes quindecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices , extimus unum pollicem cum decem lineis , intimus octodecim lineas ; posticus autem sex lineas tantùm. Alis expansis ,

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces , & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces cinq lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long ; sa queue trois pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , cinq lignes ; son pied quinze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , deux pouces , l'extérieur un pouce dix lignes , l'intérieur dix-huit lignes ; & celui de derriere six lignes seulement. Il a deux pieds six pouces de vol ; & ses aî-



les, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, & le col dans presque toute sa longueur sont d'un très-beau verd-doré, changeant en un violet brillant. Le reste du col & le haut de la poitrine sont blancs, & marqués de quelques petites taches noirâtres, formées en croissant, dont la convexité est tournée vers le bas. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir changeant en verd selon les différens aspects à la lumière : cette couleur est plus brillante sur le croupion & les couvertures du dessus de la queue que sur le dos. Les plumes scapulaires sont variées de blanc, de noirâtre, de verd-doré & de cendré-bleu. Le bas de la poitrine, le ventre & les côtés sont de couleur de marron : le bas-ventre & le bas des côtés sont de plus marqués de petites rayes transversales brunes; il y a cependant une partie du bas des côtés, vers l'anüs, qui est blanche. Le haut des jambes est d'un gris-fauve, rayé transversalement de brun. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un noirâtre mêlé de verd-doré. Les plus petites couvertures du dessous des ailes, sca-

extremities majorum remigum duorum pedum & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput, guttur, collique tota ferè longitudo elegantissimo tinguntur viridi-aureo, violaceo splendido colore variante. Reliquum collum & pectus supremum alben, & minutis quibusdam insigniuntur maculis nigricantibus, lunulatis, quarum pars convexa deorsum vertitur. Dorsum, uropygium & superiores caudæ tectrices sunt nigrae, & pro vario quo lucis radii incidunt modo viridescentes : color autem viridescens in uropygio & superioribus caudæ tectricibus magis quàm in dorso splendet. Pennæ scapulares albo, nigricante, viridi-aureo & cinereo-cœruleo variegantur. Imum pectus, ventrem & latera tingit color castaneus : venter imus & laterum infima pars minutis insuper tæniis transversis fuscis notantur; latera tamen in ima parte, versùs anum scilicet, partim albicant. Crurum suprema pars est griseo-fulva, fusco transversim striata. Pennæ caudam subtus obtegentes nigricant, & aliquid vi-



viridi-aurei admixtum habent. Teatrices alarum inferiores minimæ, istæ scilicet quæ versùs alarum margines collocantur, sunt griseæ, albo-fulvescente fimbriatæ : mediæ albæ : majores cinereæ, attamen in ipsarum exortu candidæ, sed in latere interiore tantùm. Superiores alarum teatrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori viciniores, cinereo-cœruleæ : majores has novissimè dictas proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium locum obtinent, fuscæ, candido terminatæ ; unde fit in utraque ala tænia transversa concolor : majores tandem à corpore remotiores fuscæ, exterius griseo marginatæ. Alarum componunt viginti quinque remiges : decem primos fuscæ, scapo tantummodo candido præditæ : undecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, in latere interiore & extremitate fuscæ, in latere exteriori splendide viridi-aureæ, cupri puri elegantiori colore variantes : tres nuper descriptas proximè sequentes à vigesima secunda scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, obscure viridi-au-

voir celles qui sont placées vers le bord de l'aile, sont grises, & bordées de blanc-fauve : les moyennes sont blanches : les grandes sont cendrées, excepté leur origine, qui est blanche, mais du côté intérieur seulement. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un cendré-bleu : les grandes qui suivent ces dernières, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont brunes, & terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aile une bande transversale de cette couleur : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées extérieurement de gris. L'aile est composée de vingt-cinq plumes : les dix premières sont brunes, ayant seulement leur tige blanche : les onze suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont brunes du côté intérieur & à leur extrémité ; mais leur côté extérieur est d'un verd-doré brillant, changeant en une belle couleur de cuivre de rosette : les trois qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la vingt-deuxième jusqu'à la vingt-quatrième inclusivement, sont d'un verd-doré obscur, & marquées cha-



cune d'une bande blanchâtre , qui s'étend tout le long de leur tige depuis environ le tiers de leur longueur jusqu'à leur extrémité ; il faut cependant excepter le côté intérieur de la vingt-deuxième , qui est brun : la vingt-cinquième est entièrement d'un verd-doré obscur. Ces quatre dernières plumes sont très-longues , se terminent en pointe , & s'étendent , lorsque l'aile est pliée , presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de quatorze plumes : les deux du milieu sont brunes , & variées sur leurs bords d'un peu de blanchâtre : les trois suivantes de chaque côté sont pareillement brunes dans leur milieu , & ont de larges bordures blanchâtres : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanchâtres , ayant seulement un peu de gris semé tout le long de leur tige. Toutes les plumes de la queue se terminent en pointe. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. L'iris des yeux est d'un jaune foncé. Le bec est noir , & fort

reæ , taniâ notatæ albidâ , ab ipfarum tertia longitudinis parte ad extremitatem usque secundum scapi longitudinem protensâ ; vigesima secunda tamen in latere interiore fusca est : vigesima quinta penitus obscure viridi-aurea. Quatuor autem novissimè dictæ remiges maximâ longitudine pollent , in acumen desinunt , & dum ala complicatur , ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Quatuordecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ fuscæ , paucò candicante ad margines variegatæ : tres utrinque proximè sequentes similiter in medio fuscæ , latâ margine candicante præditæ : tres utrinque extimæ candicantes , cum paucò tantummodo griseo secundum scapi longitudinem asperso. Omnes caudæ rectrices in acumen desinunt. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm antecellunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorẽ ; unde fit cauda extremitate acuta. Oculorum irides intensè luteæ. Rostrum nigrum , versùs extremitatem , præsertim in mandibulâ



superiore, maximam latitudinem obtinens : binæ autem mandibulæ in tota ipsarum circumferentia exiguis obsitæ sunt denticulis longiusculis, flexibilibus, & pectinis denticulorum æmulis. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, eleganter auranii; ungues verò grisei.

*Fœmina* crassitie paululum *mari* cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octodecim pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem quinque pollices & sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum quatuor pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad extremam ferè caudam usque protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ, rufescente marginatæ. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices fulvo colore tinguntur, & maculis fuscis notantur. Superiores alarum tectrices minimæ &

élargi vers son extrémité, surtout le demi-bec supérieur : les deux mandibules sont garnies dans toute leur circonférence de petites dents assez longues, flexibles, & qui imitent très-bien celles d'un peigne. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un bel orangé; & les ongles gris.

La *femelle* est un peu moins grosse que le *mâle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied cinq pouces six lignes. Elle a deux pieds quatre pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, bordées de roussâtre. Les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont fauves, & marqués de taches brunes. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus pro-



ches du corps, sont dans les unes de la même couleur que les plumes du dos, & dans d'autres d'un cendré-bleu : les grandes qui suivent ces dernières, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont brunes, & terminées de blanc : ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale de cette couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-brun, & bordées extérieurement de gris. L'aîle est composée de vingt-cinq plumes : les dix premières sont d'un gris-brun, ayant seulement leur tige blanche : les onze suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont brunes du côté intérieur & à leur extrémité ; mais leur côté extérieur est d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette : les quatre plus proches du corps sont brunes, & bordées de roussâtre. Les plumes de la queue sont de la même couleur que celles de la queue du mâle. Le bec est rougeâtre & tacheté de noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont orangés ; & les ongles gris.

On les trouve dans les marais. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

media, sicut & majores corpori finitimæ, in aliis pennis dorsum vestientibus concolores, in alteris cinereo-cœruleæ : majores has novissimè dictas proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium locum tenent, fuscæ, candido terminatæ ; unde fit in utraque ala tania transversa concolor : majores à corpore remotiores griseo-fuscæ, exterius griseo marginatæ. Vingt cinq remigibus ala conflatur : decem primores griseo-fuscæ, scapo tantummodo candido præditæ : undecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, in latere interiore & apice fuscæ, in latere exteriori viridi-aureæ, cupri puri colore variantes : quatuor corpori viciniore fuscæ, rufescente marginatæ. Caudæ rectrices rectricibus caudæ maris concolores. Rostrum rubescens, nigro maculatum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipforum membranæ, aurantii ; ungues verò grisei.

Paludes frequentant. *Ex museo Realmuriano,*

Hujus



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIV.* 337  
Hujus speciei varietas est Une variété de cette espece  
est

A. LE SOUCHET A VENTRE BLANC.

*Anas clypeata ventre candido.*

*Anas muscicapa*, subtus alba, superne varia, rostro nigro. *Barr. Ornith.*  
*Class. I. Gen. I. sp. 5.*

*Anas muscaria. Gesn. Avi. pag. 118. hujus icon minimè accurata pag.*  
*117.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 78, in qua eadem icon.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 223. hujus icon à Gesnero mutuata*  
*pag. 553.*

*Jonst. Avi. pag. 97. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 49.*

*Anas muscaria Gesneri, Aldrovandi, Willughbeji. Klein. Avi. pag.*  
*132. N<sup>o</sup>. 9.*

*Anas muscaria, Mugg-Ent Gesnero Aldrovandi. Willugh. Ornith.*  
*pag. 287.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 146.*

*Anas latirostra, sive fuligula. Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 162.*

*Anas fera decima septima, seu minor quinta. Schwenck. Avi. Sil.*  
*pag. 205.*

*Les Suisses l'appellent MUGGRATE. Jonst.*

*Les Allemands, MUGG-ENT. Gesn. Aldrov. MEUCK ENDTLE; MUR*  
*ENDTLE; MOS ENDTLE; FLIEGEN ENDTLE. Schwenck.*

Cum præcedente formâ,  
magnitudine & coloribus  
perfectè convenit : ab illa  
solummodo discrepat ventre  
candido.

Il ressemble parfaitement au  
précédent par sa forme, sa gran-  
deur & ses couleurs : il en dif-  
fère seulement en ce qu'il a le  
ventre blanc.

7. LE SOUCHET DU MEXIQUE.

*Anas taniis arcuatis fulvis, nigris & candidis varia; ventre*  
*fulvo; maculâ alarum splendide viridi-aureâ; rectricibus*  
*taniis arcuatis fulvis, nigris & candidis variegatis . . . .*  
*ANAS CLYPEATA MEXICANA.*

*Yacapatlahoac, seu Avis lati rostri. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 42.*  
*cap. CXXXVI.*

*Tom. VI.*

V u



*Raj. Syn. Avi. pag. 176.*

*Les Mexiquains l'appellent YACAPATLAHOAC. Fern. Raj. & quelques-uns, TEMPATLAHOAC. Fern.*

Il est un peu plus petit que le *Canard domestique*. La tête, le col, la poitrine, le dos & le croupion sont couverts de plumes variées de bandes courbées en arc, alternativement fauves, noires & blanches. Les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont fauves. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les petites du dessus sont de la même couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes : les grandes les plus proches du corps sont d'un verd doré très-brillant ; ce qui forme sur chaque aile une belle tache de cette couleur. Toutes les plumes de l'aile sont brunes. Celles de la queue sont variées de bandes courbées en arc, alternativement fauves, noires & blanches. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le bec est fort élargi

*Anati domesticæ paululùm crassitie cedit. Caput, collum, pectus, dorsum & uropygium vestiunt pennæ tæniis arcuatis, alternatim fulvis, nigris & candidis variæ. Scapulares & superiores caudæ rectrices concolores. Ventrem, latera, crurum partem supremam, inferioresque caudæ rectrices tingit color fulvus. Pennæ alas subtus obtegentes sunt candidæ. Superiores alarum rectrices minores eodem imbutæ colore : majores à corpore remotiores fuscæ : majores corpori finitimæ splendidissimè viridi-aureæ ; unde fit in utraque ala elegans macula concolor. Omnes alarum remiges fuscæ sunt. Caudæ rectrices tæniis arcuatis, alternatim fulvis, nigris & candidis variæ. Rectrices intermediae lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorè ; unde fit cauda extremitate acuta. Rostrum versùs ipsius extremitatem maximam latitudinem obtinet, & per totam*



circumferentiam exiguis ob-  
situm est denticulis longius-  
culis, flexibilibus, pectinif-  
que denticulorum amulis.  
Mandibula superior ex obf-  
curè rubro fusciscit, attamen in extremitate ex fulvo  
nigricat : mandibula inferior  
pallidè rubet. Pars crurum  
plumis denudata, pedes &  
digiti, sicut & ipsorum mem-  
branæ, sunt quoque pallidè  
rubri. Habitat in *Mexico*.

vers son extrémité, & garni dans  
toute sa circonférence de peti-  
tes dents assez longues, flexi-  
bles, & qui imitent très-bien  
celles d'un peigne. Le demi-  
bec supérieur est d'un rouge  
obscur & rembruni, excepté  
son extrémité, qui est d'un  
fauve-noirâtre; l'inférieur est  
d'un rouge pâle. La partie des  
jambes qui est dégarnie de plu-  
mes, les pieds & les doigts,  
ainsi que leurs membranes, sont  
de cette dernière couleur. On  
le trouve au *Mexique*.

\*\* 8. LE CHIPEAU.

*Voyez le mâle Pl. XXXIII. Fig. 1.*

*Anas superne fusca, lineis candicantibus arcuatis varia, in-*  
*fernè alba, griseo maculata; capite & collo supremo su-*  
*perne fuscis, maculis rufescentibus variegatis, infernè albo-*  
*rufescentibus, fusco maculatis; uropygio nigro; imo ven-*  
*tre candicante & griseo-fusco transversim & undatim stria-*  
*to; macula alarum splendide nigra, taniâ superne rufâ,*  
*infernè albâ donata; rectricibus sex utrinque extimis gri-*  
*seis, candicante exteriùs & apice marginatis, quibusdam*  
*fulvo diluto notatis. (Mas).*

*Anas superne fusca, marginibus pennarum albo-rufescentibus,*  
*infernè alba, griseo maculata; macula alarum splendide ni-*  
*gra, taniâ superne rufâ, infernè albâ donata; rectricibus*  
*sex utrinque extimis griseis; candicante exteriùs & apice*  
*marginatis, quibusdam fulvo diluto notatis. (Fœmina)....*  
STREPERA.

*Anas macula alarum rufâ nigra alba. Faun. Suec. Linn. N°. 101.*

*Anas macula alarum rufâ nigra alba. Anas Strepera. Linn. Systh. Nat.*  
*ed. 10. Gen. 61. sp. 18.*



Anas Strepera. *Gesn. Avi. pag. 121.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 78.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 234.*

Anas platyrhynchos rostro nigro & plano. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 230. hujus icon minimè accurata pag. 233.*

*Jonst. Avi. pag. 97.*

Anas platyrhynchos rostro nigro & plano Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 145. N°. A. 2.*

Anas fera decima, seu Strepera. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 202.*

Anas fera decima, seu Strepera Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag. 132. N°. 6.*

Strepera. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 20.*

Gadwall, or Gray. *Willugh. Ornith. pag. 287. hujus icon pessima Tab. LXXII.*

Les Allemands l'appellent SCHNARR ENDTE ; SCHNATTER ENDTE.

*Schwenck. & quelques-uns, LEINER. Gesn.*

Les Silésiens, SCHNERR ENDTLIN. *Schwenck.*

Les Anglois, GADWALL ou GRAY. *Willugh. Raj.*

Il approche de la grosseur du Canard domestique ; il est cependant un peu plus petit. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long ; sa queue trois pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes ; son pied seize lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce onze lignes, l'extérieur un pouce neuf lignes & demie, l'intérieur un pouce cinq lignes ; & celui de derrière cinq

Ad *Anatis domesticæ* crassitiem accedit ; illâ tamen nonnihil minor est. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & septem pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem sex pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices longum est ; cauda tres pollices & sex lineas ; pars crurum plumis denudata quinque lineas ; pes sexdecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum undecim lineis, extimus unum pollicem & novem cum semi lineas,



Intimus unum pollicem & quinque lineas; posticus autem quinque solummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum quinque pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput superius & colli superioris partem supremam vestiunt plumulæ fuscæ, minutis maculis transversis rufescentibus variegatæ. Caput ad latera, guttur, & colli inferioris pars suprema ex albo rufescunt, minutissimisque maculis fuscis variegantur: albedo autem, à capite recedendo, magis magisque rufescit. Partem colli corpori finitimam & dorsum supremum cooperiunt pennæ fuscæ, lineis candicantibus, plerisque arcuatis, & ipsarum circumferentiæ parallelis, variæ. Dorsum infimum ex fusconigris. Uropygium eleganti nigro tingitur. Tectrices caudæ superiores & inferiores eodem imbuuntur colore. Pectus & venter supremus albicans, minutisque maculis griseis variegantur. Imum ventrem, latera & crurum partem supremam obtegunt pennæ lineo-

lignes seulement. Il a deux pieds cinq pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le dessus de la tête & le haut de la partie supérieure du col sont couverts de petites plumes brunes, variées de petites taches transversales roussâtres. Les côtés de la tête, la gorge & le haut de la partie inférieure du col sont d'un blanc-roussâtre, varié de très-petites taches brunes: le blanc devient de plus en plus roussâtre en s'éloignant de la tête. La partie du col la plus voisine du corps, & la partie supérieure du dos sont couvertes de plumes brunes, variées de lignes blanchâtres, dont la plupart sont courbées en arc, & parallèles à la circonférence de la plume. La partie inférieure du dos est d'un brun-noirâtre. Le croupion est d'un beau noir. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. La poitrine & le haut du ventre sont d'un blanc varié de petites taches grises. Les côtés, le bas-ventre & le haut des jambes sont couverts de plumes rayées transversalement & en zigzags de petites lignes, alternativement blanchâtres & d'un gris-brun. Parmi les plumes scapu-



lares, les supérieures sont brunes, & rayées de blanchâtre transversalement & en zigzags : les inférieures, qui se terminent en pointe, sont d'un gris-brun, & quelques-unes sont bordées de rouffâtre. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Le plus petites du dessous sont d'un gris-brun, & quelques-unes sont marquées de petites lignes d'un gris clair, courbées en arc, & presque parallèles à la circonférence de la plume : les moyennes sont de couleur de marron : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-brun : les suivantes sont de la même couleur, quelques-unes étant bordées extérieurement de marron, & les autres de noir : enfin les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun à leur origine, & terminées obliquement de noir de velours. L'aile est composée de vingt-six plumes : les dix premières sont d'un gris-brun du côté extérieur & à leur bout, & grises du côté intérieur : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont de la même couleur, mais elles sont bordées de blanc par le bout : les quatre qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la dix-huitième

lis, alternatim candicantibus & griseo-fuscis, transversim & undatim striatæ. Ex scapularibus pennis, superiores fuscae sunt, & albedo transversim & undatim striatæ : inferiores, quæ quidem in acumen desinentes, griseo-fuscae, quibusdam rufescente marginatis. Pennæ omnes alas subtus obtegentes sunt candidæ. Superiores alarum tectrices minimæ griseo-fuscae, quibusdam lineolis dilutè griseis, arcuatis, ipsarum circumferentiæ ferè parallelis, insignitis : mediæ castaneo imbutæ colore : majores à corpore remotiores griseo-fuscae : sequentes concolores, sed ex istis quædam castaneo ; alteræ nigro exterius marginantur : majores tandem corpori viciniore sunt in ipsarum exortu griseo-fuscae, nigro, holoserici villosi instar splendente, obliquè terminatæ. Alam componunt viginti sex remiges, quarum decem primores in latere exteriori & extremitate griseo-fuscae, in latere interiore griseæ : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, concolores, sed albo in extremitate marginatæ : quatuor quæ istas nu-



per descriptas proximè sequuntur, à decima quinta scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, in latere interiore griseæ, in exteriore verò cinereo-albæ, nigro, holoserici villosi instar splendente, fimbriatæ, & in extremitate margine albâ præditæ; fimbria autem nigra eò majorem acquirit latitudinem, quò remix fit corpori vicinior: tres proximè sequentes, à decima nona scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, exteriùs candidæ, interiùs griseæ; decima nona nigro insuper exteriùs marginatur: quinque tandem corpori viciniores griseæ. Quæ quinque novissimè dictæ maximâ longitudine pollent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Sexdecim rectricibus cauda constat: binæ intermediae griseo fuscæ: utrinque proximè sequens eodem imbuta colore, sed albo exteriùs & in extremitate fimbriatæ: sex utrinque extimæ griseæ, candidante exteriùs & apice marginatæ; quædam insuper notantur maculis quibusdam dilutè fulvis, in ipsarum exteriore latere obliquè positis.

me inclusivement, sont grises du côté intérieur; mais leur côté extérieur est d'un gris-blanc, bordé de noir de velours, & terminé à son bout par une bordure blanche; la bordure noire est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps: les trois suivantes, sçavoir depuis la dix-neuvième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont blanches du côté extérieur, & grises du côté intérieur; la dix-neuvième est de plus bordée extérieurement de noir: enfin les cinq plus proches du corps sont grises. Ces cinq dernières sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de seize plumes: les deux du milieu sont d'un gris-brun: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur, mais elle est bordée de blanc extérieurement & par le bout: les six plus extérieures de chaque côté sont grises, & bordées de blanchâtre extérieurement & par le bout; quelques-unes sont de plus marquées de quelques taches de fauve clair, placées obliquement sur leur côté extérieur. Toutes les plumes de la queue



se terminent en pointe. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un bel orangé; & les ongles noirâtres. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

Celui qu'a décrit *Willughbey*, avoit la tête d'un noir-bleu. Du reste il ressembloit parfaitement au nôtre.

La femelle diffère du mâle en ce que tout le dessus de son corps est couvert de plumes brunes, bordées de blanc-roussâtre; & que ses côtés & son bas-ventre ne sont point rayés transversalement. Du reste elle lui ressemble assez bien.

Omnes caudæ rectrices in acumen desinunt. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululum superant; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē; unde fit cauda extremitate acuta. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, eleganti aurantio tincti; ungues verò nigricantes. *Ex museo D. Aubry.*

Illius cujus descriptionem dedit *Willughbeius*, caput erat nigro-coeruleum. In reliquis cum *nostrate* perfectè conveniebat.

*Fœmina à mare* discrepat corpore superiore toto peninis vestito fuscis, albo-rufescente marginatis; & lateribus, infimoque ventre nequaquam transversim striatis. In reliquis cum illo satis benè convenit.

## \*\* 9. LA TADORNE.

*Voyez Pl. XXXIII. Fig. 2.*

*Anas candida*; tuberculo in exortu rostri carnosio; capite & collo supremo nigro-viridescentibus; corpore anteriore latâ fasciâ rufâ cincto; pectore & ventre mediis nigro variegatis; maculâ alarum viridi-aureâ, cupri puri colore variante; rectricibus candidis, duodecim intermediis apice nigris . . . . TADORNA.

*Anas*



- Anas albo-variegata*, pectoris lateribus ferrugineis, abdomine longitudinaliter cinereo maculato. *Faun. Suec. Linn. N°.* 93.
- Anas* rostro simo, fronte compressa, corpore albo variegato. *Tadorna. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 3.*
- Anas longirostra* quarta. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 208.*
- Anas maritima. Gesn. Avi. pag. 803. hujus capitis & colli icon satis accurata pag. 804.*
- Gesn. icon. Avi. pag. 134; in qua capitis & colli eadem icon.*
- Anas maritima Rondeletii. Jonst. Avi. pag. 96.*
- Anas Indica* quarta, sive *Anas maritima. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 196. hujus capitis & colli icon à Gesnero mutuata pag. 195.*
- Anas Tadorna Bellonii; Vulpanser quorumdam. Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 433.*
- Tadorna. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 7.*
- Tadorna Bellonii. Raj. Syn. Avi. pag. 140. N°.* A. 1.
- Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. hujus icon minùs accurata Tab. 21.*
- Marfil. Danub. Tom. V. pag. 106. hujus icon pessima Tab. 51.*
- Tadorna Bellonii. Vulpanser quibusdam. Willugh. Ornith. pag. 278. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXX; & insuper altera icon minimè accurata Tab. LXXI.*
- Tadorne Gallis dicta. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 236. hujus icon pessima pag. 237.*
- Tadorne. Jonst. Avi. pag. 98. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 49; sub titulo, Harle.*
- Vulpanser. Gesn. Avi. pag. 161.*
- Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 159.*
- Klein. Avi. pag. 130. N°.* 9.
- Vulpanser, Chenalopex. Charlet. Exer. pag. 103. N°.* 2.
- Charlet. Onomazt. pag. 98. N°.* 2.
- Vulpanser, seu Chenalopex quibusdam. Jonst. Avi. pag. 94.*
- Bergander Aldrovandi. Willugh.*
- Tadorne. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 172; avec une très-mauvaise figure pag. 173.*
- Bel. Portr. d'Ois. pag. 36 b, dans laquelle est la même figure.*
- Morillon. Alb. Tom. I. pag. 81; avec une figure peu exacte Pl. 94.*
- Les Grecs l'appellent Χλωζωπιξ. Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands, BERG-ENDTEN. Gesn. FISCH TREIBER. Schwenck.*
- Les Suédois qui habitent la Province de Gothland, JU-GOAS. Linn. JOGAS; LUGAS. Rzac.*
- Les Anglois, SHELDRAKE ou BURROUGH-DUCK. Gesn. Willugh. Raj. BURROW-DUCK. Charlet. & quelques-uns, BERGANDER. Gesn. Aldrov. Jonst. Willugh. Raj. Charlet.*
- Tom. VI.*



Elle est un peu plus grosse que le *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds, & jusqu'à celui des ongles de vingt-quatre pouces trois lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue quatre pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derrière huit lignes & demie. Elle a trois pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & la partie du col qui est la plus voisine de la tête, sont d'un noir changeant en verd obscur. Le reste du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau blanc. La partie antérieure du corps est presque entièrement entourée d'une large bande rousse, placée au haut du dos & au-dessus de l'origine des aîles, qui descend ensuite, en s'élargissant, par les côtés, & s'étend jusque

*Crassitie Anatem domesticam* paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes explet, & ad extremos ungues viginti quatuor pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices & tres lineas longum est; cauda quatuor pollices; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & tres lineas, extimus duos pollices cum totidem lineis, intimus unum pollicem & decem lineas; posticus autem octo cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & totidem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ ferè pertingunt. Caput, guttur & pars colli capiti finitima nigro tinguntur colore, viridi obscuro variante. Reliquum collum, dorsum, uropygium, superioresque caudæ rectrices candore nitent. Partem corporis anteriorem ferè penitus cingit lata fascia rufa, in superiore dorsi parte & supra alarum exortum posita,



quæque dein, per latera descendendo, sensim atque sensim fit latior, & medium circiter pectus attingit, ibique majore latitudine pollet. Medium pectus, venterque medius, ab infimo collo versùs anum usque, albo & nigro variegantur. Reliquus venter, latera, crurum suprema pars & pennæ alas subtus obtegentes eleganter albicant, nigro nequaquam admixto. Inferiores caudæ tectrices sunt dilutè fulvæ, exceptis tamen majoribus candidis. Scapulares pennæ superiores splendide nigræ : inferiores candidæ : ex superioribus autem quædam sunt in latere interiore albæ, tæniis transversis & undatis nigris variegatæ ; aliæ interiùs penitus candidæ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori viciniore, albent : majores à corpore remotiores splendide nigrificant. Alæ nothæ pennæ similiter nigrificant, attamen in exortu candidæ, sed in latere interiore tantum. Alam componunt viginti sex remiges, quarum decem primores sunt splendide nigrificant : duodecim proximè sequentes, ab un-

vers le milieu de la poitrine, qui est l'endroit où cette bande a le plus de largeur. Le milieu de la poitrine & du ventre, depuis le bas du col jusque vers l'anüs, est varié de noir & de blanc. Le reste du ventre, le haut des jambes, les côtés & les couvertures du dessous des ailes sont d'un beau blanc, sans aucun mélange de noir. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve clair, si l'on en excepte cependant les plus grandes qui sont blanches. Les plumes scapulaires supérieures sont d'un beau noir : les inférieures sont blanches : quelques-unes des premières ont cependant leur côté intérieur d'un blanc varié de bandes noires transversales & en zigzags ; & d'autres l'ont entièrement blanc. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un noirâtre brillant. Les plumes de l'aile bâtarde sont noirâtres, si l'on en excepte leur origine, qui est blanche, mais du côté intérieur seulement. L'aile est composée de vingt-six plumes, dont les dix premières sont d'un noirâtre brillant : les douze suivantes,



ſçavoir depuis l'onzième juſqu'à la vingt - deuxième inclusive-  
ment, ſont du côté extérieur  
d'un verd-doré brillant, chan-  
geant en couleur de cuivre de  
roſette; mais du côté intérieur  
elles ſont blanches à leur ori-  
gine, & noirâtres vers leur ex-  
trémité, le blanc occupant  
d'autant plus d'eſpace, que la  
plume eſt plus proche du corps :  
la vingt-troisième eſt de cou-  
leur de marron du côté exté-  
rieur, & blanche du côté inté-  
rieur; cette dernière couleur  
tire un peu ſur le gris vers la  
tige & ſur le bord de la plume :  
la vingt-quatrième eſt blanche;  
mais ſon côté extérieur eſt mar-  
qué d'une bande longitudinale  
noire, & enſuite bordé de mar-  
ron : la vingt - cinquième eſt  
blanche, & bordée extérieure-  
ment de noir : enfin la vingt-  
fixième eſt entièrement blan-  
che. La queue eſt compoſée de  
quatorze plumes : les douze du  
milieu ſont blanches, & termi-  
nées de noir, cette dernière cou-  
leur occupant d'autant moins  
d'eſpace, que la plume eſt plus  
extérieure : la plus extérieure  
de chaque côté eſt entièrement  
blanche. Toutes les plumes de  
la queue ſe terminent en pointe.  
Les deux du milieu ſont un peu  
plus longues que les latérales,  
qui vont toutes en diminuant

decima ſcilicet ad vigesi-  
mam ſecundam uſque in-  
cluſivè, in latere exteriore  
ſplendidè viridi-aureæ, cu-  
pri puri colore variantes; in  
latere autem interiore ſunt  
ad exortum candidæ, & ver-  
ſus extremitatem nigrican-  
tes, candore eò majus ſpa-  
tium occupante, quò remix  
ſit corpori viciniôr : vigesi-  
ma tertia exteriùs caſtaneo  
colore imbuta, interiùs al-  
ba; albedo autem verſus  
pennæ ſcapum & ad margi-  
nes nonnihil ad grifeum in-  
clinat : vigesima quarta can-  
dida, ſed in latere exteriore  
taniâ longitudinali nigrâ in-  
ſignita, & deinde caſtaneo  
marginata : vigesima quinta  
candida, exteriùs nigro ſim-  
briata : vigesima ſexta tan-  
dem penitùs alba. Quatuor-  
decim rectricibus cauda con-  
flat : duodecim interme-  
diæ candidæ, nigro termi-  
natæ, nigredine ſcilicet eò  
minùs ſpatium occupante,  
quò rectrix ſit exterior : utrin-  
que extrema eſt penitùs can-  
dida. Omnes caudæ rectri-  
ces in acumen deſinunt.  
Binæ intermediæ lateralium  
longitudinem paululùm ſu-  
perant; laterales verò ſen-  
ſim atque ſenſim longitu-  
dine minuuntur ad utrinque



extimam usque breviorē; unde fit cauda extremitate acuta. In mandibulæ superioris exortu exiguum attollitur tuberculum carnosum, carneo colore imbutum. Rostrum pallidè rubrum, exceptis tamen narium ambitu & mandibulæ superioris unguiculo nigris. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguisque carneo colore tincti. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue pointu. Sur l'origine du demi-bec supérieur s'élève un petit tubercule charnu, de couleur de chair. Le bec est d'un rouge pâle, excepté le tour des narines & l'onglet du demi-bec supérieur, qui sont noirs. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont de couleur de chair. On la trouve aux bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

#### 10. LE CANARD D'HIVER.

*Anas superne nigra, infernè alba; capite viridi-aureo, coerulesco & violaceo colore variante; genis, collo, pennis scapularibus & fasciâ supra alas longitudinali candidis; rectricibus griseis. (Mas).*

*Anas in toto corpore fusca. (Fœmina) . . . . ANAS HYBERNA.*

*Anas albida, dorso remigibusque nigris, capite supra infraque tumido fericeo nitente. Anas bucephala. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 19.*

*Anas minor capite purpureo. Klein. Avi. pag. 134. N°. 19.*

Petit Canard à la tête purpurine. *Catesb. Tom. I. pag. 95; avec une figure exacte Pl. 95.*

Les Anglois l'appellent BUFFEL'S HEAD DUCK. *Catesb.*

*Crassitie Anatem domesticam inter & Querquedula medium locum obtinet. Ip-*

Il tient le milieu pour la grosseur entre le Canard domestique & la Sarcelle. Sa longueur depuis



le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied un pouce; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce huit lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes; & celui de derrière cinq lignes & demie seulement. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, si l'on en excepte les joues qui sont blanches, est d'un verd-doré brillant, & changeant en un bleu & un violet très-éclatants. Le dos & le croupion sont noirs, ainsi que les couvertures du dessus de la queue. Le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus des ailes sont noires; il faut cependant en excepter celles qui occupent le milieu, qui sont blanches, & qui forment sur

sius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes unum pollicem; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas; extimus unum pollicem cum octo lineis, intimus unum pollicem & quinque lineas; posticus autem quinque cum semi lineas tantum. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. Caput est splendide viridi-aureum, cœruleo & violaceo colore splendidissimo varians: genæ tamen sunt candidæ. Dorsum, uropygium & superiores caudæ tectrices nigræ. Collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes albicant. Scapulares concolores. Superiores alarum tectrices nigræ, exceptis tamen medium locum obtinentibus candidis, & in utraque ala latam fasciam longitu-



dinallem concolorem efficientibus. Omnes alarum remiges sunt nigrae. Caudam componunt rectrices griseae. Intermediae lateralium longitudinem paululum antecellunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Pennae caput vestientes sunt longiusculae; & majorem capitum praebent crassitiem. Rostrum plumbeo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, rubri.

*Femina à mâle discrepat colore in universo corpore fusco.*

*Habitant in Carolina, sed hyeme tantum.*

chaque aile une large bande longitudinale de cette couleur. Toutes les plumes de l'aile sont noires. La queue est composée de plumes grises. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les plumes qui couvrent la tête sont assez longues; ce qui la fait paroître beaucoup plus grosse qu'elle n'est réellement. Le bec est de couleur de plomb. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont rouges.

*La femelle diffère du mâle par sa couleur, qui est brune par tout le corps.*

*On les trouve à la Caroline pendant l'hyver seulement.*

## \*\* II. LE CANARD D'ÉTÉ.

*Voyez le mâle Pl. XXXII. Fig. 2.*

*Anas cristata, superne obscurè fusca, viridi-aureo colore varians, infernè alba; vertice viridi-aureo; capite ad latera & collo superiore splendidè violaceis; lineâ supra oculos candidâ; cristâ ex viridi-aureo, albo & violaceo variegatâ; pectore castaneo-vinaceo, maculis albis vario; lateribus albo & nigro transversim striatis; macula alarum viridi-aurea, cœruleo & violaceo colore variante, taniâ candidâ infernè donata; rectricibus binis intermediis obscurè*



viridi-aureis, tribus utrinque proximis exterius concoloribus. (*Mas*).  
*Anas cristata*, in toto corpore fusca. (*Fœmina*). . . . *ANAS*  
*ÆSTIVA*.

*Anas* crista dependente duplici viridi-cœruleo alboque varia. Sponsa!

*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 37.*

*Anas* fusca cristata, ad gulam alba, iride flammea. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 481.*

*Anas* cristata Americana. *Klein. Avi. pag. 134. N<sup>o</sup>. 21.*

*Avis* non consistens. *Euf. Nieremb. pag. 215.*

*Willugh. Ornith. pag. 299.*

*Yztactzonyayauhqui*, seu *Avis* varii capitis. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 28. cap. LXIII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 176.*

An Canard ou *Anas* varia cristata? *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 393. (ed. 1725).*

Canard d'été. *Catesb. Tom. I. pag. 97; avec une figure assez exacte Pl. 97.*

Canard d'été de Catesby. *Edwards. Tom. II. pag. CI; avec une figure exacte Pl. 101.*

*Les Anglois l'appellent AMERICAN WOOD DUCK. Browne.*

*Les Mexiquains, YZTACTZONYAYAUHQUI. Fern. Nieremb. Willugh. Raj.*

Il est beaucoup plus petit que le *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied trois pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long; sa queue quatre pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes & demie; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs,

*Anati domesticæ* multum crassitie cedit. Ipsiustudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & tres lineas æquat, & ad extremos unguis unum pedem tres pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & sex lineas longum est; cauda quatuor pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata tres cum semi lineas; pes quatuordecim lineas; trium



trium digitorum anticorum  
medius cum ungue unum  
pollicem & novem lineas,  
extimus unum pollicem cum  
sex lineis, intimus sexdecim  
lineas; posticus autem quin-  
que cum semi lineas tantum.  
Ab extremo ad extremum  
alarum extensarum distantia  
est duorum pedum & toti-  
dem pollicum; alæ verò  
complicatæ nonnihil ultra  
mediam caudæ longitudinem  
extenduntur. Capitis verti-  
cem vestiunt pennæ splendi-  
dissimè viridi-aureæ. Quæ  
occipitium cooperiunt, ma-  
ximâ longitudine pollent,  
supra collum superius depen-  
dent, elegantissimamque cris-  
tam efformant: ex illis autem  
superiores eodem imbuuntur  
viridi-aureo ac caput supe-  
rius ipsum tingitur: eas se-  
quuntur pennæ albæ, quibus  
succedunt pennæ viridi-au-  
reæ, violaceo colore splen-  
dido variantes; quibus novis-  
simis rursus succedunt pen-  
næ albæ; inferiores tandem  
sunt splendidè violaceæ;  
unde quinque in crista fiunt  
tæniæ longitudinales, qua-  
rum superior est viridis, se-  
cunda alba, tertia viridis  
violaceo colore varians,  
quarta alba, quinta tandem  
violacea. In utroque capitis

joint avec l'ongle, un pouce  
neuf lignes, l'extérieur un  
pouce six lignes, l'intérieur  
seize lignes; & celui de der-  
rière cinq lignes & demie seu-  
lement. Il a deux pieds deux  
pouces de vol; & ses ailes,  
lorsqu'elles sont pliées, s'éten-  
dent un peu au-delà de la moi-  
tié de la longueur de la queue.  
Le sommet de la tête est cou-  
vert de plumes d'un verd-doré  
très-brillant. Celles qui cou-  
vrent l'occiput, sont fort lon-  
gues, pendent sur le dessus du  
col, & forment une très-belle  
hupe: les supérieures sont du  
même verd-doré que le dessus  
de la tête: elles sont suivies  
par des plumes blanches, qui  
sont suivies elles-mêmes par des  
plumes d'un verd-doré chan-  
geant en violet éclatant; à ces  
dernières succèdent encore des  
plumes blanches; & enfin les  
inférieures sont d'un violet bril-  
lant; ce qui produit sur la hupe  
cinq bandes longitudinales,  
dont la supérieure est verte, la  
seconde blanche, la troisième  
d'un verd changeant en violet,  
la quatrième blanche, & la cin-  
quième violette. De chaque  
côté de la tête est en outre une  
ligne blanche fort étroite, qui  
part de l'origine du bec, passe  
par-dessus l'œil, & va joindre  
la première bande blanche de



la hupe. Les côtés de la tête & la partie supérieure du col sont d'un violet très-brillant : cette couleur change un peu en verd-doré auprès de l'origine du demi-bec supérieur. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches : cette couleur forme de chaque côté du col deux bandes transversales, dont une remonte vers l'occiput, & l'autre s'étend sur les côtés du col vers sa partie supérieure, sans cependant se joindre avec la bande du côté opposé. Le dos & le croupion sont couverts de plumes d'un brun sombre, & changeant en verd-doré. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, si l'on en excepte quelques-unes, qui retombent sur les côtés, & dont le milieu est roux selon la longueur de la tige. La poitrine est d'un marron-vineux, tout parsemé de taches triangulaires blanches, & marquée sur chacun de ses côtés de deux bandes transversales, l'une d'un blanc de neige, & l'autre d'un noir de velours. Les côtés sont couverts de plumes grises, rayées de petites lignes brunes transversales & en zigzags : chacune de ces plumes est terminée par un noir de velours, sur lequel il y a une ou deux bandes transversales

latere strictissima insuper extat linea candida, ab exortu rostri orta, supra oculum ducta, & primam cristæ tæniæ albam attingens. Caput ad latera & partem colli superiorem tingit color violaceus splendidissimus : qui color prope mandibulæ superioris exortum nonnihil viridi-aureo colore variat. Guttur & collum inferius sunt candida : candor autem binas in utroque colli latere efficit tæniæ transversas, quarum una versùs occipitium ducitur, altera verò supra colli latera versùs ipsius partem superiorem protenditur, nec tamen tæniæ in altero latere positam pertingit. Dorsum & uropygium vestiunt pennæ obscurè fuscæ, viridi-aureo colore variantes. Superiores caudæ tectrices concolores, si tamen quasdam excipias lateribus incumbentes, & in medio secundum ipsarum scapi longitudinem ruscæ. Pectus est castaneo-vinaceum, maculis triangularibus albis respersum, & in utroque latere binis tæniis transversis, unâ scilicet niveo candore nitente, alterâ nigrâ, holoserici villosi instar splendente, insignitum. La-



tera cooperiunt pennæ griseæ, lineolis transversis & undatis fuscis striatæ : quælibet autem penna nigro terminatur, holoserici villosi instar, splendens, unâ vel duplici tæniâ transversâ niveâ notato ; unde fiunt latera elegantissimè albo & nigro transversim striata : laterum tamen pars infima, versùs anum scilicet, est eleganter castaneo - purpurea. Venter totus albus. Pennæ caudam subtus obtegentes obscurè fusce, nonnihil violaceo colore variantes. Tectrices alarum inferiores minimæ & mediæ griseæ, albo transversim striatæ : majores cinereæ, & præcedentium instar, albo striatæ. Pennæ scapulares colore obscuro imbutæ, sed, pro vario quo lucis radii incidunt modo, alternatim viridi-aureo, cœruleo, violaceo & cupri puri coloribus splendidissimis variantes. Superiores alarum tectrices minores dorso concolores : majores corpori finitimæ iisdem ac scapulares coloribus nitentes : majores autem à corpore remotiores fusce. Alarum componunt viginti quatuor remiges : decem primores fusce ; ex illis autem sex, à secunda scilicet

d'un blanc de neige ; ce qui rend les côtés fort joliment rayés transversalement de blanc & de noir : cependant le bas des côtés, vers l'anus, est d'un beau marron-pourpré. Tout le ventre est blanc. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun sombre, qui change un peu en violet. Les petites & les moyennes du dessous des ailes sont grises, & rayées transversalement de blanc : les grandes sont cendrées, & rayées de blanc, comme les précédentes. Les plumes scapulaires sont d'une couleur sombre, mais changeante alternativement & selon les différens reflets de lumière, en verd-doré, en bleu ; en violet & en couleur de cuivre de rosette, le tout très-éclatant. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur que les scapulaires : & les grandes les plus éloignées du corps sont brunes. L'aile est composée de vingt-quatre plumes : les dix premières sont brunes ; mais six de celles-là, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la septième inclusivement, sont marquées de gris-blanc vers leur bout du côté extérieur seulement ; & huit, sçavoir depuis la seconde



jusqu'à la neuvième inclusive-  
 ment, ont leur côté intérieur  
 terminé de verd-doré : l'onzième  
 est brune, & terminée de  
 blanc : les huit suivantes, sça-  
 voir depuis la douzième jusqu'à  
 la dix-neuvième inclusivement,  
 sont pareillement brunes du  
 côté intérieur; mais leur côté  
 extérieur est d'un verd-doré,  
 changeant en bleu & en violet  
 très-éclatants; & elles sont aussi  
 terminées de blanc; ce qui  
 forme sur chaque aile une pe-  
 tite bande transversale de cette  
 couleur, au-dessus de laquelle  
 est une tache qui brille des  
 couleurs les plus éclatantes :  
 la vingtième est de la même  
 couleur que ces dernières, mais  
 elle n'est pas terminée de blanc :  
 les quatre plus proches du corps  
 sont de la même couleur que  
 les scapulaires; mais la vingt-  
 unième & la vingt-deuxième  
 sont terminées d'un peu de  
 blanc. La queue est composée  
 de seize plumes : les deux du  
 milieu sont d'un verd-doré som-  
 bre, mais brillant : les trois qui  
 les suivent immédiatement de  
 chaque côté, sont de la même  
 couleur du côté extérieur, &  
 brunes du côté intérieur : les  
 quatre plus extérieures de cha-  
 que côté sont brunes, & n'ont  
 qu'un peu de verd-doré sur leur  
 bord extérieur; la plus extérieu-

ad septimam usque inclusivè;  
 cinereo-albo versùs ipsarum  
 extremitatem, sed in latere  
 exteriori tantùm, notatæ;  
 octo verò, à secunda scilicet  
 ad nonam usque inclusivè,  
 sunt in latere interiore viridi-  
 aureo terminatæ : undecima  
 fusca, apice albo prædita :  
 octo proximè sequentes, à  
 duodecima scilicet ad deci-  
 mam nonam usque inclusivè,  
 sunt quoque in latere inte-  
 riore fuscæ, in exteriori verò  
 viridi-aureæ, cœruleo & vio-  
 laceo colore splendidissimo  
 variantes, & albo insuper ter-  
 minatæ; unde fit in utraque  
 ala exigua tania transversa  
 candida, supra quam macula  
 extat splendidissimis colori-  
 bus nitens : vigesima his nu-  
 per descriptis concolor, sed  
 albo nequaquam terminata :  
 quatuor corpori viciniore  
 iisdem ac scapulares colo-  
 ribus imbutæ; vigesima prima  
 autem & vigesima secunda  
 pauco candido terminantur.  
 Sexdecim rectricibus cauda  
 constat : binæ intermediæ  
 sunt obscurè quidem, sed  
 splendide, viridi-aureæ : tres  
 utrinque proximè sequentes  
 in latere exteriori concolo-  
 res, in interiore fuscæ : qua-  
 tuor utrinque extimæ fuscæ,  
 & ad marginem exteriorem



pauco tantum viridi-aureo notatæ; utrinque etiam extrema nequaquam viridi-aureo notatur. Binæ rectrices intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur, ad utrinque extimam usque brevior. Oculorum irides avellaneæ: ipsorum palpebræ coccineæ. Mandibula superior in exortu lutea, deinde coccinea, post coccineum colorem pauco albo notata, & tandem in extremitate nigra; longiuscula quoque extat macula similiter nigra, duas inter nares posita, & per mediam rostri longitudinem & amplius extensa: mandibula inferior penitus nigra. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti obscurè aurantii; ipsorum membranæ obscuriore colore imbutæ; ungues verò nigri.

*Fœmina à mare discrepat colore in universo corpore fusco.*

Habitant in *Carolina* & *Virginia*. In foraminibus arborum in aquis crescentium nidificant. *Ex museo D. Aubry.*

re n'en a même point du tout. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette: les paupières sont d'un rouge-vif. Le demi-bec supérieur est jaune à son origine, ensuite d'un rouge vif, lequel est suivi d'un peu de blanc, & enfin terminé de noir; il y a aussi une longue tache de la même couleur, placée entre les deux narines, & qui s'étend dans plus de la moitié de la longueur du bec: le demi-bec inférieur est tout-à-fait noir. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les doigts sont d'un orangé obscur; leurs membranes sont d'une couleur plus sombre; & les ongles noirs.

La femelle diffère du mâle par sa couleur, qui est brune par tout le corps.

On les trouve à *la Caroline* & en *Virginie*. Ils font leur nid dans les trous des arbres qui croissent dans l'eau. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*



## 12. LE CANARD DE BAHAMA.

*Anas superne fusco-rufescens, infernè griseo-rufescens, nigricante punctulata; maculâ utrinque in exortu rostri triangulari aurantiâ; capite superiore griseo-rufescente; genis, gutture & collo inferiore candidis; macula alarum viridi, taniâ superne flavicante, infernè primùm nigrâ, dein latiusculâ flavicante donata; rectricibus griseis . . .*  
**ANAS BAHAMENSIS.**

*Anas grisea, rostro plumbeo: macula laterali fulva, macula alarum viridi luteaque. Anas Bahamensis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 14.*

*Anas Bahamensis. Klein. Avi. pag. 134. N<sup>o</sup>. 18.*

*Anas sylvestris Brasiliensis Mareca dicta prima Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 292.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 149. N<sup>o</sup>. 4.*

*Mareca Anatis sylvestris species. Marcgr. Hist. Br. pag. 214.*

*Jonst. Avi. pag. 146.*

*Canard de Bahama. Catesb. Tom. 1. pag. 93; avec une figure exacte Pl. 93.*

*Les Anglois l'appellent ILATHERA DUCK. Catesb.*

*Les Brasiliens, MARECA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Il est un peu moins gros que le *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied-cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied quatre pouces six lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied treize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux

*Anati domesticæ paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque circiter pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem quatuor pollices & sex lineas. Rostrium ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & decem lineas longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes tredecim lineas; trium digitorum anticorum*



medius cum ungue duos pollices, extimus unum pollicem & undecim lineas, intimus unum pollicem cum octo lineis; posticus autem quinque lineas. Alæ complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Capitis superior pars ex griseo rufescit. Collum superius, dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt fusco-rufescentes. Genæ, guttur & pars colli inferior albicant. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera ex griseo - rufescunt, & nigricante maculantur. Pennæ caudam superne & infernè cooperientes sunt griseo-rufescentes & immaculatæ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ obscurè fuscæ : majores corpori finitimæ, sicut & à corpore remotiores, eodem imbutæ colore : majores intermedia in latere interiore griseo-fuscæ, in exteriori verò latere versùs ipsarum exortum flavicantes, deinde virides, & tandem nigro terminatæ; unde in utraque alæ tres fiunt taniæ transversæ, una scilicet latiuscula viridis, supra quam altera extat flavicans, & infra eam altera nigra. Remiges alarum majores

pouces, l'extérieur un pouce onze lignes, l'intérieur un pouce huit lignes; & celui de derrière cinq lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un gris-rouffâtre. Le dessus du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun-rouffâtre. Les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont blanches. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un gris-rouffâtre, tacheté de noirâtre. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un gris-rouffâtre & sans taches. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont d'un brun obscur : les grandes les plus proches, ainsi que les plus éloignées du corps, sont de la même couleur : les grandes intermédiaires sont d'un gris-brun du côté intérieur; mais leur côté extérieur est jaunâtre vers son origine, ensuite verd, & terminé de noir; ce qui forme sur chaque aile trois bandes transversales, sçavoir une verte assez large, au-dessus de laquelle en est une jaunâtre, & au-dessous une noire. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun-obscur : les moyennes sont



jaunâtres, & forment encore sur chaque aîle une bande transversale de cette couleur. La queue est composée de plumes grises, terminées en pointe. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le bec est de couleur de plomb, & marqué sur chacun de ses côtés, vers son origine, d'une tache triangulaire orangée. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb. On le trouve à l'*Iste Bahama* & au *Bresil*.

res sunt obscurè fuscae : minores flavicantes, & in utraque ala alteram adhuc tæniam transversam concolorem efficientes. Caudam componunt rectrices griseae, in acumen desinentes. Intermediae lateralium longitudinem paululum superant; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuantur ad utrinque extimam usque breviorē; unde fit cauda in extremitate acuta. Rostrum plumbeo colore imbutum, & in utroque latere, versùs ipsius exortum, maculâ triangulari aurantiâ insignitum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digitî, sicut & ipsorum membranae, plumbeo colore tincti. Habitat in *Bahamensi Insula* & *Brasilia*.

### 13. LE CANARD DU BRÉSIL.

*Anas* superne saturatè fusca, infernè obscurè grisea, ad aureum colorem vergens; maculâ utrinque rostrum inter & oculus rotundâ albo-flavescente; gutture albicante; macula alarum viridi-cœrulea, tæniâ nigrâ infernè donata; rectricibus nigris . . . *ANAS BRASILIENSIS*.

*Anas sylvestris Brasiliensis*, Mareca dicta secunda Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 293.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 149. N° 5.*

Mareca, alia species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 214.*

*Jonst. Avi. pag. 147.*

Les *Brasiliens* l'appellent *MARECA*. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Cum



Cum præcedente crassitie convenit. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt saturatè fuscæ. In utroque capitis latere macula extat rotunda albo-flavescens, rostrum inter & oculum posita. Guttur albi-cat. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem, crurum partem supremam, inferiores caudæ tectrices & latera tingit color obscurè griseus, ad aureum colorem vergens. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ sunt splendide fuscæ, nonnihil viridi colore variantes : majores corpori finitimæ, sicut & à corpore remotiores, concolores : majores intermedia in latere interiore fuscæ, in exteriore verò latere splendide viridi-cœruleæ, nigro terminatæ ; unde in utraque ala binæ fiunt taniæ transversæ, una scilicet latiuscula viridi-cœrulea, infra quam altera extat strictior nigra. Remiges alarum fuscæ, apicibus albis prædita. Caudam componunt tectrices nigræ. Intermedia lateraliū longitudinem paululū antecellunt ; laterales verò sensim atque sensim lon-

Il est de la même grandeur que le précédent. Le dessus de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé. De chaque côté de la tête est une tache ronde d'un blanc-jaunâtre, placée entre le bec & l'œil. La gorge est blanche. Le dessous du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un gris-obscur, tirant sur la couleur d'or. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont d'un brun brillant, & changeant un peu en verd : les grandes les plus proches, ainsi que les plus éloignées du corps, sont de la même couleur : les grandes intermédiaires sont brunes du côté intérieur ; mais leur côté extérieur est d'un verd-bleu fort brillant, & terminé de noir ; ce qui forme sur chaque aile deux bandes transversales ; sçavoir une d'un verd-bleu assez large, au-dessous de laquelle en est une noire plus étroite. Les plumes de l'aile sont brunes, & terminées de blanc. La queue est composée de plumes noires. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en dimi-



nuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un noir brillant. La partie des jambes qui est dégarée de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge vif. On le trouve au *Brésil*.

gitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum splendide nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, coccinei. Habitat in *Brasilia*.

#### 14. LE CANARD A COLLIER DE TERRE-NEUVE.

*Anas fusco-nigricans*; capite superiore & collo nigris; maculâ utrinque rostrum inter & oculum, alterâ ponè oculum, & taniâ longitudinali ad colli latera candidis; torque in medio albo, ad margines splendide nigro; taniâ transversâ ad exortum alarum concolore; pectore cinereo-cœrulescente; lateribus rufis; uropygio nigro-cœrulescente; rectricibus fuscis . . . . *ANAS TORQUATA EX INSULA TERRÆ-NOVÆ*.

*Anas fusca*, albo cœruleoque varia, auribus temporibus linea gemina, collari fasciaque pectorali albis. *Anas histrionica*. *Linn. Syst. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 30.*

Canard brun & tacheté. *Edwards. Tom. II. pag. XCIX; avec une figure exacte Pl. 99.*

Il est à peu près de la grosseur du *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses

*Anatem domesticam* crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & quinque circiter pollices æquat, & ad extremos ungues sexdecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas lon-



gum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes unum pollicem cum quinque lineis; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus unum pollicem cum septem lineis, intimus sexdecim lineas; posticus autem quatuor cum semi lineas tantum. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. Caput superius & collum nigra sunt. Spatium in utroque capitis latere rostrum inter & oculum contentum album: albedo autem supra oculos protenditur, ibique exiguae efformat taniam, quæ, versùs occipitium procedendo, magis magisque rufescit. Caput ad latera, idque ponè oculos, est obscurè cœruleum, ad purpureum colorem nonnihil inclinans. In medio cœrulei coloris macula extat rotunda candida, versùs aures posita. In utroque colli latere tania quoque extat longitudinalis candida, per totam ferè colli longitudinem extensa. Summum pectus taniâ donatur transversâ in medio albâ, nigro, holoserici villosi instar splen-

jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur un pouce sept lignes, l'intérieur seize lignes; & celui de derrière quatre lignes & demie seulement. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le dessus de la tête & le col sont noirs. L'espace contenu de chaque côté de la tête entre le bec & l'œil, est blanc: cette couleur s'étend au-dessus des yeux, & y forme une petite bande qui devient de plus en plus roussâtre, en approchant de l'occiput. Les côtés de la tête, derrière les yeux, sont d'un bleu obscur, tirant un peu sur le pourpre. Au milieu de cette couleur est une tache ronde blanche, placée vers les oreilles. De chaque côté du col est aussi une bande longitudinale blanche, qui s'étend dans presque toute sa longueur. Sur le haut de la poitrine est une bande transversale blanche dans son milieu, bordée dessus & dessous d'un noir de velours, & qui forme une espece de collier. De chaque côté, au-dessus de l'origine des aîles, est une autre



bande transversale de la même couleur que le collier. Le dos est d'un brun-noirâtre ; mais sa partie supérieure tire un peu sur le pourpre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-bleu très-foncé. Les plumes scapulaires sont blanches dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & d'un cendré-bleu sur leurs bords. La poitrine est de cette dernière couleur. Le ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-noirâtre ; sur chacun des côtés, vers l'origine de la queue, est cependant une petite tache blanche. Les côtés sont roux. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un brun obscur. Les plus petites du dessous, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont roussâtres : les moyennes sont d'un cendré-bleuâtre : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes : les grandes intermédiaires sont de la même couleur du côté intérieur ; mais leur côté extérieur est d'un bleu tirant sur le pourpre, & terminé de blanc ; ce qui forme sur chaque aile une petite bande transversale blanche. Vers le haut

dente, superne & infernè marginatâ, & torquem quodammodo efficiente. In utroque latere, supra alarum exortum, altera adest tænia transversa torqui concolor. Dorsum ex fusco nigricat ; atamen in parte suprema non nihil ad purpureum colorem inclinat. Uropygium & superiores caudæ tectrices sunt saturatissimè nigro-cœrulescentes. Pennæ scapulares in medio secundum ipsarum scapi longitudinem candidæ, ad margines cinereo-cœrulescentes. Pectus ex cinereo quoque cœrulescit. Venter, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes ex fusco nigricant ; in utroque tamen latere, versus caudæ exortum, minuta extat macula candida. Latera rufò tinguntur. Tectrices alarum inferiores sunt obscurè fuscæ. Superiores minimæ, istæ scilicet quæ articulum carpo humano respondentem cooperiunt, rufescentes : mediæ cinereo-cœrulescentes : majores corpori finitimæ concolores : majores à corpore remotiores fuscæ : majores intermedia in latere interiore eodem fusco imbutæ, in exteriori verò cœruleæ, ad purpureum



vergentes, & albo terminatæ; unde fit in utraque ala exigua tania transversa candida. Versus partem alæ superiorem exigua quoque adest macula rotunda concolor. Remiges majores fusæ sunt: proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum obtinent, in latere interiore concolores, in exteriori cæruleæ, ad purpureum inclinantes: corpori viciniore pennis scapularibus concolores. Caudam componunt rectrices fusæ, in acumen desinentes. Intermediæ lateralium longitudinem paululum superant; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum; unde fit cauda in extremitate acuta. Rostrum nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguisque ex nigro cœrulescunt. Habitat in *Insula Terræ-novæ*.

de l'aîle est aussi une petite tache ronde de cette couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont brunes: les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur du côté intérieur, & d'un bleu tirant sur le pourpre du côté extérieur: les plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes scapulaires. La queue est composée de plumes brunes, terminées en pointé. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont d'un noir-bleuâtre. On le trouve à l'*Ile de Terre-neuve*.

# 15. LE CANARD DE LA BAYE DE HUDSON.

*Anas fusco-nigricans*, superne ad purpurascentem colorem inclinans; capite superiore dilutè cinereo-cœrulescente; triplici in fronte, duplici sub gutture taniâ, & oculorum ambitu nigris; genis pallidè virescentibus; gutture, collo, pectore, maculâ in alis, alterâ in utroque uropygii latere



candidis ; rectricibus saturatè fuscis . . . , ANAS FRET  
HUDSONIS.

Anas rostro basi gibbo compresso ; carina pennacea nigra , capite canescente. *Anas spectabilis*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 4.* Canard à la tête grise. *Edwards. Tom. III. pag. CLIV ; avec une figure exacte Pl. 154.*

*Les Anglois l'appellent* GREY HEADED DUCK. *Edwards.*

Il est beaucoup plus gros que le *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied onze pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces six lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes & demie de long ; sa queue trois pouces dix lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , six lignes ; son pied un pouce dix lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , deux pouces sept lignes , l'extérieur deux pouces cinq lignes , l'intérieur deux pouces ; & celui de derrière huit lignes. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un cendré-bleuâtre clair. Les côtés de la tête , au-dessous des yeux , ou les joues sont d'un verd pâle. Sur le front sont de petites plumes noires , qui

*Crassitie Anatem domesticam* multum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem undecim pollices & tres circiter lineas explet , & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & decem cum semi lineas longum est ; cauda tres pollices & decem lineas ; pars crurum plumis denudata sex lineas ; pes unum pollicem cum decem lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & septem lineas , extimus duos pollices cum quinque lineis , intimus duos pollices ; posticus autem octo lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput superius ex dilutè cinereo coerulescit. Caput ad latera , infra oculos scilicet , sive genæ pallidè virescunt. In



fronte plumulæ extant nigrae, tres efficientes tæbias longitudinales, supra rostrum usque productas, unam scilicet in medio positam, & utrinque alteram. In utroque gutturis latere tæbia adest longitudinalis concolor. Oculorum ambitus est quoque niger. Ponè oculos minutissimæ extant maculæ nigrae, simul efficientes lineam, quæ cinereum colorem caput superius tingentem à viridi genarum colore distinguit. Guttur, collum & pectus albicant. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt fusco-nigricantes, nonnihil ad purpurascentem colorem inclinantes. Venter, crurum suprema pars & latera ex fusco nigricant. Pennæ caudam superne & infernè cooperientes sunt splendide nigrae; utrinque tamen, infra uropygium, majuscula extat macula candida. Tectrices alarum inferiores similiter candidæ, si tamen excipias ex minimis quasdam, ad alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, collocatas, & dilutè fuscas. Superiores alarum tectrices minimæ fusca: mediæ candidæ; unde fit in utraque ala ma-

forment trois bandes longitudinales, qui s'étendent jusque sur le bec, sçavoir une placée dans le milieu, & une autre de chaque côté. De chaque côté de la gorge est une bande longitudinale de la même couleur. Le tour des yeux est pareillement noir. Derrière les yeux sont de très-petites taches noires, qui forment ensemble une ligne, laquelle sépare le cendré du dessus de la tête du verd des joues. La gorge & le col sont blancs, ainsi que la poitrine. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun-noirâtre tirant un peu sur le pourpre. Le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un brun-noirâtre. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un noir brillant; de chaque côté, au-dessous du croupion, est cependant une grande tache blanche. Les couvertures du dessous des ailes sont de cette dernière couleur, si l'on en excepte quelques-unes des plus petites, placées sur le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, qui sont d'un brun clair. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont brunes: les moyennes sont blanches; ce qui forme sur chaque aile une grande tache de cette couleur: les gran-



des les plus éloignées du corps sont brunes : toutes les autres sont d'un brun - noirâtre tirant sur le pourpre. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun-foncé : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont brunes du côté intérieur ; mais leur côté extérieur est d'un noir pourpré, & terminé de blanc ; ce qui forme sur chaque aile une petite bande transversale de cette couleur : enfin les plus proches du corps sont d'un brun - noirâtre tirant sur le pourpre. La queue est composée de plumes d'un brun foncé. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est rouge, excepté son extrémité, qui est noirâtre. Le demi-bec supérieur se divise à son origine en deux lames plates, qui sont couchées sur le front. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge sale. On le trouve à la *Baye de Hudson*.

juscula macula concolor : majores à corpore remotiores fusca : reliquæ omnes fusco - nigricantes, ad purpureum colorem vergentes. Remiges alarum majores saturate fusca : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum occupant, in latere interiore fusca, in exteriori verò nigro-purpurascens, albo terminata ; unde fit in utraque ala exigua tænia transversa candida : corpori tandem finitimæ fusco-nigricantes, ad purpureum colorem inclinantes. Cauda rectricibus constat saturatè fuscis. Intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum rubrum ; attamen in extremitate nigricans. Mandibula superior ad ipsius exortum in duas dividitur laminas planas fronti incumbentes. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membrana, sordidè rubri. Habitat in *Freto Hudsonis*.



**\*\* 16. LE CANARD A LONGUE QUEUE.**

*Voyez Pl. XXXIV. le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2.*

*Anas superne fusco & cinereo transversim & undatim striata; internè alba; capite & collo supremo fuscis, marginibus pennarum in vertice griseo-rufescentibus, occipitio cupri puri colore variante; tania longitudinali in collo superiore nigra, areâ candidâ utrinque donata; macula alarum cupri puri colore tincta, taniâ superne fulvâ, internè primùm nigrâ, dein dilutè fulvâ donata; rectricibus binis intermediis longissimis nigris. (Mas).*

*Anas superne nigricante & rufescente varia, internè candicans, griseo & griseo-fusco maculata; macula alarum ad cupri puri colorem vergente, taniâ superne fulvâ, internè primùm nigricante, dein albâ donata; rectricibus quatuor intermediis longioribus, nigricantibus, rufescente transversim striatis. (Fœmina) . . . . ANAS LONGICAUDA.*

*Anas cauda cuneiformi acuta. Faun. Suec. Linn. N°. 96.*

*Anas cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque lineâ alba. Anas acuta. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 25.*

*Anas cinerea, cauda duabus pennis nigris longissimis definita. Barr. Ornith. Class. I Gen. I. sp. 8.*

*Anas cauda acuta. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 10.*

*Anas caudacuta. Gesn. Avi. pag. 121.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 234.*

*Jonst. Avi. pag. 98. hujus duæ icones Tab. 49, una scilicet minimè accurata, sub titulo, Anas; & altera à Gesnero mutuata, sub titulo, Anas fera.*

*Charlet. Exer. pag. 106. N°. 10.*

*Charlet. Onomazt. pag. 99. N°. 10.*

*Anas caudacuta Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 289. hujus iconæ minimè accurata Tab. LXXII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 147. N°. A. 5.*

*Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 355.*

*Anas caudata, sive caudacuta. Frisch. maris icon non satis accurata. Tab. 160.*

*Anas fera duodecima, seu caudacuta. Schwenck. Avi. Sil. pag. 202.*

*Anas fera duodecima, seu caudacuta, Schwenckfeldii, Aldrovandi.*

*Klein. Avi. pag. 133. N°. 15,*

*Tom. VI,*

**Aaa**



- Anas fera marina. *Gesn. Avi. pag. 120, in qua hujus icon pessima.*  
 Anas fera quædam marina. *Gesn. icon. Avi. pag. 75, in qua eadem icon.*  
 Anas See-Vogel dicta. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 229.*  
 An Anas fera ventre candido? *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 324.*  
 N<sup>o</sup>. XI.  
*Raj. Syn. Avi. pag. 192. N<sup>o</sup>. 13.*  
*Klein. Avi. pag. 136. N<sup>o</sup>. 32.*  
 Tzitzihua. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 35. cap. CIV.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 175.*  
 Phaisand de mer. *Alb. Tom. II. pag. 60; avec des figures mal coloriées,*  
*du mâle Pl. 94, & de la femelle Pl. 95.*  
*Les François l'appellent COQ DE MER.*  
*Les Catalans, CUALLARCH. Barr.*  
*Les Romains, CODA LANCEA. Willugh.*  
*Les Allemands, MEER-ENT. Gesn. SEE-VOGEL; & en quelques endroits,*  
*SPITZ-SHWANTZ. Gesn. Aldrov. SPIETZ-SHWANTZ. Schwenck.*  
*Les Silésiens, SPIES ENDTE. Schwenck.*  
*Les Suédois, ALA; ALER; AHL-FOGEL. Linn.*  
*Les Anglois, SEA-PHEASANT. Willugh. Raj. Razac. CRACKER. Willugh.*  
*Raj. Charlet.*  
*Les Oïseleurs de Londres, GADDEL. Charlet.*  
*Les Anglois de la Jamaïque, WHITE-BELLIED DUCK. Sloane. Raj.*  
*Les Mexiquains, TZITZIHUA. Fern.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Canard sauvage*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue sept pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, cinq lignes & demie; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces une ligne, l'ex-

*Anati feræ paululùm crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices & tres lineas longum est; cauda septem pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata quinque cum semi lineas; pes unum pollicem cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius*



cum ungue duos pollices cum linea unica, extimus unum pollicem & undecim lineas, intimus unum pollicem cum septem lineis; posticus autem sex cum semi lineas tantum. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & octo pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non pertingunt. Partem capitis superiorem vestiunt plumulæ in medio fuscæ, ad margines griseo-rufescentes. Caput ad latera, guttur, collum inferius & ad latera, in parte solummodo capiti finitima, fusca sunt: color autem fuscus versùs occipitium nonnihil cupri puri colore variat. Reliquum collum albicat, exceptâ solummodo latiusculâ tæniâ supra partem ipsius superiorem ab occipitio ad dorsum usque protensâ, versùs caput splendide nigrâ, versùs dorsum autem cinereâ & tantummodo nigro marginatâ. In utroque tæniæ istius latere albor colli latera tingens versùs occipitium usque ducitur, ibique aream alteram candidam efformat. Dorsum supremum & latera lineolis strictissimis, alterna-

térieur un pouce onze lignes, l'intérieur un pouce sept lignes; & celui de derriere six lignes & demie seulement. Il a deux pieds huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de petites plumes brunes dans leur milieu, & bordées d'un gris-roussâtre. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, seulement dans l'endroit le plus voisin de la tête, sont bruns: cette couleur vers l'occiput change un peu en couleur de cuivre de rosette. Tout le reste du col est blanc, si l'on en excepte seulement une assez large bande, qui s'étend sur sa partie supérieure depuis l'occiput jusqu'au dos, & qui est vers la tête d'un noir brillant, & devient ensuite cendrée & seulement bordée de noir vers le dos. De chaque côté de cette bande le blanc des côtés du col remonte jusque vers l'occiput, & y forme une autre bande de cette couleur. La partie supérieure du dos & les côtés sont rayés transversalement & ont zigzags de petites lignes brunes étroites, alternatim parties brunes & cendrées. A a a ij



férieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un cendré-brun, mais dont le milieu est d'une couleur plus foncée. Les petites couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, & de plus bordées de gris-fauve : les grandes sont de cette dernière couleur du côté intérieur, & noires du côté extérieur. Parmi les plumes scapulaires, les supérieures sont à leur origine rayées des mêmes couleurs que les plumes de la partie supérieure du dos, & terminées de noir : les suivantes, qui sont très-longues, & se terminent en pointe, sont dans leur milieu d'un noir de velours, & bordées de fauve très-clair dans toute leur circonférence ; dans quelques plumes cependant la bordure extérieure ne suit pas toujours les bords, mais rentre dans le corps de la plume : enfin les inférieures, qui sont assez larges, sont d'un cendré brun. La poitrine & le haut du ventre sont blancs. Le bas-ventre est d'un blanchâtre tout parsemé de petits points gris, & rayé transversalement & en zigzags de petites lignes de la même couleur. Les bas des côtés, versous, est d'un fauve clair. Les queues des du dessous de la noires, & toutes,

tim fuscis & cinereis sunt transversim & undatim striata. Dorsum infimum & uropygium pennis vestiuntur cinereo-fuscis, in medio tamen saturatiore colore tinctis. Testrices caudæ superiores minores concolores, & griseo-fulvo insuper fimbriatæ : majores in latere interiore griseo-fulvæ, in exterioriore nigrae. Ex scapularibus pennis, superiores sunt in exortu iisdem ac pennæ dorsum supremum vestientes coloribus striatæ, & nigro terminatæ : sequentes, quæ quidem maximam longitudinem obtinent, & in acumen desinunt, sunt in medio nigrae, holoserici villosi instar, splendentes, & in tota circumferentia dilutissimo fulvo fimbriatæ ; in quibusdam tamen pennis margo exterior non semper margines sequitur, sed supra pennæ superficiem ducitur : inferiores tandem, quæ latiusculæ, sunt cinereo-fuscae. Pectus & venter supremus albet. Venter imus candicans, punctulis griseis in tota superficie respersus, & lineolis concoloribus transversim & undatim striatus. Laterum infima pars, versus anum scilicet, est dilutè



*Fulva.* Pennæ caudam subtus obtegentes nigræ, omnes, exceptis tamen medium locum occupantibus, albo exterius fimbriatæ. Tectrices alarum inferiores minores cinereo-fuscæ, pauco albido variegatæ : majores dilutè cinereæ, pauco candicante similiter variæ. Omnes alarum superiores tectrices sunt cinereo-fuscæ ; ex majoribus tamen, septem aut octo, illæ scilicet quæ medium locum tenent, apicibus fulvis præditæ sunt ; unde fit in utraque ala exigua tania transversa concolor. Alarum componunt viginti quinque remiges, quarum decem primores in latere exteriori & apice fuscæ, in latere interiori griseo-fuscæ, & scapo albido præditæ : undecima & duodecima cinereo-fuscæ, exterius fulvo diluto, interiorius albo terminatæ : octo proximè sequentes, à decima tertia scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in latere exteriori ad exortum cinereo-fuscæ, deinde cupripuri colore splendidissimo imbutæ, quem colorem sequitur tania transversa nigra, holoserici villosi instar, splendens, & tandem fulvo diluto terminatæ ; in latere

excepté celles qui occupent le milieu, sont bordées extérieurement de blanc. Les petites du dessous des ailes sont d'un cendré-brun, & variées d'un peu de blanchâtre : les grandes sont d'un cendré-clair, varié de même d'un peu de blanchâtre. Toutes les couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré-brun ; cependant sept à huit des grandes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont terminées de fauve ; ce qui forme sur chaque aile une petite bande transversale de cette couleur. L'aile est composée de vingt-cinq plumes : les dix premières sont brunes du côté extérieur & à leur bout, d'un gris-brun du côté intérieur, & ont leur tige blanchâtre : l'onzième & la douzième sont d'un cendré-brun, & terminées de fauve clair du côté extérieur & de blanc du côté intérieur : les huit suivantes, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont du côté extérieur d'un cendré-brun à leur origine, ensuite d'une couleur de cuivre de rosette très-brillante, qui est suivie d'une bande transversale d'un noir de velours, & enfin terminées de fauve clair ; leur côté intérieur est d'un cendré-brun, & terminé de blanc : la vingt-



unième est d'un noir de velours du côté extérieur, excepté une bande d'un joli gris-blanc, qui s'étend tout le long de sa tige; son côté intérieur est d'un gris-brun, & marqué d'un peu de noir de velours tout le long de la tige vers l'extrémité de la plume: les quatre plus proches du corps, sçavoir depuis la vingt-deuxième jusqu'à la vingt-cinquième inclusivement, sont d'un gris-brun, & marquées d'une large bande longitudinale d'un noir de velours, qui dans la vingt-deuxième plume s'étend sur le côté intérieur tout le long de la tige, & dans les trois autres occupe le milieu de la plume. Ces cinq dernières plumes sont fort longues, se terminent en pointe, & quelques-unes s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'à un pouce neuf lignes au-delà de l'origine de la queue. La queue est composée de dix-huit plumes: les deux du milieu sont noires, excepté leur origine, qui est grise, & marquée du côté intérieur seulement de quelques petits points d'une couleur plus claire: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est d'un gris-brun du côté intérieur, noire du côté extérieur & à son bout, & bordée extérieurement de gris: la troisième

interiore sunt cinereo-fusca, albo terminata: vigesima prima in latere exteriori nigro, holoserici villosi instar, splendente tincta, exceptâ tamen taniâ eleganter cinereo-albâ, secundum scapi longitudinem ductâ, in latere verò interiore griseo-fusca, paucò nigro, holoserici villosi instar, splendente versùs ipsius extremitatem secundum scapi longitudinem notata: quatuor corpori viciniore, à vigesima secunda scilicet ad vigesimam quintam usque inclusivè, sunt griseo-fusca, latâ insignitâ taniâ longitudinali nigrâ, holoserici villosi instar, splendente, in vigesima secunda remige supra latus interius secundum scapi longitudinem extensâ, & in tribus reliquis remigibus ipsarum medium occupante. Quæ quinque novissimè dictæ remiges maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, ex illis quædam ad unius pollicis & novem linearum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Octodecim rectricibus cauda constat: binæ intermedia nigra, attamen in exortu grisea, & quibusdam punctulis dilutiore colore



tinētis, sed interiùs tantùm, notatæ : utrinque proximè sequens in latere interiore griseo-fusca, in latere exteriori & extremitate nigra, griseo exterioriùs marginata : tertia grisea, exterioriùs & apice fulvo diluto simbriata, & in latere exteriori latâ taniâ nigricante, secundùm ipsius scapi longitudinem ductâ, insignita : sex utrinque extimæ dilutè griseæ, exterioriùs & apice dilutissimo fulvo marginatæ; ex istis autem sex novissimis, quatuor intimæ quibusdam insuper notantur minutis maculis dilutissimè fulvis. Sex rectrices intermediae in acutissimum mucronem desinunt. Binæ intermediae lateralium longitudinem multùm excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis quatuor pollicum & trium linearum longitudine cedentem. Mandibula superior in medio & ad margines nigra, ad latera cinereo-coeruleascens sive plumbeo colore tincta : mandibula inferior nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, plumbeo colore imbuti; ungues verò fusci.

me est grise, bordée de fauve clair extérieurement & à son bout, & marquée sur son côté extérieur d'une large bande noirâtre, qui s'étend tout le long de la tige : les six plus extérieures de chaque côté sont d'un gris clair, & bordées extérieurement & à leur bout d'un fauve très-clair; de ces six dernières, les quatre plus intérieures sont de plus marquées de quelques petites taches de fauve très-clair. Les six plumes du milieu de la queue se terminent en pointe fort aiguë. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte que les deux du milieu de quatre pouces trois lignes. Le demi-bec supérieur est noir sur son milieu & sur ses bords, & d'un cendré-bleuâtre ou de couleur de plomb sur les côtés : le demi-bec inférieur est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb; & les ongles bruns.



La femelle (voyez Pl. XXXIV. Fig. 2) est un peu plus petite que le mâle, & a la queue beaucoup plus courte. Elle en diffère encore par la couleur. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes d'un brun-noirâtre dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & roussâtres sur leurs bords. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de noirâtre & de roussâtre, cette dernière couleur formant des bandes, les unes transversales, les autres à peu près parallèles à la circonférence de la plume. Les plumes qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, ainsi que les couvertures du dessus de la queue, sont variées de même de brun foncé & de blanc-roussâtre. La gorge est blanche, & variée de petites taches brunes. La partie inférieure & les côtés du col, la poitrine & les côtés sont d'un blanc-roussâtre, varié de taches d'un brun foncé, cette dernière couleur formant sur les côtés des bandes à peu près parallèles à la circonférence de la plume. Le haut du ventre est d'un blanchâtre mêlé d'un peu de gris. Le bas-ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue

Fœmina (vide Tab. XXXIV. Fig. 2) magnitudine paululum mari cedit, & caudâ multò brevior donatur. Ab illo quoque colore discrepat. Caput & partem colli superiorem vestiunt pennæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fusco-nigricantes, ad margines rufescentes. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ nigricante & rufescente variegantur, rufescente scilicet colore tæbias efformante, alias transversas, alteras circumferentiæ pennæ circiter parallelas. Pennæ dorsum infimum & uropygium vestientes, sicut & superiores caudæ teñtrices, fusco saturato & albo-rufescente similimodo variegantur. Guttur album, minutis maculis fuscis varium. Collum inferius & ad latera, pectus & latera sunt albo-rufescentia, maculis saturatè fuscis varia, fusco saturato colore in lateribus efficiente tæbias penarum circumferentiæ circiter parallelas. Venter supremus candicat, & aliquid grisei admixtum habet. Venter imus, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes similiter candicant, & maculis griseo-fuscis



fuscis variegantur. Teñtrices alarum inferiores minimæ & mediæ sunt griseæ, maculis tæniisque transversis candidibus variæ : majores cinereo-albæ, pauco albido in apice fimbriatæ. Superiores alarum teñtrices minimæ griseo-fuscæ, albido marginatæ : mediæ, sicut & majores corpori viciniores, griseo-fusco nonnihil saturatiore imbutæ, albo ad fulvum inclinante fimbriatæ, & maculis quibusdam concoloribus variæ ; ex majoribus tamen, septem aut octo, illæ scilicet quæ medium locum occupant, apicibus donantur dilutè fulvis ; unde fit in utraque ala exigua tænia transversa concolor : majores tandem à corpore remotiores griseo-fuscæ & immaculatæ. Sex primores alarum remiges sunt in latere exteriori & extremitate fuscæ, in latere interiori griseo-fuscæ, & scapo albido præditæ : quatuor proximè sequentes, à septima scilicet ad decimam usque inclusivè, concolores, sed pauco candidante in extremitate fimbriatæ : undecima & duodecima griseo-fuscæ, albo terminatæ : octo proximè se-

font d'un blanchâtre varié de taches de gris-brun. Les petites & les moyennes couvertures du dessous des aîles sont grises, & variées de taches & de bandes transversales blanchâtres : les plus grandes sont d'un gris-blanc, & bordées par le bout d'un peu de blanchâtre. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun, bordées de blanchâtre : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun un peu plus foncé, bordées d'un blanc tirant sur le fauve, & variées de quelques taches de la même couleur ; cependant sept à huit des grandes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont terminées de fauve clair ; ce qui forme sur chaque aîle une petite bande transversale de cette couleur : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-brun & sans taches. Les six premières plumes de l'aîle sont brunes du côté extérieur & à leur bout, d'un gris-brun du côté intérieur, & ont leur tige blanchâtre : les quatre suivantes, sçavoir depuis la septième jusqu'à la dixième inclusivement, sont de la même couleur, mais elles sont bordées d'un peu de blanchâtre par le bout : l'onzième & la



douzième font d'un gris-brun, & terminées de blanc : les huit suivantes, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont du côté extérieur d'un gris-brun à leur origine, ensuite cette couleur tire un peu sur celle de cuivre de rosette, & est suivie d'une bande transversale noirâtre, & enfin elles sont terminées de blanc; leur côté intérieur est d'un gris-brun, terminé de blanc, & marqué vers le bout d'une bande transversale de la même couleur : la vingt-unième est du côté intérieur de la même couleur que ces dernières, mais son côté extérieur est d'un gris tirant un peu sur le fauve, rayé transversalement de brun-noirâtre, & terminé de blanc : enfin les quatre plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, bordées de roussâtre, & variées de quelques taches de la même couleur, dont les unes sont transversales & d'autres longitudinales. La queue n'a que quatre pouces huit lignes de long : les quatre plumes du milieu sont noirâtres, & rayées transversalement de roussâtre : toutes les autres sont d'un gris-brun, & rayées pareillement de roussâtre; ces couleurs sont plus foncées du côté extérieur que du côté in-

quentes, à decima tertia scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sunt in latere exteriori ad exortum griseo-fuscæ, qui color deinde nonnihil ad cupri puri colorem vergit, quemque sequitur tænia transversa nigricans; & tandem apicibus albis præditæ sunt; in latere autem interiore sunt griseo-fuscæ, albo terminatæ, & fasciâ transversâ concolore versùs extremitatem insignitæ : vigesima prima in latere interiore his novissimè descriptis concolor, in exteriori verò grisea, nonnihil ad fulvum inclinans, fusco-nigricante transversim striata, & candido terminata : quatuor tandem corpori finitimæ fusco-nigricantes, rufescente marginatæ, & quibusdam maculis concoloribus, aliis scilicet transversis, alteris longitudinalibus, variegatæ. Cauda quatuor pollices & octo tantummodo lineas longa est : quatuor rectrices intermediae sunt nigricantes, rufescente transversim striatæ : reliquæ omnes griseo-fuscæ, rufescente simili modo striatæ; qui colores in latere exteriori magis quàm in interiore sunt saturati. Rostrum, pedes,



unguesque iisdem ac in mare térieur. Le bec, les pieds & coloribus imbuti. les ongles sont colorés comme ceux du mâle.

Juxta maris littora versantur. *Ex museo Realmuriano.* On les trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

17. LE CANARD A LONGUE QUEUE D'ISLANDE;

*Anas superne nigricans, pectore concolore, infernè alba; occipitio cinereo; genis candidis; pennis scapularibus spadicis; uropygio albo, taniâ longitudinali nigrâ notato; rectricibus binis intermediis longissimis nigris . . .*  
ANAS LONGICAUDA ISLANDICA.

*Anas cauda forcipata. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 9.*

*Anas cauda cuneiformi forcipata. Faun. Suec. Linn. N°. 95.*

*Anas cauda cuneata: rectricibus intermediis longis, corpore griseo, temporibus albis. Anas hyemalis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 26.*

*Anas caudacuta Islandica Havelda ipsis dicta Wormii. Willugh. Ornith. pag. 290.*

*Anas caudacuta, Haveldæ Wormii similis, si non eadem. Raj. Syn. Avi. pag. 145. N°. 14.*

*Anas Islandica; cauda protensa. Klein. Avi. pag. 133. N°. 16.*

*Anas Islandica, protensa cauda, Havellda ipsis dicta. Mus. Worm. pag. 302.*

*Anas Islandica, Havellda ipsis dicta. Charlet. Exer. pag. 104. N°. 8. Charlet. Onomazt. pag. 99. N°. 8.*

*Canard à longue queue de la Baye de Hudson. Edwards. Tom. III. pag. CLVI; avec une figure exacte Pl. 156.*

*The Swallow-tail'd Sheldrake D. Johnson. Raj.*

*Les Suédois l'appellent WINTER-AND. Linn.*

*Les Islandois, HAVELLD. Worm. Willugh. Charlet.*

*Les Anglois, LONG-TAILED DUCK FROM HUDSON'S BAY. Edwards.*

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem undecim pollices & sex cir-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied onze pouces six lignes,



& jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long; sa queue sept pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, quatre lignes; son pied seize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce onze lignes, l'intérieur un pouce sept lignes; & celui de derrière six lignes seulement. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'au quart de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos & la poitrine sont noirâtres; il faut cependant en excepter les joues, qui sont blanches, & l'occiput, qui est cendré. Le bas de la partie supérieure du col est aussi couvert de quelques plumes d'un rouge - bai. Les scapulaires sont de cette dernière couleur. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur; mais il y a une bande longitudinale noire, qui s'étend depuis le dos jusque sur la queue. Les couvertures

citer lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem & septem pollices. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque sesquipollicem longum est; cauda septem pollices & sex lineas; pars crurum plumis denu-data quatuor lineas; pes sexdecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue pollices binos, extimus unum pollicem & undecim lineas, intimus unum pollicem cum septem lineis; posticus autem sex tantummodo lineas. Alæ complicatæ quartam longitudinis caudæ partem non attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum & pectus sunt nigricantia; genæ tamen sunt candidæ; & occipitium cinereum est. Colli superioris infima pars quibusdam quoque pennis spadiceis obsita est. Scapulares spadiceo similiter tinguntur. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ testrices albicant. Uropygium & pennæ caudam superne cooperientes eodem imbuuntur colore, sed taniâ notantur longitudinali nigrâ, à dorso ad caudam usque protensâ. Testrices alarum superiores & inferiores nigricantes. Remi-



ges majores concolores : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum occupant, fuscæ : corpori viciniore spadiceæ. Quæ novissimè dictæ remiges maximam longitudinem obtinent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Binæ rectrices intermediae sunt nigrae : utrinque proximè sequentes cinereæ : utrinque extimæ candidæ. Binæ intermediae sunt strictissimæ, in acumen desinentes, & rectricem utrinque proximè sequentem trium pollicum & novem linearum longitudine excedentes ; laterales omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum nigrum ; mandibula tamen superior tæniâ transversâ rubrâ versùs ipsius extremitatem insignitur. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti ex fusco rubescunt ; ipsorum membranæ obscuriore tinguntur colore ; ungues verò nigricant. Habitat in *Islandia & Freto Hudsonis.*

du dessus & du dessous des ailes sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont de la même couleur : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont brunes : les plus proches du corps sont d'un rouge-bai. Ces dernières sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. Les deux plumes du milieu de la queue sont noires : celles qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont cendrées : & les plus extérieures de chaque côté sont blanches. Les deux du milieu sont fort étroites, pointues, & plus longues de trois pouces neuf lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté ; toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir ; cependant le demi-bec supérieur est marqué vers son extrémité d'une bande transversale rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont d'un brun-rougeâtre ; leurs membranes sont d'une couleur plus obscure ; & les ongles sont noirâtres. On le trouve en *Islande & à la Baye de Hudson.*



## 18. LE CANARD A LONGUE QUEUE DE TERRE-NEUVE.

*Anas superne splendide nigra, inferne nigricans; capite anteriorius & ad latera, collique lateribus griseo-vinaceis, maculâ ovatâ nigrâ utrinque notatis; capite posteriore, collo superne & inferne, pennis scapularibus & imo ventre candidis; rectricibus binis intermediis longissimis nigris . . . .*  
*ANAS LONGICAUDA EX INSULA TERRÆ-NOVÆ.*

Canard à longue queue de Terre-neuve. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 146. chap. LXX; avec une figure exacte Pl. 280.*  
*Les Anglois l'appellent LONG-TAILED DUCK FROM NEW-FOUNDLAND. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur des précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix-huit pouces. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue sept pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied seize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce onze lignes, l'intérieur un pouce sept lignes; & celui de derrière six lignes seulement. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'au quart de la longueur de la queue. La partie antérieure &

Cum præcedentibus crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem decem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues octodecim pollices. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda septem pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes sexdecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices; extimus unum pollicem cum undecim lineis, intimus unum pollicem & septem lineas; posticus autem sex lineas tantum. Alæ complicatæ ad quartam longitudinis caudæ partem non per-



tingunt. Caput anteriùs & ad latera, collumque similiter ad latera sunt griseo-vinacea; in utroque tamen colli latere, immediatè infra caput, majuscula extat macula ovata nigra. Caput posterius, guttur, collum superne & infernè, pectusque supremum sunt candida. Dorsum & uropygium splendè nigra. Ex superioribus caudæ tectricibus, medium locum obtinentes sunt quoque splendè nigra: laterales omnes candidæ. Imum pectus & venter supremus nigriscant: color autem nigriscans utrinque supra exortum alarum protenditur, & dorsi nigrum colorem pertingit. Venter imus, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albescent. Pennæ scapulares concolores: ex illis autem majores maximâ longitudine pollent, in acutissimum mucronem desinunt, & dum ala complicatur, ferè ad caudæ exortum usque protenduntur. Tectrices alarum superiores sunt splendè nigrae. Inferiores obscurè fuscæ. Remiges alarum majores nigrae: minores obscurè spadiceæ. Caudæ rectrices quatuor intermediæ nigrae;

les côtés de la tête, ainsi que les côtés du col, sont d'un gris-vineux; cependant sur chacun des côtés du col, immédiatement au-dessous de la tête, est une grande tache noire d'une figure ovale. Le derrière de la tête, la gorge, le dessus & le dessous du col, & le haut de la poitrine sont blancs. Le dos & le croupion sont d'un noir brillant. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur: toutes les latérales sont blanches. Le bas de la poitrine & le haut du ventre sont noirâtres: cette couleur s'étend de chaque côté au-dessus de l'origine des ailes, & va joindre le noir du dos. Le bas-ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les plumes scapulaires sont de la même couleur: les plus grandes sont fort longues, se terminent en pointe fort aiguë, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque jusqu'à l'origine de la queue. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un noir brillant. Celles du dessous sont d'un brun sombre. Les grandes plumes de l'aile sont noires: les moyennes sont d'un rouge-bai-obscur. Les quatre plumes du milieu de la



queue sont noires : toutes les autres sont blanches. Les deux du milieu sont fort étroites, pointues, & plus longues de trois pouces six lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté, & qui se termine pareillement en pointe ; toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir ; cependant le demi-bec supérieur est marqué d'une bande transversale rouge, placée entre son extrémité & les narines. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont d'un rouge obscur ; leurs membranes sont d'une couleur un peu plus sombre ; & les ongles noirâtres. On le trouve à l'Isle de Terre-neuve.

reliquæ omnes candidæ. Binæ intermediae sunt strictissimæ, in acumen desinunt, & utrinque proximè sequentem, in acumen similiter desinentem, trium pollicum & sex linearum longitudine excedunt ; laterales autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum nigrum ; mandibula tamen superior taniâ transversâ rubrâ, nares inter & ipsius extremitatem positâ, notatur. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti sunt obscurè rubri ; ipsorum membranæ colore nonnihil obscuriore tinguntur ; ungues verò nigricant. Habitat in *Insula Terræ-novæ*.

\*\* 19. LE MILLOUIN.

Voyez le mâle Pl. XXXV. Fig. 1.

Anas superne cinereo-albo & fusco, infernè cinereo-albo & griseo transversim & undatim striata ; capite & collo castaneis ; corpore anteriùs fuliginoso ; imo ventre dorso concolore ; rectricibus cinereo-fuscis. . . . PENELOPE.

Anas alis cinereis immaculatis ; uropygio nigro. *Faun. Suec. Linn. N° 107.*

Anas alis cinereis immaculatis, uropygio nigro. *Anas ferina. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 27.*

Anas cinerea, vertice & collo ferrugineis. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. 1. sp. 9.*

Anas fusca. *Jonst. Avi. pag. 97. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 49, sub titulo, Anas fera fusca.*

*Marfil.*



# LES OISEAUX, Classe III. Ordre XXIV. 385

*Marfil. Danub. Tom. V. pag. 122. hujus icon non satis accurata*  
*Tab. 59.*

*Anas fusca, quibusdam media. Charlet. Exer. pag. 105. N° 9.*

*Charlet. Onomast. pag. 99. N° 9.*

*Anas fera fusca. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 15.*

*Anas fera fusca vel media. Gesn. Avi. pag. 116, in qua hujus icon non*  
*satis accurata.*

*Gesn. icon. Avi. pag. 76, in qua eadem icon.*

*Anas fera fusca vel mediæ magnitudinis. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 221,*  
*hujus icon à Gesnero mutuata pag. 552.*

*Anas fera fusca vel media Gesneri. Klein. Avi. pag. 132. N° 5*

*Anas fera fusca Gesneri, Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 288. hujus*  
*icon pessima Tab. LXXII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 143. N° A. 10.*

*Anas fera octava seu Erythrocephalos primus. Schwenck. Avi. Sil. pag.*  
*201.*

*Anas media Schwenckfeldii. Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 357.*

*An Anas fera capite subrufo minor? Willugh. Ornith. pag. 282. (an*  
*fæmina?)*

*Penelops primus Ornithologi. Aldrov. Avi. Tom III. pag. 218.*

*Penelope. Jonst. Avi. pag. 98.*

*Charlet. Exer. pag. 106. N° 3.*

*Charlet. Onomast. pag. 100. N° 3.*

*Cane à la tête rousse Bellonii. Jonst. Avi. pag. 98.*

*Cane à la tête rousse. Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 173.*

*Cane à tête rousse. Alb. Tom. II. pag 62; avec une figure mal coloriée*  
*Pl. 98.*

*Les Catalans l'appellent BUIXOT. Barr.*

*Les Boulonnois, COLLO ROSSO. Aldrov.*

*Les Allemands, ROT-HALSS. Gesn. Aldrov. Jonst. ROT-ENT. Gesn.*  
*MITTEL-ENT; WILDE GRAWE ENT. Gesn. Aldrov. MITTEL-ENDE.*  
*Rzac. ROTE ENDTE; MITTEL ENDTE; WILDE GRAW ENDTE;*  
*BRAUN KOEPFFICHTE ENDTE. Schwenck.*

*Les Silésiens, BRAUN ENDTE. Schwenck.*

*Les Anglois, POCHARD; GREAT RED-HEADED WIDGEON. Willugh.*

*Raj. RED-HEADED WIDGEON; COMMON GREY WIDGEON. Charlet.*

*Anati domesticæ paululùm*  
*crassitie cedit. Ipsi longi-*  
*tudo ab apice rostri ad cau-*  
*dam extremam unum pedem*  
*quinque pollices & quatuor*  
*lineas æquat, & ad extre-*

*Tom. VI.*

*Il est un peu moins gros que*  
*le Canard domestique. Sa lon-*  
*gueur depuis le bout du bec*  
*jusqu'à celui de la queue est*  
*d'un pied cinq pouces quatre*  
*lignes, & jusqu'à celui des on-*

*Ccc*



gles de dix-huit pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a vingt-cinq lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied quatorze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces sept lignes, l'extérieur deux pouces sept lignes & demie, l'intérieur un pouce onze lignes & demie; & celui de derrière huit lignes. Il a deux pieds deux pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge & la plus grande partie de la longueur du col sont d'un beau marron: cette couleur tire sur le pourpre sur la partie supérieure de la tête. Sous la gorge est une très-petite tache blanche, placée à l'origine du demi-bec inférieur. Le bas du col & la partie antérieure du corps, savoir le haut de la poitrine, des côtés & du dos, sont de couleur de suie; les plumes de la poitrine sont cependant bordées de gris-blanc par le bout. Tout le reste du dos est joliment rayé transversalement & en zigzags de très-petites lignes,

mos ungues octodecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque viginti quinque lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes quatuordecim cum semi lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices cum septem lineis, extimus duos pollices & septem cum semi lineas; intimus unum pollicem & undecim cum semi lineas; posticus autem octo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum totidem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput, guttur, maximamque longitudinis colli partem tingit color castaneus elegans, in capite superiore ad purpureum vergens. Sub gutture minutissima extat macula candida, in mandibulæ inferioris exortu posita. Collum infimum & corpus anterius; pectus scilicet supremum, laterumque & dorsi suprema pars, fuliginoso colore tinguntur; pennæ tamen pectus vestientes cinereo-alba



in apice marginantur. Reliquum dorsum minutissimis lineis transversis & undatis, alternatim fuscis & cinereo-albis, eleganter striatur. Scapulares pennas & latera variegant iidem colores; cinereo-albus autem color non nihil est ad latera dilutior. Imum pectus & venter supremus cinereo-albo tinguntur dilutissimo, lineolis griseis, transversis & undatis, non multum conspicuis, striato. Venter imus eodem modo ac dorsum variegatur; in eo tamen color fuscus magis est conspicuus; & cinereo-albus fit obscurior. Crurum suprema pars & uropygium fusco imbuuntur colore, lineolisque griseis transversis & undatis striantur. Pennæ caudam superne & infernè cooperientes sunt nigricantes. Tectrices alarum inferiores corpori finitimæ candidæ: à corpore remotiores cinereo-albæ. Superiores minores, sicut & majores corpori viciniore, cinereæ, minutissimis punctulis cinereo-albis aspersæ: majores à corpore remotiores cinereo-fuscæ. Alarum componunt viginti quatuor remiges, quarum novem primores in latere exteriori &

alternativement brunes & d'un gris-blanc. Les plumes scapulaires & les côtés sont de la même couleur; mais le gris-blanc est plus clair sur les côtés. Le bas de la poitrine & le haut du ventre sont d'un gris-blanc très-clair, rayé transversalement & en zigzags de petites lignes grises, fort peu apparentes. Le bas-ventre est varié de même que le dos; mais le brun est plus apparent, & le gris-blanc est plus sombre. Le haut des jambes & le croupion sont bruns, & rayés transversalement & en zigzags de petites lignes grises. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont noirâtres. Parmi celles du dessous des ailes; les plus proches du corps sont blanches; les plus éloignées du corps sont d'un gris-blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un cendré tout parsemé de très-petits points de gris-blanc: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun. L'aile est composée de vingt-quatre plumes: les neuf premières sont d'un cendré-brun du côté extérieur & à leur extrémité; leur côté intérieur est d'une couleur un peu plus claire: les neuf sui-



vantes, ſçavoir depuis la dixième juſqu'à la dix-huitième incluſivement, ſont d'un joli cendré, & bordées de blanc par le bout, mais du côté extérieur ſeulement. La dix-neuvième & la vingtième ſont d'un joli cendré, & bordées extérieurement de noirâtre : les quatre plus proches du corps ſont de la même couleur que les ſcapulaires. Ces quatre dernières plumes ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de ſeize plumes d'un cendré-brun. Les deux du milieu ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue un peu pointu. L'iris des yeux eſt d'un jaune-rougeâtre. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un cendré-bleuâtre, excepté ſon extrémité, qui eſt noire ; l'inférieur eſt entièrement noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainſi que leurs membranes ſont de couleur de plomb ; & les ongles noirâtres. On le trouve ſur les bords de la mer & dans les marais. *Qu cabinet*

extremitate cinereo-fuſcæ, in latere interiore colore nonnihil dilutior tinctæ ; novem proximè ſequentes, à decima ſcilicet ad decimam octavam uſque incluſivè, eleganter cinereæ, albo in apice marginatæ, ſed exteriùs tantùm : decima nona & vigesima eleganti cinereo imbutæ, nigricante exteriùs ſimbriatæ : quatuor corpori finitimæ pennis ſcapularibus concolores. Quæ quatuor noviffimè dictæ remiges maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur ; majorum remigum extremitates attingunt. Cauda ſexdecim conſtat reſtrictibus cinereo-fuſcis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem ſenſim atque ſenſim longitudine minuuntur ad utrinque extremam uſque breviorẽ ; unde fit cauda paululùm in extremitate acuta. Oculorum irides flavo-rubefcentes. Mandibula ſuperior cinereo-cæruleſcens, excepto apice nigro ; inferior penitùs nigra. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, ſicut & ipſorum membranæ, plumbeo colore imbuti ; ungues verò nigricantes. Juxta



maris littora versatur, & de Madame de Bandeville.  
paludes frequentat. *Ex museo D. de Bandeville.*

Hujus speciei varietas Une variété de cette espece  
est est

A. LE MILLOUIN NOIR.

Penelope nigra.

Anas fera fusca alia. *Abdrov. Avi. Tom. III. pag 221. hujus icon pessima pag. 222.*

Magnitudine & crassitie præcedentem circiter æmulatur. Caput, guttur, maxillæ longitudinis colli partem tingit color obscure castaneus. Collum infimum superne eodem colore imbutum, ad latera cinereum, infernè nigricans. Dorsum, uropygium & cauda similiter nigricant. Pectus & venter fusci sunt, nigricante & cinereo variegati. Alæ albo & nigro variæ. Oculorum irides luteæ. Mandibula superior cinereo-cæruleus, attamen in extremitate nigra; inferior penitus nigra. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti olivacei; ipsorum membranae, unguetque nigri.

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur du précédent. La tête, la gorge & la plus grande partie de la longueur du col sont d'un marron obscur. Le bas du col est de la même couleur en-dessus, cendré sur les côtés, & noirâtre en-dessous. Le dos, le croupion & la queue sont de cette dernière couleur. La poitrine & le ventre sont d'un brun varié de noirâtre & de cendré. Les ailes sont variées de noir & de blanc. L'iris des yeux est jaune. Le demi-bec supérieur est d'un cendré-bleuâtre, excepté son extrémité, qui est noire; l'inférieur est entièrement noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont olivâtres; leurs membranes & les ongles sont noirs.



## 20. LE MILLOUIN DU MEXIQUE.

*Anas superne fusco & fulvo transversim striata, infernè fulva;  
capite & collo concoloribus; rectricibus albo & nigro variis . . . .* PENELOPE MEXICANA.

Quapachcanauhtli. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 52. cap. CXCIV.  
Raj. Syn. Avi. pag. 177.*

*Les Mexiquains l'appellent QUAPACHCANAUHTLI. Fern. Raj.*

Il est à peu près de la même grandeur & de la même grosseur que le précédent. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont fauves. Le dos, & le croupion sont rayés transversalement de fauve & de brun. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont rayées de même & des mêmes couleurs. Les plumes de l'aile sont pareillement fauves, & rayées transversalement de brun. Celles de la queue sont variées de noir & de blanc. Les yeux sont noirs. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un cendré-bleuâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Mexique*, où il se tient sur les lacs.

Magnitudine & crassitie cum præcedente circiter convenit. Caput, guttur, collum, pectus, ventrem, crurum partem supremam, inferiores caudæ rectrices & latera tingit fulvus color. Dorsum & uropygium fusco & fulvo transversim striantur. Pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ rectrices interdum coloribus & simili modo sunt striatæ. Alarum remiges sunt quoque fulvæ, fusco transversim striatæ. Caudæ rectrices albo & nigro variæ. Oculi sunt nigri. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, cinereo-cœrulescentes; ungues verò nigricantes. Habitat in *Mexico*, ibique lacus frequentat.



**\*\* 21. LE CANARD SIFFLEUR.**

*Voyez le mâle Pl. XXXV. Fig. 2.*

**Anas** superne cinereo-albo & nigricante transversim striata, infernè alba; capite & colli superioris parte supremâ castaneis, nigricante maculatis, vertice dilutè fulvo; gutture & colli inferioris parte supremâ fuliginosis; macula alarum viridi-aurea, taniâ splendide nigrâ superne & infernè donata; rectricibus binis intermediis cinereo-fuscis, lateralibus griseis, candicante marginatis. (*Mas*).

**Anas** superne griseo-fusca, marginibus pennarum rufescentibus, infernè alba; capite & collo supremo rufescentibus, nigricante maculatis; rectricibus cinereo-fuscis; albo exteriùs & apice marginatis. (*Fœmina*) . . . **ANAS FISTULARIS.**

**Anas** capite brunneo, fronte alba, cauda subtus nigra. *Faun. Suev. Linn. N°.* 105.

**Anas** cauda acutiuscula subtus nigra, capite brunneo, fronte alba. *Penelope. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 24.*

**Anas** clangosa, rostro cyaneo, pectore albo, tergo nigris subrubrisque maculis. *Barr. Ornith. Class. 1. Gen. 1. sp. 7.*

**Anas** fistularis. *Gesn. Avi. pag. 121.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 234.*

*Jonst. Avi. pag. 98.*

**Anas** fistularis Willughby; *Penelope Aldrovandi. Razac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 356.*

**Anas** fistularis Fabricii. *Klein. Avi. pag. 132. N°.* 7.

**Anas** fera undecima seu canora. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 202.*

**Boschas**, aliis **Anas** fistularis. *Charlet. Exer. pag. 106. N°.* 2.

*Charlet. Onomazt. pag. 100. N°.* 2.

**Penelops.** *Gesn. Avi. pag. 108.*

**Penelops** Avis. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 217 icones minimè accuratæ maris pag. 219, & fœminæ pag. 220.*

*Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 49.*

**Penelope.** *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 22.*

**Penelope** Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 288. hujus icon pessima Tab. LXXII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 146. N°.* A. 3.

**Cane de mer.** *Alb. Tom. II. pag. 63; avec une figure mal coloriée Pl. 99.*



*Les Catalans l'appellent PIULA. Barr.*

*Les Allemands aux environs de Strasbourg, SCHMEY. Willugh. & quelques-uns, PFEIFF-ENTE. Gesn. Aldrov.*

*Les Silésiens, PFEIFF-ENTLIN. Schwenck.*

*Les Suédois, WRI-AND. Linn.*

*Les Anglois, WHIM. Raj. WIGEON. Willugh. Raj. WHEWER. Raj. Charlet. COMMON WIGEON; COMMON WHEWER. Willugh.*

Il est à peu près de la même grosseur que le *Millouin*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied cinq pouces quatre lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied seize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce onze lignes, l'intérieur dix-huit lignes; & celui de derrière six lignes seulement. Il a deux pieds six pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est d'un fauve clair. Le reste de la tête & le haut de la partie supérieure du col sont d'un marron tout parsemé de très - petites taches noirâtres. Le haut des

*Craffitie cum Penelope* circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem sex pollices & tres lineas explet, & ad extremos unguis unum pedem quinque pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda tres pollices & decem lineas; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes sexdecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extimus unum pollicem cum undecim lineis; intimus octodecim lineas; posticus autem sex tantummodo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum sex pollicum & novem linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Vertex capitis diluto imbuitur fulvo. Reliquum caput & colli superioris



perioris partem supremam tingit castaneus color, minutissimis maculis nigricantibus aspersus. Laterum colli suprema pars est castanea & immaculata. Guttur, & collum inferius in parte suprema tantum sunt fuliginosa. Colli inferioris pars infima ex griseo ad castaneum vergit, & tenuis quibusdam transversis nigricantibus insignitur. Collum infimum superius & ad latera, dorsum & uropygium lineolis transversis & undatis, alternatim cinereo-albis & nigricantibus striantur. Pennæ scapulares concolores. Ex superioribus caudæ tectricibus, medium locum occupantes sunt nigrae, interius albo fimbriatae: laterales omnes nigrae quidem, sed viridi-aureo colore variantes. Pectus & venter elegantissimo candore nitent. Latera albo & griseo sunt transversim & undatim striata. Crurum suprema pars ex cinereo albet, & griseo similiter transversim & undatim striatur. Pennæ caudam subtus obtegentes splendide nigrae. Tectrices alarum inferiores minores, sicut & majores corpori viciniore, griseae, candicante variegatae: majores à corpore remo-

*Tom. VI.*

côtés du col est de couleur de marron & sans taches. La gorge & le haut de la partie inférieure du col sont de couleur de suie. Le bas de la partie inférieure du col est d'un gris tirant sur le marron, & marqué de quelques rayes transversales noirâtres. Le bas de la partie supérieure & des côtés du col, le dos & le croupion sont rayés transversalement & en zigzags de petites lignes, alternativement d'un gris-blanc & noirâtres. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont noires, & bordées intérieurement de blanc : toutes les latérales sont d'un noir changeant en verdoré. La poitrine & le ventre sont d'un très-beau blanc. Les côtés sont rayés transversalement & en zigzags de gris & de blanc. Le haut des jambes est d'un gris-blanc, rayé pareillement de gris transversalement & en zigzags. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau noir. Les petites du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris varié de blanchâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-blanc. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont

D d d



d'un cendré - brun varié d'un peu de blanchâtre : les moyennes sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-brun : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur du côté intérieur ; mais leur côté extérieur est blanc, & terminé obliquement de noir de velours ; ce qui forme sur chaque aîle une petite bande transversale de cette couleur : les grandes les plus proches du corps sont brunes. L'aîle est composée de vingt-cinq plumes : les dix premières sont d'un cendré - brun, cette couleur étant un peu plus clair sur le côté intérieur : l'onzième est de la même couleur, mais elle est marquée d'une tache noirâtre, placée à son extrémité sur le côté extérieur : les neuf suivantes, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont d'un cendré-brun du côté intérieur ; leur côté extérieur est d'un verd-doré à son origine, & d'un noir de velours vers le bout, le verd - doré occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps : la vingtunième est brune du côté intérieur, blanche & bordée de noir de velours du côté exté-

rieures cinereo-albæ. Superiores alarum teatrices minimæ cinereo-fuscæ, pauco candidante variæ : mediæ candidæ : majores à corpore remotiores griseo-fuscæ : majores proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum tenent, in latere interiore concolores, in latere exteriori candidæ, nigro, holoserici villosi instar, splendentes obliquè terminatæ ; unde fit in utraque ala exigua tænia transversa splendide nigra ; majores corpori viciniore fuscæ. Viginti quinque remigibus ala conflatur : decem primores sunt cinereo - fuscæ, attamen in latere interiore colore nonnihil dilutiore imbutæ : undecima concolor, sed maculâ nigricante, in latere exteriori ad extremitatem positâ, insignita : novem proximè sequentes, à duodecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in latere interiore cinereo-fuscæ, in exteriori verò ad exortum viridi-aureæ, versùs extremitatem nigræ, holoserici villosi instar, splendentes, viridi-aureo colore eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior : vigesima prima interiùs fusca, exte-



rius candida, nigro, holoserici villosi instar, splendente fimbriata : quatuor tandem corpori viciniore in latere interiore saturatè fuscæ, in exteriore nigræ, holoserici villosi instar, splendor, cinereo-albo marginatæ ; vigesima secunda, vigesima tertia & vigesima quarta scapo insuper candicante donantur. Quæ quinque novissimè dictæ remiges maximam longitudinem obtinent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, ad tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caudam componunt sexdecim rectrices, quarum binæ intermediæ sunt cinereo-fuscæ : laterales omnes griseæ, candicante marginatæ. Binæ intermediæ in acutissimum mucronem desinunt, & utrinque proximè sequentem quinque linearum longitudine superant ; reliquæ omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē ; unde fit cauda in extremitate acuta. Mandibula superior cinereo-cœrulea, excepto unguiculo nigro ; inferior in exortu tantum cinereo-cœrulea, in reliqua longitudine nigra. Pars crurum plumis denudata,

rieur : enfin les quatre plus proches du corps sont d'un brun foncé du côté intérieur, & leur côté extérieur est d'un noir de velours, bordé de gris-blanc ; la vingt-deuxième, la vingt-troisième & la vingt-quatrième ont de plus leur tige blanchâtre. Ces cinq dernières plumes sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de seize plumes : les deux du milieu sont d'un cendré-brun : toutes les latérales sont grises, & bordées de blanchâtre. Les deux du milieu se terminent en pointe fort aiguë, & sont plus longues de cinq lignes que celle qui le suit immédiatement de chaque côté ; toutes les autres vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le demi-bec supérieur est d'un cendré-bleu, excepté son ongle, qui est noir ; l'inférieur est d'un cendré-bleu seulement à son origine, & noir dans tout le reste de sa longueur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de



plomb; & les ongles noirâtres.

La *femelle* est un peu moins grosse que le *mâle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces. Elle a deux pieds cinq pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont d'un rouffâtre parsemé de très-petites taches noirâtres. Les plumes qui couvrent le bas de la partie supérieure du col, le dos & le croupion, ainsi que les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue, sont d'un gris-brun, & bordées de rouffâtre. Celles qui couvrent le bas de la partie inférieure du col, sont de la même couleur, mais la bordure rouffâtre est plus large. La poitrine & le ventre sont blancs. Les côtés & le haut des jambes sont variés de blanc & de gris-rouffâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches, & variées de taches transversales brunes. Celles du dessous des aîles sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc.

pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, plumbeo colore imbuti; ungues verò nigricantes.

*Fœmina* crassitie paululum *mari* cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices æquat, & ad extremos ungues sexdecim pollices. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum quinque pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudam extremam ferè pertinent. Caput, guttur & pars colli capiti finitima rufescunt, minutissimisque maculis nigricantibus resperguntur. Pennæ colli superioris partem infimam obtegentes, dorsum & uropygium vestientes, sicut & scapulares, superioresque caudæ tectrices, sunt griseo-fuscæ, rufescente marginatæ. Quæ colli inferioris partem infimam cooperiunt, eodem colore tinguntur, sed margine latiore rufescente donantur. Pectus & venter albet. Latera, crurumque suprema pars albo & griseo-rufescente variegantur. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt candidæ, maculis transversis fus-



*cis varia. Tectrices alarum inferiores cinereo - fusca, albo fimbriata. Superiores minimae ex griseo nonnihil ad rufescentem inclinantes colorem : mediae cinerae, albo marginatae : majores a corpore remotiores cinereo-fusca : majores proximè sequentes, illae scilicet quae medium locum occupant, cinerae, albo fimbriatae, & nigro obliquè terminatae ; unde fit in utraque ala exigua tænia transversa nigro colore tincta : majores corpori viciniore fusca. Alarum remiges remigibus maris circiter concolores ; ab illis tantummodo discrepantes in eo quod novem intermediae, à duodecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, pauco notentur viridiaureo ; & quatuor corpori finitimae sint nigricantes eo in loco in quo maris remiges sunt nigrae, holoserici villosi instar, splendentes. Caudae rectrices cinereo-fusca, albo exterius & apice marginatae. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranae, unguisque eodem ac in mare colore tincti.*

*Juxta maris littora versantur, paludisque frequentant.*

Les plus petites du dessus sont d'un gris tirant un peu sur le roussâtre : les moyennes sont cendrées, & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont cendrées, bordées de blanc, & terminées obliquement de noir ; ce qui forme sur chaque aîle une petite bande transversale de cette couleur : les grandes les plus proches du corps sont brunes. Les plumes de l'aîle sont colorées à peu près comme celles du mâle : elles en diffèrent seulement en ce que les neuf plumes du milieu, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingtième inclusivement, ont fort peu de verd-doré, & que les quatre plus proches du corps sont noirâtres dans l'endroit où celles du mâle sont d'un noir de velours. Les plumes de la queue sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc extérieurement & par le bout. Le bec, la partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont de la même couleur que dans le mâle.

On les trouve sur les bords de la mer & dans les marais.



## 22. LE CANARD SIFFLEUR HUPÉ.

*Anas cristata*, superne cinereo-vinacea, infernè nigra; capite & gutture rufis; cristâ dilutiùs rufa; collo & uropygio nigris; pennis scapularibus areolis binis lunulatis albis insignitis; rectricibus cinereis . . . . . *ANAS FISTULARIS CRISTATA*.

*Anas Erythrocephalos. Rzac. Aud. Hist. Nat. Pol. pag. 357.*

*Anas fera nona, seu Erythrocephalos secundus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 201.*

*Anas cristata flavescens. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 110. hujus icon satis accurata Tab. 53.*

*Klein. Avi. pag. 135. N°. 26.*

*Anas capite rufo major. Raj. Syn. Avi. pag. 140. N°. 2.*

*Capo rosso maggiore. Willugh. Ornith. pag. 279.*

*Les Romains l'appellent CAPO ROSSO MAGGIORE. Willugh. Raj.*

*Les Allemands, BRANDT ENDE. Rzac. BRANDT ENDTE; ROTT HALS; ROTT KOPFF. Schwenck.*

Il est un peu plus grand que le *Canard domestique*. Le sommet de la tête est couvert de plumes d'un roux clair, douces comme de la soye, assez longues, & qui s'élèvent un peu en forme de hupe. Le reste de la tête & la gorge sont d'un roux plus foncé. Le col, la poitrine, le ventre & le haut des jambes sont noirs. Le dos est d'un cendré-vineux. Les plumes scapulaires sont de la même couleur, & marquées de deux petites bandes blanches, assez larges, & qui ont la figure d'un croissant. Le croupion est noir, ainsi que les couvertures

*Anatem domesticam paululum crassitie superat. Summum caput vestiunt pennæ dilutè rufæ, serici instar, mollissimæ, longiusculæ, & nonnihil, cristæ in modum, erectæ. Reliquum caput, gutturque saturatione rufo tinguntur. Collum, pectus, ventrem & crurum partem supremam tingit color niger. Dorsum est cinereo-vinaceum. Pennæ scapulares concolores, & binis exiguis areolis latiusculis, lunulatis, albis insignitæ. Uropygium & superiores caudæ rectrices nigræ. Pennæ caudam subtus*



obtegentes, inferiores alarum tectrices & latera albicant, & aliquid vinacei admixtum habent. Tectrices alarum superiores minimæ, illæ scilicet quæ articulum carpo humano respondentem cooperiunt, sunt candidæ: reliquæ omnes cineræ. Alarum componunt viginti sex remiges: quatuor aut quinque primores in latere exteriori & extremitate nigræ, in latere interiore albæ, aliquæ vinacei mixturâ adumbratæ: quindecim proximè sequentes, à sexta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in utroque latere albæ, vinaceo adumbratæ, attamen in extremitate nigræ; ex istis autem quædam, illæ scilicet quæ medium locum occupant, rursus albo terminantur: sex corpori viciniore sunt cineræ. Sexdecim reatricibus concoloribus cauda constat. Oculorum irides coccinæ. Rostrum dilutiore rubro tinctum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti rubri; ipsorum membranæ, unguisque nigri. Paludes frequentat.

du dessus de la queue. Celles du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de vineux. Les plus petites couvertures du dessus des aîles, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont blanches: toutes les autres sont cendrées. L'aîle est composée de vingt-six plumes: les quatre ou cinq premières sont noires du côté extérieur & à leur extrémité; leur côté intérieur est d'un blanc mêlé d'une légère teinte de vineux: les quinze suivantes, sçavoir depuis la sixième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont entièrement de cette dernière couleur, excepté leur extrémité, qui est noire; quelques-unes de celles-là, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont de rechef terminées de blanc: les six plus proches du corps sont cendrées. La queue est composée de seize plumes de la même couleur. L'iris des yeux est d'un rouge vif. Le bec est d'un rouge plus clair. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont rouges; leurs membranes & les ongles sont noirs. On le trouve dans les marais.



\*\* 23. LE CANARD SIFFLEUR D'AMÉRIQUE.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 1.

*Anas superne castanea, infernè nigricans; capite superiore & collo dilutè castaneis; occipitio & uropygio nigricantibus; genis, gutture & pectore griseis; tectricibus alarum superioribus mediis fusco-rufescentibus, majoribus albidis; rectricibus nigris . . . ANAS FISTULARIS AMERICANA.*

*Anas grisea, remigibus cauda ventrequè nigris, area alarum fulva albaque. Anas autumnalis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 33. An Anas fera, griseo colore, mento cinnabarino, undulante pectore? Marfil. Danub. Tom. V. pag. 108. hujus icon non satis accurata Tab. 52.*

*Klein. Avi. pag. 135. N°. 25.*

Canard siffant au bec rouge. *Edwards. Tom. IV. pag. CXCIV; avec une figure exacte Pl. 194.*

*Les Anglois l'appellent RED-BILL'D WHISTLING DUCK. Edwards.*

Il est un peu moins gros que le *Canard domestique*; mais il a les jambes & le col proportionnellement plus allongés. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, sept lignes & demie; son pied un pouce onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur

*Anati domesticæ paululùm crassitie cedit; sed cruribus donatur & collo, servatâ proportionè, magis elongatis. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis unum pedem sex pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata septem cum semi lineas; pes unum pollicem cum undecim lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue*



gue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum totidem lineis, intimus unum pollicem & novem lineas; posticus autem decem tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum sex pollicum & totidem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput superius & collum sunt dilutè castanea: qui color, versùs pectus procedendo, magis magisque fit dilutior; pectus autem griseum est. Occipitium nigricat: nigricans autem color supra partem colli superiorem nonnihil protenditur. Caput ad latera sive genæ, gutturque griseo tinguntur, sub gutture dilutius. Dorsum suprema pars & scapulares pennæ sunt castaneæ. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ tectrices nigricantes. Venter, latera & pennæ alas subtus obtegentes concolores. Inferiores caudæ tectrices albidæ, maculis nigricantibus variegatæ. Crurum suprema pars grisea, maculis quoque nigricantibus varia. Superiores alarum tectrices minimæ, illæ scilicet quæ mar-

deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce neuf lignes; & celui de derrière dix lignes seulement. Il a deux pieds six pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le dessus de la tête & le col sont d'un marron clair: cette couleur s'éclaircit de plus en plus en approchant de la poitrine, qui est grise. L'occiput est noirâtre: cette couleur s'étend un peu sur la partie supérieure du col. Les côtés de la tête ou les joues, & la gorge sont d'un gris plus clair sous la gorge qu'ailleurs. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont de couleur de marron. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. Le ventre, les côtés & les couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur. Les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres, & variées de taches noirâtres. Le haut des jambes est gris, & varié de même de taches noirâtres. Les plus petites couvertures du dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le bord de l'aile depuis son origine jusqu'à son extrémité, sont d'un brun foncé ou noirâtre; les moyennes sont



d'un fauve-rouffâtre ; les grandes les plus proches du corps font blanchâtres : parmi les plus éloignées du corps , les intérieures font blanchâtres , & les plus extérieures noirâtres. L'aîle est composée de vingt - six plumes : les deux premières font noirâtres : les quinze suivantes , ſçavoir depuis la troiſième juſqu'à la dix-ſeptième incluſivement , font de la même couleur , excepté leur côté extérieur , qui eſt d'un gris-blanc à ſon origine ; cette couleur ſ'étend d'autant plus loin , & eſt d'autant plus claire , que la plume eſt plus éloignée du corps : les quatre ſuivantes , ſçavoir depuis la dix-huitième juſqu'à la vingt-unième incluſivement , font entièrement noirâtres : les cinq plus proches du corps font de la même couleur que les ſcapulaires , cependant un peu plus claires. Ces cinq dernières plumes font fort longues , & ſ'étendent , lorſque l'aîle eſt pliée , auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt composée de ſeize plumes noires. Les deux du milieu font un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui eſt la plus courte. L'iris des yeux eſt de

gines alarum ab ipſarum exortu ad extremitatem uſque cooperiunt , ſaturatè fuſcæ ſive fuſco-nigricantes : mediæ fulvo-rufescentes : majores corpori finitimæ candicantes : ex majoribus à corpore remotioribus , interiores albidæ , magis extimæ nigricantes. Alam componunt viginti ſex remiges , quarum binæ primores ſunt nigricantes : quindecim proximè ſequentes , à tertiâ ſcilicet ad decimam ſeptimam uſque incluſivè , concolores , attamen exterius in exortu cinereo-albæ ; cinereo-albus autem color eò majus ſpatium occupat , & eò magis fit dilutior , quò remix fit à corpore remotior : quatuor quæ proximè ſequuntur , à decima octava ſcilicet ad vigefimam primam uſque incluſivè , penitus nigricantes : quinque corpori finitimæ ſcapularibus concolores , attamen nonnihil dilutiores. Quæ quinque nuper deſcriptæ remiges maximâ longitudine pollent , & dum ala complicatur , majorum remigum extremitates attingunt. Cauda ſexdecim conſtat rectricibus nigris. Binæ intermediae lateraliſium longitudinem nonnihil



excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum rubrum, excepto mandibulæ superioris unguiculo nigro. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, carneo colore tincti; ungues verò nigricantes. Habitat in *America Septentrionali. Ex museo Reaumuriano.*

Illa cujus descriptionem dedit *Edwardus*, ab ista paululum coloribus discrepat. Capitis superior pars, margines alarum, crurumque pars suprema sunt penitus nigra; superiores autem alarum tectrices mediæ vividè aurantiæ. In reliquis cum nuper à me descripta satis benè convenit.

couleur de noisette. Le bec est rouge, excepté l'onglet du demi-bec supérieur, qui est noir. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de chair; & les ongles noirâtres. On le trouve dans l'*Amerique Septentrionale. Du cabinet de M. de Reaumur.*

Celui qu'a décrit *Edwards*, diffère un peu de celui-ci par ses couleurs. Il a le dessus de la tête, le bord des ailes & le haut des jambes entièrement noirs; & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont d'un orangé vif. Du reste il ressemble assez bien à celui que je viens de décrire.

#### 24. LE CANARD SIFFLEUR DE LA JAMAÏQUE.

*Anas superne fusca, marginibus pennarum rufescentibus, infernè alba, nigro maculata; vertice & uropygio nigricantibus; genis, gutture & collo inferiore candidis, pectore rufescente, collo inferiore & pectore maculis nigris variegatis; reatricibus nigricantibus . . . ANAS FISTULARIS JAMAICENSIS.*

*Anas grisea, capite subcristato, abdomine albo nigroque maculato: Anas arborea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 38.*



*Anas subfusca major*, rostro & vertice nigricantibus, alis variegatis.

*Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 480.*

*Anas fistularis arboribus insidens. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 324.*

*Nº. IX. hujus icon minimè accurata Tab. 272.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 192. Nº. 12.*

*Anas fera, major. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 123.*

Canard sillant au bec noir. *Edwards. Tom. IV. pag. CXIII; avec une figure exacte Pl. 193.*

*Les Anglois l'appellent WHISTLING DUCK. Sloane. Browne. Raj.*

*BLACK-BILL'D WHISTLING DUCK. Edwards.*

*Les Guianois, OPANO. Barr.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent, & a, comme lui, les jambes & le col proportionnellement plus allongés qu'ils ne le sont dans les autres especes de ce genre. Le sommet de la tête est couvert de plumes noirâtres, assez longues, & qui forment une petite hupe peu apparente. Le reste du dessus de la tête est d'un brun-roussâtre. La partie supérieure du col est brune. Les plumes qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont de la même couleur dans leur milieu, & bordées de roussâtre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. Les joues & la gorge sont blanches. La partie inférieure du col est de la même couleur, & variée de taches noires. La poitrine est roussâtre, & variée de même de taches noires. Le ventre, les côtés, le haut des jambes & les cou-

Crassitie præcedentem circiter æmulatur, &, illius instar, cruribus donatur & collo, servatâ proportionē, magis elongatis quàm aliæ hujus generis species. Capitis verticem cooperiunt pennæ nigricantes, longiusculæ, exiguam cristam, non multum conspicuam, efficientes. Reliquum caput superius ex fusco rufescit. Pars colli superior fusca est. Pennæ dorsum vestientes, sicut & scapulares, in medio concolores, rufescente marginatæ. Uropygium & superiores caudæ tectrices nigricant. Genæ & guttur albescent. Pars colli inferior est pariter candida, maculis nigris variegata. Pectus rufescit, illudque simili modo maculæ nigræ variegant. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albescent, nigrisque respergun-



tur maculis, ad latera densissimis, in medio ventre raris. Pennæ alas superne cooperientes sunt rufescentes, maculâ nigrâ, in ipforum medio positâ, notatæ. Remiges majores nigricantes : minores fuscæ, rufescente marginatæ. Corpori viciniore maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt rectrices nigricantes. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum ; unde fit cauda in extremitate acuta. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipforum membranæ, plumbeo colore imbuti ; ungues verò nigri. Habitat in *Americæ Septentrionali regione.*

vertures du dessous de la queue sont d'un blanc tout parsemé de taches noires, en grand nombre sur les côtés, & clair-semées sur le milieu du ventre. Les couvertures du dessus des ailes sont roussâtres, & marquées chacune d'une tache noire, placée dans leur milieu. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les moyennes sont brunes, & bordées de roussâtre. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb ; & les ongles noirs. On le trouve dans la partie Septentrionale de l'*Amerique.*



## \*\* 25. LE MORILLON.

Voyez Pl. XXXVI. le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2.

*Anas cristata*, superne fusco-nigricans, violaceo adumbrata; infernè alba, in pectore & imo ventre fusco variegata; capite & collo supremo splendide nigricantibus, ad violaceum vergentibus; collo infimo fusco-rufescente; taniâ transversâ in alis candidâ; rectricibus fusco-nigricantibus, ad violaceum vergentibus. ( *Mas* ).

*Anas* superne splendide fusca, punctulis griseis aspersa, infernè alba, in pectore & imo ventre fusco variegata; capite & collo fuscis, nigricante variis; uropygio fusco-nigricante, viridi adumbrato; taniâ transversa in alis candida; rectricibus fusco-nigricantibus, ad violaceum vergentibus. ( *Fœmina* ) . . . GLAUCIUM.

*Anas oculorum* iridibus flavis; capite griseo; collari albo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 104.

*Anas* iridibus flavis, capite griseo, collari albo. *Glaucion. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 23.*

*Anas* *Glaucia*, fera. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. I. sp. 10.*

*Anas* fera capite lubrifo major. *Willugh. Ornith. pag. 282.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 144. N°.* 12.

*Anas* fera fusca minor. *Willugh. Ornith. pag. 281. hujus icon minimè accurata Tab. LXXIII. ( an fœmina? )*

*Raj. Syn. Avi. pag. 143. N°.* 11. ( an fœmina? )

*Anas platyrhynchos. Gesn. Avi. pag. 118, in qua hujus icon minimè accurata.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 223.*

*Anas platyrhynchos* *Gesneri. Mus. Worm. pag. 301.*

*Charlet. Exer. pag. 104. N°.* 7.

*Charlet. Onomazt. pag. 99. N°.* 7.

*Anas platyrhynchos* minor alter, seu *Anas Fuligula* alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 227. hujus icon minimè accurata pag. 229. ( fœmina ).*

*Anatis platyrhynchi* species. *Gesn. icon. Avi. pag. 79, in qua hujus icon minimè accurata.*

*Glaucium. Gesn. Avi. pag. 108.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 215. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 216.*

*Glaucium* *Bellonii. Willugh. Ornith. pag. 281.*



*Raj. Syn. Avi. pag. 144.*

*Glaucius. Jonst. Avi. pag. 97. hujus icon à Bellonio mutuata Tab 49, sub titulo, Glaucion.*

*Charlet. Exer. pag. 106. N<sup>o</sup>. 4.*

*Charlet. Onomazt. pag. 100. N<sup>o</sup>. 4.*

*Glaucion. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 21.*

*Morillon. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 165 ; avec une très-mauvaise figure pag. 166.*

*Bel. Portr. d'Ois. pag. 33 b, dans laquelle est la même figure.*

*Les Grecs l'appellent Γλαύκιον. Bel. Gesn.*

*Les Vénitiens, CAPO ROSSO. Willugh. Raj.*

*Les Allemands, SCHELL-ENT ; SCHILT-ENT. Gesn. Aldrov. SKEL-ENDT.*

*Worm. LEPEL-GANS. Worm. Charlet.*

*Les Suédois, BRUNNACKE. Linn.*

*Les Anglois, SPOON-BILL'D DUCK. Charlet.*

A *Penelope paululùm* crassitie superatur. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quatuordecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues quindecim pollices. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & decem lineas longum est ; cauda duos pollices & sex lineas ; pars crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes duodecim cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & totidem lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis, intimus unum pollicem & novem lineas ; posticus autem octo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est viginti quinque

Il est un peu moins gros que le *Millouin*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes de long ; sa queue deux pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes ; son pied douze lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces deux lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur un pouce neuf lignes ; & celui de derriere huit lignes. Il a vingt-cinq pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La



bâse du bec est entourée de petites plumes variées de noirâtre & de blanchâtre. La tête, la gorge, & le col dans la plus grande partie de sa longueur sont d'un noirâtre brillant & tirant sur le violet. Le bas du col est d'un brun tirant sur le roux. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun - noirâtre brillant, mêlé d'une légère teinte de violet. La poitrine est couverte de plumes brunes, terminées par une bordure blanche très-large; de façon que le brun paroît fort peu. Le ventre est d'un beau blanc : sur le bas-ventre cette couleur est variée de brun. Les côtés sont d'un brun parsemé de très-petits points gris. Le haut des jambes est entièrement brun. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun parsemé de petits points gris & de petites lignes ondées de la même couleur. Parmi celles du dessous des aîles, les plus proches du corps sont blanches : les petites les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré plus clair & sans bordures. Les couvertures du dessus des aîles sont d'un brun-

pollicum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Basim rostri ambiunt plumulæ nigricante & albido variæ. Caput, guttur & colli longitudinis pars maxima splendidè nigricant, & ad violaceum colorem vergunt. Collum infimum fuscum est, & ad rufescentem inclinat colorem. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt splendidè fusco-nigricantes, violaceo adumbratæ. Pectus obtegunt pennæ fuscæ, latissimâ margine albâ terminatæ; ita ut fuscus color sit minimè conspicuus. Venter eleganter albicat : albedo autem fusco in imo ventre variegatur. Latera fusca sunt, minutissimis punctulis griseis aspersa. Crurum suprema pars penitus fuscescit. Pennæ caudam subtrus cooperientes sunt fuscæ, punctulis griseis & lineolis undatis concoloribus respersæ. Ex inferioribus alarum tectricibus, corpori viciniores omnes sunt candidæ : minores à corpore remotiores cinereo-fuscæ, albo fimbriatæ : majores à corpore remotiores dilutiùs cinereæ, & marginibus destitutæ. Superiores alarum tectrices



testrices fusco - nigricantes, omnes, exceptis tamen majoribus à corpore remotioribus, viridi adumbratæ. Viginti sex remigibus ala conflatur : decem primores in latere exteriori & extremitate fusco-nigricantes, in latere interiori cinereo-fusco nonnihil dilutiore imbutæ ; ex illis tamen septem, à quarta scilicet ad decimam usque inclusivè, in latere exteriori, prope scapum mediam versùs longitudinem, griseo insigniuntur diluto, eò majus spatium occupante, quò remix fit interior : undecima & duodecima cinereo-albæ, apicibus fusco-nigricantibus præditæ : octo proximè sequentes, à decima tertia scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, fusco-nigricante terminatæ ; qui color fusco-nigricans exterius tantùm ad viride obscurum vergit ; vigesima tamen in latere interiori penitus fusca ; decima nona autem & vigesima sunt insuper exterius versùs extremitatem nigricante marginatæ : sex corpori finitimæ fusco-nigricantes, ad viride obscurum inclinantes ; & ex illis extrema minutâ notatur maculâ candidâ, in latere

noirâtre, & toutes, excepté les grandes les plus éloignées du corps, sont nuancées de verd. L'aile est composée de vingt-six plumes : les dix premières sont d'un brun-noirâtre du côté extérieur & à leur extrémité, & d'un cendré-brun un peu clair du côté intérieur ; cependant sept de celles-là, sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la dixième inclusivement, sont marquées sur le côté extérieur, auprès de leur tige vers le milieu de leur longueur, d'un gris clair, qui s'étend d'autant plus loin, que la plume est plus intérieure : l'onzième & la douzième sont d'un gris-blanc, & terminées de brun-noirâtre : les huit suivantes, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont blanches ; & terminées d'un brun-noirâtre, qui sur le côté extérieur seulement tire sur le verd obscur ; la vingtième est cependant entièrement brune du côté intérieur ; & la dix-neuvième & la vingtième sont de plus bordées de noirâtre du côté extérieur vers le bout : les six plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre tirant sur le verd obscur ; & de celles-là, la plus extérieure est marquée d'une petite tache blanche, placée le long de sa tige sur le côté exté-



rieur, vers les deux tiers de sa longueur. Ces six dernières plumes sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de quatorze plumes d'un brun-noirâtre tirant sur le violet. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb noirâtre; & les ongles noirs.

*La femelle (voyez Pl. XXXVI. Fig. 2)* est à peu près de la même grandeur & de la même grosseur que le *mâle*. Elle en diffère un peu par ses couleurs. La tête, la gorge & le col sont d'un brun varié d'un peu de noirâtre sur la tête & la partie inférieure du col. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un brun brillant, tout parsemé de très-petits points gris. La partie inférieure du dos, le croupion & les ouvertures du dessous de la queue

extérieure, versus duas tertias longitudinis partes, secundum ipsius scapi longitudinem positâ. Quæ sex nuper descriptæ remiges maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt quatuordecim rectrices fusco-nigricantes, ad violaceum colorem vergentes. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, ex plumbeo colore nigricant; ungues verò nigri.

*Fœmina (vide Tab. XXXVI. Fig. 2)* magnitudine & cæsitie cum *mare* circiter convenit. Ab illo coloribus paululum discrepat. Caput, guttur & collum fusco tinguntur colore, pauco nigricante in capite & parte colli inferiore vario. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt splendide fuscæ, minutissimis punctulis griseis aspersæ. Dorsum infimum; uropygium & superiores caudæ rectrices fusco-nigrican-



tes, viridi adumbrata. Lateraliter tingit color griseofuscus. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt candidæ, taniâ transversâ fuscâ notatæ. In reliquis cum mare convenit; caudæ rectrices non sunt tamen ita splendentes.

Juxta maris littora versantur; fluviosque & piscinas frequentant. *Ex museo D. de Bandeville.*

font d'un brun-noirâtre nuancé de verd. Les côtés sont d'un gris-brun. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches, & marquées chacune d'une bande transversale brune. Tout le reste est comme dans le mâle, si ce n'est que les plumes de la queue sont moins brillantes.

On les trouve sur les bords de la mer, sur les rivières & les étangs. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

**\*\* 26. LE PETIT MORILLON.**

*Voyez Pl. XXXVII. Fig. 1.*

*Anas cristata*, superne fusco-nigricans, punctulis dilutioribus aspersa, infernè albo-argentea; capite & collo supremo saturatè violaceis; collo infimo & imo ventre fusco-nigricantibus; uropygio saturatè fusco, viridi obscuro adumbrato; taniâ transversâ in alis candidâ; rectricibus splendide fuscis. . . . GLAUCIUM MINUS.

*Anas cristata* dependente; corpore nigro; ventre maculaque alarum albis. *Faun. Suec. Linn. N°. 99.*

*Anas cristata* dependente, corpore nigro, ventre maculaque alarum albis. *Fuligula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 39.*

*Anas cirrhata. Gesn. Avi. pag. 120.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 229.*

*Jonst. Avi. pag. 98.*

*Anas cristata. Raj. Syn. Avi. pag. 142. N°. A. 7.*

*Anas platyrhynchos minor prior. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 227. hujus icon non satis accurata pag. 228.*

*Anas Fuligula. Gesn. Avi. pag. 120, in qua hujus capitis icon pessima.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 227, in qua hujus capitis icon à Gesnero mutuata.*

*Anas Fuligula prima Gesneri, Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 280. hujus icon non satis accurata Tab. LXXIII.*



*Klein. Avi. pag. 133. N°. 11.*

*Anas Fuligula prima Gefneri, Mergus cirratus minor ejusdem, Querquedula cristata seu Colymbis Bellonii & Willughby. Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 356.*

*Fuligula, Gefn. icon. Avi. pag. 80, in qua hujus capitis icon pessima.*

*Jonst. Avi. pag. 98. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 49, sub titulo, Anas platyrynchos.*

*Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 18.*

*Querquedula cristata, seu Colymbis Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 210.*

*Querquedula cristata, quam Bellonius Colymbim vocat. Jonst. Avi. pag. 97.*

*Charlet. Exer. pag. 107. N°. 2.*

*Charlet. Onomazt. pag. 101. N°. 2.*

*Mergus cirratus minor Gefneri; Anas Fuligula prima ejusdem; Querquedula cristata, Colymbus Bellonii. Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 393.*

*Strausz Endt. Gefn. Avi. pag. 107, in qua hujus icon satis accurata.*

*Canard à crête noire. Alb. Tom. 1. pag. 82; avec une figure mal coloriée Pl. 95.*

*Petit Plongeon, Espece de Canard. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 175.*

*Les Vénitiens l'appellent CAPO NEGRO. Willugh. Rzac. Klein.*

*Les Allemands, VOLL-ENTEN. Gefn. Aldrov. Jonst. & quelques-uns; RUSGEN. Gefn. Aldrov.*

*Les Suédois, WIGGE. Linn.*

*Les Anglois, TUFTED DUCK. Willugh. Raj.*

Il n'est pas tout - à - fait si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces dix lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue deux pouces cinq lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied treize lignes; ce-

Præcedenti paululum crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda duos pollices & quinque lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas;



pes tredecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extimus viginti quinque lineas, intimus unum pollicem & septem cum semi lineas; posticus autem septem tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur & partem colli capiti finitimam tingit color saturatè violaceus splendidissimus. Pennæ summum caput vestientes sunt longissimæ, quædam enim duorum pollicum & sex linearum longitudine pollent, elegantemque cristam retrò dependentem, efficiunt. Pars colli corpori vicinior est splendidissimè fusco - nigricans. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ concolores quidem, sed minutissimis punctulis dilutiore colore imbutis, attamen minimè conspicuis, aspersæ. Dorsum inferius, uropygium & superiores caudæ rectrices sunt saturatè fuscæ, aliquâ viridis obscuri mixturâ adumbratæ. Summum pectus vestiunt pennæ fusco-nigricantes, al-

lui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur vingt-cinq lignes, l'intérieur un pouce sept lignes & demie; & celui de derrière sept lignes seulement. Il a deux pieds de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont d'un violet foncé très-brillant. Les plumes du sommet de la tête sont fort longues, quelques-unes ayant jusqu'à deux pouces six lignes de long, & formant une belle hupe qui pend en arrière. La partie du col la plus voisine du corps est d'un brun-noirâtre très-brillant. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont de la même couleur, mais elle est toute parsemée de très-petits points d'une couleur plus claire, qui sont cependant très-peu apparens. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé, légèrement nuancé de verd obscur. Le haut de la poitrine est couvert de plumes d'un brun-noirâtre, & bordées par le bout de blanc-argenté. Le bas de la poitrine, le haut



du ventre & le haut des côtés sont de cette dernière couleur. Le bas-ventre, le bas des côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-noirâtre brillant. Parmi les couvertures du dessous des ailes, les plus proches du corps sont blanches : les petites les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-blanc. Toutes les couvertures du dessus des ailes sont d'un brun moins foncé que celui du dos ; mais les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont nuancées d'une légère teinte de verd obscur. L'aile est composée de vingt-quatre plumes : les huit premières sont brunes en-dessus, & d'un gris-blanc en-dessous : les dix suivantes, savoir depuis la neuvième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, sont blanches, & terminées de brun ; mais dans six de celles-là, savoir depuis la treizième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, le brun est nuancé de verd obscur ; la dix-huitième est cependant entièrement brune à son origine & dans tout son côté intérieur ; & la dix-septième & la dix-huitième sont

bo-argenteo in extremitate fimbriatæ. Imum pectus, ventrem supremum, supremamque laterum partem tingit quoque albo-argenteus color. Venter imus, laterum pars infima, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes ex fusco splendidè nigricant. Ex inferioribus alarum tectricibus, corpori viciniore sunt candidæ : minores à corpore remotiores cinereo-fusæ, albo fimbriatæ : majores à corpore remotiores cinereo-albæ. Superiores alarum tectrices omnes fusco minùs quàm in dorso saturato imbutæ ; mediæ tamen, sicut & majores corpori viciniore, aliquâ viridis obscuri-mixturâ adumbratæ. Alam componunt viginti quatuor remiges : octo primores sunt superne fusæ, infernè cinereo-albæ : decem proximè sequentes, à nona scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, candidæ, apicibus fuscis præditæ ; qui fuscus color in sex ex istis, à decima tertia scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, viridi obscuro adumbratur ; attamen decima octava in exortu & per totam lateris interioris longitudinem peni-



tus fusca; decima septima & decima octava exterius insuper versus extremitatem fusco marginata: sex tandem corpori viciniore fuscæ, viridi obscuro adumbrata. Quæ sex novissimè dictæ remiges maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates pertingunt. Cauda quatuordecim constat rectricibus superne splendide fuscis, infernè verò cinereo - fuscis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm superant; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Oculorum irides eleganter luteæ. Rostrum saturatè cinereo-coeruleum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti plumbeo colore tincti; ipsorum membranæ, unguesque nigricantes. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Reaumuriano.*

Hujus speciei varietas est

de plus bordées de brun du côté extérieur vers le bout : enfin les six plus proches du corps sont d'un brun nuancé de verd obscur. Ces six dernières plumes sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de quatorze plumes d'un brun brillant en-dessus, & d'un cendré-brun en-dessous. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est d'un beau jaune. Le bec est d'un cendré-bleu foncé, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont de couleur de plomb; leurs membranes & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Une variété de cette espece est



## A. LE PETIT MORILLON RAYÉ.

*Glaucium minus striatum.*

*Fuligula dicta Gefnero. Willugh. Ornith. pag. 279.*

*Fuligula fortè Gefneri. Raj. Syn. Avi. pag. 142. N°. A. 6.*

*Les Anglois l'appellent SCAUP DUCK. Willugh. Raj.*

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur du précédent : il lui ressemble même par ses couleurs, si ce n'est que le milieu de son dos est rayé transversalement & en zigzags de brun & de blanc. On le trouve aussi sur les bords de la mer.

Magnitudine & crassitie cum præcedente circiter convenit : ab illo quoque coloribus non discrepat, nisi medio dorso albo & fusco transversim & undatim striato. Juxta maris littora pariter versatur.

## \*\* 27. LE GARROT.

*Voyez Pl. XXXVII. Fig. 2.*

*Anas superne nigra, infernè alba ; capite & collo supremo nigris, violaceo & viridi-aureo colore variantibus ; maculâ utrinque rostrum inter & oculum, collo infimo, tectricibus alarum superioribus mediis & remigibus intermediis candidis ; rectricibus nigricantibus . . . CLANGULA.*

*Anas nigro alboque variegata ; capite nigro-viridi ; sinu oris alba macula. Faun. Suec. Linn. N°. 100.*

*Anas nigro alboque varia, capite tumido nigro-viridi : sinu oris macula alba. Clangula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 20.*

*Anas Clangula. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 224, in qua hujus capitis icon à Gefnero mutuata.*

*Klein. Avi. pag. 133. N°. 13.*

*Anas platyrynchos. Alarov. Avi. Tom. III. pag. 224. hujus icon pessima pag. 225.*

*Anas platyrynchos mas Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 282. hujus icon minimè accurata Tab. LXXIII, sub titulo, Clangula Gefneri. Raj. Syn. Avi. pag. 142. N°. A. 8.*

*Anas platyrinchos, mas. Klein. Avi. pag. 135. N°. 27.*

Anas



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIV.* 417

*Anas marina platyrnchos mas* : Clangula Gefneri ; Quattro Occhi Italis. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 114. hujus icon non satis accurata Tab. 55.*

*Anas fera sexta seu cristata. Schwenck. Avi. Sil. pag. 200.*

*Anas cristata sexta Schwenckfeldii. Rzac. Auc. Hist. nat. Pol. pag. 357.*

*Clangula. Gefn. Avi. pag. 119, in qua hujus capitis icon minimè accurata; Gefn. icon. Avi. pag. 79, in qua capitis eadem icon.*

*Jonst. Avi. pag. 97.*

*Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 19.*

*Petit Plongeon. Alb. Tom. I. pag. 83 ; avec une figure peu exacte & mal coloriée Pl. 96.*

*Les Italiens l'appellent QUATTRO OCCHII. Willugh. QUATTRO OCCHI. Marfil. QUATTR' OCCHII. Klein.*

*Les Allemands , KOBEL ENDTE ; STRAUS ENDTE. Schwenck. STRAUS-ENDE. Rzac.*

*Les Allemands aux environs de Strasbourg , WEISSER DRITT-VOGEL. Aldrov. Willugh. & quelques-uns , KLINGER. Gefn. Aldrov.*

*Les Suédois , KNIPA. Linn.*

*Ceux qui habitent la Province de Skone , DOPPING. Linn.*

*Les Anglois , GOLDEN EYE. Willugh. Raj.*

*Anati domesticæ paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem sex pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues unum pedem sex pollices cum linea unica. Rostrium ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & undecim lineas longum est ; cauda tres pollices & octo lineas ; pars crurum plumis denudata tres lineas ; pes quindecim lineas ; trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices cum septem lineis , extimus duos polli-*

Il est un peu moins gros que le *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied six pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce onze lignes de long ; sa queue trois pouces huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , trois lignes ; son pied quinze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , deux pouces sept lignes , l'extérieur deux pouces six lignes & demie , l'intérieur deux pou-



ces ; & celui de derriere neuf lignes seulement. Il a deux pieds quatre pouces quatre lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à un pouce au-delà de l'origine de la queue. La tête , la partie du col qui en est la plus voisine , & la gorge sont d'un noir changeant en violet & en verdoré très-brillants. De chaque côté de la tête , entre le bec & l'œil , tout près de l'origine du demi-bec supérieur , est une tache blanche , qui remonte en pointe vers le synciput , & s'étend un peu au-dessous de l'œil : elle a treize lignes de hauteur sur neuf lignes de large. Il y a aussi sous la gorge une fort petite tache blanche. Le reste du col , la poitrine , le ventre , les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs ; cependant les plus grandes plumes des côtés sont terminées de noir ; & le bas des côtés , vers l'anús , est noirâtre , ainsi que le haut des jambes. Le dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un très-beau noir. Les petites plumes scapulaires sont variées de noir & de blanc : les plus grandes sont tout-à-fait noires. Les petites couvertures du dessus des aîles , ainsi que les grandes les plus proches

ces & sex cum semí lineas ; intimus duos pollices ; posticus autem novem tantummodo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum quatuor pollicum & totidem linearum ; alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput , pars colli ipsi finitima , gutturque nigro tinguntur violaceo & viridi-aureo colore splendidissimo variante. In utroque capitis latere , rostrum inter & oculum , prope mandibulæ superioris exortum , macula extat candida , versùs synciput in acumen producta , & infra oculum paululùm extensa : quæ macula tredecim linearum altitudinem & novem linearum latitudinem obtinet. Sub gutture minutissima quoque adest macula alba. Reliquum collum , pectus , venter , latera , inferioresque caudæ tractorices albicant ; ex pennis tamen latera vestientibus , majores nigro terminantur ; & laterum infima pars , versùs anum scilicet , crurumque pars suprema nigricant. Dorsum , uropygium & pennæ caudam superne cooperientes elegantissimo nigro tin-



guntur. Pennæ scapulares minores albo & nigro variegantur : majores sunt penitus nigra. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniore, eodem imbuuntur nigro ac dorsum ipsum tingitur : mediæ sunt candidæ : majores à corpore remotiores nigricantes : majores tandem medium locum occupantes, nigra, apicibus albis præditæ. Tectrices alarum inferiores minores fusca : majores cinerea. Alarum componunt viginti sex remiges : quatuordecim primores nigricant ; decima quarta tamen minutâ maculâ candidâ, in latere interiore ad extremitatem positâ, notatur : decima quinta in latere exteriori nigricat, in interiore albicat : sex proximè sequentes, à decima sexta scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, sunt candidæ ; attamen decima sexta maculâ insignitur nigricante, mediam versùs longitudinem exteriùs ad marginem positâ ; vigesima prima verò binis notatur maculis similiter nigricantibus, in latere interiore versùs extremitatem collocatis : quinque corpori viciniore eodem imbuuntur nigro ac dorsum

du corps, sont du même noir que le dos : les moyennes sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres : enfin les grandes qui occupent le milieu, sont noires, & terminées de blanc. Les petites couvertures du dessous des aîles sont brunes : les grandes sont cendrées. L'aîle est composée de vingt-six plumes : les quatorze premières sont noirâtres ; mais la quatorzième est marquée d'une petite tache blanche, placée à son extrémité du côté intérieur : la quinzième est noirâtre du côté extérieur, & blanche du côté intérieur : les six suivantes, savoir depuis la seizième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont blanches ; mais la seizième est marquée d'une tache noirâtre, placée sur son bord du côté extérieur vers le milieu de sa longueur ; & la vingt-unième est marquée de deux taches de la même couleur, placées vers son extrémité sur le côté intérieur : les cinq plus proches du corps sont du même noir que le dos. Ces cinq dernières sont assez longues, & se terminent en pointe. La queue est composée de seize plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus courtes que celle qui les suit immédiate-



ment de chaque côté, laquelle est la plus longue : toutes les autres vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte : de sorte que la queue, lorsqu'elle est étendue, paroît un peu fourchue. L'iris des yeux est d'un jaune de safran. Le bec, qui est fort élevé à sa base, est tout noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont orangés ; leurs membranes sont d'une couleur plus obscure ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

colore obscuriore imbutæ ; unguis verò nigricantes. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

ipsum tingitur. Quæ quinque novissimè dictæ remiges sunt longiusculæ, & in acumen desinunt. Sexdecim rectricibus nigricantibus cauda constat. Binæ intermediæ utrinque proximè sequenti paululùm longitudine cedunt ; quæ proximè sequens est longissima ; reliquæ autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē : ita ut cauda explicata nonnihil bifurca videatur. Oculorum irides croceæ. Rostrum, quod ad basim maximè elatum, penitus nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti aurantii, ipsorum membranæ

## \*\* 28. LA MACREUSE.

*Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 2.*

Anas superne splendide nigra, infernè nigricans ; tuberculo in exortu rostri carnosio rubro, lineâ flavâ diviso ; capite & collo nigris, violaceo saturato colore variantibus ; rectricibus nigricantibus . . . . ANAS NIGRA.

Anas tota nigra, basi rostri gibba. Anas nigra. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 6.*

Anas niger minor, *Raj. Syn. Avi. pag. 141. N°. A. 5.*

Anas niger, Eboracensibus Scoter. *Willugh. Ornith. pag. 280. hujus*



*icon non satis accurata Tab. LXXIV, sub titulo , Anas niger minor.*

*Les Anglois qui habitent la Province d'Yorck l'appellent SCOTER. Willugh. Raj.*

*Crassitie Anatem domestici-*  
*cam paululum antecellit. Ip-*  
*sius longitudo ab apice rostri*  
*ad caudæ extremitatem unum*  
*pedem octo pollices & tres*  
*lineas explet, & ad extre-*  
*mos unguis unum pedem &*  
*octo pollices. Rostrum ab*  
*ipsius apice ad oris angulos*  
*usque duos pollices & tres*  
*lineas longum est; cauda*  
*quatuor pollices; pars cru-*  
*rum plumis denudata qua-*  
*tuor lineas; pes septemdecim*  
*cum semi lineas; trium digito-*  
*rum anticorum medius cum*  
*ungue duos pollices & no-*  
*vem lineas, extimus duos pol-*  
*lices cum decem lineis; inti-*  
*mus duos pollices & toti-*  
*dem lineas; posticus autem*  
*octo lineas. Alis expansis,*  
*extremitates majorum remi-*  
*gum duorum pedum & sex*  
*pollicum intervallo distant;*  
*alæ verò complicatæ ultra*  
*caudæ exortum non multum*  
*protenduntur. Caput, guttur*  
*& collum nigra sunt, splen-*  
*didissimo violaceo saturato*  
*colore variantia. Summum*  
*pectus, dorsum, uropy-*  
*gium, pennæ scapulares,*  
*superioresque caudæ tectri-*

Elle est un peu plus grosse  
que le *Canard domestique*. Sa  
longueur depuis le bout du bec  
jusqu'à celui de la queue est  
d'un pied huit pouces trois lig-  
nes, & jusqu'à celui des ongles  
d'un pied huit pouces. Son bec  
depuis son bout jusqu'aux coins  
de la bouche a deux pouces  
trois lignes de long; sa queue  
quatre pouces; la partie de ses  
jambes qui est dégarnie de plu-  
mes, quatre lignes; son pied  
dix-sept lignes & demie;  
celui du milieu des trois doigts  
antérieurs, joint avec l'on-  
gle, deux pouces neuf lig-  
nes, l'extérieur deux pouces  
dix lignes, l'intérieur deux  
pouces deux lignes; & celui de  
derrière huit lignes. Elle a deux  
pieds six pouces de vol; & ses  
ailes, lorsqu'elles sont pliées,  
ne s'étendent guères au-delà  
de l'origine de la queue. La  
tête, la gorge & le col sont  
d'un noir changeant en violet  
foncé très-brillant. Le haut de  
la poitrine, le dos, le crou-  
pion, les plumes scapulaires &  
les couvertures du dessus de la  
queue sont d'un noir brillant.  
Les côtés & le haut des jam-  
bes sont de la même couleur,



mais moins brillante. Le bas de la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont noirâtres. Les petites couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur : les grandes sont cendrées. Les petites du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même noir que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. L'aile est composée de vingt-cinq plumes, dont les vingt premières sont noirâtres du côté extérieur & à leur extrémité, & d'un cendré-brun du côté intérieur : les cinq plus proches du corps sont de la même couleur que les scapulaires. Ces cinq dernières sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de seize plumes noirâtres, & qui se terminent en pointe. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est d'une couleur obscure ; leurs paupières sont jaunes. Sur l'origine du demi-bec supérieur s'élève un tubercule charnu,

ces sont splendide nigræ. Latera & crurum suprema pars eodem colore, sed non ita splendido, tinguntur. Imum pectus, venter & pennæ caudam subtus obtegentes nigricant. Tectrices alarum inferiores minores concolores : majores cinereæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniore, eodem nigro imbutæ ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores nigricantes. Alam componunt viginti quinque remiges, quarum viginti primores in latere exteriori & extremitate nigricantes, in latere interiore cinereo-fuscæ : quinque corpori finitimæ scapularibus concolores. Quæ quinque novissimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda sexdecim constat rectricibus nigricantibus, in acumen desinentibus. Binæ intermediae lateraliū longitudinem paululū superant ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculorum irides colore obscuro imbutæ ; ipsarum palpebræ luteæ.



Supra mandibulæ superioris exortum tuberculum attollitur carnosum, Cerasi crassitiem æquans, eleganter rubrum, & lineâ flavâ, secundum rostri longitudinem ductâ, in duas partes divisum. Mandibula superior in medio lutea, ad margines nigra; inferior penitus nigra. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguisque fuscis. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

gros comme une Cerise, d'un beau rouge, & divisé en deux parties par une ligne jaune, qui s'étend selon la longueur du bec. Le demi-bec supérieur est jaune dans son milieu, & noir sur ses bords; l'inférieur est entièrement noir. La partie des jambes qui est dépourvue de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont bruns. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

## 29. LA GRANDE MACREUSE.

*Anas nigra*; tuberculo in exortu rostri carnosio nigro; capite & collo supremo nigro-virescentibus; maculâ ponè oculos & taniâ longitudinali in alis candidis; rectricibus nigris. (*Mas*).  
*Anas fusca*; maculâ ponè oculos & taniâ longitudinali in alis candidis; rectricibus fuscis. (*Fœmina*) . . . . *ANAS NIGRA MAJOR.*

*Anas corpore obscuro: macula ponè oculos lineaque alarum alba.*  
*Faun. Suec. Linn. N° 106.*  
*Anas nigricans, macula ponè oculos lineaque alarum albis. Anas fusca.*  
*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 5.*  
*Anas nigra, rostro nigro, rubro & luteo. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 234. hujus icon non satis accurata pag. 235.*  
*Anas nigra. Jonst. Avi. pag. 98.*  
*Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 14.*  
*Anas nigra Aldrovandi. Rzac. Auc. Hist. Nat. Pol. pag. 357.*  
*Klein. Avi. pag. 133. N° 12.*  
*Anas niger Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 278. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXX, sub titulo, Anas niger major.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 141. N° A. 4.*  
*Les Suédois l'appellent SWAERTA. Linn.*  
*Les Anglois, GREAT BLACK DUCK. Willugh. Raj.*



Elle est un peu plus grande que la précédente. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont d'un noir-verd assez brillant; derrière chaque œil est cependant une tache blanche. Le bas du col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes noires, douces comme de la soye. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, celles du dessus & du dessous de la queue, les plumes de l'aile & celles de la queue sont de la même couleur; il y a cependant sur le milieu de chaque aile une bande transversale blanche, large d'environ un pouce. Sur l'origine du demi-bec supérieur s'élève un tubercule charnu, d'un assez beau noir. Le bec est jaune sur les côtés, noir dans son milieu; & l'onglet du demi-bec supérieur est rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont rouges extérieurement, & d'un jaune de citron intérieurement; leurs membranes & les ongles sont d'un très-beau noir.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est brune par-tout où le mâle est noir.

Præcedentem crassitie paululum antecellit. Caput, guttur & pars colli capiti finitima sunt satis splendide nigro-virescentia; ponè utrumque oculum macula tamen extat candida. Collum infimum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ nigræ, serici instar, mollissimæ. Scapulares, alas superne & inferne cooperientes, teñtrices caudæ superiores & inferiores, alarum remiges & caudæ rectrices eodem colore tinguntur; attamen in utriusque alæ medio tania extat transversa candida, unius circiter pollicis latitudinem obtinens. Supra mandibulæ superioris exortum tuberculum attollitur carnosum, eleganter nigrum. Rostrum ad latera luteum, in medio nigrum, mandibulæ superioris unguiculo rubro. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti exterius rubri, interiùs citrini; ipsorum membranæ, unguesque aterrimi.

Fœmina colore à mare discrepat; fusco enim imbitur omnibus in locis in quibus mas nigro tingitur.

Juxta



Juxta maris littora ver-      On les trouve sur les bords  
santur, fluminaque frequen-      de la mer & sur les rivières.  
tant.

30. LA GRANDE MACREUSE DE LA BAYE DE HUDSON.

*Anas nigra*; maculâ utrinque in exortu rostri quadratâ nigrâ;  
maculâ in vertice, alterâ infra occipitium triangularibus  
candidis; reâtricibus superne nigris, subtus cinereo-fus-  
cis . . . . *ANAS NIGRA MAJOR Freti HUDSONIS.*

*Anser maximus niger*, The Whilk dictus. *Raj. Syn. Avi. pag. 138.*  
*N<sup>o</sup>. A. 2.*

*Anas nigra*, vertice nuchaque albis macula nigra rostri ponè nares.

*Anas perspicillata.* *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 22.*

Gros Canard noir de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CLV;*  
*avec une figure exacte Pl. 155.*

*Les Anglois l'appellent WHILK.* *Raj. GREAT BLACK DUCK FROM*  
*HUDSON'S-BAY. Edwards.*

Crassitie præcedentem ad-  
huc paululùm superat. Ipsius  
longitudo à rostri apice ad  
caudam extremam unum pe-  
dem decem pollices & sex  
circiter lineas explet, & ad  
extremos ungues unum pe-  
dem novem pollices & toti-  
dem lineas. Rostrum ab ip-  
sius extremitate ad oris an-  
gulos usque duos pollices  
& quatuor lineas longum  
est; cauda quatuor pollices  
& tres lineas; pars crurum  
plumis denudata sex lineas;  
pes unum pollicem cum no-  
vem lineis; trium digitorum  
anticorum medius cum un-  
gue duos pollices & quatuor  
*Tom. VI.*

Elle est encore un peu plus  
grosse que la précédente. Sa lon-  
gueur depuis le bout du bec  
jusqu'à celui de la queue est  
d'environ un pied dix pouces  
six lignes, & jusqu'à celui des  
ongles d'un pied neuf pouces  
neuf lignes. Son bec depuis son  
bout jusqu'aux coins de la bou-  
che a deux pouces quatre lig-  
nes de long; sa queue quatre  
pouces trois lignes; la partie  
de ses jambes qui est dégarnie  
de plumes, six lignes; son pied  
un pouce neuf lignes; celui du  
milieu des trois doigts anté-  
rieurs, joint avec l'ongle, deux  
pouces quatre lignes, l'exté-  
rieur vingt-cinq lignes, l'inté-  
H h h



rieur un pouce huit lignes; & celui de derriere six lignes seulement. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Sur le sommet de la tête est une tache blanche, en forme de triangle isoscele, dont le sommet est tourné en devant. Au-dessous de l'occiput est une autre tache de la même couleur, qui a aussi la figure d'un triangle isoscele, dont la bâte est tournée vers la tête. Le reste de la tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes noires. Les scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. Les couvertures du dessous des aîles & celles du dessous de la queue sont d'un cendré-brun. Toutes les plumes de l'aîle sont noires. Celles de la queue sont de la même couleur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est orangé, excepté sur son milieu, où il est rouge : de plus sur chaque côté du demibec supérieur est un espace noir & quarré, qui est un peu

lineas, extimus viginti quinque lineas, intimus unum pollicem cum octo lineis; posticus autem sex lineas tantum. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. In capitis vertice macula extat candida, trianguli isosceli figuram æmulans, & cujus apex antrorsum vertitur. Infra occipitium altera adest macula pariter candida, trianguli isosceli figuræ similiter æmula, cujusque basis caput spectat. Reliquum caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ nigræ. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices concolores. Rectrices alarum inferiores & pennæ caudam subtus obtegentes sunt cinereo-fusæ. Omnes alarum remiges nigræ. Caudæ rectrices eodem imbutæ colore. Binæ intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum aurantium; attamen in medio rubrum : in utroque mandibulæ superioris latere spatium insuper extat quadratum nigrum,



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIV.* 427

reliquo rostro paulò magis plus élevé que le reste du bec.  
elatum. Pars crurum plumis La partie des jambes qui est dé-  
denudata, pedes & digiti garnie de plumes, les pieds &  
coccinei; ipforum membra- les doigts sont d'un rouge vif;  
næ, unguetque nigricantes. leurs membranes & les ongles  
Habitat in *Freto Hudsonis.* sont noirâtres. On la trouve à la  
*Baye de Hudson.*

\*\* 31. LA SARCELLE.

*Voyez Pl. XXXIX. le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2.*

*Anas superne fusca, marginibus pennarum griseo-rufescentibus, infernè alba, ad latera nigricante transversim striata; capite & collo supremo fusco-rufescentibus, lineolis longitudinalibus albis variis; vertice & occipitio fusco-nigricantibus; taniâ supra oculos candidâ; pectore rufescente, fusco eleganter variegato; macula alarum viridi-aurea, taniâ albâ superne & infernè donata; rectricibus griseo-fuscis, exteriùs albido marginatis. (Mas).*

*Anas superne fusca, marginibus pennarum griseo-rufescentibus, pectore supremo concolore, infernè alba; capite & collo rufescentibus, maculis fuscis variegatis; macula alarum nigricante, viridi-aureo adumbrata, taniâ albâ inferiùs donata; rectricibus quatuor utrinque extimis griseo-fuscis, exteriùs albido marginatis. (Fœmina) . . . . QUERQUEDULA.*

*Anas macula alarum viridi; linea alba supra oculos. Faun. Suec. Linn. N°. 108.*

*Anas macula alarum viridi, linea alba supra oculos. Querquedula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 28.*

*Anas Kernell circa Argentoratum dicta. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 210.*

*Jonst. Avi. pag. 97.*

*Anas fera decima quinta seu minor tertia. Schwenck. Avi. Sil. pag. 204.*

*Anas fera quinta seu media. Schwenck. Avi. Sil. pag. 199. (fœmina).*

*Anas mediocris. Gesn. Avi. pag. 117. (fœmina).*

*Klein. Avi. pag. 131. N°. 4. (fœmina).*

*Kernell, seu Querquedula varia. Gesn. Avi. pag. 107.*

*Querquedula. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 23.*

H h h ij



- Querquedula prima. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 209. hujus icon pessima pag. 549.*
- Querquedula prima Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 291. hujus icon pessima Tab. LXXIV, sub titulo, Querquedula altera.*
- Raj. Syn. Avi. pag. 148. N° 8.*
- Querquedula varia. *Gesn. icon. Avi. pag. 77.*
- Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 416.*
- Querquedula varia, Gesneri; prima, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag. 132. N° 8.*
- Querquedula Kernell circa Argentoratum dicta. *Charlet. Exer. pag. 107. N° 3.*
- Charlet. Onomazt. pag. 101. N° 3.*
- Boscas Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 208. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 548.*
- Boscas. *Gesn. Avi. pag. 104: (femina).*
- Phalcas fortè Gesnero. *Willugh. Ornith. pag. 289. (femina).*
- Phalcas fortè Gesnero D. Johnson. *Raj. Syn. Avi. pag. 147. N° A. 4. (femina).*
- Sarcelle. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 175; avec une mauvaise figure pag. 176.*
- Sarcelle, Cercelle, Cercerelle, Alebrande, Garfotte, Halebran. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 37 b, dans laquelle est la même figure.*
- Les Grecs l'appellent Βίονας ou Βασνας. *Bel.*
- Les Italiens, CERCEDULA; CERCEVOLO; SCAVOLO; SARTELLA; GARGANELLO. *Bel.*
- Les Milanois, GARGANEY. *Bel. Aldrov. Willugh. Raj. Klein.*
- Les Allemands, SCHECKRICHT ENDTLIN; SPRENGLICHT ENDTE. Ils appellent la femelle MITTEL ENDTE. *Schwenck. MITTEL-ENDTEN; MITTEL-ENT. Gesn.*
- Les Allemands aux environs de Strasbourg, KERNELL. *Gesn. Aldrov. Willugh. KERNEL. Schwenck.*
- Les Bas-Allemands, CRACKASONA. *Gesn. Aldrov.*
- Les Anglois qui habitent la Province d'York, appellent la femelle WIGEON. *Willugh. Raj.*

Elle est beaucoup plus petite que le Canard domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces neuf lignes. Son bec depuis son extrémité

*Anati domesticæ multum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quindecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius ex-*



tremitate ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus unum pollicem cum septem lineis; intimus sexdecim lineas; posticus autem quatuor tantummodo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & unius pollicis intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Vertex capitis & occipitium ex fusco nigricant. Infra colorem fusco-nigricantem binæ extant tæniæ candidæ, utrinque scilicet una, supra oculos ductæ, deinde infra occipitium usque protensæ, ibique coadunatæ. Caput ad latera, guttur, partemque colli capiti finitimam vestiunt pennæ fusco-rufescentes, lineolis longitudinalibus albis variæ. Quæ collum infimum & pectus obtegunt; rufescunt, lineisque fuscis eleganter variegantur. Dorsum & uropygium cooperiunt pennæ fuscæ, griseo-rufescente margi-

jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégar- nie de plumes, quatre lignes; son pied quinze lignes; ce- lui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'exté- rieur un pouce sept lignes, l'intérieur seize lignes; & celui de derriere quatre lignes seu- lement. Elle a deux pieds un pouce de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'éten- dent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête & l'occiput sont d'un brun-noi- râtre. Au-dessous de cette cou- leur sont deux bandes blanches, sçavoir une de chaque côté, qui passent par-dessus les yeux, & vont ensuite se réunir au- dessous de l'occiput. Les côtés de la tête, la gorge, & la partie du col la plus voisine de la tête sont couverts de plumes d'un brun-roussâtre, variées de peti- tes lignes longitudinales blan- ches. Celles qui couvrent le bas du col & la poitrine, sont roussâtres, & joliment variées de lignes brunes. Le dos & le croupion sont bruns, chaque plume étant bordée de gris-roussâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont pareil-



lement brunes, mais elles sont bordées de blanchâtre. Le haut du ventre est blanc. Les côtés & le haut des jambes sont de la même couleur, & rayés transversalement de noirâtre. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâtre tacheté de brun. Parmi les couvertures du dessous des ailes, les plus proches du corps sont blanches: les plus éloignées du corps sont cendrées, & bordées de blanc. Les plumes scapulaires intérieures sont noirâtres, & marquées chacune d'une bande blanche, qui s'étend tout le long de leur tige: les extérieures sont d'un joli cendré, & bordées extérieurement de blanc: quelques-unes des inférieures sont d'un cendré-brun. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont d'un joli cendré: les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré un peu plus foncé, & terminées de blanc; ce qui forme sur chaque aile une bande transversale de cette couleur: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun, & bordées extérieurement de blanc. L'aile est composée de vingt-cinq plumes: les dix premières sont d'un gris-brun qui s'éclaircit un peu sur le côté intérieur, & bordées

nataæ. Superiores caudæ tectrices similiter fusca, sed candicante fimbriata. Venter supremus albus est. Latera & crurum suprema pars pariter albicant, & nigricante transversim striantur. Venter imus & pennæ caudam subtus obtegentes candicant, & fusco maculantur. Ex inferioribus alarum tectricibus, corpori viciniore sunt candidæ: à corpore remotiores cinereæ, albo fimbriatæ. Pennæ scapulares interiores nigricantes, tæniâ candidâ, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ: exteriores eleganter cinereæ, exteriùs albo marginatæ: ex inferioribus quædam cinereo-fusca. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ eleganter cinereæ: majores corpori viciniore cinereo nonnihil saturatiore imbutæ, apicibus albis præditæ, quibus fit in utraque ala tæniâ transversa concolor: majores tandem à corpore remotiores cinereo-fusca, exteriùs albo marginatæ. Viginti quinque remigibus ala conflatur: decem primores griseo-fusco imbutæ colore, in latere interiore nonnihil dilutiore, & albo exteriùs fimbriatæ: undecima



similiter griseo-fusca, sed exterius cinereo marginata, & insuper albo terminata : novem proximè sequentes, à duodecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in latere interiore griseo-fusca, in exteriore verò ad exortum tantum concolores, deinde splendide viridi-aurea, & tandem albo obliquè terminata; unde binæ fiunt in utraque ala tæniæ transversæ, alia viridi-aurea, altera alba : vigesima prima in latere interiore griseo-fusca, in exteriore cinerea, viridi obscuro adumbrata, alboque marginata : quatuor corpori viciniore griseo-fusca, viridi obscuro pariter adumbrata, & exterius albo marginata, margine scilicet albâ eò strictiore, quò remix fit corpori viciniore. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges maximâ longitudine pollent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt quatuordecim rectrices griseo-fusca, exterius albedo marginata : tres utrinque extremæ in latere exteriori sunt insuper candicante maculatæ. Binæ intermedia lateraliū longitudinem paululum

extérieurement de blanc : l'onzième est du même gris-brun, mais elle est bordée extérieurement de cendré, & de plus terminée de blanc : les neuf suivantes, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont d'un gris-brun du côté intérieur; leur côté extérieur est de la même couleur, mais à son origine seulement, il est ensuite d'un verd-doré brillant, & terminé obliquement de blanc; ce qui forme sur chaque aîle deux bandes transversales, l'une d'un verd-doré, & l'autre blanche : la vingt-unième est d'un gris-brun du côté intérieur; son côté extérieur est d'un cendré nuancé de verd obscur, & bordé de blanc : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun nuancé pareillement de verd obscur, & bordées extérieurement de blanc, cette bordure étant d'autant plus étroite, que la plume est plus proche du corps. Ces quatre dernières plumes sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de quatorze plumes d'un gris-brun, bordées extérieurement de blancâtre. Les trois plus extérieu-



res de chaque côté sont de plus tachetées de blanchâtre sur le côté extérieur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que

brun tirant sur la couleur de plomb ; & les ongles noirâtres. La femelle (voyez Pl. XXXIX. Fig. 2) est un peu plus petite que le mâle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long ; sa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes ; son pied onze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur dix-huit lignes, l'intérieur quinze lignes ; & celui de derrière trois lignes & demie seulement. Elle a deux pieds de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Elle diffère

excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranae, ex fusco ad plumbeum colorem vergentes ; ungues verò nigricantes.

leurs membranes, sont d'un

Fœmina (vide Tab. XXXIX. Fig. 2) crassitie paululum mari cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octodecim lineas longum est ; cauda duos pollices & novem lineas ; pars crurum plumis denudata tres lineas ; pes undecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum septem lineis, extimus octodecim lineas, intimus quindecim lineas ; posticus autem tres tantum cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum ; alae verò complicatae ad tres circiter quartas longitudinis caudae



caudæ partes pertingunt. A  
mare quoque coloribus dis-  
crepat. Caput superius ex  
griseo rufescit, minutisque  
maculis transversis fuscis va-  
riegatur. Caput ad latera,  
collumque vestiunt pennæ  
rufescentes, maculâ fuscâ  
notatæ. Guttur ex albo-ru-  
fescit, & minutissimis simi-  
liter variegatur maculis fus-  
cis, sed non ita quàm reli-  
quæ conspicuis. Pennæ par-  
tem dorsi supremam & su-  
premum pectus vestientes, si-  
cut & scapulares, fuscæ sunt,  
griseo-rufescente marginatæ.  
Quæ dorsum infimum & uro-  
pygium cooperiunt, fuscæ,  
marginibus griseis præditæ.  
Superiores caudæ rectrices  
griseo-fuscæ, albido fimbria-  
tæ, quibusdam insuper eo-  
dem colore striatis. Pectus  
imū & venter albicant. La-  
tera & crurum suprema pars  
pennis vestiuntur fusco-ful-  
vis, fulvo dilutior fimbriatis  
& transversim striatis. Pennæ  
caudam subtus obtegentes  
sunt candidæ, latisque ma-  
culis transversis fuscis insigni-  
tæ. Rectrices alarum infe-  
riores minores griseæ, albo  
marginatæ : majores corpori  
viciniores candidæ, griseo  
variegatæ : majores à corpore  
remotiores cinereo-albæ. Su-

aussi du mâle par ses couleurs. Le  
dessus de la tête est d'un gris-  
roussâtre, varié de petites ta-  
ches transversales brunes. Les  
côtés de la tête & le col sont  
couverts de plumes roussâtres,  
marquées chacune d'une tache  
brune. La gorge est d'un blanc-  
roussâtre, varié aussi de très-  
petites taches brunes, mais  
moins apparentes que les au-  
tres. Les plumes qui couvrent  
la partie supérieure du dos &  
le haut de la poitrine, ainsi que  
les scapulaires, sont brunes,  
& bordées de gris-roussâtre.  
Celles qui couvrent la partie  
inférieure du dos & le crou-  
pion, sont brunes, & bordées  
de gris. Les couvertures du  
dessus de la queue sont d'un  
gris-brun, & bordées de blan-  
châtre : quelques-unes sont  
aussi rayées de cette couleur.  
Le bas de la poitrine & le ven-  
tre sont blancs. Les côtés & le  
haut des jambes sont couverts  
de plumes d'un brun-fauve,  
rayées transversalement & bor-  
dées d'un fauve plus clair. Les  
couvertures du dessous de la  
queue sont blanches, & mar-  
quées de larges taches trans-  
versales brunes. Les petites du  
dessous des ailes sont grises, &  
bordées de blanc : les grandes  
les plus proches du corps sont  
blanches, & variées de gris : &



les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-blanc. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré - brun, & bordées de gris : les moyennes sont d'un gris-brun, bordées de blanc : les grandes les plus proches du corps sont brunes, & bordées pareillement de blanc : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-brun & sans bordures. Les dix premières plumes de l'aile sont d'un gris-brun qui s'éclaircit un peu sur le côté intérieur : l'onzième est du même gris-brun, mais elle est bordée extérieurement de gris, & terminée de blanc : les neuf suivantes, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingtième inclusive-ment, sont d'un gris-brun du côté intérieur ; leur côté extérieur est de la même couleur, mais à son origine seulement, il est ensuite d'un noirâtre nuancé de verd-doré, & terminé obliquement de blanc : la vingt-unième est d'un gris-brun du côté intérieur, son côté extérieur est d'un gris-blanc, & bordé de blanc par le bout : les quatre plus proches du corps sont brunes du côté intérieur, d'un brun-noirâtre & bordées de blanc du côté extérieur ; le brun - noirâtre est

periores alarum tectrices minimæ cinereo-fusca, griseo fimbriatæ : mediæ griseo-fusca, marginibus albis præditæ : majores corpori finitimæ fusca, albo similiter marginatæ : majores tandem à corpore remotiores griseo-fusca, marginibus destitutæ. Remiges decem primores griseo-fusco imbutæ colore, in latere interiore nonnihil dilutiores : undecima similiter griseo-fusca, sed exterius griseo fimbriata, & insuper albo terminata : novem proximè sequentes, à duodecima scilicet ad vigesimam usque inclusive, in latere interiore griseo-fusca, in exteriori verò ad exortum tantum colores, deinde nigricantes, viridi-aureo adumbratæ, & tandem albo obliquè terminatæ : vigesima prima in latere interiore griseo-fusca, in exteriori cinereo-alba, albo in apice marginata : quatuor corpori viciniore sunt in latere interiore fusca, in exteriori fusco-nigricantes, alboque fimbriatæ ; color autem fusco-nigricans eò saturatior est, & margo eò latior, quò remix fit exterior. Caudæ rectrices sex intermedia fusca, exterius albido fimbriatæ : quatuor utrinque



extimæ griseo-fusca, exteriùs albido similiter marginata; tres insuper utrinque extimæ in latere exteriori nonnihil ad fulvum inclinant. Rostrum ex fusco rubescit, attamen in extremitate nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguisque fusci.

d'autant plus foncé, & la bordure est d'autant plus large, que la plume est plus extérieure. Les six plumes du milieu de la queue sont brunes, & bordées extérieurement de blanchâtre; les quatre plus extérieures de chaque côté sont d'un gris-brun, & bordées de même extérieurement de blanchâtre; de plus le côté extérieur des trois plus extérieures de chaque côté tire

un peu sur le fauve. Le bec est d'un brun-rougeâtre, excepté son extrémité, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont bruns.

Paludes, piscinasque frequentant. *Ex museo Reaumuriano.*

On les trouve dans les marais & sur les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Hujus speciei varietas est

Une variété de cette espece est

#### A. LA SARCELLE A TESTE ROUGE.

*Querquedula erythrocephalos.*

*Anas fera septima, seu maculâ in fronte candidâ insignis. Schwenck. Avi. Sil. pag. 200.*

*Les Allemands l'appellent BLAS ENDTE; PLAS ENDTE. Schwenck.*

Magnitudine cum præcedente circiter convenit. Ab illa autem differt capite ruforubescente, maculâ tamen insignito nivêâ, in fronte posita. Dorsum ipsius est fuscum. Pectus castaneo colore imbutum; & venter candidus. Rostrum obscure cœrulescens.

Elle est à peu près de la grandeur de la précédente. Elle en diffère en ce qu'elle a la tête d'un roux-rougeâtre, excepté une tache d'un blanc de neige qu'elle a sur le front. Son dos est brun. Sa poitrine est de couleur de marron; & son ventre blanc. Son bec est d'un bleuâ-



tre obscur. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, ses pieds & ses doigts, ainsi que leurs membranes, sont rougeâtres. On la trouve en *Silésie*, mais fort rarement.

Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubescens. In *Silesia* rariùs invenitur.

\*\* 32. LA PETITE SARGELLE.

*Voyez le mâle Pl. XL. Fig. 1.*

*Anas superne albido & nigricante transversim & undatim striata, infernè alba; vertice castaneo-fusco, pennis rufescente marginatis; taniâ supra oculos albo-rufescente, infra oculos candidâ; fasciâ ponè oculos viridi-aureâ; genis & collo castaneis; gutture fusco; pectore maculis nigris vario; macula alarum nigra & viridi-aurea, taniâ dilutè fulvâ superiùs donata; rectricibus fuscis, albido marginatis.*  
(*Mas.*)

*Anas superne fusca, pennis rufescente maculatis & marginatis, infernè rufescens; macula alarum nigra & viridi aurea, taniâ albâ superne & infernè donata; rectricibus griseo-fuscis, exteriùs rufescente maculatis & albido marginatis.*  
(*Fœmina*) . . . . *QUERQUEDULA MINOR.*

*Anas macula alarum viridi: linea alba supra infraque oculos.* *Faun. Succ. Linn. N°.* 109.

*Anas macula alarum viridi, linea alba supra infraque oculos.* *Crecca. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 29.*

*Anas grisea, alis tania ex cœsio & viridi cinctis.* *Barr. Ornith. Class. I. Gen. 1. sp. 12.*

*Anas Querquedula Francia.* *Klein. Avi. pag. 133. N°.* 14.

*Anas Querquedula secunda, Aldrovandi.* *Klein. Avi. pag. 136. N°.* 31.

*Anas fera decima tertia, seu minor prima.* *Schwenck. Avi. Sil. pag. 203.*

*Anas fera decima tertia Schwenckfeldii, seu minor.* *Klein. Avi. pag. 132. N°.* 8.

*Anas fera decima sexta, seu minor quarta.* *Schwenck. Avi. Sil. pag. 204. (fœmina).*

*Anas fera decima sexta, seu minor quarta, Schwenckfeldii.* *Raj. Syn. Avi. pag. 148. N°.* 9. (*fœmina*),



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXIV.* 437.

- Anas parva mustelaris. Raj. (femina).*  
*Vulpanas, Anas fera decima sexta Schwenckfeldii. Klein. Avi. pag. 132. N<sup>o</sup>. 8. (femina).*  
*Querquedula. Gefn. Avi. pag. 105, in qua hujus icon minùs accurata. Gefn. icon. Avi. pag. 77, in qua eadem icon.*  
*Querquedula secunda. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 209. hujus icon pessima pag. 550.*  
*Querquedula secunda Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 290. hujus icon pessima Tab. LXXIV, sub titulo, Querquedula. Raj. Syn. Avi. pag. 147. N<sup>o</sup>. A. 6. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 324. N<sup>o</sup>. X. Raj. Syn. Avi. pag. 192. N<sup>o</sup>. 14.*  
*Querquedula secunda Aldrovandi ; Boschis Columellæ. Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 416.*  
*Querquedula Varroni, Boschas minor Commelino ; Boschis Columellæ. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 293.*  
*Querquedula, Nonnullis Boscas minor. Charlet. Exer. pag. 106. N<sup>o</sup>. XIV. Charlet. Onomazt. pag. 100. N<sup>o</sup>. XIV.*  
*Querquedula minor. Jonst. Avi. pag. 96. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 49, sub titulo, Querquedula ; & insuper altera icon minùs accurata eâdem Tab. sub titulo, Anas marina.*  
*Querquedula major. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.*  
*Querquedula sylvestris, seu Anas sylvestris minor. Rzac. Aud. Hist. Nat. Pol. pag. 416.*  
*Phascas. Gefn. Avi. pag. 104. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 24.*  
*Phascas, seu Querquedula minor. Aldrov. Avi. Tom III. pag. 207. Phascas Eberi & Peuceri. Schwenck. Klein.*  
*Pepatzca, seu Anas splendens. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 32. cap. LXXXVIII. (an femina?)*  
*Cercelle. Alb. Tom. I. pag 86 ; avec une figure mauvaise & mal coloriée du mâle Pl. 100.*  
*Cercelle de France. Alb. Tom. II. pag. 65 ; avec une figure mal coloriée de la femelle Pl. 102.*  
*Les Grecs l'appellent Κερνίς. Ils appellent la femelle Νητίανόπνξ. Schwenck.*  
*Les Espagnols, CERCÉTA. Gefn. Aldrov.*  
*Les Italiens, GARGANEI. Gefn. SARTELLA ; & en quelques endroits, CERCEDULA. Gefn. Aldrov.*  
*Les Italiens aux environs de Ferrare, CERCEVOLO ; SCAVOLO. Gefn. Aldrov.*  
*Les Milanois, GARGANELLO. Gefn. Aldrov.*  
*Les Suisses, KLEINE ENT ; GRAW-ENTLE ; MOUR-ENTLE ; SOR-ENTLE ; SOCKE. Gefn. Aldrov.*



*Les Allemands*, TROESSEL; KRIG-ENTE; KRIEG-ENTEN; KRICH-ENTLEIN; KRUCK-ENTLE. *Gesn. Aldrov.* KRICH-ENDTE; KRIECH-ENTE. *Rzac.* KRIECH ENDLIN; KRIEG ENDLIN; GRAW ENDTLIN.

*Ils appellent la femelle* BRAUN-KOEFFFICHT ENDTE. *Schwenck.*

*Les Silésiens*, KREUCK ENDTLE. KREUCK ENDTLIN. *Ils appellent la femelle* FUCHS ENDTE. *Schwenck.*

*Les Polonois*, CYRANKA. *Rzac.*

*Les Suédois*, AERTA. *Linn.*

*Les Hollandois*, TALING. *Aldrov.*

*Les Anglois*, TEAL. *Aldrov. Willugh. Raj. Sloane. Charlet. Sibbald.*

COMMON TEAL. *Raj.* TEALE *Willugh.*

*Les Mexiquains*, PEPATZCA. *Fern.*

Elle n'est pas si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces six lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes & demie de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied un pouce; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur treize lignes & demie; & celui de derrière cinq lignes. Elle a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est d'un marron-brun, chaque plume étant bordée de rouffâtre; cette cou-

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuordecim pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & septem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes unum pollicem; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & sex lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus tredecim cum semi lineas; posticus autem quinque lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis decem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam pertingunt. Vertex capitis est



castaneo-fuscum, pennis rufescente marginatis; qui castaneo-fuscus color supra partem colli superiorem mediam versus longitudinem usque protenditur, ibique efformat taniam, quæ deinde nigro, holoserici villosi instar, splendente terminatur. In utroque capitis latere stricta extat tania albo-rufescens, ab oris angulis orta, versus syn-ciput assurgens, supra oculos ducta, & ad occipitium usque protensa. Infra quam taniam in utroque capitis latere majuscula adest macula viridi-aurea, ponè oculum posita, quæque prolongata fasciam efficit secundum colli superioris latera protensam. Infra hanc maculam insuper extat in utroque capitis latere exigua tania candida, infra oculos ducta, & versus occipitium usque protensa. Genas, collumque inferius & ad latera tingit castaneus color. Guttur fuscum est. Supremam dorsi partem vestiunt pennæ lineolis transversis & undatis, alternatim albidis & nigricantibus, striatæ. Scapulares concolores; ex illis tamen quædam sunt in latere exteriori candidæ, latâ margine nigro, holoserici villosi instar, splendente

leur s'étend sur la partie supérieure du col jusque vers la moitié de sa longueur, & y forme une bande qui est ensuite continuée par un noir de velours. De chaque côté de la tête est une étroite bande d'un blanc-roussâtre, qui part des coins de la bouche, remonte vers le syn-ciput, passe par dessus les yeux, & s'étend jusqu'à l'occiput. Audessous de cette bande est de chaque côté de la tête une grande tache de verd-doré, placée derrière l'œil, & qui, en se prolongeant, forme une bande qui s'étend tout le long des côtés du dessus du col. Audessous de cette tache est encore de chaque côté de la tête une petite bande blanche, qui passe par-dessous les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. Les joues, la partie inférieure & les côtés du col sont de couleur de marron. La gorge est brune. La partie supérieure du dos est couverte de plumes rayées de petites lignes transversales & en zigzags, alternativement blanchâtres & noirâtres. Les scapulaires sont de la même couleur; quelques-unes ont cependant le côté extérieur blanc, & marqué d'une large bordure de noir de velours. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un



brun varié de quelques petites rayes transversales & en zigzags blanchâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un noirâtre changeant en verd-doré, & bordées de roussâtre clair. Le bas de la partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont couverts de plumes blanches à leur origine, roussâtres vers leur extrémité, ces deux couleurs étant séparées par une tache noire ; de sorte que, toutes les plumes étant couchées les unes sur les autres, ces parties paroissent d'un roussâtre varié de taches noires. Le bas de la poitrine & le ventre sont blancs. Les côtés sont rayés transversalement & en zigzags de blanchâtre & de noirâtre. Le haut des jambes est rayé transversalement de gris & de blanchâtre. Parmi les couvertures du dessous de la queue, celles du milieu sont d'un noir de velours : les latérales sont d'un blanc-fauve. Les plus petites du dessous des ailes sont grises, & bordées de blanc : les moyennes sont blanches : & les grandes sont d'un gris-blanc. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus éloignées du corps, sont d'un cendré-brun : les grandes les plus proches du corps sont de la

imbutâ notatæ. Dorsum infimum & uropygium fusca sunt, minutis quibusdam tæniis transversis & undatis candicantibus varia. Superiores caudæ tectrices nigricantes, viridi-aureo colore variantes, diluto rufescente marginatæ. Colli inferioris partem infimam & pectus supremum cooperiunt pennæ in exortu candidæ, versùs extremitatem rufescentes, quos colores binos macula nigra distinguit ; ita ut, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, partes istæ videantur rufescentes, maculis nigris variegatæ. Imum pectus & venter albeant. Latera sunt albido & nigricante transversim & undatim striata. Crurum suprema pars griseo & candicante transversim quoque striatur. Ex inferioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum occupant, sunt nigræ, holoserici villosi instar, splendentes : laterales albo-fulvescentes. Tectrices alarum inferiores minimæ griseæ, albo fimbritæ : mediæ candidæ : majores cinereo-albæ. Superiores minimæ & mediæ, sicut & majores à corpore remotiores, cinereo-fusæ : majores corpori finitimæ concolores, sed albido insuper marginatæ : majores



jores tandem medium locum obtinentes, cinereo-fusca, fulvo diluto terminata; unde fit in utraque ala exigua tania transversa concolor. Alam componunt viginti quatuor remiges, quarum decem primores cinereo-fusco imbuta colore, in latere interiore nonnihil dilutior; binæ insuper priores sunt subtus candicantes, sed exterius tantum: undecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, in latere interiore cinereo-fusca; in latere autem exteriori ex istis quatuor, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, nigricant, alboque in extremitate marginantur; quatuor proximè sequentes, à decima quinta scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, sunt viridi-aureæ, per totam longitudinem nigro, holoserici villosi instar, splendente fimbriatæ, & albo in apice marginatæ; viridi-aureus color eò majus spatium occupat, quò remix fit corpori vicinior; ita ut in decima octava remige margo nigra sit strictissima, & decima quinta sit tantum prope scapum viridi-aurea; decima nona & vigesima sunt viridi-

*Tom. VI.*

même couleur, mais elles sont de plus bordées de blanchâtre: enfin les grandes qui occupent le milieu, sont d'un cendré-brun, & terminées de fauve clair; ce qui forme sur chaque aîle une petite bande transversale de cette couleur. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes: les dix premières sont d'un cendré-brun qui s'éclaircit un peu sur le côté intérieur; de plus les deux premières sont blanchâtres en-dessous du côté extérieur seulement: les onze suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont d'un cendré-brun du côté intérieur; mais du côté extérieur quatre de celles-là, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout; les quatre suivantes, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, sont d'un verd-doré, bordées de noir de velours dans toute leur longueur, & de blanc par le bout; le verd-doré occupe d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps; de sorte que la bordure noire de la dix-huitième est fort étroite, & la quinzième n'a de verd-doré qu'auprès de sa tige; la dix-neuvième & la vingtième

K k k



sont d'un verd-doré, & bordées de blanc par le bout; enfin la vingt-unième est d'un gris-blanc tout le long de sa tige, ensuite d'un noir de velours, & bordée de blanc-rouffâtre : les quatre plus proches du corps sont d'un cendré-brun, & variées de blanchâtre sur leur bord extérieur; de plus le côté extérieur de la vingt-deuxième est marqué d'une large bande longitudinale noirâtre, placée auprès du bord de la plume. Ces quatre dernières plumes sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de seize plumes brunes, bordées de blanchâtre : le brun est d'autant plus clair, que la plume est plus extérieure : de plus les trois plus extérieures de chaque côté sont marquées du côté extérieur d'une tache de brun foncé, placée vers leur extrémité. Toutes les plumes de la queue se terminent en pointe. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte; ce qui rend le bout de la queue pointu. L'iris des yeux

aureæ, albo in apice fimbriatæ; vigesima prima tandem secundum scapi longitudinem cinereo-alba, dein nigra, holoserici villosi instar splendens, & albo-rufescente marginata: quatuor corpori viciniore cinereo-fuscæ, ad marginem exteriorem candicante variæ; vigesima secundæ latus exterius latâ insuper notatur tæniâ longitudinali nigricante, prope remigis marginem positâ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges maximâ longitudine pollent, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Cauda sexdecim constat rectricibus fuscis, albido marginatis: qui color fuscus eò dilutior est, quò rectrix exterior fit: tres insuper utrinque extimæ maculâ saturatè fuscâ, versùs ipsarum extremitatem collocatâ, in latere exteriori notantur. Omnes caudæ rectrices in acumen desinunt. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē: unde fit cauda in extremitate acuta. Oculorum irides avellaneæ.



Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, griseo-cinerei; ungues vero grisei.

*Fœmina* crassitie paululum *mari* cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes unum pollicem; trium digitorum anticorum medius cum ungue sesquipollicem, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus tredecim cum femi lineas; posticus autem quinque lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis novem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam pertingunt. Coloribus quoque à *mare* discrepat. Partes capitis & colli superiores vestiunt pennæ fuscæ, rufescente marginatæ. Quæ dorsum & uropygium obte-

est de couleur de noisette. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un gris-cendré; & les ongles gris.

La *femelle* est un peu plus petite que le *mâle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied un pouce; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur treize lignes & demie; & celui de derrière cinq lignes. Elle a un pied neuf pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Elle diffère aussi du *mâle* par ses couleurs. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes brunes, bordées de roussâtre. Celles qui couvrent le dos & le croupion, ainsi que les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue,



sont de la même couleur, mais elles sont de plus marquées de taches transversales roussâtres. La gorge & la partie inférieure du col sont roussâtres, & tachetées de brun. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un roussâtre, qui devient de plus en plus clair, en approchant de l'anus. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale varié de taches longitudinales brunes. Celles du dessous des aîles sont variées de brun & de blanc sale. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus éloignées du corps, sont d'un gris-brun : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur, & terminées de blanc. Les plumes de l'aîle sont colorées comme celles de l'aîle du *mâle*, avec cette différence cependant qu'il n'y en a que trois, sçavoir depuis la dix-huitième jusqu'à la vingtième inclusivement, qui soient d'un verd-doré du côté extérieur ; toutes les autres sont noires à la place de cette couleur, & ensuite terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aîle une petite bande transversale de cette couleur. Les plumes de la queue sont d'un gris-brun, bordées extérieurement de

gunt, sicut & scapulares ; superioresque caudæ rectrices concolores, sed maculis transversis rufescentibus insuper notatæ. Guttur & pars colli inferior rufescunt, & fusco maculantur. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera rufescente imbuuntur colore, sensim atque sensim, versùs anum procedendo, dilutiore. Inferiores caudæ rectrices sunt sordide albæ, maculis longitudinalibus fuscis variæ. Pennæ alas subtus cooperientes fusco & sordide albo variegatæ. Rectrices alarum superiores minores, sicut & majores à corpore remotiores, griseo-fuscæ : majores corpori finitimæ eodem colore tinctæ, apicibus albis præditæ. Alarum remiges remigibus *maris* concolores, ab illis tamen discrepantes in eo quod tres tantum, à decima octava scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sint in latere exteriore viridi-aureæ ; reliquæ omnes sunt eo in loco nigre, & deinde albo terminatæ ; unde fit in utraque ala exigua tænia transversa concolor. Caudæ rectrices sunt griseo-fuscæ, exteriùs albido marginatæ, & in latere quoque exteriore maculis obliti-



quis rufescentibus variegatæ : binæ rectrices intermediæ iisdem maculis interiùs similiter variegantur. Mandibula superior obscurè olivacea , minutissimis maculis nigris aspersa ; inferior penitus nigra. Pars crurum plumis denudata , pedes & digiti , sicut & ipsorum membranæ , griseo-fusci ; ungues verò fusci.

blanchâtre , & variées du même côté de taches obliques rousâtres : le côté intérieur des deux du milieu est aussi varié des mêmes taches. Le demi-bec supérieur est d'un olivâtre obscur , parsemé de très-petites taches noires ; l'inférieur est entièrement noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les doigts , ainsi que leurs membranes , sont d'un gris-brun ; & les ongles bruns.

Paludes & stagna frequent. *Ex museo Realmuriano.*

On les trouve dans les marais & sur les étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

### 33. LA SARCELLE D'ÉTÉ.

*Anas superne cinereo-fusca , marginibus pennarum candicantibus , infernè albo-rufescens , in imo ventre griseo maculata ; tæniâ supra oculos candidâ ; genis & gutture castaneis ; collo inferiore & pectore rufescentibus , pennis fusco marginatis ; macula alarum nigra & viridi-aurea , tæniâ albâ superne & infernè donata ; rectricibus cinereo-fuscis. ( Mas ).*

*Anas superne cinereo-fusca , marginibus pennarum rufescentibus , infernè albo-rufescens , in imo ventre griseo maculata ; tæniâ suprâ oculos candidâ ; genis & gutture albido variegatis ; macula alarum viridi-aurea , tæniâ albâ infernè donata ; rectricibus cinereo-fuscis. ( Fœmina ) . . . . .*  
**QUERQUEDULA ÆSTIVA.**

*Anas testaceo nebulosa , superciliis albidis , rostro pedibusque cinereis. Faun. Suec. Linn. N°. III.*

*Anas macula alarum varia , linea alba supra oculos , rostro pedibusque cinereis. Circia. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 32.*



Anas Circia. *Gesn. Avi. pag. 106.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 209.*

*Jonst. Avi. pag. 97.*

*Charlet. Exer. pag. 107. N<sup>o</sup>. 1.*

*Charlet. Onomazt. pag. 101. N<sup>o</sup>. 1.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 21.*

Anas Circia seu Querquedula fusca. *Gesn. icon. Avi. pag. 77.*

Anas Circia Gesneri. *Willugh. Ornith. pag. 291. hujus icon pessima Tab. LXXVI.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 148. N<sup>o</sup>. 7.*

Anas fera decima quarta, seu minor secunda. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 204.*

*Querquedula fusca. Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 416.*

*Circia. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 25.*

*Circia Gesneri. Klein. Avi. pag. 132. N<sup>o</sup>. 8.*

*Cercelle d'été. Alb. Tom. II. pag. 66; avec des figures mal coloriées du mâle Pl. 103, & de la femelle Pl. 104*

*Les Allemands l'appellent BIRCKILGEN. Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh. GRAW ENDTLIN. Schwenck.*

*Les Ecoffois, ATEAL. Sibbald.*

*Les Anglois, SUMMER-TEAL. Willugh. Raj. Sibbald.*

Elle est encore un peu moins grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ treize pouces six lignes. Elle a environ un pied neuf pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête, le dessus du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes d'un cendré-brun, celles du dos étant bordées de blanchâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont aussi d'un cendré-brun. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part

Præcedenti paululùm adhuc crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & sex circiter lineas æquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis novem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad extremam ferè caudam pertingunt. Partem capitis superiorem, collum superius, dorsum & uropygium obtegunt pennæ cinereo-fuscæ, pennis dorsum vestientibus candicante marginatis. Superiores caudæ tectrices tingit quoque cinereo-fuscus



color. In utroque capitis latere tania extat candida, prope rostri exortum orta, supra oculos ducta, & versus occipitium usque protensa. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, gutturque eleganti castaneo tinguntur. Pars colli inferior & pectus pennis vestiuntur rufescentibus, fusco marginatis. Venter, latera, crurum suprema pars & inferiores caudæ teñtrices ex albo rufescunt; imus autem venter griseo maculatur. Ex scapularibus pennis, minores sunt pennis dorsum obtegentibus concolores: majores in medio albæ ad margines fuscæ. Teñtrices alarum superiores minimæ & mediæ, sicut & majores corpori viciniore, cineræ: majores novissimas istas proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum tenent, cinereo quoque imbutæ, sed albo terminatæ; unde fit in utraque ala exigua tania transversa concolor: majores tandem à corpore remotiores fuscæ, exteriùs albo fimbriatæ. Alam componunt viginti quinque remiges: decem primores sunt saturatè fuscæ, exteriùs albo marginatæ: proximè sequentes in latere inte-

d'auprès de l'origine du bec, passe par-dessus les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. Les côtés de la tête, au-dessous des yeux, ou les joues, & la gorge sont d'un beau marron. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes roussâtres, bordées de brun. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc-roussâtre; & le bas-ventre est tacheté de gris. Parmi les plumes scapulaires, les petites sont de la même couleur que les plumes du dos: les grandes sont blanches dans leur milieu, & brunes sur leurs bords. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont cendrées: les grandes qui suivent ces dernières, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur, & terminées de blanc; ce qui forme sur chaque aîle une petite bande transversale de cette couleur: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées extérieurement de blanc. L'aîle est composée de vingt-cinq plumes: les dix premières sont d'un brun foncé, & bordées extérieurement de blanc: les suivantes sont brunes du



côté intérieur ; mais du côté extérieur elles sont d'un verd-doré brillant , bordé de noir de velours , & terminées de blanc ; ce qui forme encore sur chaque aîle une petite bande transversale blanche : enfin les plus proches du corps sont d'un cendré-brun , bordées extérieurement de blanc. Ces dernières plumes sont fort longues , se terminent en pointe , & s'étendent , lorsque l'aîle est pliée , presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de plumes d'un cendré-brun , toutes se terminant en pointe. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les doigts sont d'un cendré-bleuâtre ; leurs membranes sont d'une couleur plus foncée ; & les ongles noirs.

La *femelle* est un peu plus petite que le *mâle*. Elle en diffère encore par ses couleurs. La partie supérieure de la tête , le dessus du col , le dos & le croupion sont couverts de plumes

riore fusca , in exteriori verò splendide viridi-aurea , nigro , holoserici villosi instar ; splendente marginata , & apicibus albis prædita ; unde rursus fit in utraque ala exigua tænia transversa alba ; corpori tandem viciniore cinereo-fusca , exterius albo fimbriata. Quæ novissimè dictæ remiges maximam obtinent longitudinem , in acumen desinunt , & dum ala complicatur , majorum remigum extremitates ferè pertinent. Caudam componunt rectrices cinereo-fusca , omnes in acumen desinentes. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē ; unde fit cauda in extremitate acuta. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata , pedes & digiti cinereo-coerulescentes ; ipsorum membranæ colore saturatiore tinctæ ; ungues verò nigri.

*Fœmina* magnitudine paululum *mari* cedit. Ab illo quoque coloribus discrepat. Caput superius , partem colli superiorem , dorsum & uropygium vestiunt pennæ cinereo-



*cinereo - fusca*, pennis dorsum cooperientibus rufescente marginatis. Superiores caudæ rectrices sunt quoque *cinereo - fusca*. In utroque capitis latere tania extat, sicut & in *mare*, candida. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ rectrices ex albo rufescunt; genæ tamen & guttur albido variegantur; & venter imus est griseo maculatus. Pennæ scapulares, superioresque alarum rectrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori viciniore, sunt *cinereo - fusca*, rufescente fimbriatæ : majores à corpore remotiores *fusca*, exterius albo marginatæ. Alarum remiges remigibus *maris* concolores : intermediarum tamen remigum latus exterius nequaquam nigro marginatur. Caudæ rectrices sunt *cinereo - fusca*. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque iisdem coloribus ac in *mare* imbuuntur.

d'un cendré-brun, celles du dos étant bordées de rouffâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont aussi d'un cendré-brun. De chaque côté de la tête est une bande blanche pareille à celle du *mâle*. Les côtés de la tête, au-dessous des yeux, ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc-rouffâtre ; mais les joues & la gorge sont variées de blanchâtre ; & le bas-ventre est tacheté de gris. Les plumes scapulaires, les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un cendré-brun, & bordées de rouffâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées extérieurement de blanc. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que celles du *mâle*, excepté que le côté extérieur des intermédiaires n'est pas bordé de noir. Les plumes de la queue sont d'un cendré-brun. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont colorés comme dans le *mâle*.



On les trouve dans les marais Paludes, piscinasque frequ-  
& sur les étangs. quantant.

## 34. LA SARCELLE DE LA CHINE.

*Anas cristata*, superne obscurè fusca, cœruleo & viridi colore varians, infernè alba; vertice & crista viridibus, crista taniâ purpureâ utrinque notata; genis candidis; collo supremo rubro-aurantio; pectore vinaceo; lateribus albo & nigro transversim striatis; macula alarum cœruleo-virescente, taniâ albâ inferiùs donata; remigibus binis interiùs spadiceis, versùs apicem nigro fimbriatis, sursum reflexis; rectricibus fuscis, cœruleo colore variantibus . . .  
**QUERQUEDULA SINENSIS.**

*Anas crista dependente*, dorsoque postico utrinque penna recurvata compressa elevata. *Anas galericulata*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 36.*

*Anas Sinensis*. Klein. *Avi. pag. 136. N°. 34.*

*An Querquedula Indica?* Aldrov. *Avi. Tom. III. pag. 209. hujus icon pessima pag. 551.*

Cercelle de la Chine. Edwards. *Tom. II. pag. CII; avec une figure exacte Pl. 102.*

Elle est un peu plus grosse que notre *Sarcelle*. Tout le dessus de la tête est couvert de plumes vertes, fort longues, & qui forment une belle hupe: de chaque côté derrière les yeux part cependant un petit paquet de plumes pourpres, qui font partie de la hupe, & forment sur elle une bande de cette couleur. Les joues sont blanches. La gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont couvertes de plumes longues & pointues, d'un rouge-orangé. Le bas de la par-

*Querquedulam nostratem paululum crassitie superat. Totum caput superius vestiunt pennæ virides, longissimæ, elegantemque cristam efficientes: utrinque tamen ponè oculos fasciculus oritur pennarum purpurearum; cristam partim constituentium, & supra eam taniam concolorem efformantium. Genæ sunt candidæ. Guttur & partem colli capiti finitimam cooperiunt pennæ longæ, in acumen desinentes, rubro-aurantiæ. Colli superioris*



pars infima, dorsum, uropygium, superioresque caudæ teatrices sunt obscure fuscæ, cœruleo & viridi colore variantes. Colli inferioris partem infimam & pectus tingit color vinaceus. Utrinque supra alarum exortum binæ extant taniæ transversæ candidæ & binæ aliæ nigræ, alternatim positæ. Venter albicat. Crurum suprema pars & inferiores caudæ teatrices sunt pariter albæ. Latera obtegunt pennæ dilutè cinereo-cœruleæ, taniis transversis, alternatim albis & nigris, terminatæ. Pennæ scapulares sunt fuscæ, exteriùs albo fimbriatæ. Superiores alarum teatrices dorso concolores. Remiges majores nigricantes, exteriùs versùs extremitatem albo marginatæ : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum obtinent, in latere interiore fuscæ, in exteriore verò splendidissime cœruleo-virescentes, & apicibus albis præditæ ; unde fit in utraque ala exigua tania transversa concolor : corpori tandem viciniore fuscæ, exteriùs albo fimbriatæ : attamen prope novissimas istas in utraque ala una remix extat in latere exteriore eleganter cœrulea, in interiore

tie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun sombre, changeant en bleu & en verd. Le bas de la partie inférieure du col & la poitrine sont d'une couleur vineuse. De chaque côté au-dessus de l'origine des aîles sont deux bandes transversales blanches & deux autres noires, placées alternativement. Le ventre est blanc. Le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur. Les côtés sont couverts de plumes d'un cendré - bleu clair, terminées de bandes transversales, alternativement noires & blanches. Les plumes scapulaires sont brunes, & bordées extérieurement de blanc. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que le dos. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres, & bordées extérieurement de blanc vers le bout : les suivantes, savoir celles qui occupent le milieu, sont brunes du côté intérieur ; mais du côté extérieur elles sont d'un bleu-verd fort brillant, & terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aîle une petite bande transversale de cette couleur : enfin les plus proches du corps sont brunes, & bordées extérieurement de



blanc ; auprès de ces dernières il y en a cependant une à chaque aîle qui est d'un beau bleu du côté extérieur ; mais du côté intérieur elle est d'un rouge-bai vif , & bordée de noir vers le bout ; ces deux plumes ont leurs barbes intérieures recourbées en en - haut , & lorsque les aîles sont pliées , elles s'élevent au - dessus du dos. La queue est composée de plumes d'un brun changeant en bleu. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un rougeâtre obscur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les doigts sont orangés ; leurs membranes sont d'une couleur plus sombre ; & les ongles noirs. On la trouve à la *Chine*.

verò latere vividè spadicea ; & versùs apicem nigro fimbriata ; duarum autem istarum remigum pinnulæ interiores sursum reflectuntur , & alis complicatis , supra dorsum eriguntur. Cauda conflatur rectricibus fuscis , cœruleo colore variantibus. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum obscurè rubescens. Pars crurum plumis denudata , pedes & digiti aurantii ; ipsorum membranæ colore obscuriore imbutæ ; ungues verò nigri. Habitat in *Sinenſi* regno.

### 35. LA SARCELLE D'AMÉRIQUE.

*Anas superne fusca , griseo transversim & undatim striata ; infernè rufescens , fusco maculata ; capite & collo supremo violaceis , viridi colore variantibus ; pennis basim rostri ambientibus & vertice nigris ; tanià utrinque transversâ rostrum inter & oculum candidâ ; rectricibus alarum superioribus cœruleis ; macula alarum viridi , tanià albâ superius donata ; rectricibus fuscis. ( Mas ).*



Anas in toto corpore fusca. (*Fœmina*) . . . . QUERQUEDULA AMERICANA.

Anas subfusca minor, remigibus extimis cœruleis, mediis albis, maximis subvirescentibus, fascia alba in fronte. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 481.*

Anas Querquedula Americana variegata. *Klein. Avi. pag. 134. N<sup>o</sup>. 24.*

An Anas Americana cinerea, extremis alis viridibus? *Barr. Ornith. Class. I. Gen. I. sp. 13.*

An Querquedula minor varia? *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 146.*

Sarcelle d'Amérique. *Catesb. Tom. I. pag. 100; avec une figure exacte Pl. 100.*

Les François de la Guiane l'appellent PETITE SARCELLE. *Barr.*

Les Anglois, WHITE-FACE TEAL. *Catesb.*

Les Anglois de la Jamaïque, TEAL. *Browne.*

Les Indiens de la Guiane, SOUKOUROUROU. *Barr.*

*Craffitie Querquedulam nostratam nonnihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & tres circiter lineas æquat; & ad extremos ungues quindecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda duos pollices & sex circiter lineas; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes septemdecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus quatuordecim lineas; posticus autem quatuor cum semi li-*

Elle est un peu plus grosse que la nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces six lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue environ deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied dix-sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derrière quatre lignes & demie seulement. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de



la queue. Le sommet de la tête est noir. Les plumes qui entourent la base du bec, sont de la même couleur. Entre ces plumes & les yeux est de chaque côté de la tête une bande transversale blanche. Tout le reste de la tête & la partie du col qui en est la plus voisine, sont d'un violet changeant en verd brillant. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un brun rayé de petites lignes grises transversales & en zigzags. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes longues & pointues, d'un brun clair. Les couvertures du dessus de la queue sont brunes. Le bas de la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un roussâtre tacheté de brun. Les couvertures du dessous de la queue sont noires. Les petites & les moyennes du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un bleu brillant : les grandes qui suivent ces dernières, savoir celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur, & terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aile une petite bande transversale blanche : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont

neas tantum. Alæ complatæ caudam ferè extremam pertingunt. Capitis verticem tingit color niger. Pennæ basim rostri ambientes eodem imbuuntur colore. Pennas istas inter & oculos in utroque capitis latere tænia extat transversa candida. Reliquum caput & pars colli ipsi finitima tinguntur violaceo, viridi splendido colore variante. Dorsû suprema pars & scapulares pennæ fuscæ sunt, lineolis transversis & undatis griseis striatæ. Dorsum infimum & uropygium obtegunt pennæ longiores, in acumen desinentes, & dilutè fuscæ. Superiores caudæ teatrices tingit color fuscus. Colli inferioris pars infima, pectus, venter, crurum suprema pars & latera rufescunt, & fusco maculantur. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt nigrae. Superiores alarum teatrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, splendide coeruleæ : majores novissimas istas proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum occupant, concolores, sed apicibus albis præditæ ; unde fit in utraque ala exigua tænia transversa alba : majores tan-



dem à corpore remotiores fusca. Ala notha similiter fusca. Remiges majores saturatè fusca : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum obtinent, in latere exteriori virides, in interiore fusca : corpori viciniore fusco quoque imbutæ. Cauda rectricibus conflatur pariter fuscis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, lutei ; ungues verò nigricantes.

*Fœmina* à *mare* discrepat colore in universo corpore fusco.

Habitant in *Americæ* septentrionali regione. Piscinas & flumina frequentant.

brunes. L'aîle bâtarde est de la même couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun foncé : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont vertes du côté extérieur, & brunes du côté intérieur : les plus proches du corps sont de cette dernière couleur. La queue est composée de plumes brunes. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont jaunes ; & les ongles noirâtres.

La femelle diffère du mâle par sa couleur, qui est brune par tout le corps.

On les trouve dans la partie septentrionale de l'*Amérique*. Elles fréquentent les étangs & les rivières.

### 36. LA SARCELLE DE VIRGINIE.

*Anas* superne griseo-fusca, infernè grisea ; rectricibus alarum superioribus cœruleis ; macula alarum viridi, taniâ albâ superiùs donata ; rectricibus fuscis. (*Mas*).

*Anas* in toto corpore fusca. (*Fœmina*) . . . . *QUERQUEDULA VIRGINIANA*.

*Anas* Quacula. *Klein. Avi. pag. 134. N°. 23.*



Sarcelle brune de l'Amérique. *Catesb. Tom. 1. pag. 99 ; avec une figure exacte Pl. 99.*

Les Anglois l'appellent BLUE-WING TEAL. *Catesb.*

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse, que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue & celui des ongles est d'environ treize pouces six lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long ; sa queue environ deux pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes ; son pied treize lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur quatorze lignes ; & celui de derrière cinq lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont gris. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Iplius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem & extremos ungues tredecim pollices & sex circiter lineas explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est ; cauda duos pollices & sex circiter lineas, pars crurum plumis denudata sex lineas ; pes tredecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus quatuordecim lineas ; posticus autem quinque lineas. Alæ complicatæ caudam extremam non attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt griseo-fuscæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, crurum partem supremam, pennas caudam subtus cooperientes & latera tingit color griseus. Superiores alarum rectrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori viciniore, sunt splendide cœruleæ : majores



jores novissimas istas proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum occupant, concolores, sed albo terminatæ; unde fit in utraque ala exigua tænia transversa alba : majores tandem à corpore remotiores fuscæ. Ala notha similiter fusca. Remiges alarum majores sunt saturatè fuscæ : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum tenent, in latere exteriori virides, in interiori fuscæ : corpori viciniore fusco colore pariter imbutæ. Rectricibus fuscis cauda constat. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque fusci.

*Fœmina à mâle differt colore in universo corpore fusco.*

*Æstate habitant in Virginia & Carolina. Paludes frequentant.*

*Tom. VI.*

corps, sont d'un bleu brillant : les grandes qui suivent ces dernières, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur, & terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aîle une petite bande transversale blanche : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont brunes. L'aîle bâtarde est de la même couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun foncé : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont vertes du côté extérieur, & brunes du côté intérieur ; les plus proches du corps sont de cette dernière couleur. La queue est composée de plumes brunes. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont bruns.

*La femelle diffère du mâle par sa couleur, qui est brune par tout le corps.*

*On les trouve pendant l'été en Virginie & à la Caroline. Elles se tiennent dans les marais.*

M m m



## 37. LA SARCELLE DU MEXIQUE.

*Anas alba*, nigro punctulata; capite fulvo, nigricante & viridi-cœruleo variegato; maculâ rostrum inter & oculos candidâ; rectricibus alarum superioribus & caudæ inferioribus cœruleis; macula alarum viridi, taniâ superne albâ internè fulvâ donata; rectricibus nigricantibus, exterius albicante marginatis. (*Mas*).

*Anas superne nigra*, marginibus pennarum fulvescentibus & candidis, internè alba, nigro mixta; maculâ alarum viridi; rectricibus nigricantibus, exterius albicante marginatis. (*Fœmina*) . . . . *QUERQUEDULA MEXICANA*.

Toltecoloctli, seu Metzcanauhtli I; *Avis lunaris*. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 36. cap. CV. (Mas)*.

Toltecoloctli seu Metzcanahachtli, id est, *Avis lunaris*. *Raj. Syn. Avi. pag. 175. (Mas)*.

Toltecoloctli, seu *Avis Stertrix Junceti*. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 36. cap. CVI. (fœmina)*.

*Les Mexiquains l'appellent* TOLTECOLOCTLI; METZCANAUHTLI. *Fern.*

Elle est à peu près de la grandeur de la nôtre. La tête est d'un fauve varié de noirâtre & de verd-bleu très-brillant : de chaque côté de la tête est cependant une tache blanche, placée entre le bec & l'œil, assez large dans sa partie supérieure, & finissant en pointe dans sa partie inférieure. La gorge, le col & tout le corps sont d'un blanc tout parsemé de points noirs, qui sont en plus grand nombre sur la poitrine que partout ailleurs. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la

*Cum Querquedula nostrate* magnitudine circiter convenit. Caput fulvum est, nigricante & viridi - cœruleo splendidissimo variegatum : in utroque capitis latere macula tamen extat candida, rostrum inter & oculum posita, in parte suprema latiuscula, in infima verò in acumen desinens. Guttur, collum, universumque corpus alba sunt, punctulis aspersa nigris, frequentioribus in pectore quàm in reliquis prædictis partibus. Pennæ scapulares, superio-



resque caudæ testrices concolores. Pennæ caudam subtus obtegentes cœruleæ. Testrices alarum inferiores albæ, fusco variegatæ. Superiores minimæ & mediæ, sicut & majores corpori viciniores, cœruleæ : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum obtinent, eodem imbutæ colore, sed apicibus albis præditæ ; unde fit in utraque ala tænia transversa alba : majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges alarum majores nigrae : quæ proximè sequuntur, illæ scilicet quæ medium locum occupant, sunt in latere interiore concolores, in exteriori verò latere virides, apicibus fulvis donatæ ; unde fit in utraque ala altera tænia transversa fulva : corpori tandem viciniores candidæ, punctulis nigris aspersæ. Caudam componunt testrices nigricantes, exterius albicante marginatæ. Oculi mediocris magnitudinis & nigri. Mandibula superior cœrulea ; inferior nigra. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, sunt pallide rubri.

même couleur. Celles du dessous de la queue sont bleues. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & variées de brun. Les petites & les moyennes du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont bleues : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur, & terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale blanche : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont de la même couleur du côté intérieur, mais du côté extérieur elles sont vertes, & terminées de fauve ; ce qui forme sur chaque aîle une autre bande transversale fauve : enfin les plus proches du corps sont blanches, & parsemées de points noirs. La queue est composée de plumes noirâtres, bordées extérieurement de blanc. Les yeux sont d'une grandeur médiocre, & noirs. Le demi-bec supérieur est bleu ; l'inférieur est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un rouge pâle.



La *femelle* diffère du *mâle* par ses couleurs. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noires, bordées tantôt de fauve & tantôt de blanc. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc mêlé de noir. Les grandes plumes de l'aile sont noires, & bordées extérieurement de blanc : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont d'un verd-brillant du côté extérieur, & noires du côté intérieur : enfin les plus proches du corps sont noires, & bordées extérieurement de blanc. Les plumes de la queue sont de la même couleur que celles du *mâle*. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont cendrés.

On les trouve au *Mexique*, où elles se tiennent sur les lacs.

*Fœmina* coloribus à *marē* discrepat. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigræ, modò fulvescente, modò candido marginatæ. Pennæ scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant, & aliquid nigri admixtum habent. Remiges alarum majores sunt nigræ, exteriùs albo fimbriatæ : proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum obtinent, in latere exteriori splendide virides, in interiori nigræ : corpori tandem viciniore nigro colore imbutæ, exteriùs albo marginatæ. Caudæ rectrices rectricibus maris concolores. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, cinerei.

Habitant in *Mexico*, ibique lacus frequentant.



\*\* 38. LA SARCELLE DE LA LOUISIANE.

*Voyez Pl. XLI. Fig. 1.*

*Anas alba*; capite & collo supremo viridi-aureis, violaceo colore in summo capite, genis & gutture variantibus; occipite candido; dorso splendide nigro; uropygio cinereo-albo; rectricibus cinereis, tribus utrinque extimis exterius albo marginatis . . . . *QUERQUEDULA LUDOVICIANA.*

*Anas Alba*, dorso remigibusque nigris, capite cœrulescente, occipite albo. *Albeola. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 15.*

*Anas parva ex nigro & albo variegata. Klein. Avi. pag. 136. N°. 23.*

Petit Canard noir & blanc, *Edwards. Tom. 11. pag. C; avec une figure exacte Pl. 100.*

*Crassitie Querquedulam nostratam* non multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues quindecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata tres cum semi lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices cum linea unica, extimus viginti quinque cum semi lineas, intimus unum pollicem cum octo lineis; posticus autem septem

Elle n'est guères plus grosse que notre *Sarcelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces neuf lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, trois lignes & demie; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces une ligne, l'extérieur vingt-cinq lignes & demie, l'intérieur un pouce huit lignes; & celui de derrière sept lignes. Elle a un pied neuf pouces de vol; & ses aî-



les, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont d'un verd-doré très-brillant, cette couleur changeant en un violet éclatant sur le sommet de la tête, sur les joues & la gorge : cependant l'espace contenu entre les deux yeux, en partant de l'angle de chaque œil, & passant par l'occiput, est blanc. Le reste du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous des ailes sont cendrées, & variées d'un peu de blanc. Le dos est d'un noir de velours. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-blanc. Parmi les plumes scapulaires, les extérieures sont blanches ; ce qui forme de chaque côté du dos une bande longitudinale de cette couleur : toutes les autres sont du même noir que celui du dos. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont noirâtres, & bordées de blanc : les moyennes, ainsi que les grandes intermédiaires, sont entièrement blanches : les grandes les plus éloignées, ainsi que les plus proches

lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & novem pollicum ; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput ; guttur & pars colli capiti finitima splendidissimo tinguntur viridi-aureo, qui color in summo capite, genis & gutture violaceo splendido colore variat : spatium tamen inter utrumque oculum contentum, scilicet ab unius oculi cantho ad alterius oculi canthum, per occipitium procedendo, est candidum. Reliquum collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albescent. Pennæ alas subtus obtegentes sunt cineræ, paucis candido variegatæ. Dorsum nigro, holoserici villosi instar, splendente imbuitur. Uropygium & superiores caudæ tectrices sunt cinereo-albæ. Ex scapularibus pennis, exteriores candidæ ; unde fit utrinque in dorso tæxia longitudinalis concolor : reliquæ omnes eodem imbutæ nigro ac dorsum ipsum tingitur. Superiores alarum tectrices minimæ nigricantes, albo fimbriatæ : me-



diæ, sicut & majores inter-  
mediæ, penitus candidæ :  
majores à corpore remotio-  
res, sicut & corpori finiti-  
mæ, nigricantes. Alam com-  
ponunt viginti quinque re-  
miges, quarum decem pri-  
mores nigricant : tres prox-  
imè sequentes, ab undecima  
scilicet ad decimam tertiam  
usque inclusivè, sunt in la-  
tere exteriore concolores,  
in latere interiore cinereo-  
fusca : decima quarta tribus  
istis nuper descriptis conco-  
lor, sed minutâ maculâ albâ  
in ipsius extremitate insigni-  
ta ; quatuordecim autem istæ  
remiges sunt subtus cinereæ :  
quinque quæ proximè se-  
quuntur, à decima quinta  
scilicet ad decimam nonam  
usque inclusivè, sunt in ip-  
sarum exortu & latere inte-  
riore cinereæ, in latere exte-  
riore & extremitate candidæ ;  
decima quinta est insuper ex-  
teriùs in ipsius extremitate  
fusco marginata ; & decima  
nona interiùs in ipsius extre-  
mitate simili margine dona-  
tur : vigesima in latere inte-  
riore cinereo-fusca, in exte-  
riore verò ad ipsius exortum  
& extremitatem concolor,  
in medio candida : quinque  
tandem corpori viciniore nigra,  
holoserici villosi instar,

du corps, sont noirâtres. L'aîle  
est composée de vingt-cinq plu-  
mes : les dix premières sont  
noirâtres : les trois suivantes,  
sçavoir depuis l'onzième jusqu'à  
la treizième inclusivement,  
sont de la même couleur du  
côté extérieur, & d'un cendré-  
brun du côté intérieur : la qua-  
torzième est colorée comme  
ces trois dernières, mais elle  
est marquée à son extrémité  
d'une petite tache blanche ; le  
dessous de ces quatorze plu-  
mes est cendré : les cinq sui-  
vantes, sçavoir depuis la quin-  
zième jusqu'à la dix-neuvième  
inclusivement, sont cendrées à  
leur origine & du côté inté-  
rieur, & blanches du côté ex-  
térieur & à leur extrémité ; la  
quinzième est de plus bordée de  
brun à son extrémité du côté  
extérieur ; & la dix-neuvième  
a une pareille bordure à son  
extrémité du côté intérieur :  
la vingtième est d'un cendré-  
brun du côté intérieur ; du côté  
extérieur elle est de la même  
couleur à son origine & à son  
extrémité, & blanche dans son  
milieu : enfin les cinq plus pro-  
ches du corps sont d'un noir de  
velours. Ces cinq dernières se  
terminent en pointe. La queue  
est composée de seize plumes  
cendrées ; les trois plus exté-  
rieures de chaque côté sont de



plus bordées extérieurement de blanc. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le demi-bec supérieur est d'un noirâtre clair, excepté son extrémité, qui est verdâtre; l'inférieur est entièrement de cette dernière couleur. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont orangés; & les ongles noirâtres. On la trouve à la *Louisiane* & à l'*Isle de Terre-neuve*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

splendentes. Quæ quinque novissimè dictæ remiges in acumen desinunt. Cauda sexdecim conflatur rectricibus cinereis, quarum tres utrinque extimæ sunt insuper exteriùs albo marginatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinè paululùm excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorè. Mandibula superior dilutè nigricans, attamen in extremitate viridescens; inferior penitùs viridescit. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, aurantii; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ludovicis* & *Insula Terræ-novæ*. Ex museo D. Aubry.

### 39. LA SARCELLE DE LA CAROLINE.

*Anas ex albo & nigro varia.* ( *Mas* ).

*Anas superne saturatè fusca, infernè dilutè grisea; maculâ ponè oculos & maculâ alarum candidis; rectricibus saturatè fuscis.* ( *Fœmina* ) . . . . . *QUERQUEDULA CAROLINENSIS.*

*Anas fusco-cinerea, macula aurium alarumque alba. Anas rustica.*  
*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 21.*

*Anas minor ex albo & fusco varia. Klein. Avi. pag. 134. N<sup>o</sup>. 22.*

*Perit Canard brun. Catesb. Tom. 1. pag. 98; avec une figure assez exacte de la femelle Pl. 98.*

*Les Anglois l'appellent LITTLE BROWN DUCK. Catesb.*

*Querquedula*



*Querquedula minori* nostrati paululum crassitie cedit. *Fœminæ* longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum circiter pedem explet. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices & sex circiter lineas. Alæ complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices sunt saturatè fuscæ; attamen in utroque capitis latere macula extat ovata candida, ponè oculum posita. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam & rectrices caudæ inferiores tingit color dilutè griseus. Remiges alarum majores sunt saturatè fuscæ: minores eodem fusco saturato imbutæ, sed albo, saltem in latere exteriori, terminatæ; unde fit in utraque ala complicata majuscula macula concolor. Caudam componunt rectrices saturatè fuscæ. Binæ intermediæ lateraliū longitudinem paululum antecellunt; laterales

Tom. VI.

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que notre petite *Sarcelle*. La longueur de la femelle, depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue environ deux pouces six lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun foncé; il y a cependant de chaque côté de la tête une tache ovale blanche, placée derrière l'œil. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris clair. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun foncé: les moyennes sont de la même couleur, & terminées de blanc, du moins du côté extérieur; ce qui forme sur chaque aile, lorsqu'elle est pliée, une grande tache de cette couleur. La queue est composée de plumes d'un brun foncé. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en

Nnn



diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs.

Le mâle diffère de la femelle par sa couleur, qui est variée par tout le corps de blanc & de noir.

On les trouve à la Caroline. Elles se tiennent ordinairement à l'embouchure des rivières.

verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranae, nigro colore imbuti.

Mas à Fœmina discrepat colore in universo corpore albo & nigro variegato.

Habitant in Carolina. Juxta fluviorum ostia sapissimè versantur.

## \*\* 40. LA SARCELLE DE FERROE.

Voyez Pl. XL. Fig. 2.

*Anas* superne fusco-nigricans, infernè alba; tæniâ longitudinali nigricante in vertice; capite ad latera dilutè griseo, oculorum ambitu candido; occipite & collo superiore nigricante & albido variis; gutture & collo inferiore fusco maculatis; maculâ alarum fusco-rufescente; rectricibus quinque utrinque extimis griseis, exterius albido marginatis . . . . *Querquedula Ferroensis*.

Les Habitans de l'Isle Ferroë l'appellent O EDEL.

Elle est un peu plus grosse que notre grande Sarcelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied quatre pouces trois lignes, & jusqu'à celui des on-

*Querquedulam majorem nostratam* paululùm crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem quatuor pollices & tres lineas



explet, & ad extremos ungues unum pedem quatuor pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes tredecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices; extimus eâdem longitudine pollet; intimus octodecim lineas longus; posticus autem septem tantummodo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum; alæ verò complicatæ ad tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. In capitis vertice tænia extat nigricans, ab exortu rostri versùs occipitium usque protensa; attamen prope rostri exortum minuta adest macula dilutè grisea. Caput ad latera diluto quoque imbuatur griseo, ponè oculos tantùm nonnihil ad fulvum inclinante. Oculorum ambitus albet. Occipitium & collum superius nigricante & albido variegantur. Collum ad latera ex fusco nigricat; versùs corpus tamen griseo-ful-

gles d'un pied quatre pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes & demie de long; sa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied treize lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces; l'extérieur est de la même longueur; l'intérieur a dix-huit lignes de long; & celui de derriere sept lignes seulement. Elle a deux pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Sur le sommet de la tête est une bande noirâtre, qui s'étend depuis l'origine du bec jusque vers l'occiput; tout près de l'origine du bec est cependant une petite tache d'un gris clair. Les côtés de la tête sont de cette dernière couleur, laquelle tire un peu sur le fauve derriere les yeux seulement. Le tour des yeux est blanc. L'occiput & le dessus du col sont variés de noirâtre & de blanchâtre. Les côtés du col sont d'un brun - noirâtre, excepté vers le corps, où ils sont d'un gris-fauve. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc varié de petites taches



brunes. La partie du col la plus voisine du corps, le dos & le croupion sont d'un brun-noirâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur; cependant de celles-là, les latérales sont blanches du côté extérieur. Parmi les plumes scapulaires, les supérieures, qui sont longues & pointues, sont noirâtres, & bordées de roux : les inférieures sont brunes. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les petites & les moyennes couvertures du dessous des ailes sont brunes : les plus grandes sont cendrées. Toutes celles du dessus sont d'un brun foncé. L'aile est composée de vingt-quatre plumes brunes : cette couleur s'éclaircit un peu sur le côté intérieur; & le côté extérieur des huit qui occupent le milieu, sçavoir depuis la treizième jusqu'à la vingtième inclusive-ment, est d'un brun tirant un peu sur le roussâtre. La seconde des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de quatorze plumes : les quatre du milieu sont d'un gris-brun : les cinq plus extérieures de chaque côté sont d'un gris plus clair, & bordées extérieurement de blanchâtre.

vum est. Guttur & collum inferius sunt candida, minutis maculis fuscis variegata. Pars colli capiti finitima, dorsum & uropygium ex fusco nigricant. Superiores caudæ teatrices concolores, ex istis tamen laterales sunt exterius candida. Ex scapularibus pennis, superiores, quæ quidem longiusculæ & in acumen desinentes, nigricant & rufo marginantur : inferiores fuscescunt. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes albicant. Teatrices alarum inferiores minimæ & mediæ sunt fuscæ : majores cinereæ. Superiores omnes saturatè fuscæ. Alarum componunt viginti quatuor remiges fusco imbutæ colore, in latere interiore nonnihil dilutior; latus insuper exterius octo intermediarum, à decima tertia scilicet ad vigesimam usque inclusivè, ex fusco paululùm ad rufescentem inclinat colorem. Remix secunda reliquarum omnium longitudinem excedit. Cauda quatuordecim constat reatricibus, quarum quatuor intermediæ sunt griseo-fuscæ : quinque utrinque extremæ dilutius griseæ, exterius albedo



*marginatæ. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum ; unde fit cauda in extremitate acuta. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, fusci, ad plumbeum colorem vergentes ; ungues verò nigricantes. Habitat in Ferroensi Insula, unde ad D. de Marigny missa est à D. Thurot. Hodie in museo D. Aubry servatur.*

Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un brun tirant sur la couleur de plomb ; & les ongles noirâtres. On la trouve dans l'*Isle Ferroë*, d'où elle a été envoyée à M. le Marquis de Marigny par M. Thurot. Elle est actuellement dans le cabinet de M. l'Abbé Aubry.

41. LA SARCELLE DE LA BAYE DE HUDSON.

*Anas superne obscurè fusca, infernè alba, dilutè rufescente transversim striata ; pennis basim mandibulæ superioris ambientibus, & maculâ ad aures candidis ; summo pectore & uropygio fusco-rufescentibus ; imo ventre rufescente & fusco transversim striato ; rectricibus fusco-rufescentibus . . . . QUERQUEDULA Freti HUDSONIS.*

*Anas grisea, auribus albis, remigibus primoribus nigricantibus. Anas minuta. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 61. sp. 31.*

Petit Canard brun & blanc. *Edwards. Tom. III. pag. CLVII ; avec une figure exacte Pl. 157.*

*Les Anglois l'appellent LITTLE BROWN AND WHITE DUCK. Edwards.*

*Cum Querquedula nostrate crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tredecim pollices & sex circiter*

Elle est à peu près de la grosseur de la nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ treize pouces six lignes, & jus-



qu'à celui des ongles de quatorze pouces. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue environ deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur un pouce six lignes, l'intérieur quinze lignes; & celui de derrière six lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col & le dos sont d'un brun sombre; cependant les plumes qui entourent la bête du demi-bec supérieur, sont blanches: cette couleur s'étend de chaque côté jusqu'au-dessous des yeux. Il y a de plus de chaque côté de la tête une tache blanche, placée derrière les yeux vers les oreilles. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un brun clair. Le haut de la poitrine, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-roussâtre. Le bas de la poitrine & le haut du ventre sont d'un blanc rayé transversalement de roussâtre clair. Le bas-ventre & le haut des jambes sont rayés transversalement de

lineas æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda duos circiter pollices; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum octo lineis, extremus unum pollicem & sex lineas, intimus quindecim lineas; posticus autem sex lineas. Alæ complicatæ ad quartam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, collum superius & dorsum sunt obscurè fusca; pennæ tamen basim mandibulæ superioris ambientes sunt candidæ: candor autem utrinque infra oculos usque protenditur. In utroque capitis latere insuper extat macula candida, ponè oculos versùs aures posita. Guttur & pars colli inferior diluto imbuuntur fusco. Summum pectus, uropygium & superiores caudæ tectrices sunt fusco-rufescentes. Pectus infimum, venterque supremus albet, & dilutè rufescente transversim striantur. Venter imus & crurum suprema pars tæniis variegantur transversis fulcis



& rufescentibus. Pennæ caudam subtus obtegentes concolores. Latera fusca sunt. Pennæ scapulares, superioresque alarum rectrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, fusco - rufescentes : majores à corpore remotiores nigricantes. Pennæ alas subtus cooperientes fuscæ, pauco sordidè albo mixtæ. Remiges alarum majores nigricantes : minores fusco-rufescentes. Caudam componunt rectrices remigibus minoribus concolores. Omnes in acumen desinunt : binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē ; unde fit cauda in extremitate acuta. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti ex nigricante ad rubescentem obscurum colorem vergunt ; ipsorum membranæ, unguisque nigricant. Habitat in *Freto Hudsonis*.

brun & de rouffâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur. Les côtés sont bruns. Les plumes scapulaires, les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un brun-rouffâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un brun mêlé d'un peu de blanc sale. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres : les moyennes sont d'un brun-rouffâtre. La queue est composée de plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle. Toutes se terminent en pointe : les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue pointu. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts sont d'un noirâtre tirant sur le rougeâtre obscur ; leurs membranes & les ongles sont noirâtres. On la trouve à la *Baye de Hudson*.



## \*\* 42. LA SARCELLE DE S. DOMINGUE.

*Voyez Pl. XLI. Fig. 2.*

*Anas superne rufa , mediis pennarum-nigricantibus, infernè griseo-fusca , albido mixta ; capite anteriore fuliginoso ; imo ventre dilutè rufo , griseo-fusco maculato ; maculâ alarum candidâ ; rectricibus nigricantibus , scapis aterrimis præditis . . . . QUERQUEDULA DOMINICENSIS.*

*Chilcanauhtli , seu Anas Chilli colore. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 21; cap. XXXI.*

*Chilcanauhtli , seu Avis Chilli colore. Raj. Syn. Avi. pag. 177.*

*Colcanauhtli , seu Anas Coturnicum Mexicanarum colore. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 49. cap CLXXV. ( an femina? )*

*Raj. Syn. Avi. pag. 176. ( an femina? )*

*Les Mexiquains l'appellent , CHILCANAUHTLI ; & la femelle COLCANAUHTLI. Fern. Raj.*

C'est la plus petite espece que je connoisse dans ce genre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces six lignes. Son bec depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes & demie de long ; sa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes ; son pied dix lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce onze lignes & demie, l'extérieur un pouce neuf lignes & demie, l'intérieur un pouce cinq lignes ; & celui de derriere six lignes.

Hæc est hujus generis species quam noverim minima. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat , & ad extremos ungues undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque unum pollicem & quinque cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices & novem lineas ; pars crurum plumis denudata tres lineas ; pes decem cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & undecim cum semi lineas, extimus unum pollicem & novem cum semi lineas , intimus unum pollicem



tem cum quinque lineis; posticus autem sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput antèrius & guttur fuliginoso colore tinguntur. Caput posterius, collumque rufa sunt. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superiores caudæ testrices & latera sunt quoque rufæ, sed nigricante variæ; qui color nigricans cujusque pennæ medium occupat. Pectus & venter supremus griseo-fusco tinguntur, & aliquid albidum admixtum habent. Imum ventrem, crurum partem supremam & inferiores caudæ testrices tingit color dilutè rufus, griseo-fusco varius, griseo-fusco scilicet colore uniuscujusque pennæ medium occupante. Testrices alarum inferiores omnes, sicut & superiores minimæ, sunt griseo-fuscæ: superiores mediæ concolores, sed albo-variegatæ: majores corpori finitimæ, sicut & à corpore remotiores, griseo-fuscæ: majores intermediae candidæ. Alarum component viginti quatuor remiges, quarum decem primo-

Elle a un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La partie antérieure de la tête & la gorge sont de couleur de fuye. La partie postérieure de la tête & le col sont roux. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont d'un roux varié de noirâtre, cette dernière couleur occupant le milieu de chaque plume. La poitrine & le haut du ventre sont d'un gris-brun mêlé d'un peu de blanchâtre. Le bas-ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux clair, varié de gris-brun, cette dernière couleur occupant le milieu de chaque plume. Toutes les couvertures du dessous des aîles, ainsi que les plus petites du dessus, sont d'un gris-brun: les moyennes du dessus sont de la même couleur, & variées de blanc: les grandes les plus proches, ainsi que les plus éloignées du corps, sont d'un gris-brun: les grandes intermédiaires sont blanches. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes: les dix premières sont brunes; cette couleur s'éclaircit un peu sur le côté intérieur: les six suivantes, sça-



voir depuis l'onzième jusqu'à la seizième inclusivement, sont pareillement brunes, si l'on en excepte cependant leur côté extérieur, qui est blanc à son origine, cette couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure; de sorte que dans l'onzième plume elle s'étend jusqu'aux deux tiers de sa longueur; ce qui, conjointement avec les couvertures blanches, forme sur chaque aile une tache de cette couleur : les quatre qui suivent ces dernières, sçavoir depuis la dix-septième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont brunes : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-fauve. La queue est composée de vingt plumes noirâtres, & dont la tige est d'un noir brillant. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de dix-huit lignes que les deux du milieu. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes & les ongles sont bruns. On la trouve à *S. Domingue* & au *Mexique*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

res fusco imbutæ colore, in latere interiore nonnihil dilutior : sex proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam sextam usque inclusivè, similiter fuscæ, excepto tamen latere exteriori in exortu candido, candore eò majus spatium occupante, quò remix fit exterior; ita ut in undecima remige ad duas tertias longitudinis partes usque tendatur; unde, simul cum alarum tectricibus candidis, fit in utraque ala macula concolor : quatuor quæ novissimas istas proximè sequuntur, à decima septima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, fuscæ sunt : quatuor corpori viciniore griseo-fulvæ. Caudam componunt viginti rectrices nigricantes, scapis aterimis præditæ. Binæ intermedix lateralium longitudinem excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis octodecim linearum longitudine cedentem. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque fusci. Habitat in *Dominicensi Insula* & *Mexico*. Ex museo D. Aubry.





2. Canard d'été, mâle.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Souchet, mâle.

2. Canard d'é, mâle.









Fig. 2.

2. Tadorne.







Échelle de 6. pouces.

Fig. 1.

Fig. 2.



Dessiné et Gravé par Martinet.


1. Chipeau, mâle.

2. Tadorne.









2. Canard à longue queue, femelle.










1. Canard à longue queue, mâle.

2. Canard à longue queue, femelle.









2. Canard siffleur, mâle.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Millouin, mâle.

2. Canard siffleur, mâle.









mâle 2. Morillon, femelle.









Dessiné à Gravé par Martinet.

1. Morillon mâle 2. Morillon, femelle.










2. Garrot.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Petit Morillon.

2. Garrot.










rique

2. *Macreuse.*









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Canard siffleur d'Amérique

2. Macreuse.









Fig. 1.

2 . Sarcelle , femelle .









Desiné et Gravé par Martinet.

1. Sarcelle, mâle.

2. Sarcelle, femelle.










2. Sarcelle de Ferroë.









Designé et Gravé par M. de Lamoignon.

1. Petite Sarcelle, mâle. 2. Sarcelle de Ferroë.










2. *Sarcelle de S. Domingue.*









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Sarcelle de la Louisiane.

2. Sarcelle de S. Domingue.









## ORDO XXV. ORDRE XXV.

### A V E S

### LES OISEAUX

*Digitis quatuor ; omnibus membranis integris inter se connexis : cruribus circa corpus medium & extra abdomen positiss, corpore brevioribus præditæ.*

*Qui ont quatre doigts , tous joints ensemble par des membranes entières : & les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen , & plus courtes que le corps.*

**I**NTER hujus Or-  
linis Aves aliæ ros-  
tro donantur acu-  
to ; aliæ rostro apice aduncum præditæ sunt. In duas sec-  
tiones dividuntur : prima  
continet eas quæ rostrum  
habent acutum , ut *Anhinga* ,  
*Lepturus* : & secunda il-  
las quæ rostrum habent apice  
aduncum , ut *Sula* , *Phala-*  
*crocorax* , *Onocrotalus*.

**P**ARMI les Oiseaux de  
cet Ordre , les uns ont  
le bec pointu ; & les  
autres ont le bec crochu vers  
le bout. Ils se divisent en deux  
sections : dans la première sont  
ceux dont le bec est pointu ,  
comme l'*Anhinga* , le *Paille-*  
*en-cul* : & dans la seconde  
ceux dont le bec est crochu  
vers le bout , comme le *Fou* ,  
le *Cormoran* , le *Pélican*.

#### SECTIO I.

#### SECTION I.

*Eæ quæ rostro donantur  
acuto.*

*Ceux dont le bec est pointu.*

**H**ÆC sectio duobus con-  
stat generibus Avium  
rostro sive recto sive inflexo

**C**ETTE section contient  
deux genres d'Oiseaux ,  
qui se distinguent entr'eux par

O o o ij



le bec, qui est ou droit ou courbé. Les uns ont le bec tout-à-fait droit, comme l'*Anhinga* : les autres ont le bec un peu courbé vers le bas, comme le *Paille-en-cul*. Les Oiseaux de ce dernier genre ont deux plumes très-longues à la queue.

à se invicem discrepantium: Aliæ enim rostrum habent planè rectum, ut *Anhinga* : aliæ rostro donantur deorsum modicè inflexo, ut *Lepturus*. Hujus novissimi generis Aves rectricibus binis longissimis præditæ sunt.

## CVIII.

*Le genre de l'Anhinga.*

Son caractère est d'avoir Quatre doigts, tous joints ensemble par des membranes entières :

Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

Le bec droit & pointu.

Tous les Oiseaux de ce genre ont sur les bords du bec une dentelure fine & peu apparente. L'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé intérieurement comme une scie.

## CVIII.

*Genus Anhingæ.*

Hujus character est Digiti quatuor, omnes membranæ integris inter se connexi :

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora :

Rostrum rectum, acutum.

Omnes hujus generis Alites rostro donantur ad marginés minutè & haud multum conspicuè denticulato. Trium digitorum anticorum medii unguis est interiùs, ferræ instar, denticulatus.

## \*\* I. L'ANHINGA.

*Anhinga* superne nigricans, maculis albidis varia, infernè albo-argentea; capite & collo superiore griseo-rufescentibus; gutture & collo inferiore griseis; uropygio, rectricibusque splendidè nigris . . . ANHINGA.

*Anhinga* Brasiliensibus Tupinambis. *Marcgr. Hist. Br. pag. 218, in qua hujus icon non satis accurata.*



*Jonst. Avi. pag. 149. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 60.*  
*Anhinga Brasiliensibus Tupinambis Marcgravio. Willugh. Ornith. pag. 250. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LXXII.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 124. N<sup>o</sup>. 7.*  
*Plancus Brasiliensis, Anhinga vocatus. Klein. Avi. pag. 145. N<sup>o</sup>. 8.*  
*Mergus longirostrus, cervice longiori. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 135.*  
*Mergus Americanus, subcastaneus, punctatus, cervice longiori. Barr. Ornith. Class. I Gen. III. sp. 6.*  
*Prinx. Moehr. Avi. Gen. 63.*  
*Les François de la Guiane l'appellent PLONGEON ORDINAIRE. Barr.*  
*Les Brâsiliens Toupinambous, ANHINGA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Klein.*

Cum *Anate domestica* crassitie circiter convenit. Ipsi longitududo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes novem pollices & octo lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes & tres pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices longum est; cauda decem pollices; pes unum pollicem & quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & quatuor lineas, extimus duos pollices cum totidem lineis, intimus unum pollicem & septem lineas; posticus autem decem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & pollicis unius; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput habet parvum & longiusculum; collum gracile,

Il est à peu près de la grosseur du *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds trois pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; sa queue dix pouces; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces quatre lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce sept lignes; & celui de derrière dix lignes. Il a trois pieds un pouce de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Sa tête est petite & alongée. Son col est menu, rond, & long d'un pied. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes très-fines & douces comme de la soie;



celles qui couvrent la tête & la partie supérieure du col, sont d'un gris-roussâtre : celles qui couvrent la gorge & la partie inférieure du col, sont grises. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un noirâtre, varié de petites taches oblongues & blanchâtres, qui occupent le milieu de chaque plume. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau noir. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc argenté. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un gris-brun. Les petites & les moyennes du dessus sont de la même couleur que les plumes de la partie supérieure du dos : les grandes les plus proches du corps sont variées de noir & de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont entièrement noires. Toutes les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur. La queue est composée de douze plumes fort larges, d'un noir brillant. Les yeux sont noirs ; leur iris est de couleur d'or. Le bec est gris, excepté son origine, qui est un peu jaunâtre. Les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un

rotundum, pedis unius longitudinem obtinens. Caput, guttur, collumque vestiunt pennæ subtilissimæ, serici instar, mollissimæ : quæ caput & partem colli superiorem obtegunt, sunt griseo-rufescentes : quæ guttur & collum inferius cooperiunt, griseæ. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt nigricantes, minutis variegatæ maculis oblongis albidis, cujuslibet pennæ medium occupantibus. Dorsum infimum, uropygium & superiores caudæ rectrices splendidè nigrae. Pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferioresque caudæ rectrices tingit color albo-argenteus. Pennæ alas subtus obtegentes sunt griseo-fusca. Superiores alarum rectrices minimæ & mediæ pennis dorsum supremum vestientibus colores : majores corpori viciniores albo & nigro variegatæ : majores à corpore remotiores penitus nigrae. Omnes alarum remiges simili nigro imbutæ. Cauda duodecim constat rectricibus latissimis, splendidè nigris. Oculi sunt quoque nigri : ipsorum irides aureo colore tinctæ. Rostrum griseum, attamen in exortu nonnihil flavicans. Pedes &



Digiti, sicut & ipforum membranæ, ex griseo ad flavescen-  
centem colorem inclinantes;  
ungues verò grisei. Habitat in  
*Brasilia & Cayana*, unde in  
*museum Realmurianum* missa  
à *D. Artur.*

gris tirant sur le jaunâtre; & les  
ongles gris. On le trouve au *Bré-  
sil*, & à *Cayenne*, d'où il a été  
envoyé à *M. de Reaumur* par  
*M. Artur.*

CIX.

*Genus Lepturi.*

Hujus character est  
Digiti quatuor, omnes mem-  
branis integris inter se  
connexi:

Crura circa corpus medium  
& extra abdomen posita,  
corpore breviora:

Rostrum deorsum modicè  
inflexum, acutum:

Rectrices binæ longissimæ.

Omnes hujus generis Aves  
rostro donantur ad margines  
minutè & haud multùm con-  
spicuè denticulato. Ipsarum  
digitus extimus per totam la-  
teris exterioris longitudinem  
membranulâ donatur; &  
crurum pars infima plumis  
est denudata.

CIX.

*Le genre du Paille-en-cul.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, tous joints en-  
semble par des membranes  
entieres:

Les jambes avancées vers le  
milieu du corps & hors de  
l'abdomen, & plus courtes  
que le corps:

Le bec un peu courbé vers le  
bas & pointu:

Deux des plumes de la queue  
très-longues.

Tout les Oiseaux de ce genre  
ont sur les bords du bec une  
dentelure fine & peu apparente.  
Ils ont aussi une petite mem-  
brane tout le long du côté ex-  
térieur du doigt extérieur; &  
la partie inférieure des jambes  
dégarnie de plumes.



## \*\* I. LE PAILLE-EN-CUL.

*Voyez Pl. XLII. Fig. 1.*

*Lepturus albo-argenteus*, superne cinereo-nigricante transversim striatus ; taniâ supra oculos splendide nigrâ , rectricibus candidis , scapis in exortu nigris . . . . **LEPTURUS**,

*Lepturus. Moehr. Avi. Gen. 67.*

*Avis Tropicorum. Willugh. Ornith. pag. 250. hujus icon non satis accurata Tab. LXXVI.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 191. N°. 4.*

*Avis Tropicorum nostratibus nautis. Raj. Syn. Avi. pag. 123. N°. 6.*

*Plancus Tropicus. Klein. Avi. pag. 145. N°. 7.*

*Phaethon rectricibus duabus longissimis , rostro serrato , digito postico adnato. Phaeton æthereus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 67. sp. 1.*

*Fetu en cul ou Oiseau du Tropic. Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 276 ; avec une assez mauvaise figure pag. 246. N°. 11.*

*Les François l'appellent OISEAU DES TROPIQUES.*

*Les Anglois, TROPICK BIRD. Willugh. Raj.*

Il est à peu près de la grosseur du *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces six lignes , & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche , qui s'étendent jusque sous les yeux , a trois pouces deux lignes de long ; sa queue un pied huit pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , quatre lignes ; son pied onze lignes ; celui du milieu des trois doigts

*Anatem domesticam* crassitie circiter æmulatur. Ipsi-  
us longitudo à rostri apice  
ad caudæ extremitatem duos  
pedes novem pollices & sex  
lineas æquat , & ad extremos  
ungues quindecim pollices &  
quatuor lineas. Rostrum ab  
ipsius apice ad oris angulos ,  
qui quidem sub oculos us-  
que protenduntur , tres pol-  
lices & lineas binas longum  
est ; cauda unum pedem oc-  
to pollices & sex lineas ;  
pars crurum plumis denu-  
data quatuor lineas ; pes un-  
decim lineas ; trium digito-  
rum



rum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus octodecim lineas, intimus unum pollicem cum quinque lineis; posticus autem sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & duorum pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad quinque pollicum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Partes capitis & colli superiores tingit color albo-argenteus splendidissimus: quælibet tamen penna in exortu ex cinereo nigricat; color autem iste, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, nequaquam aut saltem minimè conspicuus est. In utroque capitis latere tænia extat splendide nigra, ab exortu mandibulæ superioris orta, quæ supra oculum affurgit, & inde versùs occipitium usque protenditur. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt splendidissimè albo-argenteæ, cinereo-nigricante transversim striatæ. Caput ad latera, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices &

antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur dix-huit lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes; & celui de derrière six lignes. Il a trois pieds deux pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à cinq pouces au-delà de l'origine de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un blanc-argenté très-brillant: chaque plume est cependant d'un cendré-noirâtre à son origine, mais cette couleur ne paroît point, ou elle paroît du moins bien foiblement, lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. De chaque côté de la tête est une bande d'un beau noir, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, remonte au-dessus de l'œil, & s'étend de là jusque vers l'occiput. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un blanc-argenté très-brillant, & rayé transversalement de cendré-noirâtre. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont du même blanc-argenté, mais sans rayures: le bas des



côtés est cependant garni de plumes plus longues que les autres, d'un cendré-noirâtre, & marquées sur leurs bords de taches transversales blanches. Les petites couvertures du dessus des ailes, sçavoir celles qui sont depuis l'origine de l'aile jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, sont blanches, & rayées transversalement de cendré - noirâtre : les autres petites, sçavoir celles qui sont depuis le pli qui répond à celui du poignet jusque vers le bout de l'aile, sont entièrement blanches, si l'on en excepte quelques - unes, vers le bout de l'aile, qui sont marquées de quelques rayes transversales noires : les grandes les plus éloignées du corps sont noires, & bordées de blanc dans toute leur circonférence, cette bordure étant d'autant plus large, que la plume est plus intérieure ; de sorte qu'il y en a qui ne sont noires que dans leur milieu tout le long de leur tige : les grandes qui suivent celles-ci, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont blanches, & ont leur tige noire depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur : les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré-noirâtre, & bordées de blanc. L'aile est

pennæ alas subtus cooperientes eodem imbuuntur albo-argenteo, sed striis cinereo - nigricantibus destituuntur : latera tamen in parte infima pennis obsita sunt quàm reliquæ longioribus, cinereo - nigricantibus, & maculis transversis albis ad margines insignitis. Superiores alarum tectrices minores, illæ scilicet quæ alas cooperiunt ab ipsarum exortu ad articulum carpo humano respondentem usque, sunt candidæ, cinereo-nigricante transversim striatæ : reliquæ minores, illæ scilicet quæ alas obtegunt ab articulo carpo humano respondente versùs ipsarum extremitatem usque, penitus candidæ, si tamen quasdam excipias versùs alæ extremitatem positas, tæniis quibusdam transversis nigris insignitas : majores à corpore remotiores nigræ, in tota circumferentia albo marginatæ ; margo autem eo latior est, quò penna fit interior ; ita ut quædam in ipsarum tantummodo medio secundùm scapi longitudinem nigræ sint : majores proximè sequentes, illæ scilicet quæ medium locum obtinènt, candidæ, scapo ab



ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque nigro præditæ : majores corpori finitimæ cinereo-nigricantes , albo fimbriatæ. Alam componunt triginta tres remiges , quarum binæ primores subtus penitus candidæ , superne verò exterius & in parte lateris interioris scapo finitima nigræ , in reliquis candidæ : tertia & quarta binis primoribus concolores , ab illis tamen discrepantes in eo quod exterius albo marginentur , sed versùs exortum tantùm : quinta in latere exteriori nigra & albo fimbriata , in latere interiore & extremitate penitus candida : sexta alba , paucò tantummodo nigro , in latere exteriori secundùm ipsius scapi longitudinem posito , ab ipsius exortu versùs extremitatem usque notata : novemdecim proximè sequentes , à septima scilicet ad vigesimam quintam usque inclusivè , candidæ , scapo ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque nigro præditæ : vigesima sexta & vigesima septima albæ , paucò notatæ cinereo-nigricante simili modo quo sexta nigro insignitur :

composée de trente-trois plumes : les deux premières sont entièrement blanches en-dessous ; mais en-dessus elles sont noires du côté extérieur & dans la partie du côté intérieur qui est voisine de la tige , tout le reste est blanc : la troisième & la quatrième sont colorées comme les deux premières , avec cette différence cependant qu'elles sont aussi bordées de blanc du côté extérieur , vers l'origine seulement : la cinquième est noire & bordée de blanc du côté extérieur ; son côté intérieur & son bout sont entièrement blancs : la sixième est blanche , & marquée seulement d'un peu de noir placé sur le côté extérieur tout le long de sa tige depuis son origine jusque vers son extrémité : les dix-neuf suivantes , sçavoir depuis la septième jusqu'à la vingt-cinquième inclusivement , sont blanches , & ont leur tige noire depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur : la vingt-sixième & la vingt-septième sont blanches , marquées d'un peu de cendré-noirâtre de la même façon que la sixième est marquée de noir : la vingt-huitième est d'un cendré - noirâtre , & bordée de blanc dans toute sa circonférence , cette dernière couleur



étant engrenée en forme de dents dans le cendré-noirâtre sur le côté intérieur seulement : enfin les cinq plus proches du corps sont d'un cendré-noirâtre, & bordées de blanc extérieurement & par le bout ; elles ont aussi un peu de blanc à leur origine du côté intérieur. La queue est composée de quatorze plumes blanches, dont la tige est noire vers leur origine dans la plus grande partie de leur longueur, excepté celle des deux plumes du milieu, qui n'est noire que jusque vers le quart de sa longueur. Ces deux dernières plumes sont fort étroites, & plus longues de quinze pouces neuf lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & l'origine des doigts sont jaunâtres ; le reste des doigts, leurs membranes & les ongles sont noirâtres. On le trouve entre les deux Tropiques. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

vigesima octava cinereo-nigricans, in tota circumferentia albo marginata, albedine in cinereo-nigricante colore dentatim inclusâ, sed in latere interiore tantum : quinque tandem corpori finitimæ cinereo-nigricantes, exterius & apice albo fimbriatæ, & pauco insuper candido interius in ipsarum exortu notatæ. Caudam componunt quatuordecim rectrices candidæ, scapo in maxima longitudinis parte, idque versùs exortum, nigro præditæ ; binarum tamen intermediarum scapus non nisi ab ipsarum exortu versùs quartam longitudinis partem usque nigrescit. Quæ binæ novissimè dictæ rectrices sunt strictissimæ, & utrinque proximè sequentem quindecim pollicum & novem linearum longitudine excedentes : laterales autem omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Rostrum rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, digitique ad exortum flavicantes ; digiti in reliqua longitudine, ipsorum membranæ, unguesque nigricantes. Binus inter Tropicos habitat. *Ex museo Realmuriano.*



\*\* 2. LE PAILLE-EN-CUL BLANC.

*Voyez Pl. XLII. Fig. 2.*

**Lepturus** albo-argenteus; taniâ supra oculos, pennis scapularibus versùs extremitatem, fasciâque supra alas nigris; rectricibus candidis, scapis in exortu nigris . . . .  
**LEPTURUS CANDIDUS.**

Alcyon media alba, rectricibus binis intermediis longissimis. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 482.*

Paille-en-cul ou *Larus leucomelanos*, cauda longissima bipenni. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 116. (ed. 1725).*

Oiseau des Tropiques. *Catesb. Append. pag. 14; avec une figure assez exacte Pl. 14.*

Oiseau Tropicque. *Edwards. Tom. III. pag. CXLIX; avec une figure exacte Pl. 149.*

Les Espagnols l'appellent **RABOS DI JUNCO.** *Feuillée.*

Les Anglois, **TROPICK BIRD.** *Edwards.*

*Columbam Romanam* crassitie circiter æquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & quinque pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, qui quidem sub oculos usque protenduntur, duos pollices & octo lineas longum est; cauda unum pedem quinque pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes novem lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon Romain*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusque sous les yeux, a deux pouces huit lignes de long; sa queue un pied cinq pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur quatorze lignes &



demie, l'intérieur treize lignes ; & celui de derriere six lignes. Il a trois pieds de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à cinq pouces au-delà de l'origine de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont d'un blanc-argenté très-brillant. Il y a cependant de chaque côté de la tête une bande d'un beau noir, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, remonte au-dessus de l'œil, & s'étend de là jusque vers l'occiput. Les plumes qui couvrent le haut de la partie supérieure du col, sont d'un cendré-noirâtre à leur origine ; mais cette couleur ne paroît pas, lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. Le bas des côtés est de plus garni de plumes assez longues, d'un cendré-noirâtre, & bordées de blanc dans toute leur circonférence. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue, ainsi que toutes celles du dessous des aîles, sont entièrement blanches. Les plumes scapulaires sont blanches depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur ; le reste est d'un très-beau noir ; quelques-unes sont cependant terminées de blanc. Les plus petites couvertures du dessus

quatuordecim cum semilíneas, intimus tredecim líneas ; posticus autem sex líneas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum ; alæ verò complicatæ ad quinque pollicum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput, guttur, collum, universumque corpus albo-argenteo tinguntur splendidissimo. In utroque tamen capitis latere tania extrat splendide nigra, ab exortu mandibulæ superioris orta, supra oculum asurgens, & inde versùs occipitium usque protensa. Pennæ colli superioris partem supremam obtegentes ex cinereo nigricant ; color autem iste, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, nequaquam conspicuus est. Laterum insuper pars infima pennis obfita est longiusculis, cinereo-nigricantibus, & in tota circumferentia albo marginatis. Tectrices caudæ superiores & inferiores, sicut & pennæ omnes alas subtus cooperientes, sunt penitus candidæ. Pennæ scapulares ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque albæ, in reliqua longitudine splendide nigre,



quibusdam tamen albo terminatis. Superiores alarum tectrines minimæ, sicut & majores corpori viciniore, candidæ : mediæ splendide nigræ ; unde fit in utraque ala lata fascia concolor : majores à corpore remotiores albæ, lineâ nigrâ, secundum ipsarum scapi longitudinem ab ipsarum exortu versus extremitatem usque protensâ, notatæ. Viginti novem remigibus ala conflatur : quinque primores sunt subtus penitus candidæ, superne verò exterius & in lateris interioris medietate scapo finitima nigræ, in altera ejusdem lateris medietate & ad ipsarum extremitatem albæ : quinque proximè sequentes, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, candidæ, & maculâ insignitæ nigrâ, exterius secundum scapi longitudinem ab ipsarum exortu versus duas tertias longitudinis partes usque productâ ; quæ macula eò minor est, quò remix fit corpori vicinior : quinque quæ proximè sequuntur, ab undecima scilicet ad decimam quintam usque inclusivè, albæ, solummodo scapo ab ipsarum exortu versus duas tertias

des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches : les moyennes sont d'un très-beau noir ; ce qui forme sur chaque aîle une large bande de cette couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont blanches, & marquées d'une ligne noire, qui s'étend tout le long de leur tige depuis leur origine jusque vers leur extrémité. L'aîle est composée de vingt-neuf plumes : les cinq premières sont entièrement blanches en-dessous ; mais en-dessus elles sont noires du côté extérieur & dans la moitié du côté intérieur voisine de la tige, l'autre moitié est blanche, ainsi que l'extrémité de la plume : les cinq suivantes, sçavoir depuis la sixième jusqu'à la dixième inclusivement, sont blanches, & marquées d'une tache noire, qui s'étend sur leur côté extérieur tout le long de leur tige depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur ; cette tache est d'autant plus petite, que la plume est plus proche du corps : les cinq autres, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quinzième inclusivement, sont blanches, & ont seulement leur tige noire depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur : les cinq qui suivent ces dernie-



res, sçavoir depuis la seizième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont blanches, & marquées d'une tache noire, semblable à celle des cinq plumes qui précèdent immédiatement les cinq dernières décrites, avec cette différence seulement que cette tache est d'autant plus grande, que la plume est plus proche du corps : les quatre suivantes, sçavoir depuis la vingt-unième jusqu'à la vingt-quatrième inclusivement, sont noires du côté extérieur depuis environ leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; tout le reste est blanc : la vingt-cinquième est de la même couleur, mais le noir s'étend aussi sur le côté intérieur vers le milieu de la longueur de la plume : la vingt-sixième & la vingt-septième sont noires, & terminées de blanc ; elles ont aussi un peu de cette dernière couleur à leur origine du côté intérieur : enfin les deux plus proches du corps sont entièrement noires, excepté leur origine, qui est blanche du côté intérieur seulement. La queue est composée de douze plumes blanches, dont la tige est noire dans presque toute leur longueur. Les deux du milieu sont fort étroites, & plus longues de douze pouces six lignes que celle qui les suit

longitudinis partes usque nigro præditæ : quinque nuper descriptas proximè sequentes, à decima sexta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, & maculâ notatæ nigrâ, maculæ ; quâ insigniuntur quinque remiges quinque novissimè dictas immediatè præcedentes, æmulâ ; hæc est tantummodo differentia quod ista macula eò major sit, quò remix sit corpori vicinior ; quatuor proximè sequentes, à vigesima prima scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, in latere exteriori ab ipsarum circiter exortu mediam versùs longitudinem usque nigræ, in reliquis candidæ : vigesima quinta concolor, niger tamen color versùs mediam remigis longitudinem supra latus interiorius quoque protenditur : vigesima sexta & vigesima septima nigræ, apicibus albis præditæ, & pauco insuper candido interiùs in ipsarum exortu notatæ : binæ tandem corpori viciniore penitus nigræ, excepto ipsarum exortu albo, sed in latere interiori tantum. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ, scapo per totam ferè longitudinem nigro



nigro præditæ. Binæ intermedia sunt strictissimæ, & utrinque proximè sequentem duodecim pollicum & sex linearum longitudine excedunt: laterales autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Rostrum ad exortum cinereum, in reliquis flavescens. Pars crurum plumis denudata, pedes, digitique ad exortum flavicantes; digiti in reliqua longitudine, ipsorum membranæ, unguæque nigricantes. Præcedentis instar, binos inter Tropicos habitat. *Ex museo Realmuriano.*

immédiatement de chaque côté: toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est cendré vers son origine; tout le reste est jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & l'origine des doigts sont jaunâtres; le reste des doigts, leurs membranes & les ongles sont noirâtres. On le trouve, comme le précédent, entre les deux Tropiques. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**\*\* 3. LE PAILLE-EN-CUL FAUVE.**

*Lepturus albo-fulvescens*; tæniâ supra oculos, pennis scapularibus versùs extremitatem, fasciâque supra alas nigris; rectricibus albo-fulvescentibus, scapis in exortu nigricantibus . . . . **LEPTURUS FULVUS.**

Præcedenti multum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem decem pollices & octo lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, qui quidem sub oculos usque

Il est beaucoup moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusque sous les yeux, a deux



pouces six lignes de long ; sa queue douze pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , quatre lignes ; son pied neuf lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , un pouce cinq lignes , l'extérieur un pouce quatre lignes , l'intérieur quatorze lignes ; & celui de derrière six lignes. Il a deux pieds neuf pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à cinq pouces au-delà de l'origine de la queue. La tête , la gorge , le col & tout le corps sont d'un blanc tirant sur le fauve. Il y a cependant de chaque côté de la tête une bande d'un beau noir , qui part de l'origine du demi-bec supérieur , remonte au - dessus de l'œil , & s'étend de là jusque vers l'occiput. Le bas des côtés est de plus garni de plumes assez longues , d'un cendré-noirâtre , & bordées de blanc-fauve dans toute leur circonférence. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue , ainsi que toutes celles du dessous des ailes , sont entièrement de cette dernière couleur. Les plumes scapulaires sont d'un blanc tirant sur le fauve depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur ;

protenduntur , duos pollices & sex lineas longum est ; cauda duodecim pollices cum sex lineis ; pars crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes novem cum semi lineas ; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas , extimus unum pollicem cum quatuor lineis , intimus quatuordecim lineas ; posticus autem sex lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum duorum pedum novem pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad quinque pollicum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput , guttur , collum , universumque corpus ex albo ad fulvescentem inclinant colorem. In utroque tamen capitis latere tænia extat splendide nigra , ab exortu mandibulæ superioris orta , quæ supra oculum assurgit , & inde versus occipitium usque producitur. Latera insuper in parte infima pennis obsita sunt longiusculis , cinereo-nigricantibus , & in tota circumferentia albo-fulvescente marginatis. Tectrices caudæ superiores & inferiores , sicut & pennæ omnes alas



subtus obtegentes, penitus ex albo fulvescunt. Pennæ scapulares ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque ex albo ad fulvescentem colorem vergunt, in reliqua longitudine sunt splendide nigræ, quibusdam tamen albo-fulvescente terminatis. Superiores alarum tectrices eodem imbuuntur colore ac corpus ipsum tingitur; ex illis tamen excipiendæ sunt quædam mediæ, quæ, simul cum majoribus corpori finitimis, sunt splendide nigræ, & in utraque ala latiusculam fasciam concolorem efformant: majores insuper à corpore remotiores scapo donantur ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque nigricante. Alarum componunt viginti novem remiges, quarum quatuor primores sunt subtus penitus albo-fulvescentes, superne verò exterius & in lateris interioris medietate scapo finitima nigræ, in altera ejusdem lateris medietate & ad ipsarum extremitatem albo-fulvescentes: septem proximè sequentes, à quinta scilicet ad undecimam usque inclusivè, albo-fulvescentes, scapo tantum-

le reste est d'un beau noir; quelques-unes sont cependant terminées de blanc-fauve. Les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le corps; il faut cependant en excepter quelques-unes des moyennes, qui, jointes à celles des grandes qui sont les plus proches du corps, sont d'un beau noir, & forment sur chaque aile une assez large bande de cette couleur: de plus les grandes les plus éloignées du corps ont leur tige noirâtre depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur. L'aile est composée de vingt-neuf plumes: les quatre premières sont entièrement d'un blanc-fauve en-dessous; mais en dessus elles sont noires du côté extérieur & dans la moitié du côté intérieur qui est voisine de la tige, l'autre moitié est d'un blanc-fauve, ainsi que l'extrémité de la plume: les sept suivantes, savoir depuis la cinquième jusqu'à l'onzième inclusivement, sont d'un blanc-fauve, & ont seulement leur tige noire depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur; la cinquième est de plus marquée d'une longue tache noire, placée sur son bord extérieur vers la moitié de sa longueur: les onze qui suivent,



ſçavoir depuis la douzième juſqu'à la vingt-deuxième incluſivement, ſont entièrement d'un blanc-fauve : la vingt-troisième & la vingt-quatrième ſont de la même couleur, & ont leur tige noire depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur : la vingt-cinquième eſt noire du côté extérieur depuis environ ſon origine juſque vers la moitié de ſa longueur ; tout le reſte eſt d'un blanc-fauve : la vingt-fixième eſt de la même couleur, mais le noir s'étend auſſi ſur le côté intérieur vers le milieu de la longueur de la plume : la vingt-septième eſt noire, & terminée de blanc-fauve ; elle a auſſi un peu de cette dernière couleur à ſon origine du côté intérieur : enfin les deux plus proches du corps ſont tout-à-fait noires, ſi l'on en excepte leur origine qui eſt d'un blanc-fauve du côté intérieur ſeulement. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un blanc-fauve, dont la tige eſt noirâtre dans preſque toute leur longueur, excepté celle des deux plumes du milieu, qui n'eſt noirâtre que depuis ſon origine juſque vers la moitié de ſa longueur. Ces deux dernières plumes ſont fort étroites, & plus longues de ſept pouces ſix lignes que celle qui

modo ab ipſarum exortu verſus duas tertias longitudinis partes uſque nigro prædita ; quinta maculâ inſuper notatur longiuſculâ nigrâ, ad marginem exteriorem mediam verſus longitudinem collocatâ : undecim quæ proximè ſequuntur, à duodecima ſcilicet ad vigefimam ſecundam uſque incluſivè, penitùs ex albo fulveſcunt : vigefima tertia & vigefima quarta eodem imbuuntur colore, & ſcapo donantur ab ipſarum exortu verſus duas tertias longitudinis partes uſque nigro : vigefima quinta in latere exteriore ab ipſius circiter exortu mediam verſus longitudinem uſque nigra, in reliquis albo-fulveſcens : vigefima ſexta concolor, niger tamen color verſus mediam remigis longitudinem ſupra latus interius quoque protenditur : vigefima ſeptima nigra, apice albo-fulveſcente prædita, & paulo inſuper albo-fulveſcente interiùs in ipſius exortu notata : binæ tandem corpori viciniore penitùs nigræ, excepto ipſarum exortu albo-fulveſcente, ſed in latere interiore tantùm. Caudam componunt duodecim rectrices albo-fulveſcentes, ſcapo per






2. Paille-en-cul blanc.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Paille-en-cul.

2. Paille-en-cul blanc.







totam ferè longitudinem nigricante præditæ; binarum tamen intermediarum scapus non nisi ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque nigricat. Quæ binæ novissimè dictæ rectrices sunt strictissimæ, & utrinque proximè sequentem septem pollicum & sex linearum longitudine excedentes: laterales autem omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum rubrum.

Pars crurum plumis denudata, pedes, digitique ad reliqua longitudine, ipsorum membranæ, unguesque nigricantes. Binos inter Tropicos similiter habitat. *Ex museo Realmuriano.*

les suit immédiatement de chaque côté : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & l'origine des doigts sont jaunâtres; le reste des doigts, leurs membranes & les ongles sont noirâtres. On le trouve aussi entre les deux Tropiques. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Pars crurum plumis denudata, pedes, digitique ad exortum flavicantes; digiti in reliqua longitudine, ipsorum membranæ, unguesque nigricantes. Binos inter Tropicos similiter habitat. *Ex museo Realmuriano.*

## SECTION II.

*Ex quæ rostrum habent apice aduncum.*

**I**N illa sectione tria continentur genera Avium rostri formâ à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostro donantur recto, conico, ut *Sula*: aliæ rostrum habent rectum, subcylindraceum, ut *Phalacrocorax*: aliæ rostro recto, horizontaliter plano præditæ sunt, ut *Onocrotalus*. Hujus novissimi

## SECTION II.

*Ceux dont le bec est crochu vers le bout.*

**I**L y a dans cette section trois genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme de leur bec. Les uns ont le bec droit & conique, comme le *Fou*: d'autres ont le bec droit & presque cylindrique, comme le *Cormoran*: d'autres enfin ont le bec droit & applati horizontalement, comme le *Pélican*. Les Oiseaux de ce dernier genre



ont une poche membraneuse sous la gorge.

generis Aves gutture donantur bursâ inflabili instructo,

## CX.

*Le genre du Fou.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, tous joints ensemble par des membranes entières :

Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps :

Le bec droit, conique & crochu vers le bout.

La plupart des Oiseaux de ce genre ont le demi-bec supérieur composé de plusieurs pièces articulées les unes aux autres, & cela tout près de la tête; au moyen desquelles l'ouverture du bec peut être considérablement augmentée. Ils ont aussi sur les bords du bec une dentelure fine & peu apparente. Ils n'ont point de narines apparentes; mais à leur place sur chacun des côtés du demi-bec supérieur est une rainure, qui s'étend dans presque toute sa longueur. Leur langue est extrêmement courte. L'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé intérieurement comme une scie.

## CX.

*Genus Sulæ.*

Hujus character est  
Digiti quatuor, omnes membranis integris inter se connexi :

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora :

Rostrum rectum, conicum, apice aduncum.

In plerisque hujus generis Avibus mandibula superior pluribus conflatur partibus prope caput simul junctis, quibus ope oris rictus fit valde intensus. Pleraque Aves istæ rostro quoque donantur ad margines minutè & haud multum conspicuè denticulato. Naribus conspicuis carent; sed earum loco in utroque mandibulæ superioris latere sulcus extat per totam ferè illius longitudinem productus. Ipsarum lingua valdè brevis est. Trium digitorum anticorum mediî unguis est interiùs, ferræ instar, denticulatus.



**\*\* I. LE FOU.**

*Sula* superne cinereo-fusca ; capite & collo concoloribus ; infernè alba ; rectricibus cinereo-fuscis ; oculorum ambitu nudo , luteo . . . . *SULA.*

*Pelecanus* cauda cuneiformi , rostro ferrato , remigibus omnibus nigris. *Piscator. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 66. sp. 5.*

Anseri Bassano congener fusca *Avis. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 322. N°. II. hujus icon satis accurata ( exceptis pedibus in quibus digitus posticus solutus est , quod inaccuratè ) Tab. 271. fig. 2.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 191. N°. 6.*

*Mergus Americanus* fuscus , *Stultus* vulgò dictus. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. III. sp. 7.*

*Anas angustirostra* , *Stultus* vulgò dicta. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 122.*

*Plancus Morus* , simpliciter. *Klein. Avi. pag. 144. N°. 4.*

*Anæthetus major melinus* , subtus albidus rostro ferrato - dentato. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 481.*

*Cancrofagus minor* vulgatissimus. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 128.*

*Fou. Catesb. Tom. I. pag. 87 ; avec une figure exacte Pl. 87.*

*Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 275.*

*Les Anglois l'appellent , BOOBY. Browne. Catesb.*

*Crassitie Anatem moschatam* non multum antecellit. *Ipsius* longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & quinque pollices æquat , & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & tres lineas. *Rostrum* ab ipsius apice ad oris angulos quatuor pollices & septem lineas longum est ; cauda novem pollices & totidem lineas ; pes unum pollicem cum octo lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pol-

Il n'est guères plus gros que le *Canard musqué*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds cinq pouces , & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces sept lignes de long ; sa queue neuf pouces neuf lignes ; son pied un pouce huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , trois pouces , l'extérieur deux pouces neuf lignes , l'intérieur



un pouce dix lignes; & celui de derriere treize lignes. L'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé intérieurement comme une scie. Il a cinq pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Toutes les couvertures du dessous des aîles sont d'un cendré-brun. Les petites & les moyennes du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-noirâtre. L'aîle est composée de trente-sept plumes de cette dernière couleur, dont cependant le côté intérieur est vers son origine d'une couleur un peu plus claire. La queue est composée de quatorze plumes d'un cendré-brun. Les deux du milieu sont les plus longues : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte

lices, extimus duos pollices & novem lineas, intimus unum pollicem cum decem lineis; posticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medii unguis est interius, ferræ instar, denticulatus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quinque pedum; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt cinereo-fuscæ. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices albescent. Pennæ omnes alas subtus cooperientes sunt cinereo-fuscæ. Superiores alarum rectrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, concolores : majores à corpore remotiores cinereo-nigricantes. Ala triginta septem conflatur remigibus pariter cinereo-nigricantibus, attamen in latere interiore versùs ipsarum exortum colore nonnihil dilutiore imbutis. Caudam componunt quatuordecim rectrices cinereo-fuscæ. Binæ intermediæ reliquas longitudine excedunt : laterales



laterales omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis quinque pollicum & sex linearum longitudine cedentem. Oculorum irides dilutè griseæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo coopertum. Rostrum griseum. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, pallidè flavi; ungues verò grisei. In *Africa* & *America* maris littora frequentat. Longè etiam à littoribus quandoque discedit. *Ex museo Realmuriano.*

de cinq pouces six lignes que les deux du milieu. L'iris des yeux est d'un gris clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Le bec est gris. Les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont d'un jaune pâle; & les ongles gris. On le trouve sur les côtes d'*Afrique* & de l'*Amérique*. Il s'avance très-loin en pleine mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

## 2. LE GRAND FOU.

*Sula* superne saturatè fusca, albo maculata, capite; collo & pectore concoloribus, infernè sordidè alba; rectricibus fuscis; oculorum ambitu nudo, nigricante . . . *SULA MAJOR.*

Plancus congener *Anseri Bassano*. *Klein. Avi. pag. 144. N°. 3.*  
Grand Fou. *Catesb. Tom. I. pag. 86*; avec une figure exacte de la tête & du col *Pl. 86.*  
*Les Anglois l'appellent GREAT BOOBY. Catesb.*

Magnitudine & crassitie *Anserem* circiter æmulatur; sed caudâ multò longiori gaudet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & lineas binas longum est. Alis expansis, extremitates majorum remi-  
*Tom. VI.*

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur d'une Oye; mais il a la queue beaucoup plus longue. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces deux lignes de long. Il a environ six pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'il vole, ont

Rrr



qu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun foncé, varié de taches blanches, fort petites & très-proches les unes des autres sur la tête, plus grandes & moins fréquentes sur le col, la poitrine & surtout sur le dos. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale. Toutes les plumes de l'aile sont brunes. Celles de la queue sont de la même couleur. Les deux du milieu sont les plus longues : les latérales vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau noirâtre. Le bec est d'un gris-brun. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs. On le trouve sur les côtes de *la Floride* : il fréquente aussi les embouchures des grandes rivières.

gum sex circiter pedum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Caput, guttur, collum, pectus, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ rectrices sunt saturatè fuscæ, albis variegatæ maculis, in capite minutissimis & frequentissimis, in collo, pectore & præsertim dorso majoribus & rarioribus. Venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices sordidè albicant. Omnes alarum remiges fuscæ sunt. Caudæ rectrices concolores. Binæ intermediæ reliquas longitudine superant : laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculorum irides avelanæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute nigricante obsitum. Rostrum griseo-fuscum. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque nigri. In *Florida* maris littora frequentat : juxta majorum fluminum ostia quoque versatur.



\*\* 3. LE FOU BRUN.

*Voyez Pl. XLIII. Fig. 1.*

*Sula cinereo-fusca*, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; uropygio cinereo-albo; rectricibus binis intermediis cinereis; lateralibus cinereo-fuscis, utrinque extimâ apice cinereo-albâ; oculorum ambitu nudo, rubro . . . . *SULA FUSCA.*

Anseri Bassano congener, Avis cinereo-albus. *Sloane. Voy. of Jamaica. Tom. I. pag. 31. hujus icon non satis accurata Tab. 6. fig. 1.*

Anseri Bassano affinis; Avis cinereo-alba. *Raj. Syn. Avi. pag. 191. N<sup>o</sup>. 5.*

*Larus piscator cinereus.* *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 134.*

Fol ou Fiber marinus, rostro acutissimo adunco, serrato. *Feuillée, Journ. des Obs. phys. pag. 98. (ed. 1725).*

*Les Anglois l'appellent BOOBY. Sloane. Raj.*

*Crassitie Anatem domestica* non multum excedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes æquat, & ad extremos ungues unum pedem & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & octo lineas longum est; cauda novem pollices; pes tredecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis; intimus unum pollicem & octo lineas; posticus autem undecim cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medii unguis est interiùs, ferræ instar,

Il n'est guères plus gros qu'un *Canard domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces huit lignes de long; sa queue neuf pouces; son pied treize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur un pouce huit lignes; & celui de derrière onze lignes & demie. L'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est intérieurement dentelé comme un scie. Il a quatre



pieds quatre pouces de vol ;  
 & ses ailes, lorsqu'elles sont  
 pliées, s'étendent environ jus-  
 qu'aux deux tiers de la lon-  
 gueur de la queue. La tête, la  
 gorge, le col, la poitrine, le  
 ventre, les côtés & les jam-  
 bes sont d'un cendré-brun as-  
 sez clair. Le dos & les plu-  
 mes scapulaires sont d'une cou-  
 leur un peu plus foncée : les  
 plus grandes des scapulaires,  
 qui sont les inférieures, sont  
 même d'un cendré-noirâtre.  
 Le croupion, & les couvertu-  
 res du dessus & du dessous de  
 la queue sont d'un gris-blanc.  
 Toutes les couvertures du des-  
 sous des ailes sont d'un cendré-  
 brun. Les petites du dessus,  
 ainsi que les grandes les plus  
 proches du corps, sont de la  
 même couleur : les grandes les  
 plus éloignées du corps, sont  
 d'un cendré-noirâtre. L'aile  
 est composée de trente-sept plu-  
 mes de cette dernière couleur,  
 dont cependant le côté inté-  
 rieur est vers son origine d'une  
 couleur un peu plus claire. La  
 queue est composée de qua-  
 torze plumes : les deux du mi-  
 lieu sont cendrées : toutes les  
 autres sont d'un cendré un  
 peu rembruni, sur-tout sur le  
 côté extérieur ; & la plus ex-  
 térieure de chaque côté est  
 terminée de gris-blanc. Les deux

denticulatus. Alis expansis ;  
 extremitates majorum remi-  
 gum quatuor pedum & to-  
 tidem pollicum intervallo  
 distant ; alæ verò complicatæ  
 ad duas circiter tertias lon-  
 gitudinis caudæ partes ex-  
 tenduntur. Caput, guttur,  
 collum, pectus, ventrem,  
 latera & crura tingit color  
 dilutè cinereo-fuscus. Dor-  
 sum & scapulares pennæ co-  
 lore imbuuntur nonnihil sa-  
 turatiore : & quidem ex sca-  
 pularibus majores, quæ in-  
 feriores, ex cinereo nigri-  
 cant. Uropygium, tectrices-  
 que caudæ superiores & in-  
 feriores ex cinereo albeant.  
 Pennæ omnes alas subtus  
 obtegentes sunt cinereo-  
 fusca. Superiores alarum  
 tectrices minores, sicut &  
 majores corpori finitimæ,  
 concolores : majores à cor-  
 pore remotiores cinereo-ni-  
 gricantes. Alarum componunt  
 triginta septem remiges pa-  
 riter cinereo-nigricantes, in  
 latere tamen interiore ver-  
 sùs ipsarum exortum colore  
 nonnihil dilutiore imbutæ.  
 Quatuordecim tectricibus  
 cauda constat : binæ inter-  
 mediæ cinereæ : reliquæ om-  
 nes cinereo nonnihil fuf-  
 cescente, præsertim in la-  
 tere exteriori, imbutæ ;



utrinque extrema apice insuper cinereo-alba. Binæ rectrices intermediæ reliquas longitudine superant : laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis quinque pollicum & duarum linearum longitudine cedentem. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute rubrâ solummodo obducitur. Rostrum, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, similiter rubri; ungues verò rubescentes. In *Africa* & *America* maris littora frequentat. Longè etiam à littoribus quandoque discedit. *Ex museo Realmuriano.*

plumes du milieu de la queue sont les plus longues : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de cinq pouces deux lignes que les deux du milieu. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau rouge. Le bec, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de la même couleur; & les ongles sont rougeâtres. On le trouve sur les côtes d'*Afrique* & de l'*Amérique*. Ils s'avance très-loin en pleine mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**\*\* 4. LE FOU BLANC.**

*Sula candida*; remigibus majoribus fuscis; rectricibus candidis; oculorum ambitu nudo, rubro. . . . *SULA CANDIDA.*

Fou d'une autre sorte. *Du Tertre. Hist. des Antill. Tom. II. pag. 275.*

Primam hujus generis speciem crassitie nonnihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & septem pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes unum pollicem & quin-

Il est un peu plus gros que la première espèce de ce genre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce cinq lignes. Son bec depuis son bout



jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces de long ; sa queue dix pouces ; son pied un pouce neuf lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , trois pouces trois lignes , l'extérieur deux pouces onze lignes , l'intérieur deux pouces ; & celui de derriere quatorze lignes. L'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé intérieurement comme une scie. Il a cinq pieds deux pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête , la gorge , le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires , les couvertures du dessus & du dessous des ailes , & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur ; il faut cependant en excepter les grandes couvertures du dessus des ailes les plus éloignées du corps , qui sont brunes. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur : les moyennes sont blanches. La queue est composée de quatorze plumes pareillement blanches. Les deux du milieu sont les plus longues : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de

que lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices longum est ; cauda decem pollices ; pes unum pollicem & novem lineas ; trium digitorum anteriorum medius cum ungue tres pollices & totidem lineas , extimus duos pollices cum undecim lineis , intimus duos pollices ; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anteriorum medii unguis est interiorius , serræ instar , denticulatus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quinque pedum & duorum pollicum ; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput , guttur , collum , universumque corpus vestiunt pennæ candidæ. Scapulares , quæ alas superne & infernè cooperiunt , rectricesque caudæ superiores & inferiores concolores , exceptis tamen rectricibus alarum superioribus majoribus à corpore remotioribus fuscis. Remiges majores similiter fusæ : minores albæ. Caudam componunt quatuordecim rectrices pariter candidæ. Binæ intermediae reliquarum longitudinem ex-



cedunt : laterales omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis quinque pollicum & septem linearum longitudine cedentem. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute rubrâ solummodo oblitum. Rostrum, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, rubri; ungues verò rubescetes. In *Africa* & *America* juxta maris littora versatur. Longè etiam à littoribus quandoque discedit. *Ex museo Realmuriano.*

chaque côté, qui est plus court de cinq pouces sept lignes que les deux du milieu. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau rouge. Le bec, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes sont rouges; & les ongles rougeâtres. On le trouve sur les côtes d'*Afrique* & de l'*Amérique*. Il s'avance très-loin en pleine mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

\*\* 5. LE FOU DE BASSAN.

*Voyez Pl. XLIV.*

*Sula candida*; remigibus majoribus fuscis; rectricibus candidis; oculorum ambitu nudo, nigro . . . SULA BASSANA.

*Sula Hoieri. Clus. Exot. Aucluar. pag. 367.*

*Sula Hoieri, Clusii. Willugh. Ornith. pag. 249.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 123. N°. 5.*

*Pelecanus cauda cuneiformi, rostro serrato; remigibus primoribus nigris. Bassanus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 66. sp. 4.*

*Anser cinereus, oblongo, crassoque capite. Barr. Ornith. Class. I. Gen. II. sp. 4.*

*Anser Bassanus, sive Scoticus. Gesn. Avi. pag. 163, in qua hujus icon pessima.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 162.*

*Jonst. Avi. pag. 94.*

*Anser Bassanus vel Scoticus. Gesn. icon. Avi. pag. 83, in qua hujus icon pessima.*

*Anser Bassanus. Willugh. Ornith. pag. 247. hujus icon non satis accurata Tab. LXIII.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 122. N°. A. 2.*



*Charlet. Exer. pag. 100. N°. IV.*

*Charlet. Onomazt. pag. 95. N°. IV.*

*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20. hujus icon satis accurata Tab. 9. fig. 2; & insuper capitis & pedis icones satis accuratæ eâdem Tab. fig. 1 & 3.*

*Plancus, Anser Bassanus. Klein. Avi. pag. 143. N°. 2.*

*Graculus. Moehr. Avi. Gen. 66.*

*Oye de Soland. Alb. Tom. I. pag. 75; avec une figure peu exacte Pl. 86.*

*Les François l'appellent OYE DE BASSAN.*

*Les Allemands, SOLEND-GANSS ou SCHOTTEN-GANSS. Gefn.*

*Les Ecoissois, SOLEND-GUSE. Gefn. Aldrov. Jonst.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë, SULA. Cluf.*

*Les Anglois, SOLAND GOOSE. Willugh. Raj. Charlet. Alb.*

Il est à peu près de la longueur d'une Oye. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces trois lignes de long; sa queue neuf pouces; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces dix lignes; l'extérieur est de la même longueur; l'intérieur a deux pouces dix lignes de long; & celui de derrière treize lignes. L'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé intérieurement comme une scie. Il a cinq pieds trois pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la

Cum *Anfere* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & undecim pollices æquat; & ad extremos ungues duos pedes & septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & tres lineas longum est; cauda novem pollices; pes pollices binos; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & decem lineas; extimus eandem longitudinem obtinet; intimus duos pollices & decem lineas longus; posticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medii unguis est interiùs, ferræ instar, denticulatus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quinque pedum & trium pollicum;



pollicum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur, collum, univerſumque corpus pennis veſtiuntur candidis. Scapulares, quæ alas ſuperne & infernè cooperiunt, rectricesque caudæ ſuperiores & inferiores concolores; ex illis tamen excipiendæ ſunt ſuperiores alarum rectrices majores à corpore remotiores fuſcæ. Alarum componunt triginta ſeptem remiges, quarum novem primores ſunt fuſcæ, attamen in latere interiore verſus ipſarum exitum maximâ parte grifeæ: reliquæ omnes candidæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus ſimiliter candidis. Omnes ſunt valdè rigidæ. Binæ intermediæ reliquarum longitudinem antecellunt: laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam uſque binis intermediis ſex pollicum longitudine cedentem. Oculorum irides flavefcentes. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & ſolummodo cute nigrâ obſitum. In utroque capitis latere, ponè oris angulos,

queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur; il faut cependant en excepter les grandes couvertures du deſſus des aîles les plus éloignées du corps, qui ſont brunes. L'aîle eſt compoſée de trente - ſept plumes: les neuf premières ſont brunes, ayant cependant la plus grande partie de leur côté intérieur griſe, & cela vers leur origine: toutes les autres ſont blanches. La queue eſt compoſée de douze plumes de cette dernière couleur. Toutes ſont fort roides. Les deux du milieu ſont les plus longues: les latérales vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt plus courte de ſix pouces que les deux du milieu. L'iris des yeux eſt jaunâtre. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau noire. De chaque côté de la tête, derrière les coins de la bouche, eſt une bande longue d'un pouce, formée par une peau noire & dégarnie de plumes. Sous la gorge eſt une autre bande un peu plus



large que la précédente, longue d'un pouce neuf lignes, formée par une peau pareillement noire, & de même dégarnie de plumes. Ces trois bandes de peau s'élargissent prodigieusement, lorsque l'Oiseau ouvre le bec. Le dedans de la bouche est noir. Le bec est d'un cendré-bleuâtre. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont bruns : il y a cependant sur la partie antérieure du pied une raye verte, qui s'étend dans toute sa longueur, & se divise ensuite en quatre rayes, chacune desquelles s'étend sur un des doigts selon sa longueur. On le trouve pendant l'été dans l'*Isle de Bals* ou *Bassan*, où il fait son nid. Il s'en éloigne quelquefois. *M. de Reaumur* en avoit un dans son cabinet, qui lui avoit été envoyé de *Boulogne* par *M. de Colambert*.

tania extat pollicis unius longitudinem obtinens, quæ cute nigrâ & plumis denudatâ conflatur. Sub guttore altera adest fascia nonnihil præcedente latior, unum pollicem & novem lineas longa, quamque pariter efficit cutis nigra, & similiter plumis denudata. Quæ tres fasciæ cutaceæ, dum Avis rostrum aperit, maximam latitudinem acquirunt. Os intus nigrum est. Rostrum cinereo-cœrulescens. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque fusci : in parte tamen pedis anteriore tania extat viridis, per totam illius longitudinem extensa, dein in quatuor tancias divisa, quarum quælibet supra unumquemque digitum secundum ipsius longitudinem protenditur. Habitat æstate in *Insula*

*Bassa* sive *Bassana* ; in eaque nidificat. Ab illa quandoque discedit. Una servabatur in museo *Reaumuriano*, in quod à *Bononia* missa fuerat à *D. de Colambert*.

## 6. LA FRÉGATE.

*Voyez le mâle Pl. XLIII. Fig. 2. A.*

Sula in toto corpore nigra ; caudâ bifurcâ ; oculorum ambitu nudo, nigro. (*Mas*).

Sula nigra, ventre albo ; caudâ bifurcâ ; oculorum ambitu nudo, nigro. (*Fœmina*) . . . . FREGATA,



- Fregata Avis Rochefortio & Du Tertre. Raj. Syn. Avi. pag. 153.*  
*Fregata marina*, apus, subtus alba, superne nigra. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. VIII. sp. 1. (Fœmina.)*  
*Pelecanus cauda forficata*, corpore nigro, capite abdomineque albis. *Aquilus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 66. sp. 2.*  
*Rabihorcado. Euf. Nieremb. pag. 221, in qua hujus icon minimè accurata.*  
*Willugh. Ornith. pag. 306. hujus icon ab Eusebio Nierembergio mutuata Tab. LXXVII.*  
*Rabihorcados todos negros de Oviedo. Raj. Syn. Avi. pag. 192. N°. 15.*  
*Avis Raboforcado Lusitanis. Petiv. Gaz. Nat. hujus icon ab Eusebio Nierembergio mutuata Tab. LIV. fig. 1.*  
*Caripira. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 575. Jonst. Avi. pag. 150.*  
*Hirundo marina major*, apus, rostro adunco. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 133.*  
*Alcyon major pulla*, caudâ longiori bifurcâ. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 483.*  
*Atagen. Moehr. Avi. Gen. 108.*  
*Frégate. Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 269; avec une mauvaise figure pag. 246. N°. 10.*  
*Frégate ou Vultur marinus leucocephalos. Feuillée. Jour. des Obs. phys. pag. 107. (ed. 1725). (La femelle).*  
*Oiseau de Frégates. Alb. Tom. III. pag 33; avec une mauvaise figure Pl. 80.*  
*Les Espagnols l'appellent RABIHORCADO. Nieremb. Willugh. Raj. RABO-FORCADO. De Laët. Jonst.*  
*Les Portugais, RABOFORCADO. Nieremb. Petiv. Willugh. Raj.*  
*Les Anglois, FRIGATE-BIRD. Alb.*  
*Les Anglois de la Jamaïque, MAN OF WAR BIRD. Browne.*

Hæc Alitis species non nisi valdè imperfectè descripta fuit. Secundùm *du Tertre* crassitie *Gallinam* nequaquam antecellit. Collum habet mediocris longitudinis; caput parvum; oculos magnos & nigros; rostrum sex septemve pollices longum; pedesque valdè breves.

Cette espece d'Oiseau n'a encore été décrite que très-imparfaitement. Selon *du Tertre*, elle n'est pas plus grosse qu'une Poule. Son col est d'une longueur mediocre; sa tête petite; ses yeux grands & noirs; son bec long de six à sept pouces; & ses pieds fort courts. Elle a sept à huit pieds de vol. *M*



*Poivre*, qui a bien voulu me prêter le dessin qu'il en a fait, & sur lequel je l'ai fait graver, m'a dit lui avoir trouvé près de quatorze pieds de vol. Tout son corps est couvert de plumes noires. Celles des aîles & celles de la queue sont de la même couleur. Les deux plumes du milieu de la queue sont les plus courtes : toutes les latérales vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus longue ; ce qui rend la queue très - fourchue. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau noire. Le mâle, lorsqu'il est vieux, a deux membranes charnues, d'un rouge vif, qui pendent sous la gorge. Le bec, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont noirs.

branis carnis, coccineis, sub pedes, digiti, sicut & ipsorum

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le ventre blanc. Du reste elle lui ressemble parfaitement.

On les trouve en *Amérique*. Elles vont très-loin en mer, & se nourrissent de *Poissons*.

Alis expansis, extremitates majorum remigum septem aut octo pedum intervallo distant. *D. Poivre*, qui illius iconem ab ipso depictam mihi communicavit, ex qua icone eam aeri insculptam esse curavi, ab extremo ad extremum alarum extensarum quatuordecim ferè pedum distantiam observavit. Universum corpus vestiunt pennæ nigrae. Alarum remiges, & caudæ rectrices concolores. Binæ rectrices intermediae reliquis longitudine cedunt : laterales omnes gradatim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extimam usque longiorem ; unde fit cauda valdè bifurca. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute nigrâ tantùm obducitur. Mas, jam ad senectutem perventus, binis donatur membris pendulis. Rostrum, membranae, unguesque nigri.

*Fœmina* à mare discrepat ventre albo. In reliquis cum illo perfectè convenit.

Habitant in *America*. A littoribus maris longissimè discedunt, & *Piscibus* vicitant.



7. LA PETITE FRÉGATE.

*Sula fusco-ferruginea*; collo inferiore & pectore albis; re-  
trixibus fusco-ferrugineis; caudâ bifurcâ; oculorum am-  
bitu nudo, rubro . . . . FREGATA MINOR.

Frégate. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 209. chap. XCIX; avec une  
figure exacte Pl. 309.*

*Les Anglois l'appellent MAN OF WAR BIRD. Edwards.*

Præcedenti crassitie cedit.  
Ipsius longitudo ab apice  
rostri ad caudæ extremitatem  
duos pedes novem pollices  
& totidem circiter lineas  
explet, & ad extremos un-  
gues duos pedes. Rostrum  
ab ipsius extremitate ad oris  
angulos quinque pollices  
longum est; cauda duode-  
cim pollices & tres lineas;  
pes novem lineas; trium di-  
gitorum anticorum medius  
cum ungue duos pollices,  
extimus unum pollicem &  
octo lineas, intimus unum  
pollicem cum quinque li-  
neis; posticus autem unde-  
cim lineas. Alis expansis,  
extremitates majorum remi-  
gum quinque pedum septem  
pollicum & sex circiter li-  
nearum intervallo distant;  
alæ verò complicatæ cau-  
dam ferè extremam attingunt.  
Caput, partem colli  
superiorem, dorsum, uro-  
pygium, pennas scapulares,

Elle n'est pas si grosse que la  
précédente. Sa longueur depuis  
le bout du bec jusqu'à celui de  
la queue est d'environ deux pieds  
neuf pouces neuf lignes, & jus-  
qu'à celui des ongles de deux  
pieds. Son bec depuis son extré-  
mité jusqu'aux coins de la bou-  
che a cinq pouces de long; sa  
queue douze pouces trois lig-  
nes; son pied neuf lignes; ce-  
lui du milieu des trois doigts  
antérieurs, joint avec l'ongle,  
deux pouces, l'extérieur un  
pouce huit lignes, l'intérieur  
un pouce cinq lignes; & celui  
de derrière onze lignes. Elle a  
environ cinq pieds sept pouces  
six lignes de vol; & ses ailes,  
lorsqu'elles sont pliées, s'étend-  
ent presque jusqu'au bout de  
la queue. La tête, la partie  
supérieure du col, le dos, le  
croupion, les plumes scapulai-  
res, les couvertures du dessus  
& du dessous des ailes, le ven-  
tre, les côtés, les jambes, &  
les couvertures du dessus & du



deffous de la queue font d'un brun-ferrugineux. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine font blanches. L'aîle est composée d'environ trente plumes, toutes d'un brun-ferrugineux. La queue est composée de dix plumes de la même couleur. Les deux du milieu font les plus courtes : toutes les latérales vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est une fois plus longue que les deux du milieu ; ce qui rend la queue très-fourchue. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau rouge. Dans cette espece les narines font apparentes, & placées sur le demi-bec supérieur, assez près de la tête. Le bec est rouge. Les pieds & les doigts font d'un jaunâtre sale ; leurs membranes, qui font fort échancrées, font de la même couleur.

fordide flavicantes ; ipsorum membranæ, quæ quidem maximè emarginatæ, concolores.

C'est peut-être la femelle de la précédente.

testrices alarum superiores & inferiores, ventrem, latera, crura, & pennas caudam superne & infernè cooperientes tingit fusco-ferrugineus color. Guttur, pars colli inferior & pectus alben. Alarum componunt triginta circiter remiges, omnes fusco-ferrugineæ. Decem rectricibus concoloribus cauda constat. Binæ intermediae reliquis longitudine cedunt : laterales omnes gradatim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extremam usque binarum intermediarum duplici longitudine pollentem ; unde fit cauda valdè bifurca. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute rubrâ solummodo obsitum. Hujus speciei nares sunt conspicuæ, & supra mandibulam superiorem, non longè à capite, collocatæ. Rostrum rubrum. Pedes & digiti

An præcedentis fœmina?





2. Frégate, mâle.









Designé d'Ornæ par Martini.

1. Fou brun.

2. Frégate, mâle.










*Fou de Basan.*









Dessiné et Gravé par Martinet.

*Fou de Bassan.*







CXI.

CXI.

*Genus Phalacrocoracis.*

*Le genre du Cormoran.*

Hujus character est  
Digitiquatuor, omnes mem-  
branis integris inter se  
connexi :

Crura circa corpus medium  
& extra abdomen posita,  
corpore breviora :

Rostrum rectum, subcylin-  
draceum, apice adun-  
cum.

In hujus generis Avibus  
trium digitorum anticorum  
medii unguis est interiùs,  
serræ instar, denticulatus.

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, tous joints en-  
semble par des membranes  
entieres :

Les jambes avancées vers le  
milieu du corps & hors de  
l'abdomen, & plus courtes  
que le corps :

Le bec droit, presque cylin-  
drique, & crochu vers le  
bout.

Dans les Oiseaux de ce genre  
l'ongle de celui du milieu des  
trois doigts antérieurs est den-  
telé intérieurement comme une  
scie.

\*\* I. LE CORMORAN.

*Voyez Pl. XLV.*

Phalacrocorax cristatus, superne cupri colore obscuro tinc-  
tus & ad viride inclinans, marginibus pennarum nigro-  
virescentibus, infernè nigro-virescens, uropygio concolo-  
re; capite superiore & collo supremo lineolis longitudi-  
nalibus albis variegatis; gutture & maculâ ad crura exte-  
riora candidis; rectricibus nigricantibus . . . PHALACRO-  
CORAX.

Phalacrocorax. *Gesn. Avi. pag. 683.*  
*Jonst. Avi. pag. 95.*  
*Charlet. Exer. pag. 100. N°. V.*  
*Charlet. Onomazet. pag. 95. N°. V.*



- Phalacrocorax* five *Corvus aquaticus* Plinii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 267. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 269.*
- Corvus aquaticus. Gesn. Avi. pag. 350.*  
*Gesn. icon. Avi. pag. 84, in qua hujus icon non satis accurata.*  
*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 261. hujus icon non satis accurata pag. 263.*  
*Jonst. Avi. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 47.*  
*Willugh. Ornith. pag. 248. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXIII.*
- Raj. Syn. Avi. pag. 122. N°. A. 3.*  
*Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*  
*Mus. Best. pag. 29. N°. 1. hujus icon non satis accurata Tab. VIII. N°. 1.*  
*Marfil. Danub. Tom. V. pag. 76. hujus icon pessima Tab. 36.*
- Corvus aquaticus major, seu Mergus magnus niger Gesneri. Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 374.*
- Corvus lacustris. Schwenck. Avi. Sil. pag. 246.*  
*Corvus Sinarum marinus. Euf. Nieremb. pag. 224.*  
*Carbo aquaticus. Gesn. Avi. pag. 136. hujus icon non satis accurata pag. 137.*  
*Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 50. sp. 2.*
- Plancus Corvus lacustris, aquaticus, Gesneri. Klein. Avi. pag. 144. N°. 5.*
- Pelecanus subtus albicans; rectricibus quatuordecim. Faun. Suec. Linn. N°. 116.*
- Pelecanus cauda æquali, corpore nigro, rostro edentulo. Carbo. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 66. sp. 3.*
- Mergus magnus niger, Nonnullis. Gesn. Schwenck. Klein. Morfex. Gesn. Avi. pag. 136.*  
*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 286.*  
*Jonst. Avi. pag. 89.*  
*Charlet. Exer. pag. 102. N°. 8.*  
*Charlet. Onomazt. pag. 96. N°. 8.*
- Cormorant. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 161; avec une mauvaise figure pag. 162.*  
*Bel. Portr. d'Ois. pag. 32 b, dans laquelle est la même figure.*  
*Alb. Tom. II. pag. 53; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 81.*  
*Les Bourguignons l'appellent CROT PESCHEROT. Gesn. Aldrov.*  
*Les Grecs, Φαλακροκοράξ. Bel. Aldrov. Κορογι θαλασσιος. Bel.*  
*Les Espagnols, CUERVO CALVO. Gesn. Aldrov.*  
*Les Italiens, CORVO MARINO. Bel.*  
*Les Allemands, SCHARB; NEZE-SCHARB. Gesn. Aldrov. WASSER-RABE. Schwenck. Rzac. SCHALUCHORN. Gesn. Aldrov. Schwenck. SCALVEREN; DUCHER; & quelques-uns, VUCHT-ARSZ ou FEUCHT-ARSZ. Gesn. FEUCHT ARS. Schwenck.*



*Ceux qui habitent le Duché de Stein, SCHULVEREN. Gefn.*

*Les Bas-Allemands, SCOLUCHERETZ ou SCOLUCHEREN. Gefn. Aldrov.*

*SCHWEMMER-GANSZ. Gefn.*

*Les Silésiens, SEE RABE. Schwenck. Rzac.*

*Les Polonois, KRUK WODNY. Rzac.*

*Les Suédois, HAFS-TJAEDER. Linn.*

*Les Norvégeois, SKARY.*

*Les Habitans de l'Isle Ferroë, HUPLING.*

*Les Anglois, CORMORANT. Gefn. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Mus. Best. Alb.*

*Les Anglois qui habitent la Province de Cornouaille, SHAGG. Charlet. Mus. Best.*

*Ceux qui habitent l'Isle de Wigt ou Ought, LESSER PUFFIN. Charlet.*

*Craffitie Anatem moschatam paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes septem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes sex pollices & totidem lineas. Rostrium ab ipsius unco ad oris angulos usque tres pollices & septem lineas longum est; cauda sex pollices; pes duos pollices & tres lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum linea unica, extimus tres pollices & decem lineas, intimus duos pollices cum tribus lineis; posticus autem octodecim lineas. Digiti omnes sunt valde crassi. Trium digitorum anticorum medii unguis est interiùs, ferræ instar, denticulatus. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum unius*

Il est un peu plus gros que le *Canard musqué*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds sept pouces six lignes; & jusqu'à celui des ongles de deux pieds six pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces sept lignes de long; sa queue six pouces; son pied deux pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces une ligne, l'extérieur trois pouces dix lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derrière dix-huit lignes. Tous les doigts sont très-gros. L'ongle de celui du milieu des trois antérieurs est dentelé intérieurement comme une scie. Il a quatre pieds un pouce six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce



au-delà de l'origine de la queue. Le dessus de la tête & la partie du col qui en est la plus proche, sont d'un noir-verd, varié de petites lignes longitudinales blanches, formées par une pointe longue & déliée de cette couleur, dont chaque plume est terminée. Sur l'occiput sont quelques plumes plus longues & plus larges que les autres, qui forment une hupe étroite & longue d'environ deux pouces : ces plumes ne sont point terminées de blanc. La gorge est blanche : cette couleur remonte de chaque côté jusqu'aux yeux, & y forme une bande d'environ neuf lignes de largeur. Tout le reste du col, la partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un noir-verd. Les jambes sont de la même couleur ; elles sont cependant marquées d'une grande tache blanche, placée sur leur côté extérieur. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'une couleur de cuivre obscure & tirant un peu sur le verd, chaque plume étant bordée de noir-verd dans toute sa circonférence. Les couvertures du dessous des ailes sont

pollicis & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput superius & pars colli capiti finitima nigro-virescente tinguntur, & lineolis variegantur longitudinalibus albis, quas lineolas efformant mucrones longiusculi, gracilesque concolores, quibus unaquæque penna terminatur. In occipitio quædam extant pennæ reliquis longiores & latiores, strictam cristam, duos circiter pollices longam, efficientes : quæ pennæ nequaquam albo terminantur. Guttur candidat : candor autem utrinque ad oculos usque producit, ibique tæniam efficit novem circiter linearum latitudine pollentem. Reliquum collum, dorsi pars infima, uropygium, pectus, venter, latera, tectricesque caudæ superiores & inferiores ex nigro virescunt. Crura eodem colore tinguntur ; sed majusculâ notantur maculâ candidâ, in ipsorum latere exteriori positâ. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices cupri colore tinguntur obscuro, nonnihil ad viride inclinante, unaquæque pennâ



in tota circumferentia nigro-virescente marginatâ. Pennæ alas subtus obtegentes sunt nigricantes, viridi adumbratæ. Triginta & unâ remigibus ala conflatur : majores eodem imbuuntur colore ac inferiores alarum tectrices ipsæ tinguntur : minores superioribus alarum tectricibus concolores : quæ tamen novissimè dictæ ipsarum tectricibus minùs splendentes, & in illis margo non ita conspicua. Caudam componunt quatuordecim rectrices nigricantes. Binæ intermediae lateraliùm longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis duorum pollicum & totidem linearum longitudine cedentem ; unde fit cauda in extremitate rotundata. Oculorum pupilla cœrulescens : ipsorum irides virescentes. Palpebræ punctulis ex albo ad violaceum vergentibus ad margines sunt notatæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute rostrum inter & oculum nigricante, infra oculum ad oris angulos usque aurantiâ, ob-

d'un noirâtre nuancé de verd. L'aîle est composée de trente-une plumes : les grandes sont de la même couleur que les couvertures du dessous des aîles : & les moyennes sont de la même couleur que les couvertures du dessus : ces dernières sont cependant moins brillantes que leurs couvertures, & leur bordure est moins apparente. La queue est composée de quatorze plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de deux pouces deux lignes que les deux du milieu ; ce qui rend le bout de la queue arrondi. La prunelle des yeux est bleuâtre : leur iris est verdâtre. Les bords des paupieres sont marqués de petits points d'un blanc tirant sur le violet. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau, qui entre le bec & l'œil est noirâtre ; au-dessous de l'œil jusqu'aux coins de la bouche elle est orangée. D'un coin de la bouche à l'autre, en passant par-dessous la gorge, s'étend aussi une peau nue, variée de noirâtre & de jaune-



olivâtre : cette peau se prolonge sous le bec jusque vers son extrémité, & s'étend prodigieusement, lorsque l'Oiseau avale quelque Poisson. Le bec est d'un cendré qui se rembrunit un peu sur sa partie supérieure ; & l'origine du demi-bec inférieur tire un peu sur le couleur de chair. Les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont d'un très-beau noir. On le trouve sur les bords de la mer & dans les marais. Il fait son nid tantôt dans les rochers, tantôt sur les arbres les plus élevés. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

situm. Ab oris angulo ad oris angulum, sub gutture procedendo, cutis quoque extenditur nuda, nigricante & flavo-olivaceo variegata : quæ cutis sub rostro versus ipsius extremitatem usque producit, & dum Avis Piscem deglutit, maximè dilatatur. Rostrum cinereum, supra partem superiorem non nihil ad fuscum inclinans ; mandibulæ inferioris exortus paululùm insuper ad carneum colorem vergit. Pedes, digiti, sicut & ipsorum membranæ, unguesque splendidissimo nigro imbuti. Juxta maris littora versatur, paludesque frequentat. Modò in rupibus, modò in arboribus excelsis nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

## \*\* 2. LE PETIT CORMORAN.

*Phalacrocorax superne nigro-viridescens, infernè cinereo-albus ; gutture candido ; imo ventre griseo-fusco ; rectricibus nigricantibus . . . . PHALACROCORAX MINOR.*

*Pelecanus subtus fuscus ; rectricibus duodecim. Faun. Suec. Linn. N°. 117.*

*Graculus palmipes. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 50. sp. 3.*

*Graculus palmipes Aristotelis, seu Corvus aquaticus minor. Aldrov. Avi. Tom III. pag. 272. hujus icon non satis accurata pag. 273.*

*Jonst. Avi. pag. 95. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 47.*

*Graculus palmipes, Corvus marinus, Mergus magnus niger. Charlet. Exer. pag. 101. N°. VI.*

*Charlet. Onomazt. pag. 95. N°. VI.*

*Corvus aquaticus minor. Rzac. Auc. Hist. Nat. Pol. pag. 375.*



*Corvus aquaticus minor*, sive *Graculus palmipes*. *Willugh. Ornith. pag. 249. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXIII. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 20.*

*Corvus aquaticus minor*, *Graculus palmipes dictus*. *Raj. Syn. Avi. pag. 123. N°. A. 4.*

*Plancus Corvus minor*, *aquaticus*. *Klein. Avi. pag. 145. N°. 6.*

*Cormoran*. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. pag. 213 ; avec une figure peu exacte Pl. 31.*

*Les Anglois l'appellent SHAG. Willugh. Sibbald. SHAGGE. Willugh. Raj. SEA-CROW ; COWT. Charlet.*

*Les Anglois Septentrionaux, CRANE. Willugh. Raj.*

*Præcedenti multum crassitie cedit. Ipsi longitudine ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & tres pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes unum pollicem & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque tres pollices longum est ; cauda quinque pollices & sex lineas ; pes quindecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & octo lineas, extimus tres pollices cum totidem lineis, intimus duos pollices ; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medii unguis est interiùs, ferræ instar, denticulatus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & sex pollicum ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum nequaquam protrahuntur. Partes capitis &*

*Il est beaucoup moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long ; sa queue cinq pouces six lignes ; son pied quinze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces huit lignes, l'extérieur trois pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces ; & celui de derrière quinze lignes. L'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé intérieurement comme une scie. Il a trois pieds six pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas au-delà de l'origine de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus*



& du dessous de la queue sont d'un noir-vert assez brillant. La gorge est blanche. La partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un gris-blanc. Le bas-ventre, les jambes & les côtés sont d'un gris-brun. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un gris varié de blanchâtre. Les petites & les moyennes du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. L'aîle est composée de trente plumes : les grandes sont de la même couleur que ces dernières couvertures : les moyennes sont d'un noir-vert. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte ; ce qui rend le bout de la queue arrondi. L'iris des yeux est d'un rouge clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau rouge. Le demi-bec supérieur est noir ; l'inférieur est d'un gris-rougeâtre dans les uns, & d'un verd-jaunâtre dans d'au-

colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, tectricesque caudæ superiores & inferiores sunt splendide nigro-viridescentes. Guttur albicat. Pars colli inferior, pectus & venter supremus cinereo-albo colore tinguntur. Venter imus, crura & latera ex griseo fuscescunt. Pennæ alas subtus obtegentes sunt griseæ, albido variegatæ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores nigricantes. Alam componunt triginta remiges, quarum majores eodem imbuuntur colore ac nuper descriptæ tectrices ipsæ tinguntur : minores ex nigro viridescunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda constat. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē ; unde fit cauda in extremitate rotundata. Oculorum irides dilute rubræ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute rubrâ obsitum. Mandi-













Desiné et Gravé par Martinet.

*Cormoran.*







LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXV.* 519  
 bula superior nigra; inferior  
 in aliis griseo-rubescens, in  
 alteris viridi-flavicans. Pedes  
 & digiti, sicut & ipforum  
 membranæ, fusci; ungues  
 verò nigri. Juxta maris littora  
 versatur, lacusque frequen-  
 tat. Præcedentis instar, mo-  
 dò in rupibus, modò in ar-  
 boribus nidificat. *Ex museo  
 Realmuriano.*

tres. Les pieds & les doigts,  
 ainsi que leurs membranes, sont  
 bruns; & les ongles noirs. On  
 le trouve sur les bords de la mer  
 & sur les lacs. Comme le pré-  
 cédent, il fait son nid tantôt  
 dans les rochers, tantôt sur  
 les arbres. *Du cabinet de M. de  
 Reaumur.*

CXII.

CXII.

*Genus Onocrotali.*

*Le genre du Pélican.*

Hujus character est  
 Digiti quatuor, omnes mem-  
 branis integris inter se  
 connexi :  
 Crura circa corpus medium  
 & extra abdomen posita,  
 corpore breviora :  
 Rostrum rectum, horizonta-  
 liter planum, apice adun-  
 cum :  
 Guttur bursâ inflabili inf-  
 tractum.  
 In omnibus hujus generis  
 Avibus nares nequaquam  
 sunt conspicuæ.

Son caractère est d'avoir  
 Quatre doigts, tous joints en-  
 semble par des membranes  
 entieres :  
 Les jambes avancées vers le  
 milieu du corps & hors de  
 l'abdomen, & plus courtes  
 que le corps :  
 Le bec droit, applati horizon-  
 talement & crochu vers le  
 bout :  
 Une poche membraneuse sous  
 la gorge.  
 Tous les Oiseaux de ce genre  
 n'ont point de narines apparen-  
 tes.

\*\* I. LE PÉLICAN.

Onocrotalus albus, ad carneum colorem nonnihil inclinans;  
 remigibus majoribus nigris; rectricibus candidis . . . .  
 ONOCROTALUS.



- Onocrotalus gula faccata. Linn. *Systh. Nat. ed. 6. Gen. 50. sp. 1.*  
 Onocrotatus. *Gesn. Avi. pag. 630, in qua hujus icon minùs accurata.*  
*Gesn. icon. Avi. pag. 94, in qua eadem icon.*  
*Bell. Obs. pag. 90.*  
*Charlet. Exer. pag. 100. N<sup>o</sup>. 1.*  
*Charlet. Onomazt. pag. 94. N<sup>o</sup>. 1.*  
*Moehr. Avi. Gen. 65.*  
 Onocrotalus seu Pelecanus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 42. hujus icones non satis accuratæ, maris pag. 48, & fæminæ pag. 49.*  
 Onocrotalus live Pelecanus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 246. hujus icon non satis accurata Tab. LXIII.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 121. N<sup>o</sup>. 1.*  
 Onocrotalus, live Pelecanus Aldrovandi, Willughbei. *Marsil. Danub. Tom. V. pag. 74. hujus icon satis accurata Tab. 35.*  
 Onocrotalus, seu Pelicanus. *Jonst. Avi. pag. 91. maris & fæminæ icones ab Aldrovando mutuata Tab. 46.*  
 Onocrotalus, Truo. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 311.*  
 Onocrotalus Avis. *Bont. Ind. Ori. pag. 67. hujus icon minimè accurata pag. 68.*  
 Onocrotalus Plinio; Pelicanus Bellonio, Aldrovando; Truo Festo. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 288.*  
 Onocrotalus Gæneri; Pelecanus Bellonii & Aldrovandi; Truo Festi. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 399.*  
 Pelicanus gula faccata. Onocrotalus. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 66. sp. 1.*  
 Plancus Gulo. Onocrotalus albus. *Klein. Avi. pag. 142. N<sup>o</sup>. 1.*  
 Atototl, Onocrotalus Mexicanus non dentatus. *Hernand. Hist. Mex. pag. 673, in qua hujus icon minimè accurata.*  
 Alcatraz. *Euf. Nieremb. pag. 223.*  
 Pelican. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 153; avec une mauvaise figure pag. 154.*  
*Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag. 189; avec une figure exacte Pl. 26.*  
*Edwards. Tom. II. pag. XCII; avec une figure exacte Pl. 92.*  
 Pelican, Livane. *Bel. Port. d'Ois. pag. 306, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*  
 Les Hébreux l'appellent KIK ou HAKIK. *Aldrov.*  
 Les Chaldéens, CATHA. *Aldrov.*  
 Les Arabes, KUK. *Aldrov. ALHAUTEL. Klein. ALHAUSAL. Charlet.*  
 Les Perses, KIK. *Aldrov.*  
 Les Grecs, Οὐκροταλός. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Πελικαν. Aldrov. Πελικάνος. Bel.*  
 Les Turcs, SACKAGUSCH. *Gesn. Aldrov.*  
 Les Espagnols, GRÓTO. *Gesn. Aldrov.*



# LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXV.* 521

*Les Italiens*, GROTTO; GROTTO MARINO; AGROTTO; UCCELLO D'EL  
DUCHA. *Gesn. Aldrov.* GROTTO MOLINARO. *Gesn. Aldrov. Marfil.*  
PELECANO. *Aldrov.*

*Les Romains*, TRUO. *Charlet. Klein.*

*Les Habitans de Mantouë*, AGROTTI. *Bel.*

*Les Habitans de Sienne*, AGROTTI. *Bel.* AGROTTO. *Aldrov.*

*Les Savoyards aux environs du Lac de Genève & de Lausanne*, GOUT-  
TREUSE. *Gesn. Aldrov. Charlet.*

*Les Allemands*, MEER - GANSS. *Gesn.* SACK - GANS; SCHNEE - GANS.  
Schwenck. Rzac. KROPF - GANS. Rzac. KROPFF - GANS; VIELFRAS  
Schwenck.

*Les Bas-Allemands aux environs de Malines*, VOGEL - HEINE. *Gesn.*  
*Aldrov.*

*Les Autrichiens*, ON-VOGEL. *Gesn. Aldrov.* OHN-VOGEL. *Schwenck.*

*Les Polonois*, BAK; BAK CUDZOZIEMSKI. *Rzac.*

*Les Russiens*, BABA. *Rzac.*

*Les Suédois*, WATTUDRAGAREN. *Linn.*

*Les Flamands*, VOKEL VAN ETNA. *Bel. Aldrov.*

*Les Brabançons*, LIVANE ou LIBANE. *Bel. Gesn.*

*Les Anglois*, PELECAN. *Willugh. Raj.* PELLICAN. *Charlet.*

*Les Mexiquains*, ALCATRAZ. *Aldrov.* ATOTOTL. *Hernand.*

Duplicem ferè *Cygni* craf-  
titiem obtinet. Ipsi longi-  
tudo ab apice rostri ad cau-  
dam extremam quinque pe-  
des duos pollices & novem  
lineas æquat, & ad extre-  
mos ungues quinque pedes  
& tres pollices. Rostrum ab  
ipsius unco ad oris angu-  
los, ultra oculos protensos,  
unum pedem & quinque pol-  
lices longum est, & per to-  
tam ferè longitudinem unius  
pollicis & octo linearum la-  
titudine pollet. Cauda sep-  
tem pollices longa; pes tres  
pollices cum lineis binis;  
trium digitorum anticorum  
medius cum ungue quatuor

*Tom. VI.*

Il a presque le double de la  
grosseur d'un *Cygne*. Sa longueur  
depuis le bout du bec jusqu'à  
celui de la queue est de cinq  
pieds deux pouces neuf lignes,  
& jusqu'à celui des ongles de  
cinq pieds trois pouces. Son  
bec depuis son crochet jus-  
qu'aux coins de la bouche, qui  
s'étendent au-delà des yeux, a  
un pied cinq pouces de long,  
& un pouce huit lignes de large  
dans presque toute sa longueur;  
sa queue sept pouces; son pied  
trois pouces deux lignes; ce-  
lui du milieu des trois doigts  
antérieurs, joint avec l'ongle,  
quatre pouces dix lignes, l'ex-  
térieur quatre pouces sept lig-

Vuu



nes, l'intérieur trois pouces six lignes; & celui de derriere deux pouces deux lignes. Il a onze pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un blanc tirant tant soit peu sur le couleur de chair. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur; dans quelques-uns il y a cependant quelques petites plumes noires sur le bord de l'aîle vers le pli qui répond à celui du coude. Les plumes qui couvrent le col, sont fort petites; & ressemblent à du duvet: celles de l'occiput sont un peu plus longues que les autres, & forment une espece de hupe. Les grandes plumes de l'aîle sont noires: les moyennes sont blanches. La queue est composée de vingt plumes de cette dernière couleur. Les deux du milieu sont tant soit peu plus longues que les latérales. Les côtés de la tête sont dégarnis de plumes, & couverts seulement d'une peau d'un couleur de chair clair. Les yeux sont placés dans cet espace nud: leur iris est d'un gris-jaunâtre dans les uns, & de couleur de

pollices & decem lineas, extimus quatuor pollices & septem lineas, intimus tres pollices cum sex lineis; posticus autem duos pollices & lineas binas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pedum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, collum, universumque corpus vestiunt pennæ albæ, ad carneum colorem non nihil inclinantes. Scapulares, alas superne & infernè cooperientes, rectricesque caudæ superiores & inferiores concolores; in aliquibus tamen quædam sunt plumulæ nigræ, ad margines alarum, versùs articulum cubito humano respondentem, positæ. Pennæ collum obtegentes sunt minutissimæ, & lanuginis æmulæ: quæ occipitium cooperiunt, reliquis paulò longiores, & cristam quodammodo efficientes. Remiges alarum majores sunt nigræ: minores candidæ. Cauda viginti constat rectricibus similiter candidis. Binæ intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt. Caput ad latera plumis denudatur, & cute carneo colore diluto tinctâ solummodo obducitur. In illo spatio plumis de-



rudato oculi siti sunt : ipso-  
rum irides in aliis griseo-flavi-  
cantes, in alteris obscurè avel-  
laneæ. Supra mandibulam su-  
perioiorem costa quædam at-  
tollitur coccinea, per totam  
illius longitudinem extensa,  
& unco satis acutò termina-  
ta : mandibula superior in re-  
liquis versùs ipsius exortum  
pallidè rubet, versùs extre-  
mitatem flavicat : mandibula  
inferior penitùs pallidè ru-  
bet. Bursa inflabilis sub gut-  
ture pendula, & per totam  
mandibulæ inferioris longi-  
tudinem extensa, illiusque  
bina latera connectens, fla-  
vescit. Pedes & digiti, sicut  
& ipsorum membranæ,  
plumbeo colore imbuti ; un-  
gues verò grisei. Juxta maris  
littora versatur, & flumina  
magna, lacusque frequentat.  
*Ex museo Realmuriano.*

noisette sombre dans d'autres.  
Sur le demi-bec supérieur s'é-  
lève une espece de côte d'un  
rouge vif, qui s'étend dans  
toute sa longueur, & se termine  
par un crochet assez pointu :  
le reste du demi-bec supérieur  
est d'un rouge pâle vers son  
origine, & jaunâtre vers son  
extrémité : le demi bec infé-  
rieur est entièrement d'un rouge  
pâle. La poche membraneuse  
qui est sous la gorge, & qui s'é-  
tend dans toute la longueur du  
demi-bec inférieur, dont elle  
réunit les deux côtés, est jau-  
nâtre. Les pieds & les doigts,  
ainsi que leurs membranes, sont  
de couleur de plomb ; & les on-  
gles gris. On le trouve sur les  
bords de la mer, sur les grandes  
rivieres & sur les lacs. *Du ca-  
binet de M. de Reaumur.*

A. LE PÉLICAN A BEC DENTELÉ.

*Onocrotalus rostro denticulato.*

Atototl Alcatraz, *Onocrotalus Mexicanus dentatus. Hernand. Hist. Mex. pag. 672, in qua hujus icon non satis accurata.*  
Atototl, seu Avis aquatica. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 41. cap. CXAVIII.*  
*Les Mexiquains l'appellent ATOTOTL ; ALCATRAZ. Hernand.*

A præcedente solummodo  
differt rostro denticulato, &  
croceo colore imbuto. Pe-  
des & digiti, sicut & ipso-

Il ne diffère du précédent  
qu'en ce que son bec est den-  
telé, & de couleur de safran.  
Ses pieds & ses doigts, ainsi  
Vu u ij



que leurs membranes, sont de couleur de safran tirant sur le rouge. On le trouve au *Mexique*. *rum membranæ, ex croceo colore ad rubrum inclinant. Habitat in Mexico.*

**\*\* 2. LE PÉLICAN BRUN.**

*Onocrotalus cinereo-fuscus*, superne mediis pennarum candidantibus; capite & collo candidis; remigibus majoribus nigris; rectricibus cinereo-fuscis . . . . *ONOCROTALUS FUSCUS.*

*Onocrotalus* pedibus cœruleis & brevioribus, rostro cochleato. *Feuillee. Journ. des Obs. phys. pag. 257. (ed. 1725).*

*Onocrotalus* sive *Pelecanus fuscus*. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 322. N<sup>o</sup>. I.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 191. N<sup>o</sup>. 3.*

*Pelecanus gula faccata. Onocrotalus* f. *Pelecanus fuscus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 66. sp. 1. var. 1.*

*Pelecanus subfuscus*, gula distensili. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 480.*

*Plancus Gulo. Onocrotalus fuscus. Klein. Avi. pag. 142. N<sup>o</sup>. 1.*

Alcatrazes grandes de la Isla Espanola de Oviedo. *Sloane.*

Pélican. *Voy. de la B. de Hud. Tom. I. pag. 52; avec une figure exacte Pl. I.*

Pélican de l'Amérique. *Edwards. Tom. II. pag. XCIII; avec une figure exacte Pl. 93.*

Grand Gofier. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 271; avec une figure peu exacte pag. 246. N<sup>o</sup>. 14.*

Les Anglois l'appellent PELECAN. *Raj. PELECAN. Sloane. PELICAN. Browne.*

Il est un peu plus gros que l'Oye domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds onze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pieds. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent au-delà des yeux, a quinze pouces trois lignes de

*Crassitie Anserem domesticum paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tres pedes undecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pedes. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos, ultra oculos protensos, quindecim polli-*



ces & tres lineas longum est; cauda sex pollices & totidem lineas; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices cum totidem lineis, extimus quatuor pollices & lineas binas, intimus tres pollices cum totidem lineis; posticus autem unum pollicem & decem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum septem pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Caput & collum vestiunt pennæ candidæ: candor autem in acumen medium versùs dorsum usque porrigitur. Pennæ partem capitæ posteriorem obtegentes reliquas paululùm longitudine superant, & cristam quodammodo efficiunt. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt cinereo-fuscæ, mediis pennarum candidantibus. Pectus, venter, latera, crura & inferiores caudæ tectrices cinereo-fusco quoque tinguntur; sed absque ulla alterius coloris mixtura. Tectrices alarum inferiores omnes, superioresque minimæ & mediæ, sicut & majores corpori fini-

long; sa queue six pouces six lignes; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces quatre lignes, l'extérieur quatre pouces deux lignes, l'intérieur trois pouces trois lignes; & celui de derrière un pouce dix lignes. Il a sept pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & le col sont couverts de plumes blanches: cette couleur s'étend en pointe jusque vers le milieu du dos. Les plumes de la partie postérieure de la tête sont un peu plus longues que les autres, & forment une espece de huppe. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun, le milieu de chaque plume étant blanchâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont pareillement d'un cendré-brun, mais sans mélange d'autre couleur. Toutes les couvertures du dessous des aîles, les petites & les moyennes du dessus, ainsi que le grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes du dos: les grandes les plus éloignées du corps



font d'un cendré-brun. Toutes les plumes qui couvrent le dos & le croupion, ainsi que les couvertures du dessus & du dessous des ailes, se terminent un peu en pointe. Les grandes plumes de l'aile sont noires en-dessus, & d'un cendré obscur en-dessous : les moyennes sont d'un cendré-brun. La queue est composée de dix-huit plumes de cette dernière couleur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les côtés de la tête sont dégarnis de plumes, & couverts seulement d'une peau blanchâtre. Les yeux sont placés dans cet espace nud : leur iris est d'un cendré-bleu très-foncé. Le bec est verdâtre vers son origine, & d'un cendré-bleu mêlé d'un peu de rouge vers son extrémité. Le demi-bec supérieur n'est pas si applati que celui des autres espèces de ce genre, & est un peu moins large vers le milieu de sa longueur qu'à ses extrémités. La poche membraneuse qui est sous la gorge, & qui s'étend dans toute la longueur du demi-bec inférieur, dont elle réunit les deux côtés, est d'un cendré-bleuâtre varié de petites lignes rougeâtres. Les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb ; & les ongles

timæ, pennis dorsum vestientibus concolores : majores à corpore remotiores cinereo-fuscæ. Pennæ omnes dorsum & uropygium obtegentes, alarumque rectrices superiores & inferiores nonnihil in acumen desinunt. Remiges majores sunt superne nigræ, subtus obscurè cinereæ : minores cinereo-fuscæ. Cauda octodecim constat rectricibus pariter cinereo-fuscis. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt. Caput ad latera plumis denudatur, & cute candicante solummodo obducitur. In illo spatium plumis denudato oculi siti sunt : ipsorum irides saturatissimè cinereo-cœruleæ. Rostrum versùs ipsius exortum viridescens, versùs extremitatem cinereo-cœruleum, aliquâ rubedine mixtum. Mandibula superior non ita plana est quàm in aliis hujus generis speciebus, & mediam versùs longitudinem minorem quàm in extremitatibus latitudinem obtinet. Bursa inflabilis sub gurgure pendula, & per totam mandibulæ inferioris longitudinem extensa, illiusque bina latera connectens, ex cinereo cœrulescit, lineolisque



**LES OISEAUX**, *Classe III. Ordre XXV.* §27  
*rubescens* variegatur. Pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, plumbeo colore imbuti; ungues verò nigri. Habitat in *America*.  
*Ex museo Realmuriano.*

noirs. On le trouve en *Amérique*. Du cabinet de M. de Reaumur.

\*\* 3. LE PÉLICAN DES PHILIPPINES.

*Voyez Pl. XLVI.*

*Onocrotalus* superne griseo-cinereus, infernè albus, uropygio concolore; capite & collo candicantibus, taniâ in collo superiore longitudinali fusco & albido variegatâ; remigibus majoribus cinereo-nigricantibus; rectricibus cinereo-albis, scapis nigricantibus, lateralibus interiùs in exortu candidis . . . . *ONOCROTALUS PHILIPPENSIS.*

*On l'appelle dans les Isles Philippines PAGALA.*

Præcedentem multùm crassitie superat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pedes quinque pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pedes quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos, ultra oculos extensos, quatuordecim pollices longum est; cauda septem pollices; pes tres pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & decem lineas, extimus quatuor pollices & sex lineas, intimus tres pollices

Il est beaucoup plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pieds cinq pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pieds cinq pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent au-delà des yeux, a quatorze pouces de long; sa queue sept pouces; son pied trois pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces dix lignes, l'extérieur quatre pouces six lignes, l'intérieur trois pouces cinq lignes; & celui de derrière deux



pouces une ligne. Il a sept pieds cinq pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête & le col sont couverts de petites plumes blanchâtres & très-douces au toucher : chaque plume est brune à son origine , mais cette couleur paroît fort peu. Sur le dessus du col , depuis l'occiput jusque vers le dos , s'étend un rang de plumes plus longues que les autres , douces comme de la soye , & variées de brun & de blanchâtre : celles qui partent de l'occiput , ont jusqu'à deux pouces de longueur , & forment une jolie huppe. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un gris-cendré. Le bas de la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue , celles du dessous des aîles , la partie inférieure du dos & le croupion sont blancs. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un blanc tirant un peu sur le gris. Les petites du dessus des aîles , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont d'un gris-cendré , les tiges & les bords des plus petites étant d'une couleur un peu plus claire : les

cum quinque lineis ; posticus autem viginti quinque lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum septem pedum quinque pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput & collum plumulis vestiuntur candicantibus & tactu mollissimis : quælibet autem plumula est in exortu fusca , qui fuscus color est minimè conspicuus. Supra collum superius , ab occipitio scilicet versùs dorsum usque , series extenditur pennarum reliquis longiorum , serici instar , mollissimarum , fusco & albedo variegatarum : quæ ab occipitio oriuntur , duorum pollicum longitudinem obtinent , elegantemque cristam efficiunt. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt griseo-cinereæ. Colli inferioris pars infima , pectus , venter , latera , crura , inferiores caudæ tectrices , pennæ alas subtus obtegentes , dorsum infimum & uropygium alben. Pennæ caudam superne cooperientes ex albo nonnihil ad griseum colorem vergunt. Superiores alarum tectrices minores , sicut & majores corpori



corpori viciniore, sunt griseo - cinerea; minimarum scapo & marginibus colore nonnihil dilutioribus : majores à corpore remotiores, sicut & alae nothae pennae, cinereo - nigricantes. Alae componunt triginta sex remiges, quarum decem primores ex cinereo nigricant : viginti sex reliquae sunt in exortu candidae, in reliqua longitudine obscure cinereo-albae, & scapo nigricante praeditae. Corpori viciniore, dum ala complicitur, majorum remigum extremitates attingunt. Octodecim rectricibus cauda conflatur : binae intermediae cinereo-albae : laterales omnes concolores, attamen in latere interiore versus ipsarum exortum candidae : candor autem eò majus spatium occupat, quò rectrix exterior fit : omnes insuper caudae rectrices scapo nigricante donantur. Caput ad latera plumis est denudatum, & cute albo - rubescente solummodo obductum. In illo spatio plumis denudato oculi siti sunt. Rostrum ex albo rubescit; mandibulam tamen superiorem in utroque illius latere variegat macularum fuscescentium series. Bursa

grandes les plus éloignées du corps, ainsi que les plumes de l'aile bâtarde, sont d'un cendré-noirâtre. L'aile est composée de trente-six plumes : les dix premières sont d'un cendré-noirâtre : le vingt-six autres sont blanches à leur origine, & d'un gris-blanc sombre dans le reste de leur longueur, avec leur tige noirâtre. Les plus proches du corps s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de dix-huit plumes : les deux du milieu sont d'un gris-blanc : toutes les latérales sont de la même couleur, excepté leur côté intérieur, qui est blanc vers leur origine : cette dernière couleur s'étend d'autant plus loin, que la plume est plus extérieure : de plus toutes les plumes de la queue ont leur tige noirâtre. Les côtés de la tête sont dégarnis de plumes, & couverts seulement d'une peau d'un blanc-rougeâtre. Les yeux sont placés dans cet espace nud. Le bec est d'un blanc-rougeâtre ; mais le demi-bec supérieur est varié sur chacun de ses côtés d'un rang de taches brunâtres. La poche qui est sous la gorge, & qui s'étend dans toute la longueur du demi-bec inférieur, dont elle réunit les deux côtés, est blanchâtre. Les



pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont rouges. On le trouve dans les *Isles Philippines*. Il a été envoyé de l'*Isle de Lucon* à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

inflabilis sub gutture pendula, & per totam mandibulæ inferioris longitudinem extensa, illiusque bina latera connectens, candicat. Pedes, digiti, sicut & ipforum membranæ, unguisque rubri. Habitat in *Philippensibus Insulis*. A *Lucionensi Insula* in museum *D. Aubry* missus est.







des Philippines.









Desiné & Gravé par Martin.

*Pelican des Philippines.*









# ORDO XXVI. ORDRE XXVI.

A V E S

LES OISEAUX

*Digitis quatuor ; tribus anterioribus membranis integris inter se connexis , postico soluto : cruribus circa corpus medium & extra abdomen positis , corpore longioribus.*

*Qui ont quatre doigts , dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entieres , & le postérieur séparé : & les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen , & plus longues que le corps.*

**H**UJUS Ordinis Avium aliæ rostro donantur denticulato ; alteræ rostro edentulo præditæ sunt. In duas sectiones illas dividimus : in prima continentur eæ quæ rostrum habent denticulatum , ut *Phænicopterus* : in secunda autem illæ quæ rostrum habent edentulum , ut *Avocetta* , *Corrira*.

**P**ARMI les Oiseaux de cet Ordre les uns ont le bec dentelé ; les autres ont le bec sans dentelures. Je les divise en deux sections : dans la première sont ceux qui ont le bec dentelé , comme le *Flamant* : & dans la seconde ceux qui ont le bec sans dentelures , comme l'*Avocette* , le *Coureur*.

## SECTIO I.

## SECTION I.

*Eæ quæ rostro donantur denticulato.*

*Ceux dont le bec est dentelé.*

**U**NICO genere , *Phænicopteri* scilicet , constituitur hæc sectio.

**I**L n'y a dans cette section qu'un seul genre , sçavoir celui du *Flamant*.

Xxxij



Omnium hujus generis Avium rostrum mediam versus longitudinem deorsum incurvatur : ipsarum mandibula inferior superiore latior est.

Le bec de tous les Oiseaux de ce genre est courbé en enbas vers le milieu de sa longueur ; leur mandibule inférieure est plus large que la supérieure.

## CXIII.

## CXIII.

*Le genre du Flamant.**Genus Phaenicopteri.*

Son caractère est d'avoir Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé :

Hujus character est Digiti quatuor, tres scilicet antichi membranis integris inter se connexi, posticus solutus :

Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus longues que le corps :

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore longiora :

Le bec dentelé, courbé en enbas vers le milieu de sa longueur :

Rostrum denticulatum, mediam versus longitudinem deorsum incurvum :

La mandibule inférieure plus large que la supérieure.

Mandibula inferior superiore latior.

Les Oiseaux de ce genre ont la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes.

Hujus generis Avium crura in parte infima plumis nudantur.

## \*\* I. LE FLAMANT.

Voyez Pl. XLVII. Fig. 1.

Phaenicopterus coccineus ; remigibus plerisque nigris ; rectricibus coccineis . . . . PHAENICOPTERUS.

Phaenicopterus ruber, remigibus primoribus nigris. Phaenicopterus ruber. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 72. sp. 1.



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XXVI.* 533

- Phœnicopterus ex cinereo puniceus, minori rostro. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. VIII. sp. 1.*
- Phœnicopterus roseus. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. VIII. sp. 2.*
- Phœnicopterus Guianensis, crassiori rostro, totus phœniceus. *Barr. Ornith. Class. I. Gen. VIII. sp. 3.*
- Phœnicopterus phœniceus, rostro falcato, ad extremum nigro. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 140.*
- Phœnicopterus pullus, vertice & angulis alarum coccineis. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 480.*
- Phœnicopterus. *Gesn. Avi. pag. 689. hujus icon non satis accurata pag. 690.*  
*Gesn. icon. Avi. pag. 136, in qua eadem icon.*  
*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 319. hujus icones non satis accuratæ pag. 321 & 322.*  
*Jonst. Avi. pag. 102. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 50.*  
*Willugh. Ornith. pag. 240. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LX.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 117. N°. 2.*  
*Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 321. N°. XVII.*  
*Raj. Syn. Avi. pag. 190. N°. 1.*  
*Charlet. Exer. pag. 108. N°. III.*  
*Charlet. Onomast. pag. 102. N°. III.*  
*Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 47. sp. 1.*
- Phœnicopterus Auctorum. *Moehr. Avi. Gen. 59.*
- Phœnicopterus Plinii, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag. 126. Lit. B.*
- Phœnicopterus Americanus. *Seb. Vol. I. pag. 103. hujus icon satis accurata Tab. LXVII. fig. 1.*
- Phœnicopteros Avis. *Mus. Worm. pag. 309.*
- Avis quam Hispani Flamenco vocant. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 13.*
- Flamenco. *Jonst. Avi. pag. 130.*
- Flamant. *Catesb. Tom. 1. pag. 73; avec une figure exacte Pl. 73; & de plus une figure exacte de la tête Pl. 74.*
- Flamant ou Flambant. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 199.*
- Flambant ou Flaman. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 267; avec une assez mauvaise figure pag. 246. N°. 12.*
- Flammant ou Flamboyant. *Alb. Tom. II. pag. 51; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 77.*
- Flamand. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 142; avec une mauvaise figure pag. 172. N°. 3.*
- Becharu. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag. 43; avec une assez mauvaise figure Pl. 9.*
- Les Grecs l'appellent Φοινικόπτερος. *Bel. Gesn. Aldrov. Klein.*
- Les Portugais, FLAMINGO. *Kolbe.*
- Les Espagnols, FLAMENCO. *De Laët. Jonst.*



*Les Anglois*, FLAMINGO. *Raj. Sloane. Browne. Catesb.* FLAMENGO. *Alb.*

PHENICOPTER. *Charlet.*

*Les Indiens de Cayenne*, Tococo. *Barr.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que la *Cigogne blanche* ; mais il a les jambes & le col plus allongés. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pieds quatre pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pieds. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces trois lignes de long ; sa queue cinq pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, neuf pouces six lignes ; son pied treize pouces trois lignes, celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces six lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces neuf lignes ; & celui de derrière six lignes seulement. Il a cinq pieds un pouce de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Cet Oiseau change de couleur à mesure qu'il avance en âge. Dans sa jeunesse, c'est-à-dire, la première année, tout son corps est couvert de plumes variées de blanc & de gris : il faut cependant en excepter la plupart des plumes de l'aile qui sont noires. Son bec est gris, excepté son extré-

*Ciconia alba* paululum crassitie cedit ; sed cruribus donatur & collo magis elongatis. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pedes & totidem pollices æquat, & ad extremos ungues sex pedes. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque quatuor pollices & tres lineas longum est ; cauda quinque pollices & sex lineas ; pars crurum plumis nudata novem pollices cum sex lineis ; pes tredecim pollices & tres lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & sex lineas, extimus tres pollices, intimus duos pollices cum novem lineis ; posticus autem sex lineas tantum. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & unius pollicis intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Hæc Avis, ætate provehendo, colore variat. In juventute, primo scilicet anno, universum corpus vestiunt pennæ albo & griseo variegatæ, exceptis tamen plerisque alarum remigibus



nigris. Rostrum griseum , attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata , pedes , digiti , sicut & ipforum membranæ , unguesque grisei.

Secundo ætatis anno caput , guttur , collum , univsumque corpus albicans , cum aliqua rosei coloris mixtura. Pennæ caudam superne & inferne cooperientes concolores. Scapulares , rectrices alarum superiores omnes , inferioresque minores sunt roseo colore vivido imbutæ : inferiores alarum rectrices majores nigræ. Remiges simili nigro tinctæ ; ex illis tamen excipiendæ sunt quædam corpori viciniore scapularibus concolores. Caudam componunt sexdecim rectrices roseo colore pallido imbutæ. Rostrum pallidè rubrum , exceptâ extremitate nigrâ. Pars crurum plumis denudata , pedes , digiti , sicut & ipforum membranæ , unguesque eodem imbuuntur rubro ac rostrum ipsum tingitur.

Tertio ætatis anno coccinneo colore penitus tingitur ; attamen pleræque remiges sunt nigræ. Rostrum in aliis

mité , qui est noire. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds , les doigts , ainsi que leurs membranes , & les ongles sont gris.

Dans la seconde année la tête , la gorge , le col & tout le corps sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de couleur de rose. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les plumes scapulaires , toutes les couvertures du dessus des ailes , & les petites du dessous sont d'un couleur de rose vif : les grandes couvertures du dessous des ailes sont noires. Les plumes de l'aile sont pareillement noires , si l'on en excepte quelques-unes des plus proches du corps , qui sont de la même couleur que les scapulaires. La queue est composée de seize plumes d'un couleur de rose pâle. Le bec est d'un rouge pâle , excepté son extrémité qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds , les doigts , ainsi que leurs membranes , & les ongles sont du même rouge que le bec.

Dans la troisième année il est entièrement d'un rouge vif , excepté la plupart des plumes de l'aile , qui sont noires. Les



uns ont le bec rouge, les autres l'ont jaune ; mais dans tous l'extrémité en est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts, ainsi que leurs membranes, & les ongles sont rouges.

Le bec de cet Oiseau est d'une figure singulière. Le demi-bec supérieur est fort épais à son origine, il va ensuite en diminuant, & son extrémité est aplatie horizontalement ; il est de plus courbé vers le bas au milieu de sa longueur : le demi-bec inférieur est beaucoup plus épais & plus large que le supérieur, sur-tout vers le milieu de sa longueur ; & il est creusé en gouttière. Les bords des deux mandibules sont dentelés comme une lime. Lorsque l'Oiseau mange, il tourne son col & sa tête de façon que la partie plate du demi-bec supérieur touche la terre ; ensuite il remue la tête de côté & d'autre ; c'est ainsi qu'il se saisit de sa nourriture.

On le trouve en *Amérique*, & quelquefois sur les côtes Méridionales de *France*. La longueur de ses jambes ne lui permet pas de les placer dans son nid pendant qu'il couve ; c'est pourquoi il fait son nid sur des petites éminences pla-

rubrum, in alteris luteum ; in omnibus autem rostri extremitas nigra. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, sicut & ipsorum membranae, unguesque rubri.

Rostro singularis figurae donatur hæc Avis. Mandibula superior est in exortu crassissima, deinde sensim atque sensim fit minus crassa, & ipsius extremitas est horizontaliter plana ; est insuper per mediam versus longitudinem deorsum incurva : mandibula inferior superiore multò crassior & latior, præsertim versus mediam ipsius longitudinem, & insuper canaliculata. Mandibulae binæ sunt ad margines, limæ instar, denticulatae. Dum Avis edit, collum, caputque ita contorquet, ut mandibulae superioris pars plana terram attingat ; dein caput utrinque motitat ; & sic cibum arripit.

Habitat in *America* ; quandoque in *Gallia* juxta maris littora Meridionalia versatur. Ipsius crura tantâ longitudine pollent, ut dum incubat, ea in nido collocare nequeat ; & ideo supra monticulos in aqua sitos nidum



dum construit, eique insidet, cruribus, uno in uno latere, alio in altero, pendulis.

*Ex museo Realmuriano.*

cées dans l'eau, sur lesquelles il se pose, laissant pendre ses jambes, l'une d'un côté, l'autre de l'autre.

*Du cab inet de M. de Reaumur.*

## SECTIO II.

*Ea quæ rostro donantur edentulo.*

**D**UO in illa sectione continentur genera Avium rostri formâ & longitudine à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostrum habent gracile, longissimum, horizontaliter compressum, sursum arcuatum, ut *Avocetta*: aliæ rostro brevi & recto præditæ sunt, ut *Corrira*.

### CXIV.

*Genus Avocetta.*

Hujus character est  
Digiti quatuor, tres scilicet antici membranis integris inter se connexi, posticus solutus:

Crura circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore longiora:

*Tom. VI.*

## SECTION II.

*Ceux dont le bec est sans dentelures.*

**C**ETTE section contient deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme & la longueur de leur bec. Les uns ont le bec menu, très-long, comprimé horizontalement & courbé en arc en en-haut, comme l'*Avocette*: les autres ont le bec court & droit, comme le *Coureur*.

### CXIV.

*Le genre de l'Avocette.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur est séparé:

Les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus longues que le corps:

Yyy



Le bec sans dentelures, menu, très-long, comprimé horizontalement & courbé en arc en en-haut.

Rostrum edentulum; gracile, longissimum, horizontaliter compressum, fursum arcuatum.

Les Oiseaux de ce genre ont la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes.

Hujus generis Avium crura in parte infima plumis nudantur.

\*\* I. L'AVOCETTE.

Voyez Pl. XLVII. Fig. 2.

Avocetta candida; capite superiore, colli superioris parte supremâ, taniâ à scapulis ad uropygium, & fasciâ in alis obliquâ nigris; rectricibus candidis . . . . AVOCETTA.

Avocetta, Recurvirostra. Charlet. Exer. pag. 102. N°. VIII.

Charlet. Onomast. pag. 96. N°. VIII.

Avocetta. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 56. sp. 1.

Avocetta, Recurvirostra. Gesn. Avi. pag. 231. hujus icon non satis accurata pag. 232.

Avocetta Italis dicta. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 288. hujus icon minus accurata pag. 287.

Avocetta Italarum. Jonst. Avi. pag. 90. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48; & insuper altera icon à Gesnero mutuata Tab. 54.

Recurvirostra albo nigroque varia. Faun. Suec. Linn. N°. 137.

Recurvirostra albo nigroque varia. Avocetta. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 80. sp. 1.

Recurvirostra subtus alba, superne nigricans, pedibus cyaneis. Barr. Ornith. Class. 1. Gen. V. sp. 1.

Recurvirostra. Gesn. icon. Avi. pag. 93, in qua hujus icon non satis accurata.

Willugh. Ornith. pag. 240. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LX.

Raj. Syn. Avi. pag. 117. N°. A. 1.

Marfil. Danub. Tom. V. pag. 72. hujus icon non satis accurata Tab. 34.

Recurvirostra, seu Avocetta Italarum. Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 435.

Plotus recurviroster. Klein. Avi. pag. 142. N°. 1.

Trochilus. Moehr. Avi. Gen. 86.

Herle ou Harle, ou Avocetta des Italiens. Alb. Tom. I. pag. 87; avec une figure mal coloriée Pl. 101.



*Les Turcs l'appellent ZELUK. Gefn. KELUK. Aldrov.*

*Les Italiens , AVOSETTA. Willugh. Raj. Marfil. AVOSETTO ; BECCO-ROELLA ; BECCOSTORTO. Gefn. Aldrov. BECCOSTORTA. Marfil.*

*Les Italiens aux environs du Lac Majeur, SPINZAGO D'ACQUA. Gefn. Aldrov. Jonst. Charlet. Marfil.*

*Les Allemands , FREMBDER WASSER-VOGEL. Gefn.*

*Les Suédois qui habitent la Province d'Oeland, SKJAER-FLAECKA ou SIAER-FLAECKA. Linn.*

*Les Anglois , SCOOPER. Charlet.*

*Craffitie Vanellum multum superat. Ipsi-  
us longitudo ab apice rostri ad cau-  
dæ extremitatem unum pe-  
dem & quinque pollices ex-  
plet, & ad extremos ungues  
unum pedem octo pollices  
& septem lineas. Rostrum ab  
ipsius apice ad oris angulos  
usque tres pollices & quin-  
que lineas longum est; cauda  
tres pollices & totidem li-  
neas; pars crurum plumis  
denudata duos pollices; pes  
tres pollices cum linea una;  
trium digitorum anticorum  
medius cum ungue unum  
pollicem & novem lineas,  
extimus octodecim lineas,  
intimus unum pollicem cum  
quinque lineis; posticus au-  
tem lineam unicam & tres  
quartas partes tantum. Alis  
expansis, extremitates majo-  
rum remigum duorum pe-  
dum trium pollicum &  
octo linearum intervallo dif-  
tant; alæ verò complicatæ  
caudam extremam attin-*

Elle est beaucoup plus grosse  
que le *Vanneau*. Sa longueur  
depuis le bout du bec jusqu'à  
celui de la queue est d'un pied  
cinq pouces, & jusqu'à celui  
des ongles d'un pied huit pou-  
ces sept lignes. Son bec depuis  
sa pointe jusqu'aux coins de la  
bouche a trois pouces cinq lig-  
nes de long; sa queue trois  
pouces trois lignes; la partie  
de ses jambes qui est dégarnie  
de plumes, deux pouces; son  
pied trois pouces une ligne;  
celui du milieu des trois doigts  
antérieurs, joint avec l'ongle,  
un pouce neuf lignes, l'exté-  
rieur dix-huit lignes, l'intérieur  
un pouce cinq lignes; & ce-  
lui de derrière une ligne trois  
quarts seulement. Il a deux  
pieds trois pouces huit lignes  
de vol; & ses aîles, lorsqu'elles  
sont pliées, s'étendent jusqu'au  
bout de la queue. La partie  
supérieure de la tête est noire:  
cette couleur s'étend sur la par-  
tie supérieure du col jusque vers  
la moitié de sa longueur. Les



côtés de la tête, la gorge, le reste du col & tout le corps sont d'un beau blanc; il y a cependant sur la partie supérieure du dos deux bandes noires, qui partent des épaules, s'étendent dans une direction oblique jusque vers le milieu du dos, sans se réunir, & s'en vont ensuite en droite ligne vers le croupion, en passant par-dessus les plumes scapulaires. Le reste des scapulaires est blanc. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des ailes sont de la même couleur. Les petites du dessus de l'aile, depuis son origine jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, & toutes les moyennes sont noires; ce qui forme sur chaque aile une large bande oblique de cette couleur: les petites, depuis le pli de l'aile qui répond à celui du poignet jusqu'à son extrémité, & les grandes les plus proches du corps sont blanches: les grandes les plus éloignées du corps sont blanches à leur origine & terminées de noir. L'aile est composée de vingt-neuf plumes: la première est entièrement noire: les six suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la septième inclusivement, sont blanches à leur origine, & noires dans le

gunt. Caput superius nigro tingitur colore: nigredo autem supra superiorem colli partem mediam versus longitudinem usque protenditur. Caput ad latera, guttur, reliquum collum, universumque corpus sunt eleganter candida; binæ tamen extant in parte dorsi suprema tæniæ nigræ, à scapulis ortæ, medium versus dorsum obliquè productæ, nequaquam connexæ, & deinde secundum lineam rectam supra scapulares pennas ductæ, & versus uropygium extensæ. Scapulares in reliquis albicant. Caudæ rectrices superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes concolores. Superiores alarum rectrices minimæ, ab illarum exortu ad articulum carpo humano respondentem usque positæ, sicut & mediæ omnes, sunt nigræ; unde fit in utraque ala lata tænia obliqua concolor: minimæ ab alarum articulo carpo humano respondente ad illius extremitatem usque, majoresque corpori viciniores candidæ: majores à corpore remotiores in exortu albæ, nigro terminatæ. Alarum component viginti novem remiges, quarum prior peni-



*tus nigra* : sex proximè sequentes, à secunda scilicet ad septimam usque inclusivè, sunt in exortu albæ, in reliqua longitudine nigræ, albedine eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior : octava candida, maculâ nigrâ, in latere exteriori ad extremitatem positâ, insignita : octodecim proximè sequentes, à nona scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè, penitùs candidæ; vigesima sexta tamen pauco griseo-fusco interiùs notatur : vigesima septima ad exortum griseo-fusca, albo terminata : binæ tandem corpori finitimæ fuscæ, candidante in extremitate marginatæ. Sex remiges corpori viciniore maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim restrictibus eleganter candidis cauda constat. Rostrum nigrum, in mucronem valdè gracilem & flexibilem desinens. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti, sicut & ipsorum membranæ, ex plumbeo colore cœrulescunt; ungues verò nigri. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

reste de leur longueur, le blanc occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps : la huitième est blanche, & marquée d'une tache noire, placée à son extrémité sur le côté extérieur : les dix-huit suivantes, sçavoir depuis la neuvième jusqu'à la vingt-sixième inclusivement, sont entièrement blanches ; la vingt-sixième a cependant un peu de gris-brun sur son côté intérieur : la vingt-septième est d'un gris-brun à son origine, & terminée de blanc : enfin les deux plus proches du corps sont brunes, & bordées de blanchâtre par le bout. Les six plumes de l'aile les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un très-beau blanc. Le bec est noir : il se termine en une pointe très-déliée & flexible. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les doigts, ainsi que leurs membranes, sont de couleur de plomb-bleuâtre ; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*



*Le genre du Coureur.**Genus Corriæ.*

Son caractère est d'avoir  
Quatre doigts, dont les trois  
antérieurs sont joints en-  
semble par des membranes  
entières, & le postérieur est  
séparé :

Les jambes avancées vers le  
milieu du corps & hors de  
l'abdomen, & plus longues  
que le corps :

Le bec sans dentelures, court  
& droit.

Hujus character est  
Digiti quatuor, tres scilicet  
antici membranis integris  
inter se connexi, posticus  
solutus :

Crura circa corpus medium  
& extra abdomen posita,  
corpore longiora :

Rostrum edentulum, breve,  
rectum.

## I. LE COUREUR.

Corrira superne ferruginea, infernè alba; restrictibus binis  
intermediis candidis, apice nigris. . . . CORRIRA.

Corrira. *Jonst. Avi. pag. III.*

Trochilus. *Jonst. Avi. pag. 90. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 48.*

Trochilus, vulgò Corrira. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 288. hujus icon  
satis accurata pag. 289.*

Trochilus, vulgò Corrira Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 240.  
hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LX.*

*Raj. Syn. Avi. pag. 118. N°. 3.*

Trochilus, Corrira, seu Tabellaria Aldrovandi. *Charlet. Exer. pag. 102.  
N°. IX.*

*Charlet. Onomazt. pag. 97. N°. IX.*

*Les Grecs l'appellent Τροχίλος ou Κέλεος. Aldrov.*

*Les Boulonnois, CORRIRA. Aldrov.*

*Les Anglois, FIN-FOOTED RUNNER. Charlet.*

Il n'est pas si gros que l'*A-*  
*vocette*, & a les jambes & le  
bec beaucoup moins longs. La  
tête, la partie supérieure du

*Avocettæ* crassitie cedit,  
cruribusque & rostro dona-  
tur multo brevioribus. Ca-  
put, colli superior pars, dor-



sum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ tectrices ferrugineo colore tinguntur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obtegentes albescent. Omnes alarum remiges eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Binæ rectrices intermediae sunt candidæ, attamen in apice nigrae : laterales verisimiliter nigro quoque tinctæ. Oculi sunt nigri, albo circumdati circulo, quem rursus ambit circulus spadiceus. Rostrum luteum, attamen in extremitate nigrum. Cujus coloris sint pedes, prorsus me latet. Celerrimè currit hæc Avis; unde *Corriva* nomen. Habitat in *Italia*.

col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'une couleur ferrugineuse. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Toutes les plumes de l'aile sont de la même couleur que le dos. Les deux plumes du milieu de la queue sont blanches, & terminées de noir: selon les apparences, les latérales sont noires. Les yeux sont noirs, entourés d'un cercle blanc, lequel est lui-même entouré d'un cercle d'un rouge-bai. Le bec est jaune, excepté son extrémité, qui est noire. J'ignore quelle est la couleur des pieds. Cet Oiseau court extrêmement vite; c'est ce qui lui a fait donner le nom de *Coureur*. On le trouve en *Italie*.

*Fin du Tome Sixième.*



---

A P A R I S,  
DE L'IMPRIMERIE D'ANTOINE BOUDET,  
IMPRIMEUR DU ROI.





*Fig. 1.*









Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6 pouces

Designé et Gravé par Martinet.

1. Flamant.

2. Avocette.







# INDEX

# TABLE

*Avium in sexto volumine  
contentarum, secundum  
ordinem in quo dispo-  
nuntur.*

*Des Oiseaux contenus dans  
le sixième volume, selon  
l'ordre dans lequel ils  
sont rangés.*

## ORDO XVIII.

### SECTIO I.

LXXXVIII. *Genus Gallinulæ.*

1. **G**allinula.
2. Gallinula minor.
3. Gallinula major.

### SECTIO II.

LXXXIX. *Genus Phalaropi.*

1. Phalaropus.
2. Phalaropus cinereus.
3. Phalaropus fuscus.
4. Phalaropus rufescens.

XC. *Genus Fulicæ.*

1. Fulica.
2. Fulica major.
3. Fulica Mexicana.

## ORDRE XVIII.

### SECTION I.

LXXXVIII. *Genre de la Poule-d'eau.*

1. **L**A Poule-d'eau.
2. La petite Poule d'eau.
3. La grande Poule-d'eau.

### SECTION II.

LXXXIX. *Genre du Phalarope.*

1. Le Phalarope.
2. Le Phalarope cendré.
3. Le Phalarope brun.
4. Le Phalarope rouffâtre.

XC. *Genre de la Foulque.*

1. La Foulque ou Morelle.
2. La grande Foulque ou la Macroule.
3. La Foulque du Mexique.

## ORDO XIX.

XCI. *Genus Colymbi.*

1. Colymbus.
2. Colymbus cristatus.
3. Colymbus cristatus minor.

## ORDRE XIX.

XCI. *Genre de la Grebe.*

1. La Grebe.
2. La Grebe hupée.
3. La petite Grebe hupée.



- |  |   |
|--|---|
| 4. La Grebe cornue.                      | 4. Colymbus cornutus.                     |
| 5. La petite Grebe cornue.               | 5. Colymbus cornutus minor.               |
| 6. La Grebe à oreilles.                  | 6. Colymbus auritus.                      |
| 7. La petite Grebe.                      | 7. Colymbus minor.                        |
| 8. La Grebe de l'Isle S. Thomas.         | 8. Colymbus Insulæ S. Thomæ.              |
| 9. La Grebe de riviere ou le Castagneux. | 9. Colymbus fluviatilis.                  |
| <i>A. La Grebe de riviere noirâtre.</i>  | <i>A. Colymbus fluviatilis nigricans.</i> |
| 10. La Grebe de riviere de la Caroline.  | 10. Colymbus fluviatilis Carolinensis.    |
| 11. La Grebe de riviere de S. Domingue.  | 11. Colymbus fluviatilis Dominicanensis.  |

## O R D R E   X X .

## S E C T I O N   I .

X C I I . *Genre du Guillemot.*

1. Le Guillemot.
2. Le petit Guillemot.
3. Le petit Guillemot noir ,  
    appellé vulgairement Colombe de Groenland.
4. Le petit Guillemot rayé.

## S E C T I O N   I I .

X C I I I . *Genre du Macareux.*

1. Le Macareux.

X C I V . *Genre du Pingoin.*

1. Le grand Pingoin.
2. Le Pingoin.
3. Le petit Pingoin.

## O R D R E   X X I .

## S E C T I O N   I .

X C V . *Genre du Manchot.*

1. Le Manchot.

## O R D O   X X .

## S E C T I O   I .

X C I I . *Genus Uria.*

1. Uria.
2. Uria minor.
3. Uria minor nigra, Columba  
    Groenlandica vulgò dicta.
4. Uria minor striata.

## S E C T I O   I I .

X C I I I . *Genus Fratercula.*

1. Fratercula.

X C I V . *Genus Alca.*

1. Alca major.
2. Alca.
3. Alca minor.

## O R D O   X X I .

## S E C T I O   I .

X C V . *Genus Sphenisci.*

1. Spheniscus.



2. *Spheniscus nævius*.

2. Le Manchot tacheté.

XCVI. *Genus Catarractis*.XCVI. *Genre du Gorfou*.

1. Catarractes.

1. Le Gorfou.

## SECTION II.

## SECTION II.

XCVII. *Genus Mergi*.XCVII. *Genre du Plongeon*.1. *Mergus major*.

1. Le grand Plongeon.

2. *Mergus minor*.

2. Le petit Plongeon.

3. *Mergus gutture rubro*.

3. Le Plongeon à gorge rouge.

4. *Mergus gutture nigro*.

4. Le Plongeon à gorge noire.

5. *Mergus nævius*.

5. Le Plongeon tacheté.

6. *Mergus major nævius*.

6. Le grand Plongeon tacheté.

## ORDO XXII.

## ORDRE XXII.

XCVIII. *Genus Albatri*.XCVIII. *Genre de l'Albatros*.

1. Albatrus.

1. L'Albatros.

## ORDO XXIII.

## ORDRE XXIII.

## SECTION I.

## SECTION I.

XCIX. *Genus Puffini*.XCIX. *Genre du Puffin*.1. *Puffinus*.

1. Le Puffin.

2. *Puffinus cinereus*.

2. Le Puffin cendré.

3. *Puffinus Capitis Bonæ Spei*.3. Le Puffin du Cap de Bonne  
Espérance.4. *Puffinus Brasiliensis*.

4. Le Puffin du Brésil.

C. *Genus Procellariæ*.C. *Genre du Pétrel*.1. *Procellaria*.

1. Le Pétrel.

2. *Procellaria cinerea*.

2. Le Pétrel cendré.

3. *Procellaria nævia*.3. Le Pétrel tacheté, appelé  
vulgairement Damier.



CI. *Genre du Stercoraire.*

1. Le Stercoraire.
2. Le Stercoraire rayé.
3. Le Stercoraire à longue queue.

CI. *Genus Stercorarii.*

1. Stercorarius.
2. Stercorarius striatus.
3. Stercorarius longicaudus.

CII. *Genre du Goiland.*

1. Le Goiland noir.
2. Le Goiland cendré.
3. Le Goiland gris.
4. Le Goiland brun.
5. Le Goiland varié ou le Grifard.
6. La Mouette grise.
7. La petite Mouette grise.
8. La Mouette cendrée.
9. La petite Mouette cendrée.
10. La grande Mouette cendrée.
11. La Mouette cendrée tachetée.
12. La Mouette d'Hyver.
13. La Mouette rieuse.
14. La Mouette rieuse à pattes rouges.
15. La Mouette brune.

CII. *Genus Lari.*

1. Larus niger.
2. Larus cinereus.
3. Larus griseus.
4. Larus fulcus.
5. Larus varius sive Skua.
6. Gavia grisea.
7. Gavia grisea minor.
8. Gavia cinerea.
9. Gavia cinerea minor.
10. Gavia cinerea major.
11. Gavia cinerea naevia.
12. Gavia hyberna.
13. Gavia ridibunda.
14. Gavia ridibunda phoenicopos.
15. Gavia fusca.

## SECTION II.

## SECTION II.

CIII. *Genre de l'Hirondelle-de-mer.*

1. La grande Hirondelle-de-mer.
2. La petite Hirondelle-de-mer.
3. L'Hirondelle-de-mer cendrée.
4. L'Hirondelle-de-mer noire ou l'Epouvantail.
5. L'Hirondelle-de-mer à tête noire ou le Gacher.

CIII. *Genus Sternæ.*

1. Sterna major.
2. Sterna minor.
3. Sterna cinerea.
4. Sterna nigra.
5. Sterna atricapilla.



6. *Sterna nævia.*

6. L'Hirondelle-de-mer tachetée.

7. *Sterna fusca.*

7. L'Hirondelle-de-mer brune.

CIV. *Genus Rygchopsalia.*

CIV. *Genre du Bec-en-ciseaux.*

1. *Rygchopsalia.*

1. Le Bec-en-ciseaux.

A. *Rygchopsalia fulva.*

A. Le Bec-en-ciseaux fauve.

ORDO XXIV.

SECTIO I.

CV. *Genus Merganseris.*

1. *Merganser.*

2. *Merganser cristatus.*

3. *Merganser cristatus minor*  
sive *Albellus.*

4. *Merganser leucomelanus.*

5. *Merganser niger.*

6. *Merganser stellatus.*

7. *Merganser cinereus.*

8. *Merganser Virginianus cristatus.*

ORDRE XXIV.

SECTION I.

CV. *Genre de l'Harle.*

1. L'Harle.

2. L'Harle hupé.

3. Le petit Harle hupé ou la  
Piette.

4. L'Harle blanc & noir.

5. L'Harle noir.

6. L'Harle étoilé.

7. L'Harle cendré ou le Bièvre.

8. L'Harle hupé de Virginie.

SECTIO II.

CVI. *Genus Anserinum.*

1. *Anser domesticus.*

A. *Anser cristatus.*

2. *Anser sylvestris.*

3. *Anser Septentrionalis syl-*  
*vestris.*

4. *Anser Canadensis sylvestris.*

5. *Anser sylvestris Freti Hud-*  
*sonis.*

6. *Anser Moscoviticus.*

7. *Anser Guineensis.*

8. *Anser Gambensis.*

9. *Anser Ægyptiacus.*

10. *Anser niveus.*

SECTION II.

CVI. *Genre de l'Oye.*

1. L'Oye domestique.

A. *L'Oye hupée.*

2. L'Oye sauvage.

3. L'Oye sauvage du Nord.

4. L'Oye sauvage de Canada.

5. L'Oye sauvage de la Baye  
de Hudfon.

6. L'Oye de Moscovie.

7. L'Oye de Guinée.

8. L'Oye de Gambie.

9. L'Oye d'Egypte.

10. L'Oye de neige.



- 11. Le Cigne.
- 12. Le Cigne sauvage.
- 13. L'Oye à duvet ou l'Eider.
- 14. La Bernache.
- 15. La petite Bernache.
- 16. Le Cravant.

- 11. Cygnus.
- 12. Cygnus ferus.
- 13. Anser lanuginosus sive Eider.
- 14. Bernicla.
- 15. Bernicla minor.
- 16. Brenta.

## CVII. Genre du Canard.

- 1. Le Canard domestique.
- 2. Le Canard à bec courbé.
- 3. Le Canard musqué.
- 4. Le Canard sauvage.
  - A. *Le grand Canard sauvage.*
  - B. *Le grand Canard sauvage gris.*
  - C. *Le grand Canard sauvage tacheté.*
- 5. Le Canard sauvage du Mexique.
- 6. Le Souchet.
  - A. *Le Souchet à ventre blanc.*
- 7. Le Souchet du Mexique.
- 8. Le Chipeau.
- 9. La Tadorne.
- 10. Le Canard d'hiver.
- 11. Le Canard d'été.
- 12. Le Canard de Bahama.
- 13. Le Canard du Brésil.
- 14. Le Canard à collier de Terre-neuve.
- 15. Le Canard de la Baye de Hudson.
- 16. Le Canard à longue queue.
- 17. Le Canard à longue queue d'Islande.
- 18. Le Canard à longue queue de Terre-neuve.
- 19. Le Millouin.
  - A. *Le Millouin noir.*
- 20. Le Millouin du Mexique.
- 21. Le Canard siffleur.

## CVII. Genus Anatinum.

- 1. Anas domestica.
- 2. Anas rostro incurvo.
- 3. Anas moschata.
- 4. Anas fera sive Boschas.
  - A. *Boschas major.*
  - B. *Boschas major grisea.*
  - C. *Boschas major nævia.*
- 5. Anas fera sive Boschas Mexicana.
- 6. Anas Clypeata.
  - A. *Anas Clypeata ventre candido.*
- 7. Anas clypeata Mexicana.
- 8. Strepera.
- 9. Tadorna.
- 10. Anas hyberna.
- 11. Anas æstiva.
- 12. Anas Bahamensis.
- 13. Anas Brasiliensis.
- 14. Anas torquata ex Insula Terræ-novæ.
- 15. Anas Freti Hudsonis.
- 16. Anas longicauda.
- 17. Anas longicauda Islandica.
- 18. Anas longicauda ex Insula Terræ-novæ.
- 19. Penelope.
  - A. *Penelope nigra.*
- 20. Penelope Mexicana.
- 21. Anas fistularis.



22. *Anas fistularis cristata.*
23. *Anas fistularis Americana.*
24. *Anas fistularis Jamaicensis.*
25. *Glaucium.*
26. *Glaucium minus.*  
*A. Glaucium minus striatum.*
27. *Clangula.*
28. *Anas nigra.*
29. *Anas nigra major.*
30. *Anas nigra major Freti Hudsonis.*
31. *Querquedula.*  
*A. Querquedula erythrocephalos.*
32. *Querquedula minor.*
33. *Querquedula æstiva.*
34. *Querquedula Sinensis.*
35. *Querquedula Americana.*
36. *Querquedula Virginiana.*
37. *Querquedula Mexicana.*
38. *Querquedula Ludoviciana.*
39. *Querquedula Carolinensis.*
40. *Querquedula Ferroensis.*
41. *Querquedula Freti Hudsonis.*
42. *Querquedula Dominicensis.*

22. Le Canard siffleur luppé.
23. Le Canard siffleur d'Amérique.
24. Le Canard siffleur de la Jamaïque.
25. Le Morillon.
26. Le petit Morillon.  
*A. Le petit Morillon rayé.*
27. Le Garrot.
28. La Macreuse.
29. La grande Macreuse.
30. La grande Macreuse de la Baye de Hudson.
31. La Sarcelle.  
*A. La Sarcelle à tête rouge.*
32. La petite Sarcelle.
33. La Sarcelle d'été.
34. La Sarcelle de la Chine.
35. La Sarcelle d'Amérique.
36. La Sarcelle de Virginie.
37. La Sarcelle du Mexique.
38. La Sarcelle de la Louisiane.
39. La Sarcelle de la Caroline.
40. La Sarcelle de Ferroë.
41. La Sarcelle de la Baye de Hudson.
42. La Sarcelle de S. Domingue.

---

ORDO XXV.

SECTIO I.

CVIII. *Genus Anhinga.*

1. *Anhinga.*

CIX. *Genus Lepturus.*

1. *Lepturus.*
2. *Lepturus candidus.*
3. *Lepturus fulvus.*

---

ORDRE XXV.

SECTION I.

CVIII. *Genre de l'Anhinga.*

1. *L'Anhinga.*

CIX. *Genre du Paille-en-cul.*

1. *Le Paille-en-cul.*
2. *Le Paille-en-cul blanc.*
3. *Le Paille-en-cul fauve.*



## SECTION II.

## SECTIO II.

CX. *Genre du Fou.*

1. Le Fou.
2. Le grand Fou.
3. Le Fou brun.
4. Le Fou blanc.
5. Le Fou de Bassan.
6. La Frégate.
7. La petite Frégate.

CXI. *Genre du Cormoran.*

1. Le Cormoran.
2. Le petit Cormoran.

CXII. *Genre du Pélican.*

1. Le Pélican.  
A. *Le Pélican à bec dentelé.*
2. Le Pélican brun.
3. Le Pélican des Philippines.

CX. *Genus Sulæ.*

1. Sula.
2. Sula major.
3. Sula fusca.
4. Sula candida.
5. Sula Bassana.
6. Fregata.
7. Fregata minor.

CXI. *Genus Phalacrocoracis.*

1. Phalacrocorax.
2. Phalacrocorax minor.

CXII. *Genus Onocrotali.*

1. Onocrotalus.  
A. *Onocrotalus rostro denticulato.*
2. Onocrotalus fuscus.
3. Onocrotalus Philippensis.

## ORDRE XXVI.

## SECTION I.

CXIII. *Genre du Flamant.*

1. Le Flamant.

## SECTION II.

CXIV. *Genre de l'Avocette.*

1. L'Avocette.

CXV. *Genre du Coureur.*

1. Le Coureur.

## ORDO XXVI.

## SECTIO I.

CXIII. *Genus Phœnicopteri.*

1. Phœnicopterus.

## SECTIO II.

CXIV. *Genus Avocettæ.*

1. Avocetta.

CXV. *Genus Corrira.*

1. Corrira.



# INDEX TABLE

*Generum.*

*Des Genres.*

LXXXVIII	Genus	. pagina	2	LXXXVIII	Genre	. page	2
LXXXIX	Genus	. . .	12	LXXXIX	Genre	. . .	12
XC	Genus	. . .	23	XC	Genre	. . .	23
XCI	Genus	. . .	33	XCI	Genre	. . .	33
XCH	Genus	. . .	70	XCH	Genre	. . .	70
XCHH	Genus	. . .	81	XCHH	Genre	. . .	81
XCIV	Genus	. . .	85	XCIV	Genre	. . .	85
XCV	Genus	. . .	96	XCV	Genre	. . .	96
XCVI	Genus	. . .	102	XCVI	Genre	. . .	102
XCVII	Genus	. . .	104	XCVII	Genre	. . .	104
XCVIII	Genus	. . .	125	XCVIII	Genre	. . .	125
XCIX	Genus	. . .	130	XCIX	Genre	. . .	130
C	Genus	. . .	139	C	Genre	. . .	139
CI	Genus	. . .	149	CI	Genre	. . .	149
CII	Genus	. . .	157	CII	Genre	. . .	157
CHH	Genus	. . .	202	CHH	Genre	. . .	202
CIV	Genus	. . .	222	CIV	Genre	. . .	222
CV	Genus	. . .	230	CV	Genre	. . .	230
CVI	Genus	. . .	261	CVI	Genre	. . .	261
CVII	Genus	. . .	307	CVII	Genre	. . .	307
CVIII	Genus	. . .	476	CVIII	Genre	. . .	476
CIX	Genus	. . .	479	CIX	Genre	. . .	479
CX	Genus	. . .	494	CX	Genre	. . .	494
CXI	Genus	. . .	511	CXI	Genre	. . .	511
CXII	Genus	. . .	519	CXII	Genre	. . .	519
CXIII	Genus	. . .	532	CXIII	Genre	. . .	532
CXIV	Genus	. . .	537	CXIV	Genre	. . .	537
CXV	Genus	. . .	542	CXV	Genre	. . .	542





# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES NOMS FRANÇOIS.

La lettre G indique le genre : la lettre V, la variété ;  
& la lettre E, l'espece.

A.		G.	E.			G.	E.
A	Lbatros,	98		Canard à collier de Ter-			
	—	98	1	re-neuve,		107	14
	Albatros,	98	1	— à crête noire,		107	26
	Alebrande,	107	31	— à duvet,		106	13
	Alouette de mer, (Gran-			— à la tête grise,		107	15
	de)	103	1	— à la tête purpurine,			
	Anhinga,	108		( Petit )		107	10
	—	108	1	— à longue queue,		107	16
	Avocette,	114		— à longue queue d'Is-			
	—	114	1	lande,		107	17
Avoſetta des Italiens,		114	1	— à longue queue de la			
Autre Espece de Poule				Baye de Hudſon,		107	17
d'eau,		90	2	— à longue queue de			
B.				Terre-neuve,		107	18
B	Ec-à-cifeaux,	104		— à tête élevée,		107	2
	— -en-cifeaux,	104	1	— brun & blanc, (Petit)		107	41
	—	104	1	— brun & tacheté,		107	14
	— -en-cifeaux fauve,	104	1	— brun, ( Petit )		107	39
	Bécaſſine, ( Espece de )	89	1	— d'Amérique au grand			
	Becharu,	113	1	bec,		107	6
	Belleque,	90	1	— d'été,		107	11
	Bernache,	106	14	— d'été de Cateſby,		107	11
	— ( Petite )	106	15	— d'hyver,		107	10
	Bievre,	105	7	— de Bahama,		107	12
C.	— Oifeau,	105	7	— de la Baye de Hud-			
				ſon,		107	15
				— de Madagaſcar,		107	1
				— de Moſcovie,		107	3
				— domeſtique,		107	1
				— du Bréſil,		107	13
				— ( Espece de )		107	26
				— franc,		107	3
				— hupé,		105	7
C.							
C	Anard,	107					
	—	107	1				
	—	107	11				
	— à bec courbé,	107	2				
	— à bec crochu,	107	2				



# TABLE ALPHABETIQUE.

	G. V. E.			[G. E.]	
Canard musqué,	107	3	Cormoran,	111	
— noir de la Baye de			—	111	1
Hudson, (Grand)	107	30	—	111	2
— noir & blanc, (Grand)	106	13	— (Petit,	111	2
— noir & blanc, (Petit)	107	38	Cormorant,	111	1
— sauvage,	107	4	Coupeur d'eau,	104	1
— sauvage du Mexique,	107	5	Coureur,	115	
— sauvage, (Grand)	107	A. 4	—	115	1
— sauvage gris, (Grand)	107	B. 4	Cravant,	106	14
— sauvage tacheré,			—	106	16
(Grand)	107	C. 4	Crot pescherot,	111	1
— siffant au bec noir,	107	24	Cygne,	106	11
— siffant au bec rouge,	107	23	— sauvage,	106	12
— siffleur,	107	21	Cyne,	106	11
— siffleur d'Amérique,	107	23			
— siffleur de la Jamaïque,	107	24			
— siffleur hupé,	107	22	<b>D</b> Amier,	100	3
Cane,	107	1	— (Pétrel tacheré		
— à la tête rousse,	107	19	appellé vulgairement)	100	3
— à tête rousse,	107	19	Diabie de mer,	90	2
— au colier blanc,	106	16	— (Oiseau appelé)	102	15
— de la Guinée,	107	3	Diablotin, (Oiseau ap-		
— de la Guinée, (Gros-			pellé)	102	15
se)	107	3			
— de mer,	106	16			
—	107	21			
Caneton,	107	1	<b>E</b> Ider,	106	13
Caniar,	102	5	Epouvantail,	103	4
Castagneux,	91	9	Espec de Bécassine,	89	1
Cercelle,	107	31	— de Canard,	107	26
—	107	32	— de Plongeon,	91	8
— d'été,	107	33	— de Poule d'eau,	107	3
— de France,	107	32			
— de la Chine,	107	34			
Cercerelle,	107	31			
Chipeau,	107	8	<b>F</b> Ecu en cul,	109	1
Cigne sauvage,	106	12	Flaman,	113	1
Colin,	102	5	Flamand,	113	1
Colombe de Groenland,	92	3	Flamant,	113	
— tacherée de Groen-			—	113	1
lande,	92	4	Flambant,	113	1
Coq de mer,	107	16	Flamboyant,	113	1
			Flammant,	113	1
			Fol,	110	3



	G.	E.		G. V. E.
Fou,	110		Goiland,	103 5
—	110	1	— brun,	102 4
— blanc,	110	4	— cendré,	102 2
— brun,	110	3	— gris,	102 3
— d'une autre sorte,	110	4	— noir,	102 1
— de Bassan,	110	5	— varié,	102 5
— (Grand)	110	2	Gorfou,	96
Foucque,	90	1	—	96 1
Foulcre,	90	1	Gosier, (Grand)	112 2
Foulque,	90		Grand Canard noir de la	
—	90	1	Baye de Hudson,	107 30
— à aigrettes,	91	5	— Canard noir & blanc,	106 13
— à bec varié,	91	10	— Canard sauvage,	107 A. 4
— à cornes,	91	5	— Canard sauvage gris,	107 B. 4
— chauve,	90	1	— Canard sauvage ta-	
— d'eau, (Tringa mâle			cheté,	107 C. 4
aux pattes de la)	89	2	— Fou,	110 2
— d'eau, (Tringa rouge			— gosier,	112 2
aux pattes de la)	89	4	— Pierrot,	99 3
— du Mexique,	90	3	— Pingoin,	94 1
— (Grande)	90	2	— Plongeon,	97 1
— (Tringa au pié-de-)	89	3	— Plongeon de mer,	91 2
Fouque noire & blanche,	91	7	— Plongeon de mer de	
— oreillée,	91	6	Terre-neuve,	97 6
Frégate,	110	6	— Plongeon de riviere,	91 2
—	110	7	— Plongeon tacheté,	97 2
— (Petite)	110	7	—	97 6
Frégates, (Oiseau de)	110	6	Grande Alouette de	
			mer,	103 1
			— Foulque,	90 2
			— Hirondelle-de-mer,	103 1
			— Macreuse,	107 29
			— Macreuse de la Baye	
			de Hudson,	107 30
			— Mouette cendrée,	102 10
			— Mouette grise,	102 5
			— Mouette noire & blan-	
			che,	102 1
			— Poule d'eau,	88 1
			—	88 3
			— Poule de marais,	88 1
			Grebe,	91 1
			—	91 1

## G.

	G.	E.		G. V. E.
<b>G</b> Abian,	102			
Gacher,	103	5		
Ganser des Anglois,	106	9		
Garrot,	107	27		
Garfotte,	107	31		
Gavian,	102	11		
Glammet,	102	11		
Goiland,	102			
—	102	3		
—	102	6		
—	102	12		
—	103	1		



# DES NOMS FRANÇOIS.

xij.

	G.	V.	E.		G.	E.
Grebe à oreilles ,	91		6	Hirondelle - de - mer ,		
— cornue ,	91		4	( Grande )	103	1
— cornue , ( Petite )	91		5	— -de-mer noire ,	103	4
— de l'Isle S. Thomas ,	91		8	— -de-mer , ( Petite )	103	2
— de riviere ,	91		9	—	103	5
— de riviere de la Caro-				— -de-mer tachetée ,	103	6
line ,	91		10	— marine à la tête blan-		
— de riviere de S. Do-				che ,	102	15
mingue ,	91		11	Huubryre , ( Oiseau ap-		
— de riviere noirâtre ,	91	A.	9	pellé en Islande )	97	6
— hupée ,	91		2			
— ( Petite )	91		7	I.		
Grifard ,	102		5		G.	E.
Grosse Cane de la Gui-				J		
née ,	107		3	Ars ,	106	1
Guillemot ,	92			Jodelle ,	90	1
—	92		1	Joudarde ,	90	1
— noir , ( Petit )	92		3	Judelle ,	90	1
— ( Petit )	92		2		L.	
— rayé , ( Petit )	92		4		G.	E.
				L		
				Ivane ,	112	1
				Lumme ,	97	4

H.

	G.	E.		G.	V.	E.
H Alebran ,	107	31	M	Acareux ,	93	
Harle ,	105		—	—	93	1
—	105	1	Macreuse ,	107	28	
—	105	2	— de la Baye de Hud-			
—	107	9	son , ( Grande )	107	30	
—	114	1	— de la riviere de la			
— blanc & noir ,	105	4	Plata ,	90	2	
— cendré ,	105	7	— ( Grande )	107	29	
— étoilé ,	105	6	Macroule ,	90	2	
— hupé ,	105	2	Mallermucke ,	102	5	
— hupé de Virginie ,	105	7	Manchot ,	95		
— hupé , ( Petit )	105	3	—	95	1	
— noir ,	105	5	— tacheté ,	95	2	
Herle ,	105	2	Maulve ,	102		
—	114	1	Millouin ,	107	19	
Hirondelle-de-mer ,	103		— du Mexique ,	107	20	
—	103	2	— noir ,	107	A. 19	
— -de-mer à tête noire ,	103	5	Morelle ,	90	1	
— -de-mer brune ,	103	7	Morillon ,	107	9	
— -de-mer cendrée ,	103	3	—	107	25	

b ij



	G. V. E.			G. V. E.	
Morillon , ( Petit )	107	26	Oye à duver ,	106	13
— rayé , ( Petit )	107	A. 26	— d'Egypte ,	106	9
Mouette à pieds fendus ,	103	6	— d'Espagne ,	106	7
— à tête brune ,	102	14	— de Ballan ,	110	5
— blanche ,	102	8	— de Brenta ,	106	16
—	102	9	— de Canada ,	106	4
— blanche , ( Petite )	103	2	—	106	15
— brune ,	102	4	— de Gambie ,	106	8
—	102	15	— de Guinée ,	106	7
— cendrée ,	102	8	— de mer ,	105	1
—	102	11	— de Moscovie ,	106	6
— cendrée , ( Grande )	102	10	— de neige ,	106	10
— cendrée , ( Petite )	102	9	— de Soland ,	110	5
— cendrée tachetée ,	102	11	— domestique ,	106	1
— d'hyver ,	102	12	— hupée ,	106	A. 1
— d'Irlande , ( Petite )	102	12	— nonnette ,	106	14
— grise ,	102	6	— privée ,	106	1
— grise , ( Grande )	102	5	— sauvage ,	106	2
— grise , ( Petite )	102	7	— sauvage de Canada ,	106	4
— rieufe ,	102	13	— sauvage de la Baye		
— rieufe à pattes rou-			de Hudfon ,	106	5
ges ,	102	14	— sauvage du Nord ,	106	3
O.			Oyson ,	106	1
	G.	E.	P.		
Oie aux aîles blues ,	106	5		G. V. E.	
— de Canada ,	106	4	Paille-en-cul ,	109	
— moqueuse ,	106	3	—	109	1
Oiseau à bec tranchant ,	94	2	—	109	2
— appelé Diable ,	102	15	— -en-cul blanc ,	109	2
— appelé Diablotin ,	102	15	— -en-cul fauve ,	109	3
— appelé en Islande			Pélican ,	112	
Haubryre ,	97	6	—	112	1
— Arctique ,	101	2	—	112	2
—	101	3	— à bec dentelé ,	112	A. 1
— ( Bievre )	105	7	— brun ,	112	2
— de Frégates ,	110	6	— d'Allemagne ,	107	6
— de tempête ,	99	3	— de l'Amérique ,	112	2
— des Tropiques ,	109	1	— des Philippines ,	112	3
—	109	2	Penguin ,	96	1
— du Tropic ,	109	1	— aux piez noirs ,	95	1
— Tropicque ,	109	2	—	95	2
Oye ,	106		— du Nord ,	94	1
—	106	1	Perroquet de mer ,	93	1



# DES NOMS FRANÇOIS.

G. V E.			G. E.		
Perroquet du Groenland,	93	1	Pétrel des Anglois,	100	1
Petit Canard à la tête			— tacheté, appelé vul-		
purpurine,	107	10	gairement Da-		
— Canard brun,	107	39	mier,	100	3
— Canard brun &			Phaïland de mer,	107	16
blanc,	107	41	Phalarope,	89	
— Canard noir &			—	89	1
blanc,	107	38	— brun,	89	3
— Cormoran,	111	2	— cendré,	89	2
— Guillemot,	92	2	— rouffâtre,	89	4
— Guillemot noir,	92	3	Pie de mer à gros bec,	93	1
— Guillemot rayé,	92	4	Pierrot, (Grand)	99	3
— Harle hupé,	105	3	— (Petit)	100	1
— Morillon,	107	26	— tacheté,	100	3
— Morillon rayé,	107	A.26	Piette,	105	1
— Oiseau appelé Rot-			Pigeon du Groenland,	92	3
je,	100	1	Pingoin,	94	
— Pierrot,	100	1	—	94	2
— Pingoin,	94	3	— (Grand)	94	1
— Plongeon,	91	9	— (Petit)	94	3
—	97	2	Pinson de mer,	100	1
—	107	26	— de tempête,	100	1
—	107	27	Plongeon,	97	
— Plongeon de mer,	91	5	— à gorge noire,	97	4
— Plongeon noir &			— à gorge rouge,	97	3
blanc,	92	2	— à la poitrine rouge,	105	2
Petite Bernache,	106	15	— de mer,	94	3
— Frégate,	110	7	—	105	3
— Grebe,	91	7	— de mer à gros bec,	93	1
— Grebe cornue,	91	5	— de mer de Terre-neu-		
— Grebe hupée,	91	3	ve, (Grand)	97	6
— Hirondelle-de-mer,	103	2	— de mer, (Grand)	91	2
—	103	5	— de mer, (Petit)	91	5
— Mouette blanche,	103	2	— de riviere,	91	2
— Mouette cendrée,	102	9	— de riviere, (Grand)	91	2
— Mouette d'Irlande,	102	12	— (Espece de)	91	8
— Mouette grise,	102	7	— (Grand)	97	1
— Poule d'eau,	88	2	— hupé,	91	4
— Sarcelle,	107	32	— marqueté,	97	4
—	107	35	— noir & blanc, (Pe-		
Pétrel,	100		tit)	92	2
—	100	1	— ordinaire,	108	1
— cendré,	100	2	— (Petit)	91	9



xvj) *TABLE ALPHABETIQUE, &c.*

	G.	E.		G. V. E.
Plongeon, (Petit)	97	2	Sarcelle d'Amérique,	107 35
—	107	26	— d'été,	107 33
—	107	27	— de Ferroë,	107 40
— rouge-gorge,	97	3	— de la Baye de Hud-	
— racheté,	97	5	son,	107 41
— racheté, (Grand)	97	2	— de la Caroline,	107 39
—	97	6	— de la Chine,	107 34
Poule-d'eau,	88		— de la Louifiane,	107 38
—	88	1	— de S. Domingue,	107 42
—	90	1	— de Virginie,	107 36
— d'eau, (Autre Espece			— du Mexique,	107 37
de)	90	2	— (Petite)	107 32
— d'eau, (Espece de)	107	3	—	107 35
— d'eau, (Grande)	88	1	Souchet,	107 6
— d'eau, (Grande)	88	3	— à ventre blanc,	107 A. 6
— d'eau, (Petite)	88	2	— du Mexique,	107 7
— d'eau, (Tringa gris de			Stercoraire,	101
fer au pied de)	89	1	—	101 1
— de marais,	88	1	— à longue queue,	101 3
— de marais, (Grande)	88	1	— rayé,	101 2
— de mer,	92	1		T.
Poulette d'eau,	88	2		G. E.
Puffin,	99		<b>T</b> Adorne,	107 9
—	99	1	Tiers,	105 4
— cendré,	99	2	Tourterelle de mer,	92 2
— du Brésil,	99	4	Tringa au pie-de-Foul-	
— du Cap de Bonne Es-			que,	89 3
pérance,	99	3	— gris de fer au pied de	
			Poule d'eau,	89 1
R.			— mâle aux pattes de la	
	G. E.		Foulque d'eau,	89 2
<b>R</b> Ale d'eau,	105	6	— rouge aux pattes de la	
Rasse grand,	88	2	Foulque d'eau,	89 4
Rotje, (Petit Oiseau ap-				V.
pellé)	100	1		G. E.
S.			<b>V</b> Aisseau de guerre,	98 1
	G. V. E.		Vautour d'Irlande,	105 1
<b>S</b> Arcelle,	107	31		Z.
— à tête rouge,	107 A. 31			G. E.
— brune de l'Améri-			<b>Z</b> oucet,	91 9
que,	107	36		



# INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum , Latinorum , Hebraicorum ,  
Græcorum , &c.

*Littera G Genus designat; Littera V, varietatem; &  
Littera S, Speciem.*

A.

	A.	G.	S.		G.	S.
A <sup>Citli</sup> —	91	2		A <sup>idua</sup> ,	97	
—confueverunt vocare	91	4		Ala ,	107	16
Mexicenses, ( Ge-				Albatros ,	98	
nus Anatis quam )	91	4		—	98	1
—Hernandezii ,	91	2		Albatros ,	98	1
—Mergus Americanus ,	91	2		—spurius minimus ,		
Adem ,	91	5		( Plautus )	100	1
Aden ,	107	1		Albatus ,	98	
Admirandæ Avis cucul-				—	98	1
latæ aquaticæ spe-				— ( Plautus )	98	1
cies ,	91	4		Albella , ( Anas )	105	3
Aed ,	106	13		Albellus ,	105	3
Aeda ,	106	13		—alter ,	105	3
Aedder ,	106	13		—alter Aldrovandi ,	105	3
Aeder-fugl ,	106	13		—aquaticus ,	105	3
Aende ,	107	1		Albeola ,	107	38
Aente ,	107	1		Albuke ,	102	9
Aerfevoet ,	91	5		Alca ,	94	
Aerta ,	107	32		—	94	2
Æthia ,	94	3		—Arctica ;	93	1
Æthya ,	97	2		—Clusii ,	94	2
Affinis , ( Anleri Bassa-				—Hoieri ,	94	2
no )	110	3		—impennis ,	94	1
African-Duck ,	107	3		—major ,	94	1
Agrotti ,	112	1		—minor ,	94	3
Agrotto ,	112	1		—rostri fulcis octo , &c.	94	1
Ahl-Fogel ,	107	16		—rostri fulcis quatuor ,		
Ahr , ( Fisch )	102	14		&c.	93	1
A <sup>idua</sup> ,	91	4		—	94	2
A <sup>idua</sup> ,	91	4		—rostro compresso-an-		
A <sup>idua</sup> ,	97	2		cipiti , &c.	93	1
				—	94	1



	G. V. S.	G.	S.
Alca rostro lævi conico ,		Anade silvestre ,	107 4
&c.	92 2	Anadra ,	107 1
— rostro lævi oblongo ,		Anætherus major meli-	
&c.	92 1	nus , &c.	110 11
— rostro lævi subulato ,		— minor fuscus , &c.	102 15
&c.	92 3	Anas ,	106 1
— torquata , &c.	94 1	—	107
— Wormii Musei ,	94 2	—	107 1
Alcatraz ,	112 1	—	107 16
—	112 A. 1	— acuta ,	107 16
— (Atototl)	112 A. 1	— adunca ,	107 2
Alcatrazes grandes de la		— adunco rostro ,	107 2
Isla Espanola de		— æstiva ,	107 11
Oviedo ,	112 2	— alba , &c.	107 38
Ack ,	94 2	— Albella ,	105 3
Alcyon major pulla , &c.	110 6	— albida , &c.	107 10
— media alba ,	109 2	— albo-variegata , &c.	107 9
A ebrande ,	107 31	— alis cinereis , &c.	107 19
A enbock ,	102 9	— Americana cinerea ,	
A'er ,	107 16	&c.	107 35
A'haufal ,	112 1	— Americana moscha-	
A'hautel ,	112 1	ta ,	107 3
Alia fulicæ species ,	90 2	— angustirostra, Sculrus	
Aliis Anas fistularis ,	107 21	vulgò dicta ,	110 11
Aliud Mergi genus ,	91 4	— arborea ,	107 24
—	105 4	— arborea Schwenck-	
Alk ,	94 2	feldii ,	106 14
Alka ,	94 2	— Arctica ,	93 1
— Hoieri ,	94 2	— Arctica Clusii ,	93 1
— Hoieri, Wormii Mu-		— aurantia ,	107 1
fei ,	94 2	— autumnalis ,	107 23
Alle ,	92 2	— Bahamentis ,	107 12
—	92 3	— Brasiliensis ,	107 13
Alouette de mer, (Gran-		— bucephala ,	107 10
de)	103 1	— Cairina ,	107 3
Altera Ecatototl ,	105 8	— Cairina Aldrovan-	
Alterum genus platy-		di ,	107 3
rhynchi Anatis ,	107 6	— capite brunneo , &c.	107 21
— Mergi varii genus ,	105 6	— capite colloque ni-	
— Merguli genus ,	91 6	gris ,	106 14
American Wood Duck ,	107 11	—	106 16
Anade ,	107 1	— capite rufo major ,	107 22
— de Calle ,	107 1	— capite virecente ,	107 6



# ALPHABETICUS.

xix

G. V. S.

G. V. S.

<i>Anas cauda acuminata</i> ,		
&c.	107	16
— <i>cauda acuta</i> ,	107	16
— <i>cauda acutiuscula</i> ,		
&c.	107	21
— <i>cauda cuneata</i> , &c.	107	17
— <i>cauda cuneiformi</i>		
<i>acuta</i> ,	107	16
— <i>cauda cuneiformi</i>		
<i>forcipata</i> ,	107	17
— <i>cauda forcipata</i> ,	107	17
— <i>caudacuta</i> ,	107	16
— <i>caudacuta Aldro-</i>		
<i>vandi</i> ,	107	16
— <i>caudacuta, Haveldæ</i>		
<i>Wormii similis</i> ,	107	17
— <i>caudacuta Islandica</i>		
<i>Havelda ipsis dic-</i>		
<i>ta Wormii</i> ,	107	17
— <i>caudæ reëtricibus in-</i>		
<i>termediis recur-</i>		
<i>vis</i> ,	107	1
—	107	4
— <i>caudata</i> ,	107	16
— <i>chilli colore</i> ,	107	42
— <i>cicur</i> ,	107	1
— <i>cinerea</i> , &c.	106	3
—	107	16
—	107	19
— <i>circia</i> ,	107	33
— <i>circia Gefneri</i> ,	107	33
— <i>cirrhatà</i> ,	107	26
— <i>clangosa</i> , &c.	107	21
— <i>Clangula</i> ,	107	27
— <i>clypeata</i> ,	107	6
— <i>clypeata Germanica</i> ,	107	6
— <i>clypeata Germanis</i>		
<i>dicta</i> ,	107	6
— <i>clypeata Mexicana</i> ,	107	7
— <i>clypeata ventre can-</i>		
<i>dido</i> ,	107	A. 6
— <i>corpore obscuro</i> ,		
&c.	107	29

<i>Anas Coturnicum Me-</i>		
<i>xicanarum colo-</i>		
<i>re</i> ,	107	42
— <i>crista dependente</i> ,		
&c.	107	11
—	107	26
—	107	34
— <i>cristata</i> ,	107	26
— <i>cristata Americana</i> ,	107	11
— <i>cristata flavescens</i> ,	107	22
— <i>cristata sexta Sch-</i>		
<i>wenckfeldii</i> ,	107	27
— <i>domestica</i> ,	107	1
— <i>domestica rostro a-</i>		
<i>dunco</i> ,	107	2
— <i>domestica variè va-</i>		
<i>riegata</i> , &c.	107	1
— <i>domestica vulgaris</i> ,	107	1
— <i>domesticus</i> ,	107	1
— <i>Erythrocephalos</i> ,	107	22
— <i>facie nuda papillosa</i> ,	107	3
— <i>Farnensis</i> ,	106	13
— <i>fera</i> ,	107	4
—	107	16
— <i>fera</i> , &c.	107	4
— <i>fera canora</i> ,	107	21
— <i>fera capite subrufo</i>		
<i>major</i> ,	107	25
— <i>fera</i> , <i>capite subrufo</i>		
<i>minor</i> ,	107	19
— <i>fera caudacuta</i> ,	107	16
— <i>fera caudacuta Sch-</i>		
<i>wenckfeldii</i> ,	107	16
— <i>fera cristata</i> ,	107	27
— <i>fera decima</i> ,	107	8
— <i>fera decima quarta</i> ,	107	33
— <i>fera decima quinta</i> ,	107	31
— <i>fera decima Sch-</i>		
<i>wenckfeldii</i> ,	107	8
— <i>fera decima septima</i> ,	107	A. 6
— <i>fera decima sexta</i> ,	107	32
— <i>fera decima sexta</i>		
<i>Schwenckfeldii</i> ,	107	32



	G. V. S.		G. V. S.
Anas fera decima tertia,	107 32	Anas fera quarta,	107 B. 4
— fera decima tertia		— fera quinta,	107 31
Schwenckfeldii,	107 32	— fera secunda,	107 A. 4
— fera duodecima,	107 16	— fera secunda Sch-	
— fera duodecima Sch-		wenckfeldii,	107 A. 4
wenckfeldii,	107 16	— fera septima,	107 A. 31
— fera Erythrocephalo-		— fera sexta,	107 27
primus,	107 19	— fera tertia,	107 C. 4
— fera Erythrocephalo-		— fera torquata major,	107 A. 4
secundus,	107 22	— fera torquata major	
— fera fusca,	107 19	Schwenckfeldii,	107 A. 4
— fera fusca Aldro-		— fera torquata minor,	107 4
vandi,	107 19	— fera, torquata, viri-	
— fera fusca alia,	107 A. 19	dis, &c.	107 A. 4
— fera fusca Gesneri,	107 19	— fera ventre candido,	107 16
— fera fusca minor,	107 25	— fera undecima,	107 21
— fera, griseo colore,		— ferina,	107 19
&c.	107 2	— fistularis,	107 21
— fera juncea,	107 B. 4	— fistularis, ( Aliis )	107 21
— fera, maculâ in fron-		— fistularis Americana,	107 23
te candidâ infi-		— fistularis arboribus	
gnis,	107 A. 31	insidens,	107 24
— fera major,	107 C. 4	— fistularis cristata,	107 22
—	107 24	— fistularis Fabricii,	107 21
— fera marina,	107 16	— fistularis Jamaicensis,	107 24
— fera media,	107 19	— fistularis Willughby,	107 21
—	107 31	— Freti Hudsonis,	107 15
— fera media Gesneri,	107 19	— Fuligula,	107 26
— fera mediæ magni-		— Fuligula alia,	107 25
tudinis,	107 19	— Fuligula prima Al-	
— fera Mexicana,	107 5	drovandi,	107 26
— fera minor,	107 32	— Fuligula prima Ges-	
— fera minor prima,	107 32	neri,	107 26
— fera minor quarta,	107 32	— fusca,	107 19
— fera minor quarta		—	107 29
Schwenckfeldii,	107 32	— fusca, &c.	106 4
— fera minor quinta,	107 A. 6	—	106 14
— fera minor secunda,	107 33	—	106 16
— fera minor tertia,	107 31	—	107 14
— fera nona,	107 22	— fusca cristata, &c.	107 11
— fera octava,	107 19	— fusco-cinerea, &c.	107 39
— fera prima,	107 4	— galericulata,	107 34
— fera quædam marina,	107 16	— Glaucia, fera,	107 25



# ALPHABETICUS.

xxj

	G. V. S.			G. S.	
Anas grisea, &c.	106	5	Anas longirostra,	105	2
—	107	12	— longirostra Gesneri,	105	2
—	107	23	— longirostra prima,	105	2
—	107	24	— longirostra quarta,	107	9
—	107	32	— longirostra quinta,	105	3
—	107	41	— longirostra secun-		
— histrionica,	107	14	da,	105	2
— hyberna,	107	10	— longirostra septima,	105	3
— hyemalis,	107	17	— longirostra sexta,	105	4
— Indica,	107	3	— longirostra tertia,	105	5
— Indica alia,	107	3	— lunaris,	107	4
— Indica altera,	107	3	— Lybica,	107	3
— Indica Gesneri,	107	3	— Lybica Aldrovan-		
— Indica Gesneri, Al-			di,	107	3
drovandi,	107	3	— Lybica alia,	107	3
— Indica prima,	107	3	— Lybica Bellonii,	107	3
— Indica quarta,	107	9	— macula alari purpu-		
— Indica tertia,	107	3	rea, &c.	107	6
— iridibus flavis, &c.	107	25	— macula alarum pur-		
— Islandica, cauda pro-			purea, &c.	107	6
tenfa,	107	17	— macula alarum rufa,		
— Islandica, Havellda			&c.	107	8
ipsis dicta,	107	17	— macula alarum va-		
— Islandica, protensa,			ria, &c.	107	33
cauda, Havellda			— macula alarum viri-		
ipsis dicta,	107	17	di, &c.	107	31
— Kernell circa Ar-			—	107	32
gentoratum dicta,	107	31	— marina,	107	32
— latirostra,	107	6	— marina platyrynchos		
—	107	A. 6	mas,	107	27
— latirostra America-			— maritima,	107	9
na,	107	6	— maritima Rondele-		
— latirostra major,	107	6	tii,	107	9
— latirostra major Ges-			— maxima, &c.	107	3
neri,	107	6	— media Schwenckfel-		
— latirostra Schwenck-			dii,	107	19
feldii,	107	6	— mediocris,	107	31
— latirostra tertia fusca,	107	6	— minor capite purpu-		
— longicauda,	107	16	reo,	107	10
— longicauda ex Insula			— minor ex albo & fus-		
Terræ-novæ,	107	18	co varia,	107	39
— longicauda Islandi-			— minuta,	107	41
ca,	107	17	— mollissima,	106	13

c iij



	G.	V.	S.		G.	S.
Anas montana Spitzber-				Anas platyrhynchos ,	107	6
genfis, Friderici				—	107	25
Martensii ,	106	15		— platyrhynchos ery-		
— moscata Aldrovan-				thropsus Aldro-		
di ,	107	3		vandi ,	107	6
— moschata ,	107	3		— platyrhynchos pedi-		
— muscaria ,	107	A. 6		bus luteis ,	107	6
— muscaria Aldrovan-				— platyrhynchos pedi-		
di ,	107	A. 6		bus luteis Aldro-		
— muscaria Gefneri ,	107	A. 6		vandi ,	107	6
— muscaria Willugh-				— platyrhynchos ,	107	26
beji ,	107	A. 6		—	107	27
— Muscicapa , &c.	107	A. 6		— platyrhynchos altera ,	107	6
— Muscovitica ,	107	3		— platyrhynchos ery-		
— niger ,	107	28		thropsus ,	107	6
— niger Aldrovandi ,	107	29		— platyrhynchos * mas		
— niger major ,	107	29		Aldrovandi ,	107	27
— niger minor ,	107	28		— platyrhynchos minor		
— nigra ,	107	28		alter ,	107	25
—	107	29		— platyrhynchos minor		
— nigra , &c.	107	30		prior ,	107	26
— nigra Aldrovandi ,	107	29		— platyrhynchos pedi-		
— nigra major ,	107	29		bus rubris ,	107	6
— nigra major Freti				— platyrhynchos rostro		
Hudsonis ,	107	30		nigro & plano ,	107	8
— nigra , rostro nigro ,				— platyrhynchos rostro		
rubro & luteo ,	107	29		nigro & plano		
— nigricans , &c.	107	29		Aldrovandi ,	107	8
— nigro alboque varia ,				— plumis mollissimis ,	106	13
&c.	107	27		— plumis mollissimis		
— nigro alboque va-				Wormii ,	106	13
riegata , &c.	107	27		— Quacula ,	107	36
— oculorum iridibus				— quam vulgò Mifeni		
flavis , &c.	107	25		mustelarem ap-		
— parva ex nigro & al-				pellant ,	105	3
bo variegata ,	107	38		— Querquedula Ame-		
— parva mustelaris ,	107	32		ricana variegata ,	107	35
— peregrina ,	107	3		— Querquedula Fran-		
— perspicillata ,	107	30		cia ,	107	32
— platyrinchos ,	107	6		— Querquedula secun-		
— platyrinchos Gefne-				da , Aldrovandi ,	107	32
ri ,	107	25		— quibusdam media ,	107	19
— platyrinchos , mas ,	107	27		— raucedula ,	105	1



# ALPHABETICUS.

G. S.

xxiiij  
G. V. S.

<i>Anas rectricibus inter-</i>			<i>Anas sylvestris Brasili-</i>		
<i>mediis recurva-</i>			<i>sis magnitudine</i>		
<i>tis, &amp;c.</i>	107	1	<i>Anseris Marcgra-</i>		
—	107	2	<i>vii,</i>	107	3
—	107	4	— <i>sylvestris Brasiliensis,</i>		
— <i>rostri extremo dila-</i>			<i>Mareca dicta pri-</i>		
<i>tato, &amp;c.</i>	107	6	<i>ma Marcgravii,</i>	107	12
— <i>rostro adunco,</i>	107	2	— <i>sylvestris Brasiliensis,</i>		
— <i>rostro basi gibbo</i>			<i>Mareca dicta se-</i>		
<i>compresso, &amp;c.</i>	107	15	<i>cunda Marcgra-</i>		
— <i>rostro cylindrico,</i>			<i>vii,</i>	107	13
<i>&amp;c.</i>	106	13	— <i>sylvestris magnitu-</i>		
— <i>rostro incurvo,</i>	107	2	<i>dine Anseris,</i>	107	3
— <i>rostro latiori, &amp;c.</i>	107	6	— <i>sylvestris major,</i>		
— <i>rostro semicylindri-</i>			<i>Peuceri,</i>	107	4
<i>co, &amp;c.</i>	106	1	— <i>sylvestris minor,</i>	107	32
—	106	2	— <i>sylvestris vera, Al-</i>		
—	106	3	<i>berti,</i>	107	4
—	106	7	— <i>Tadorna Bellonii,</i>	107	9
—	106	11	— <i>testaceo nebulosa, &amp;c.</i>	107	33
—	106	12	— <i>torquata,</i>	107	4
—	106	13	— <i>torquata Bellonii,</i>	106	16
— <i>rostro fimo, &amp;c.</i>	107	9	— <i>torquata Bellonii,</i>		
— <i>rustica,</i>	107	39	<i>Cane de mer gal-</i>		
— <i>S. Cutberti,</i>	106	13	<i>licè dicta,</i>	106	16
— <i>Schellaria,</i>	107	6	— <i>torquata ex Insula</i>		
— <i>See-Vogel dicta,</i>	107	16	<i>Terræ-novæ,</i>	107	14
— <i>Sinenfis,</i>	107	34	— <i>torquata major,</i>	107	A. 4
— <i>spectabilis,</i>	107	15	— <i>torquata minor,</i>	107	4
— <i>splendens,</i>	107	32	— <i>torquata minor Al-</i>		
— <i>stellata,</i>	105	6	<i>drovandi,</i>	107	4
— <i>Strepera,</i>	107	8	— <i>tota nigra, &amp;c.</i>	107	28
— <i>Strepera Schwenck-</i>			— <i>Turcica quibusdam</i>		
<i>feldii,</i>	107	8	<i>dicta,</i>	107	1
— <i>subfusca major, &amp;c.</i>	107	24	— <i>varia cristata,</i>	107	11
— <i>subfusca minor, &amp;c.</i>	107	35	— <i>versicolor, &amp;c.</i>	107	1
— <i>sylvestris,</i>	107	4	— <i>virescens,</i>	107	6
— <i>sylvestris Brasili-</i>			<i>Anatis, ( Alterum ge-</i>		
<i>sis Ipecati A-</i>			<i>nus platyrhynchi)</i>	107	6
<i>poa dicta Marc-</i>			— <i>feræ, ( Genus quod-</i>		
<i>gravii,</i>	107	3	<i>dam)</i>	107	5
— <i>sylvestris Brasiliensis,</i>			— <i>Indicæ rara quædam</i>		
<i>ApecaApoa dicta,</i>	107	3	<i>species,</i>	107	3



Anatis platyrhynchi species,	107	25	Anser,	106	1
—quam Acitli consueverunt vocare Mexicenses, ( Genus )	91	4	—Ægyptiacus,	106	9
—quam aquatilem Leporem consueverunt vocare Mexicenses, ( Genus )	91	4	—arboreus Gefneri,	106	14
—species, Harle Gallis dicta,	105	2	—arborum,	106	14
—species, Herle Gallis dicta,	105	2	—Bassanus,	110	5
—sylvestris species, ( Mareca )	107	12	—Bassanus, (Plancus)	110	5
Anatre,	107	1	—Brenta,	106	14
—d'India,	107	3	—	106	15
—del Lybia;	107	3	—	106	16
Anaz,	106	1	—Canadensis,	106	4
Ancka,	107	1	—Canadensis fuscus		
And, ( Graes- )	107	4	—maculatus,	106	3
—( Winter- )	107	17	—Canadensis sylvestris,	106	4
—( Wri- )	107	21	—Canadensis Willughbeyi,	106	14
Anech,	107	1	—candidus, &c.	106	2
—coll vert,	107	A. 4	—Chilensis,	106	8
Anhinga,	108		—Chinesiensis,	106	7
—	108	1	—cinereus, &c.	106	2
—Brasilienfibus Tupinambis,	108	1	—	110	5
—Brasilienfibus Tupinambis Marcgravio,	108	1	—cœrulefcens,	106	5
—vocatus, ( Plancus Brasilensis )	108	1	—cristatus,	106	A. 11
Ania,	107	1	—Cygneus,	106	7
Anidra,	107	1	—Cygneus Guineensis,	106	7
Anitra,	107	1	—	106	4
—domestica,	107	1	—	106	7
—salvatica,	107	4	—Cygnus,	106	11
Anfar,	106	1	—	106	12
—bravo,	106	2	—domesticus,	106	1
Anfaron,	106	1	—Embergoose dictus		
Anser,	106		—Sibbaldi,	97	6
			—erythropus,	106	3
			—ferus,	106	2
			—ferus alius,	106	2
			—ferus Flandricus,	106	2
			—ferus simpliciter,	106	2
			—Gambensis,	106	8
			—grandinis,	106	10
			—grandinis Schwenckfeldii,	106	10
			—Guineensis,	106	7



# ALPHABETICUS.

XXV

G. V. S.			G. S.		
Anser hibernus Sch-			Anseri Bassano, (Plan-		
wenckfeldii, 106	10		cus congener ) 110	2	
— Hispanicus, 106	7		Anserinum genus aliud, 106	3	
— Hispanicus parvus, 106	9		Ant, 107	1	
— immansuetus, 106	2		— -Vogel, 107	1	
— lanuginosus, 106	13		Apeca Apoa dicta,		
— Magellanicus, 94	1		( Anas sylvestris		
— 95	1		Brasilienfis ) 107	3	
— Magellanicus Clusii, 95	1		Apoa Brasilienfisibus,		
— maximus niger, The			( Ipecati ) 107	3	
Whilk dictus, 107	30		— dicta, ( Anas sylves-		
— montanus, 106	2		tris Brasilienfis,		
— montanus Spitzber-			Apeca ) 107	3	
gensis Friderici			— dicta Marcgravii,		
Martensii, 106	15		( Anas sylvestris		
— Moscoviticus, 106	6		Brasilienfisibus Ipe-		
— niveus, 106	10		cati ) 107	3	
— nivis Schwenckfeldii, 106	10		— ( Ipecati ) 107	3	
— Nostratibus The Em-			Aquæ superficiem ra-		
bergoose dictus, 97	6		dens, 99	1	
— palustris noster, Grey			Aqueus Lepus, 91	4	
Lagg dictus, 106	2		Aquilus, 110	6	
— plumis mollissimis			Arctica, 92	2	
Willughbeji, 106	13		— 93	1	
— rostro semicylindri-			— ( Alca ) 93	1	
co, &c. 106	6		— ( Anas ) 93	1	
— Rufficus, 106	6		— Clusii, ( Anas ) 93	1	
— rusticus, 106	1		Arctick-Bird, 101	2	
— Scoticus, 110			— 101	3	
— Septentrionalis syl-			Arcticus, ( Plautus ) 93	1	
vestris, 106	3		Ard, 105	2	
— sylvestris, 106	2		Ardea exotica aurita, 91	4	
— sylvestris Freti Hud-			Ardea, 102	5	
sonis, 106	5		Ars, ( Feucht ) 111	1	
— tertius sylvestris, 106	2		Arse-foot, 91	5	
— versicolor cirratus, 106	A. 1		Arsefoot, ( Great ) 91	1	
— versicolor non cirra-			Arsevoet, 91	4	
tus, 106	1		Arssfoot, 91	5	
— vulgaris, 106	1		— -Diver, ( Greater ) 91	1	
— 106	2		Arssfoofs der Klein, 91	5	
Anseri Bassano affinis, 110	3		Arsz, ( Feucht ) 111	1	
— Bassano congener, 110	1		— ( Vucht ) 111	1	
— 110	3		Antenna, 99	1	







# ALPHABETICUS.

xxvij

G. V. S.

G. V. S.

Bak ,	112	1	Bill , ( Razor- )	94	2
— cudzoziemski ,	112	1	Birckilgen ,	107	33
Bald Coor ,	90	1	Bird , ( Arctick )	101	2
—	90	2	—	101	3
Baskak ,	106	11	— Frigate- )	110	6
Baffanus ,	110	5	— ( Man-of War )	101	3
Baum Endtle ,	106	14	—	110	6
— -Gans ,	106	14	—	110	7
— -Ganss ,	106	14	— ( Tropick )	109	1
— -Ganz ,	106	14	—	109	2
Bebe ,	107	1	Bivar ,	106	1
Bec-à-ciseaux ,	104	1	Black and White Gull ,		
— -en-ciseaux ,	104		( Great )	102	1
—	104	1	— -bill'd Whistling		
— -en-ciseaux fauve ,	104	A. 1	Duck ,	107	24
Bécassine , ( Espece de )	89	1	— -cap ,	102	14
Beccoroëlla ,	114	1	— cloven-footed Sea-		
Beccostorta ,	114	1	Swallow, (Small)	103	4
Beccostorto ,	114	1	— Duck from Hudson's		
Becharu ,	113	1	Bay , ( Great )	107	30
Begue ,	102	9	— Duck , ( Great )	107	29
—	102	11	— headed Gull ,	103	4
Belch ,	90	1	Blaonacke ,	107	4
Belchinen ,	90	1	Blaos-Klacka ,	90	1
Belleque ,	90	1	Blas Endte ,	107	4
Berg-Endten ,	107	9	—	107	A. 31
— Ente ,	106	13	Blas-Ent ,	107	4
Bergander ,	107	9	Blaw Endte , ( Wilde )	107	4
— Aldrovandi ,	107	9	Blauw Eent , ( Wild- )	107	4
Bernache ,	106	14	Biesand ,	90	1
— ( Petite )	106	15	Blessing ,	90	1
Bernacla ,	106	14	Blesz ,	90	1
Bernacle ,	106	14	Blue-wing Teal ,	107	36
Bernichia ,	106	14	— winged Goose ,	106	5
Bernicla ,	106	14	Boellhinen ,	90	1
—	106	16	Booby ,	110	1
— Anglorum ,	106	14	—	110	3
— authoris ,	106	16	— ( Great )	110	2
— minor ,	106	15	Boscas ,	107	31
Bernicula ,	106	14	— Bellonii ,	107	31
—	106	16	— major ,	107	4
Bièvre ,	105	7	— minor , ( Nonnullis )	107	32
— Oileau ,	105	7	Boschas ,	107	1

dij



	G.	V.	S.		G.	S.
Boschas,	107	4		Buphagus,	102	5
—	107	21		Burgermeester,	102	3
— major,	107	4		Burgher-meister Spits-		
—	107	A. 4		bergenfis Fride-		
— major Athenæi,	107	A. 4		rici Martensii,	102	3
— major grisea,	107	B. 4		Burgo-Master of Groen-		
— major nævia,	107	C. 4		land,	102	5
— Mexicana,	107	5		Burrough-Duck,	107	9
— minor Commelino,	107	32		Burrow-Duck,	107	9
Boschis Columellæ,	107	32				
Borax,	107	31			C.	
Bottlenose,	93	1			G.	S.
Brand-Goose,	106	16		Abuffet,	91	9
— Vogel,	103	4		Cabuffo,	91	9
— Vogel Leonardi Balt-				Calabria,	91	2
neri,	103	4		Canada Goose,	106	4
Brandt Ende,	107	22		Canard,	107	
— Endte,	107	22		—	107	1
Branta,	106	14		—	107	11
—	106	16		— à bec courbé,	107	2
— Anglorum,	106	14		— à bec crochu,	107	2
Braun Endte,	107	19		— à collier de Terre-		
— -koepfficht Endte,	107	32		neuve,	107	14
— koepffichte Endte,	107	19		— à crête noire,	107	26
Breit-Schnabel,	107	6		— à duvet,	106	13
— Schnaeblichte Wild				— à la tête grise,	107	15
Endtle,	107	6		— à la tête purpurine,		
Brent-Goose,	106	16		( Petit )	107	10
Brenta,	106	16		— à longue queue,	107	16
— ( Anser )	106	14		— à longue queue d'Is-		
—	106	15		lande,	107	17
—	106	16		— à longue queue de la		
— minor,	106	15		Baye de Hudson,	107	17
Egretas,	106	15		— à longue queue de		
Brenthus,	106	15		Terre-neuve,	107	18
Brown and white Duck,				— à tête élevée,	107	2
( Little )	107	41		— brun & blanc, (Petit)	107	41
— Duck, ( Little )	107	39		— brun & tacheté,	107	14
— Gull,	102	4		— brun, ( Petit )	107	39
— headed Gull,	102	14		— d'Amérique au grand		
Brunnacke,	107	25		bec,	107	6
Buffel's Head Duck,	107	10		— d'été,	107	11
Buixot,	107	19		— d'été de Catesby,	107	11



# ALPHABETICUS.

xxix

	V. G. S.			G.	S.
Canard d'hyver,	107	10	Caneton,	107	1
— de Bahama,	107	12	Caniar,	102	5
— de la Baye de Hudson,	107	15	Cap, ( Black- )	102	14
— de Madagascar,	107	1	Capo negro,	107	26
— de Moscovie,	107	3	— rosso,	107	25
— domestique,	107	1	— rosso maggiore,	107	22
— du Brésil,	107	13	Carbo,	111	1
— ( Espece de )	107	26	— aquaticus,	111	1
— franc,	107	3	Cargoos,	91	2
— hupé,	105	7	Caripira,	110	6
— musqué,	107	3	Castagneux,	91	9
— noir de la Baye de			Castor Bellonii,	105	7
Hudson, (Grand)	107	30	Cataractes,	92	1
— noir & blanc, (Grand)	106	13	— nofter,	102	4
— noir & blanc, (Petit)	107	38	Catarracta,	102	4
— sauvage,	107	4	— Aldrovandi,	102	4
— sauvage du Mexique,	107	5	Catarractes,	96	
— sauvage, ( Grand )	107	A. 4	—	96	1
— sauvage gris, (Grand)	107	B. 4	— nofter,	102	4
— sauvage racheté,			Catarrhaetes,	102	4
( Grand )	107	C. 4	Catha,	112	1
— siffant au bec noir,	107	24	Catharracta,	102	4
— siffant au bec rouge,	107	23	Cauka, ( Coddell )	104	1
— siffleur,	107	21	Cauky, ( Summoodra )	104	1
— siffleur d'Amérique,	107	23	Cepphus,	97	2
— siffleur de la Jamaï-			—	102	7
que,	107	24	— Aldrovandi,	102	7
— siffleur hupé,	107	22	— Aristotelis,	102	7
Cancofragus minor vul-			— Turneri,	102	14
gatifsimus,	110	1	Cercedula,	107	31
Cane,	107	1	—	107	32
— à la tête rousse,	107	19	Cercelle,	107	31
— à la tête rousse Bello-			—	107	32
nii,	107	19	— d'été,	107	33
— à tête rousse,	107	19	— de France,	107	32
— au colier blanc,	106	16	— de la Chine,	107	34
— de la Guinée,	107	3	Cercerelle,	107	31
— de la Guinée (Grosse)	107	3	Cercéta,	107	32
— de mer,	106	16	Cercevolo,	107	31
—	107	21	—	107	32
Cane de mer gallicè dicta,			Cesano,	106	11
( Anas torquata			Ceson,	106	16
Bellonii )	106	16	Cesone,	107	4



	G.	S.		G. V. S.
Χαλιχατζός ,	97		Chloropus major , ( Gal-	
Chenalopex ,	94	1	linula )	88 1
—	107	9	Cigne sauvage ,	106 12
— quibusdam ,	107	9	Cigno ,	106 11
Χλώ ,	106	1	Cignus ,	106 11
— ὁ ἀγέλαιος ,	106	2	Cinnana ,	106 11
— ὁ μικρὸς ,	106	2	Cinnaria ,	106 11
Χλωα ,	107	1	Cino ,	106 11
Χλωαλαπιξ ,	107	9	Circia ,	107 33
Χλωιδης ,	106	1	— ( Anas )	107 33
Chick , ( Dob- )	91	5	— Gesneri ,	107 33
— ( Eared Dob- )	91	5	— Gesneri , ( Anas )	107 33
— ( Horned Dob- )	91	5	Cisano ,	106 11
Chilcanauhtli ,	107	42	Cisne ,	106 11
China Goose ,	106	7	Clak-Gufe ,	106 14
Χίνα ,	106	1	Clake-Gufe ,	106 14
Chipeau ,	107	8	Clakis ,	106 14
Chloropos altera , ( Gal-			Clangula ,	107 27
linula )	88	3	— ( Anas )	107 27
— ( Fulica )	88	1	— Fabricii ,	107 6
— nostra major , ( Gal-			— Gesneri ,	107 27
linula )	88	1	Cloven footed Gull ,	103 6
Chloropus ,	88	1	Cock Coot-footed Trin-	
— alia , ( Gallinula )	88	2	ga ,	89 2
— altera Aldrovandi ,			Cockmaeu ,	102 9
( Gallinula )	88	3	Coda lancea ,	107 16
— altera Avis Aldro-			Coddell Cauka ,	104 1
vandi ,	88	3	Coddy Moddy ,	102 12
— altera , ( Gallinula )	88	3	Colcanauhtli ,	107 42
— Fulicæ similis Bello-			Colin ,	102 5
nii , Aldrovandi ,			Collier ,	107 6
( Gallinula alia )	88	2	Collo rosso ,	107 19
— Fulicæ similis Bello-			Colombe de Groenland ,	92 3
nii , ( Gallinula			— tachetée de Groen-	
alia )	88	2	lande ,	92 4
— ( Gallinula )	88	1	Columba Groenlandica ,	92 3
—	88	3	— Groenlandica dicta ,	92 3
— major Aldrovandi ,	88	1	— Groenlandica Hol-	
— major Aldrovandi ,			landis ,	92 3
( Gallinula )	88	1	Columbus Groenlandi-	
— major Aldrovandi ,			cus ,	92 3
Willughbeyi ,			Colymbi minoris aliud	
( Gallinula )	88	1	genus ,	91 A. 2



# ALPHABETICUS.

G. V. S.

xxxj

G. V. S.

Colymbim vocat, (Quer-			Colymbus fluviatilis Do-		
quedula cristata,			minicensis,	91	11
quam Bellonius)	107	26	— fluviatilis nigricans,	91	A. 9
Colymbis,	91	5	— fuscus,	91	10
—	91	9	— Insulæ S. Thomæ,	91	8
— Bellonii,	107	26	— major,	91	1
— congener, (Quæ-			—	91	4
dam Avis)	97	1	— major Aldrovandi,	91	1
— Willughby,	107	26	— major alter,	91	4
Colymbus,	91		— major Bellonii,	91	2
—	91	1	—	91	9
—	91	9	— major cristatus,	91	2
— albus, major, cris-			—	91	4
tatus, Aldrovand-			— major cristatus Al-		
di,	91	4	drovandi,	91	2
— alius major cristatus			— major cristatus &		
& cornutus,	91	4	cornutus,	91	4
— alter,	91	A. 9	— major cristatus Mar-		
— Arcticus,	97	4	filli,	91	2
— Arcticus Lumme			— major primus,	91	1
Wormio dictus,	97	4	— major secundus,	91	4
— Arcticus Willugh-			— maximus,	97	1
by,	97	4	— maximus caudatus,	97	2
— Arcticus Wormii,	97	4	— maximus caudatus		
— auritus,	91	4	alius,	97	5
—	91	5	— maximus caudatus		
—	91	6	circa Insulam Jar-		
— Bellonii,	107	26	sey occisus,	97	5
— cinereus, &c.	91	9	— maximus Gesneri,	97	1
— cinereus D. Brown,	91	3	— maximus stella-		
— cinereus major,	91	3	tus,	97	2
— cornutus,	91	4	— maximus stellatus		
— cornutus minor,	91	5	nostras,	97	6
— cristatus,	91	2	— minor,	91	5
—	91	4	—	91	6
— cristatus & cornutus			—	91	7
Willughby,	91	4	—	91	A. 9
— cristatus Mexicanus,	91	4	— minor alius,	91	6
— cristatus minor,	91	3	— minor Bellonii,	91	9
— cristatus Willughby,	91	2	— minor pullus, &c.	91	5
— fluviatilis,	91	9	— pedibus lobato-divi-		
— fluviatilis Carolinen-			sis, &c.	91	4
sis,	91	10	—	91	5



	G.	S.		G.	S.
Colymbus pedibus lobato-fissis, &c.	91	4	Coot, ( Meer- )	90	1
— pedibus lobatis, &c.	91	5	— ( Weazel )	105	6
—	91	6	Coote, ( Plantane )	90	1
—	91	10	— ( Red faced )	88	1
— pedibus palmaris, &c.	97	4	Coq de mer,	107	16
— pedibus trydactilis, &c.	92	3	Cormoran,	111	
— subrus albus, &c.	91	2	—	111	1
— tertius,	91	9	— ( Petit,	111	2
Common Grey Widgeon,	107	19	Cormorant,	111	1
— Sea Gull,	102	10	— ( Lesser )	105	2
— Sea Mall,	102	10	Corrira,	115	
— Sea-Mew,	102	10	—	115	1
— Tame Duck,	107	1	— Aldrovandi,	115	1
— Teal,	107	32	Corvo marino,	111	1
— Water-Hen,	88	1	Corvus aquaticus,	111	1
— Whewer,	107	21	— aquaticus major,		
— Wigeon,	107	21	Gefneri,	111	1
— Wild Duck,	107	4	— aquaticus minor,	111	2
— Wild Goose,	106	2	— aquaticus minor,		
Compita,	91	1	Graculus palmi-		
Congener, ( Anseri Bassano )	110	1	pes dictus,	111	2
—	110	3	— aquaticus Plinii,	111	1
— Anseri Bassano,			— lacustris,	111	1
( Plancus )	110	2	— marinus,	105	1
— ( Mergo mustelari leucomelano )	105	3	—	111	2
Coot,	88	1	— minor aquaticus,		
—	90	1	( Plancus )	111	2
— ( Bald )	90	1	— Sinarum marinus,	111	1
—	90	2	Cotta calva,	90	2
—-footed Tringa,	89	3	— major,	90	2
—-footed Tringa,			Coturnicum Mexicana-		
( Cock )	89	2	rum colore, ( A-		
—-footed Tringa,			nas )	107	42
( Grey )	89	1	—	115	1
— footed Tringa,			Cowt,	111	2
( Red )	89	4	Crackafona,	107	31
— ( Greater )	90	2	Cracker,	107	16
			Crane,	111	2

Cravant



# ALPHABETICUS.

xxxij

	G.	S.		G.	S.
Cravant,	106	14	Deucchel,	91	1
—	106	16	Deucchelin,	91	5
Crecca,	107	32	Deuckekin,	97	
Crested-Diver,	91	4	Diabie de mer,	90	2
— Diver, ( Greater )	91	4	— ( Oiseau appelé )	102	15
— Duck, ( Round- )	105	8	Diablotin, ( Oiseau ap-		
— Loon,	91	4	pellé )	102	15
Crocalo,	102		<i>Diabolum marinum vo-</i>		
—	102	9	cant, ( Fulica		
Crot pescherot,	111	1	quamParisienses)	90	2
Crow, ( Scare- )	103	4	Didapper,	91	5
— ( Sea- )	102	14	— ( Great )	91	1
—	104	1	Diomedea Aldrovandi,		
—	111	2	( Avis )	99	1
Cuallarch,	107	16	— alis impennibus, &c.	95	1
Cuervo calvo,	111	1	—	95	2
Cut Water,	104	1	— alis pennatis, &c.	98	1
Cutbert-Duck,	106	13	— Avis,	99	1
Cycnus,	106	11	— ( Avis )	99	1
—	106	12	— demerfa,	95	1
Cygne,	106	11	—	95	2
— sauvage,	106	12	— exulans,	98	1
Cygnat,	106	11	— Gesneri, ( Avis )	99	1
Cygnoides australis,	106	7	Dipper,	91	5
— Orientalis,	106	6	Diver, ( Crested- )	91	4
Cygnus,	106	11	— ( Dun )	105	1
—	106	12	— ( Great )	91	2
— ( Anser )	106	11	— ( Great Ash-colou-		
—	106	12	red )	91	3
— ferus,	106	12	— ( Greater Arsfoot- )	91	1
— manfuetus,	106	11	— ( Greater Crested )	91	4
— subcinereus, &c.	106	1	— ( Greater Loon- )	91	1
— subfuscus, &c.	106	7	— ( Greatest- )	97	2
Cyne,	106	11	—	97	6
Cyranka,	107	32	— ( Greatest Speckled )	97	2
	D.		— ( Greatest tailed )	97	2
	G.	S.	— ( Red-headed )	105	7
<b>D</b> Aucher,	105	3	— ( Speckled )	97	4
Damier,	100	3	— ( White Nun- )	105	3
— ( Pétrel tacheté ap-			Diving Killebrew,	91	5
pellé vulgaire-			Dob-chick,	91	5
ment )	100	3	— chick, ( Eared )	91	5
Dark Petterill, ( Larger )	99	3	— chick, ( Horned )	91	5



	G.	S.		G. V. S.
Dobchekin,	91	5	Duck, (Indian-)	107 3
Dobchick,	91	5	— ( Little Brown )	107 39
— ( Pied Bill )	91	10	— ( Little Brown and	
Dopping,	107	27	White )	107 41
Doucker,	91	5	— ( Muscovian- )	107 3
— ( Great Ash-colou-			— ( Muscovite )	107 3
red )	91	3	— ( Muscovy- )	107 3
Dove, ( Greenland )	92	2	— Red - bill'd Whist-	
— ( Sea-Turtle- )	92	3	ling )	107 23
Douker, ( Great )	91	1	— ( Round-crested )	105 8
Dritt-Vogel, ( Weiffer )	107	27	— ( Scaup )	107 A. 26
Duc-Laart,	91	8	— ( Spoon-bill'd )	107 25
Düchel,	91	4	— ( Tufted )	107 26
Düchele, ( Schwartz )	91	6	— ( Whistling )	107 24
Duch Endtlin,	91	6	— ( White-bellied )	107 16
Duchent,	97		— ( Wild- )	107 4
Duchentlin,	91	5	Dun Diver,	105 1
Ducher,	97		Duycker,	97
—	111	1	— ( Papegey )	93 1
Duck,	107	1	Duyf Martensii,	92 2
— ( African- )	107	3	Dzika,	90 1
— ( American Wood )	107	11	E.	G. S.
— ( Black-bill'd Whist-			Eared Dob-chick,	91 5
ling )	107	24	Eboracensis Sco-	
— ( Buffel's Head )	107	10	ter,	107 28
— ( Burrough- )	107	9	Ecatototl,	105 8
— ( Burrow- )	107	9	— altera,	105 8
— ( Common Tame )	107	1	— ( Altera )	105 8
— ( Common Wild )	107	4	Edder,	106 13
— ( Cutbert- )	106	13	— -Fugl,	106 13
— ( Egyptian- )	107	3	Edel, ( O )	107 40
— from Hudson's Bay,			Eder-Vogel,	106 13
( Great Black )	107	30	Eende, ( Whilde )	107 4
— from Hudson's Bay,			Eendt,	107 1
( Long-tailed )	107	17	Eent, ( Weltfch- )	105 1
— from New - Found-			— ( Wild-blauw )	107 4
land, ( Long-rai-			Egyptian-Duck,	107 3
led )	107	18	Eider,	106 13
— ( Great Black )	107	29	— Wormii,	106 13
— ( Grey Headed )	107	15	Elbs,	106 11
— ( Guiny )	107	3	Elk,	106 12
— Hook bill'd )	107	2	Elps,	106 11
— ( Ilathera )	107	12	Elster Endtlin,	105 3



# ALPHABETICUS.

xxxv

G. V. S.

G. V. S.

Embergoose ,	97	6	Endte , ( Raetsch )	107	4
— dictus , ( Anfer Nof-			— ( Rofz )	107	C. 4
tratribus The )	97	6	— ( Rote )	107	19
— dictus Sibbaldi, (An-			— ( Schlicht )	105	2
fer )	97	6	— ( Schmael )	107	B. 4
End-Vogel, ( Tamme )	107	1	— ( Schmil )	107	B. 4
Ende , ( Brandt )	107	22	— ( Schnarr )	107	8
— ( Mittel- )	107	19	— ( Schnatter )	107	8
— ( Straus- )	107	27	— ( Spiegel )	107	4
— ( Wilde )	107	4	— ( Spies )	107	16
Endianischer Entrach ,	107	3	— ( Sprenglicht )	107	31
Endlin , ( Kriech- )	107	32	— ( Stertz )	107	A. 4
— ( Krieg )	107	32	— ( Stor )	107	A. 4
Endrach, (Indianischer)	107	3	— ( Straus )	107	27
Endr ,	107	1	— ( Tauch )	105	5
— ( Hausf- )	107	1	— ( Teurckisch )	107	3
— ( Skel )	107	25	— ( Weisse Tuch ,	105	2
— ( Straufz )	107	26	— ( Wild )	107	4
Endte ,	107	1	— ( Wilde blaw )	107	4
—	107	4	— ( Wilde Graw ,	107	19
— ( Blas- )	107	4	— ( Zam )	107	1
—	107	A. 31	Endten , ( Berg- )	107	9
— ( Brandt )	107	22	— ( Mittel- )	107	31
— ( Braun )	107	19	Endtle , ( Baum )	106	14
— ( Braun-koepfficht )	107	32	— ( Breit - Schnaebli-		
— ( Braun koepffichte )	107	19	chte Wild )	107	6
— ( Eys )	105	3	— ( Fliegen )	107	A. 6
— ( Frembde )	107	3	— ( Kaefer )	91	6
— ( Fuchs )	107	32	— ( Kreuck )	107	32
— ( Gefcheckte Straus )	105	2	— ( Loeffel )	107	6
— ( Gros )	107	4	— ( Meuck )	107	A. 6
— ( Groffe Gefcheckte )	105	4	— ( Mos )	107	A. 6
— ( Groffe Wild )	107	A. 4	— ( Mur )	107	A. 6
— ( Groffe Wilde )	107	C. 4	— ( Schall )	107	6
— ( Haus )	107	1	— ( Schild )	107	6
— ( Kobel )	107	27	Endtlin , ( Duch )	91	6
— ( Krich- )	107	32	— ( Elfter )	105	3
— ( Mertz )	107	4	— ( Eyfz )	105	3
—	107	C. 4	— ( Gefchecktes )	105	3
— ( Mittel )	107	19	— ( Graw )	107	32
—	107	31	—	107	33
— ( Nonn )	105	3	— ( Kreuck )	107	32
— ( Plas )	107	A. 31	— ( Niederlendifch )	105	3



	G. V. S.			G.	S.
Endtlin, (Nonn)	105	3	Entle, (Mour-)	107	32
— (Pfeiff-)	107	21	— (Sor-)	107	32
— (Scheckicht)	107	31	Entlein, (Krich-)	107	32
— (Schnerr)	107	8	Entrach,	107	1
Endtrach,	107	1	— (Endianischer)	107	3
Ent,	107	1	Entrich,	107	1
— (Blafs-)	107	4	Epouvantail,	103	4
— Gefnero Aldrovan-			Equus marinus,	100	2
di (Mugg)	107	A. 6	Espece de Bécassine,	89	1
— (Grosz-)	107	4	— de Canard,	107	26
— (Hag-)	107	4	— de Plongeon,	91	8
— (Kleine)	107	32	— de Poule d'eau,	107	3
— (Meer-)	107	16	Esia,	91	4
— (Mertz-)	107	A. 4	Eyder-Ente,	106	13
— (Mittel-)	107	19	Eye, (Golden)	107	27
—	107	31	Eys Endte,	105	3
— (Mofs-)	107	A. 4	Eysz Endtlin,	105	3
— (Mour-)	107	A. 4		F.	
— (Mugg-)	107	A. 4		G.	S.
—	107	A. 6	F		
— (Retsch-)	107	4	Alco marinus aliqui-		
— (Rhy-)	105	3	— bus dictus, (Gyr-)	102	11
— (Rot-)	107	19	Fel,	103	2
— (Schell-)	107	6	Fetu en cul,	109	1
—	107	25	Feucht Ars,	111	1
— (Schilt)	107	25	— Arsz,	111	1
— (Spiegel-)	107	4	Fiber Bellonii,	105	7
— (Stor-)	107	A. 4	— marinus, &c.	110	3
— (Stortz-)	107	A. 4	Fin-footed Runner,	115	1
— (Wilde Grawe)	107	19	Fiorna,	91	5
— (Wisse Tuch-)	105	4	Fisanelle,	91	1
Ente, (Berg-)	106	13	Fisch Ahr,	102	14
— (Eyder-)	106	13	— Freßer, (Großerer)	102	13
— (Grosse)	107	A. 4	— Treiber,	107	9
— (Kriech-)	107	32	— Weiher,	103	2
— (Krig-)	107	32	Fischerlin,	103	2
— (Pfief-)	107	21	— Leonardi Baltneri,	103	2
— (Schlucht-)	105	2	Fisherling,	103	2
Enten, (Krieg-)	107	32	Flaecka, (Siaer-)	114	1
— (Voll-)	107	26	— (Skjaer-)	114	1
— (Wilde)	107	4	Flaman,	113	1
Entle, (Graw-)	107	32	Flamant,	113	1
— (Kruck-)	107	32	—	113	1
			Flamand,	113	1



# ALPHABETICUS.

xxxvij

G. V S.

G. S.

Flambant,	113	1	Foulque chauve,	90	1
Flamboyant,	113	1	— d'eau, ( Tringa mâle		
Flamenco,	113	1	aux pattes de la )	89	2
— vocant, ( Avis quam			— d'eau, ( Tringarouge		
Hispani )	113	1	aux pattes de la )	89	4
Flamengo,	113	1	— du Mexique,	90	3
Flamingo,	113	1	— ( Grande )	90	2
Flammant,	113	1	— ( Tringa au pié-de- )	89	3
Fliegen Endtle,	107	A. 6	Fouque noire & blanche,	91	7
Florn,	90	1	— oreillée,	91	6
Fluder,	91	4	Fratercula,	93	1
—	97	1	—	93	1
— dicta, ( Avis )	97	1	— Gesneri,	93	1
— ( Groſſe Zee- )	97	1	— Gesneri, Aldrovan-		
Fogel, ( Ahl- )	107	16	di,	93	1
— ( Kjoer- )	105	2	Fregata,	110	6
— ( Wark- )	105	2	— Avis Rochefortio,	110	6
Fogelen, ( Stromwae-			— Avis du Tertre,	110	6
ders )	100	1	— marina, apus, &c.	110	6
Fol,	110	3	— minor,	110	7
Folega,	90	1	Frégate,	110	6
Follaga,	90	1	—	110	7
Follega,	90	1	— ( Petite )	110	7
Follata,	90	1	Frégates, ( Oiseau de )	110	6
Foolish Sparrow of Bra-			Frembde Endte,	107	3
ſil,	102	15	Frembder Waſſer- Vo-		
Foot, ( Arſe- )	91	5	gel,	114	1
Fotge,	90	1	Freſſer, ( Groſſerer Fiſch )	102	13
Fou,	110		Frigate-Bird,	110	6
—	110	1	Fuchs Endte,	107	32
— blanc,	110	4	Fugl, ( Aeder- )	106	13
— brun,	110	3	— ( Edder- )	106	13
— d'une autre ſorte,	110	4	Fuld-Koppe,	92	2
— de Baſſan,	110	5	Fulg, ( Geir- )	105	1
— ( Grand )	110	2	Fulica,	90	
Foucque,	90	1	—	90	1
Foul, ( Sparling )	105	1	— aterrima,	90	2
Foulcre,	90	1	— atra,	90	1
Foulque,	90		— chloropos,	88	1
—	90	1	— craſſo corpore, &c.	90	2
— à aigrettes,	91	5	— fronte calva, &c.	88	1
— à bec varié,	91	10	—	90	1
— à cornes,	91	5	— fuſca, &c.	89	3



	G. V. S.	G.	S.
Gefcheckte Endte ,		Goose, ( Canada )	106 4
( Groffe )	105 4	— ( China )	106 7
— Straus Endte ,	105 2	— ( Common Wild )	106 2
Gefchecktes Endtlin ,	105 3	— ( Gambo- )	106 8
Gefnero Piscator ,	103 2	— ( Laughing- )	106 3
Ghef Friderici Marten-		— ( Rat- )	106 15
fii , ( Kudge- )	102 11	— ( Road- )	106 15
Glammet ,	102 11	— ( Scotch- )	106 14
Glaucia , fera , ( Anas )	107 25	— ( Soland )	110 5
Glaucion ,	107 25	— ( Spanish )	106 7
Glaucium ,	107 25	— ( Spur-Wingd )	106 8
— Bellonii ,	107 25	— ( Swan- )	106 7
— minus ,	107 26	— ( Tame )	106 1
— minus striatum ,	107 A. 26	— ( Wild )	106 2
Glaucius ,	106 16	Gorfou ,	96
—	107 25	—	96 F
Γλαύκιον ,	107 25	Gofe ,	106 1
Goas ,	106 1	Gofier , ( Grand )	112 2
— ( Ju- )	107 9	Gouttreufe ,	112 1
— ( Siberish )	106 7	Gracculus palmipes ,	111 2
— ( Turkisk )	106 7	Graculus ,	110 5
— ( Will )	106 2	— palmipes ,	111 2
Goes ,	106 1	— palmipes Aristotelis ,	111 2
Goufugel ,	94 1	— palmipes dictus ,	
— Hoieri ,	94 1	( Corvus aquati-	
Goiland ,	102 1	cus minor )	111 2
—	102 3	Graes-And ,	107 4
—	102 6	Grau See- Meb Leo-	
—	102 12	nardi Baltneri ,	
—	103 1	( Groffe )	102 5
—	103 5	Graver Meer-Schwalm ,	102 14
— brun ,	102 4	Grautle ,	92 3
— cendré ,	102 2	Graw Endte , ( Wilde )	107 19
— gris ,	102 3	— Endtlin ,	107 32
— noir ,	102 1	—	107 33
— varié ,	102 5	— -Entle ,	107 32
Goufugel ,	94 1	Grawe Ent , ( Wilde )	107 19
Golden Eye ,	107 27	— Gans ,	106 2
Goofander ,	105 1	Grauwe Nunn ,	105 3
Goofe ,	106 1	Gray ,	107 8
— ( Blue-Winged )	106 5	Grand Canard noir de la	
— ( Brand- )	106 16	Baye de Hudfon ,	107 30
— ( Brent- )	106 16	— Canard noir & blanc ,	106 13



# ALPHABETICUS.

xlj

G. V. S.

G. V. S.

Grand Canard sauvage, 107	A. 4	Great Red-headed Wid-	
— Canard sauvage gris, 107	B. 4	geon ,	107 19
— Canard sauvage ta-		— Sea Loon ,	91 2
cheté ,	107 C. 4	— Speckled Loon from	
— Fou ,	110 2	Newfound land ,	97 6
— Gofier ,	112 2	Greater Arsfoot-Diver ,	91 1
— Pierrot ,	99 3	— Coot ,	90 2
— Pingoin ,	94 1	— Crested Diver ,	91 4
— Plongeon ,	97 1	— Loon-Diver ,	91 1
— Plongeon de mer ,	91 2	— Sea-Swallow ,	103 1
— Plongeon de mer de		Greatest-Diver ,	97 2
Terre-neuve ,	97 6	—	97 6
— Plongeon de riviere ,	91 2	— Loon ,	97 2
— Plongeon tacheté ,	97 2	—	97 6
—	97 6	— Speckled Diver ,	97 2
Grande Alouette de		— Speckled Loon ,	97 2
mer ,	103 1	— tailed Diver ,	97 2
— Foulque ,	90 2	Grebe ,	91 1
— Hirondelle-de-mer ,	103 1	—	91 1
— Macreuse ,	107 29	—	102 9
— Macreuse de la Baye		—	102 11
de Hudfon ,	107 30	— à oreilles ,	91 6
— Mouette cendrée ,	102 10	— cornue ,	91 4
— Mouette grise ,	102 5	— cornue , ( Petite )	91 5
— Mouette noire & blan-		— de l'Isle S. Thomas ,	91 8
che ,	102 1	— de riviere ,	91 9
— Poule d'eau ,	88 1	— de riviere de la Caro-	
—	88 3	line ,	91 10
— Poule de marais ,	88 1	— de riviere de S. Do-	
Great Arsefoot ,	91 1	mingue ,	91 11
— Ash-coloured diver ,	91 3	— de riviere noirâtre ,	91 A. 9
— Ash-coloured Douc-		— hupée ,	91 2
ker ,	91 3	— ( Petite )	91 7
— Black and White		Greenland Dove ,	92 2
Gull ,	102 1	Grey Coot-footed Trin-	
— Black Duck ,	107 29	ga ,	89 1
— Black Duck from		— Gull , ( Great )	102 5
Hudson's Bay ,	107 30	— Gull , ( Lesser )	102 10
— Booby ,	110 2	— Headed Duck ,	107 15
— Didapper ,	91 1	— Lagg ,	106 2
— Diver ,	91 2	— Lagg dictus , ( An-	
— Douker ,	91 1	ler palustris nos-	
— Grey Gull ,	102 5	ter )	106 2



	G. V. S.			G.	S.
Grey Widgeon, (Common)	107	19	Guacu, (Ipeca-)	107	3
Griaibe,	102	11	Gudunge,	106	13
Griarbe,	102	9	Guillam,	92	1
Grifard,	102	5	Guillem,	92	1
Grifla,	92	3	Guillemot,	92	
Gros Endte,	107	4	—	92	1
Grosse Cane de la Guinée,	107	3	— from Greenland,	92	1
— Entte,	107	A. 4	— noir, (Petit)	92	3
— Gefcheckte Endte,	105	4	— (Petit)	92	2
— grau See-Meb Leonardibaltneri,	102	5	— rayé, (Petit)	92	4
— Langschnaeblichte,	105	2	Guiny Duck,	107	3
— See-Meb,	102	13	Gulden-Head,	93	1
— Wild Endte,	107	A. 4	Gull, (Black headed)	103	4
— Wilde Endte,	107	C. 4	— (Brown)	102	4
— Zee-Fluder,	97	1	— (Brown headed)	102	14
Grosser Kobel-Taucher,	91	4	— (Cloven footed)	103	6
— Kobel Teucher,	91	4	— (Common Sea)	102	10
— See-Schwalm,	102	14	— (Great Black and White)	102	1
— Teucher,	105	5	— (Great Grey)	102	5
Grosserer Fisch Freffer,	102	13	— (Herring-)	102	3
Grosz-Ent,	107	4	—	102	5
Gróto,	112	1	— (Langhing)	102	13
Grotto,	112	1	— (Lesser Grey)	102	10
— marino,	112	1	— (Plunging)	103	2
— Molinaro,	112	1	— (White web footed)	102	8
Grylle,	92	3	Gulo, (Plancus)	112	1
Guaca guacu,	102	12	—	112	2
— guacu Brasiliensibus,	102	12	Guse, (Clak-)	106	14
— guacu dictus Marcgravii, (Larus Brasiliensibus)	102	12	— (Clake-)	106	14
Guacu Brasiliensibus, (Guaca)	102	12	— (Solend-)	110	5
— Brasiliensium Pisoni, (Ipeca-)	107	3	Gusz,	106	1
— dictus Marcgravii, (Larus Brasiliensibus Guaca)	102	12	Gyr-Falco marinus ali-quibus dictus,	102	11
— (Guaca)	102	12	Gyven,	105	4
			H.	G.	S.
			Haffert,	100	2
			Hafs-Tjaeder,	111	1
			Hag Ent,	107	4
			Hagel Gans,	106	10
			Hakik,	112	1
			Halebran,	107	31



# ALPHABETICUS.

xlüj

	G.	S.		G.	S.
Hals, ( Rott )	107	22	Henne, ( Rohr )	90	1
Halbs, ( Rot- )	107	19	Herle,	105	2
Harle,	105	—	—	114	1
—	105	1	— Gallis dicta, ( Ana-		
—	105	2	tis species )	105	2
—	107	9	— vocat, (Mergus quem		
—	114	1	Bellonius Galli-		
— blanc & noir,	105	4	cè )	105	2
— cendré,	105	7	Herring-Gull,	102	3
— étoilé,	105	6	—	102	5
— Gallis dicta, ( Ana-			Heunle, ( Ror- )	90	1
tis species )	105	2	Hijo de Pato,	106	1
— hupé,	105	2	Himbryne,	97	6
— hupé de Virginie,	105	7	Hirondelle-de-mer,	103	
— hupé, ( Petit )	105	3	—	103	2
— noir,	105	5	— -de-mer à tête noire,	103	5
Hatsche,	107	1	— -de-mer brune,	103	7
— ( Wild )	107	4	— -de-mer cendrée,	103	3
Haubest,	100	2	— -de - mer, ( Gran-		
Havelda ipfis dicta Wor-			de )	103	1
mii, ( Anas cau-			— -de-mer noire,	103	4
dacuta Islandica )	107	17	— -de-mer, ( Petite )	103	2
Haveldæ Wormii simi-			—	103	5
lis, ( Anas cau-			— -de-mer tachetée,	103	6
dacuta, )	107	17	— marine à la tête blan-		
Haveld, )	107	17	che,	102	15
Haveldæ ipfis dicta,			Hirundinis aquaticæ		
( Anas Islandica, )	107	17	exoticæ species,		
— ipfis dicta, ( Anas			( Singularis )	97	4
Islandica, pro-			Hirundo,	103	1
tenſa cauda, )	107	17	— exotica aquatica,	97	4
Haus-Endte,	107	1	— marina,	102	11
Haufs-Endt,	107	1	—	103	1
Head, ( Gulden- )	93	1	— ( Marina )	103	2
Heatototl,	105	8	— marina Gefneri,	102	9
— altera,	105	8	— marina major,	103	1
Heine, ( Vogel- )	112	1	— marina major, apus,		
Helegug,	93	1	&c.	110	6
Hen, ( Common Wa-			— marina minor,	103	2
ter- )	88	1	— marina minor ca-		
— ( Moor- )	88	1	pite albo, ( La-		
— ( More- )	88	1	rus, )	102	15
— ( Sea- )	92	1	— minor capite albo,	102	15

fij



	G.	S.		G.	S.
Hoca,	106	1	Judelle,	90	1
Holbrod,	102	9	Junge Gans,	106	1
Holbrouder,	102	9	Jurar,	91	4
Homaoka,	102	1		K.	
—	102	8		G.	S.
Hook bill'd Duck,	107	2	K Aath,	97	
Hooper,	106	12	K Kabel,	102	9
Horned Dob-chick,	91	5	Kacza,	90	1
Houn, (Wasser)	88	2	Kaczier,	107	1
—	90	1	Kaczka,	107	1
Hupling,	111	1	— drzewna,	106	14
Hun, (Wasser)	90	1	Káczká dziká,	107	4
Hürchelin,	91	5	Kæczier,	107	1
Hus,	106	1	Kaefer Endtle,	91	6
Huubryre,	97	6	Kaeferentle,	91	5
— (Oiseau appellé en			Kaki,	106	1
Ilande)	97	6	Karabatak,	91	6
			Kasagos O'pis,	105	7
I.			Katapantys,	102	4
	G.	S.	Kautke-Gef,	102	11
J Ager, (Strundt-)	101	3	Kédes,	115	1
Jars,	106	1	Keluk,	114	1
Jaskolka morska,	103	1	Kémpas,	102	7
Icsterre,	103	1	Kepis,	107	32
Ilathera Duck,	107	12	Kernel,	107	31
Ildbrimel,	97	6	Kernell,	107	31
Imbrim,	97	6	— circa Argentoratum		
Indian-Duck,	107	3	dicta, (Anas)	107	31
Indianischer Endrach,	107	3	— circa Argentoratum		
Jodelle,	90	1	dicta, (Querque-		
Jogas,	107	9	dula)	107	31
Jomuvia,	92	1	Kesler Leonardi Balt-		
Joudarde,	90	1	neri,	102	8
Ipeca-Guacu,	107	3	Kiddaw,	92	1
— Guacu Brasiliensium			Kik,	112	1
Pisoni,	107	3	Killegrew, (Diving)	91	5
Ipecati Apoa,	107	3	Kjoer-Fogel,	105	2
— Apoa Brasiliensibus,	107	3	Kirr-Meuw,	103	6
— Apoa dicta Marc-			Kittiwake, (Avis)	102	11
gravii, (Anas syl-			Klacka, (Blaos-)	90	1
vestris Brasiliensi-			Klein Meubefzlin,	103	4
bus)	107	3	— Schwartz Teucher-		
Ju-Goas,	107	9	lin,	91	6



G.		S.	L.		G.	S.
Klein Schwartzzer See-						
Schwalbe,	103	4				
— See-Schwalbe,	103	2	L Aart, (Duc)		91	8
Kleine Ent,	107	32	Labben,		101	3
— Mewe,	103	1	Labec,		106	11
Klinger,	107	27	Labesc,		106	11
Knipa,	107	27	Labut,		106	11
Kobel Endre,	107	27	Lagg dictus, (Anser pa-			
— -Taeucher, (Gros-			lustris noster,			
fer)	91	4	Grey)		106	2
— Teucher, (Grosser)	91	4	— (Grey)		106	2
Kock-Mew,	102		Lamvier,		92	1
Kokofska,	88	1	Langhing Gull,		102	13
Κολυμβίς,	91	4	Langirie,		92	1
—	91	9	Langschnabel,		105	2
Κολυμβός,	91	4	Langschnaeblichte,			
Kopff, (Rott)	107	22	(Grosse)		105	2
Koppe, (Fuld-)	92	2	Larger Dark Petterill,		99	3
Κορυμβήρης,	101	3	— Shear-Water,		99	3
Κορονι θαλασσιος,	111	1	Λάρος,		102	
Kreuck-Endtle,	107	32	Λάρος λευκός,		102	9
— Endtlin,	107	32	— αποδοειδής,		102	11
Krich-Endte,	107	32	Larus,		102	
— Entlein,	107	32	—		102	5
Kriech-Endlin,	107	32	—		103	1
— Ente,	107	32	— albicans,		103	1
Krieg Endlin,	107	32	— albicans, dorso ca-			
— -Enten,	107	32	nescente,		102	12
Krig-Ente,	107	32	— albo-cinereus torque			
Kropf-Gans,	112	1	cinereo,		102	11
Kropff-Gans,	112	1	— albo-cinereus torque			
Kruck-Entle,	107	32	cinereo Aldro-			
Kruk morski,	105	1	vandi,		102	11
— wodny,	111	1	— albo-niger, &c.		103	5
Kudge-Ghes Friderici			— albus,		102	11
Martensii,	102	11	— albus, &c.		102	1
Kuk,	112	1	—		102	3
Kulig,	102	13	—		102	8
— morski,	103	1	—		102	13
Kuutge-Ges, (La-			— albus erythroceph-			
rus)	102	11	lus,		102	14
Κυδνός,	106	11	— albus major,		102	9
Κυκνός,	106	11	— albusmajor Bellonii,		102	9



	G.	S.		G.	S.
Larus albus minor ,	103	2	Larus cinereus primus ,	102	9
— albus minor Bello-			— cinereus rostro & pe-		
nii ,	103	2	dibus rubris ,	102	14
— Americanus , &c.	102	8	— cinereus rostro & pe-		
— Americanus , casta-			dibus rubris Al-		
neus , &c.	102	15	drovandi ,	102	14
— Americanus minor ,			— cinereus tertius ,	102	14
&c. D. Sloane ,	102	15	— clamide leucophæa ,		
— Brasiliensibus Guaca			&c.	102	6
guacu dictus ,			— fidipes alius alis bre-		
Marcgravii ,	102	12	vioribus ,	103	3
— canus ,	102	8	— fidipes alter ,	103	3
— chlamyde leuco-			— fidipes alter alis bre-		
phæa , &c.	102	6	vioribus Aldro-		
— cinereus ,	102	2	vandi ,	103	3
—	102	9	— fidipes alter nostras ,		
—	102	14	D. Johnson ,	89	2
— cinereus Aldrovan-			— fidipes primus ,	103	4
di ,	102	9	— fluviatilis ,	103	2
—	102	14	— fuscus ,	102	3
— cinereus alter ,	102	8	—	102	4
— cinereus alter , rostro			—	102	12
& pedibus rubris ,	102	14	— griseus ,	102	3
— cinereus Aristoteli ,	102	9	— griseus maximus ,	102	5
— cinereus Bellonii ,	102	11	— Hirundo marina mi-		
— cinereus fissipes , &c.	103	6	nor capite albo ,	102	15
— cinereus Jonstoni ,	102	9	— hybernus ,	102	12
— cinereus major ,	102	5	— hybernus Baltneri ,	102	5
—	102	9	— hybernus Leonardi		
— cinereus major Bel-			Baltneri ,	102	5
lonii ,	102	11	— ingens marinus ,	102	1
— cinereus maximus ,	102	3	— Kuutge-Gef ,	102	11
— cinereus maximus			— leucomelanos , cauda		
marinarius pesca-			longissima bipen-		
tor ,	102	3	ni ,	109	2
— cinereus minor ,	102	8	Larus λευκομελανος , &c.	102	3
—	102	10	— maculatus ,	102	7
—	103	3	— maculatus Marfilli ,	102	7
— cinereus minor Al-			— major ,	102	5
drovandi ,	102	8	— major albus ,	102	9
— cinereus Ornitholo-			— major Aldrovan-		
gi ,	102	14	di ,	102	5
— cinereus piscator ,	102	11	— major cinereus ,	102	14



# ALPHABETICUS.

xlviij

	G.	S.		G.	S.
Larus major cinereus			Larus piger, cunicula-		
Baltneri,	102	13	ris,	99	1
— major cinereus Leo-			— piscator,	103	2
nardi Baltneri,	102	13	— piscator Aldrovandi,	103	2
— major cinereus Sch-			— piscator ater, &c.	104	1
wenckfeldii,	102	14	— piscator Baltneri,	103	2
— marinus,	102	1	— piscator cinereus,	110	3
— marinus albus,	102	9	— piscator Gefneri,	103	2
— maritimus major gri-			— piscator Willughbe-		
seus,	102	5	ji,	103	2
— maximus, &c.	102	1	— Pyrenaicus totus a-		
— maximus Willughby,			ter,	103	4
&c.	102	1	— rectricibus duabus		
— minimus,	102	12	intermediis lon-		
— minor,	103	1	gissimis,	101	3
— minor, capite nigro,			— rectricibus interme-		
&c.	102	13	diis longissimis,	101	3
— minor cinereus,	103	2	— rostro nigro,	102	8
— minor cinereus Sch-			— subcinereus,	103	2
wenckfeldii,	103	2	— subfuscus major, &c.	101	3
— minor fidipes nos-			— subtrus albus, &c.	102	3
tras,	103	4	— torquatus, &c.	102	12
— minor melanoceph-			— tridactylus,	102	12
los,	103	1	— varius,	102	5
— minor niger,	103	4	Laughing-Goose,	106	3
— minor niger Gefneri,	103	4	Leiner,	107	8
— minor niger Sch-			Lepel-Gans,	107	25
wenckfeldii,	103	4	Leporem consueverunt		
— niger,	102	1	vocare Mexican-		
— niger fidipes,	103	4	ses, ( Genus Ana-		
— niger fidipes alis			tis quam aquati-		
longioribus Al-			lem )	91	4
drovandi,	103	4	Lepturus,	109	
— niger fidipes alter,			—	109	1
alis brevioribus			— candidus,	109	2
Aldrovandi,	103	3	— fulvus,	109	3
— niger fidipes noster,	103	4	Lepus aqueus,	91	4
— niger Gefneri,	103	4	— ( Aqueus )	91	4
— niger Gefneri, Al-			Lesser Cormorant,	105	2
drovandi,	103	4	— Grey Gull,	102	10
— parasiticus,	101	3	— Puffin,	111	1
			— Sea-Swallow,	103	2
			—	103	5



	G.	S.		G.	S.
Libane,	112	1	M.		
Little Brown and white Duck,	107	41	Macareux,	93	
— Brown Duck,	107	39	—	93	1
Livane,	112	1	Macreuse,	107	28
Loeffel Endtle,	107	6	— de la Baye de Hudson,		
Loere,	91	2	( Grande )	107	30
—	91	4	— de la riviere de la		
Lom,	97	4	Plata,	90	2
Lomben,	92	1	— ( Grande )	107	29
Lomgirie,	92	1	Macroule,	90	2
Lomm,	97	4	Maeu,	102	9
Lomvia,	92	1	Majague,	99	4
Lomvisire,	92	1	— Brasiliensium Pisoni,	99	4
Lomwia,	92	1	Mall, ( Common Sea- )	102	10
— Insulæ Farræ Hoie-			Mallard,	107	4
ri,	92	1	Malle-Mucke,	102	5
Long-tailed Duck from			Mallemuck Spitzbergen-		
Hudson's Bay,	107	17	sis Friderici Mar-		
— tailed Duck from			tenfii,	102	5
Newfound land,	107	18	Mallemucke,	102	5
Loon, ( Ash-coloured )	91	3	Man-of war Bird,	101	3
— ( Crested- )	91	4	—	110	6
— Diver, ( Greater )	91	1	—	110	7
— from Newfound land,			Manchot,	95	
( Great Speckled )	97	6	—	95	1
— ( Great Sea )	91	2	— tacheté,	95	2
— ( Greatest- )	97	2	Manks Puffin,	99	1
—	97	6	Maos,	102	3
— ( Greatest Speckled )	97	2	Mareca,	107	12
— ( Red throated )	97	3	—	107	13
— ( Small- )	91	5	— alia species,	107	13
— ( Speckled )	97	4	— Anatis sylvestris spe-		
Λσφα,	90	1	cies,	107	12
Lugas,	107	9	— dicta prima Marc-		
Lumme,	97	4	gravii, ( Anas syl-		
— Wormio dictus ( Co-			vestris Brasilien-		
lymbus Arcticus )	97	4	sis )	107	12
Lund,	93	1	— dicta secunda Marc-		
Lunda,	93	1	gravii, ( Anas syl-		
Lurar,	91	2	vestris Brasilien-		
Lyska,	90	1	sis )	107	13
— wiekfza,	90	2	Marina Hirundo,	103	2



# ALPHABETICUS.

xliv

	G.	S.		G.	S.
Martin pefcao,	103	3	Mergi varii genus, (Al-		
Martinazzo,	102	5	terum)	105	6
Mave,	102	8	— varii genus, (Ter-		
Maulve,	102		tium)	105	6
Mawe,	102	8	Mergo mustelari leuco-		
Meb,	102	9	melano conge-		
— (Grosse See-)	102	13	ner,	105	3
— Leonardi Baltneri,			Mergon,	97	
(Grosse grau			—	105	4
See-)	102	5	Merguli genus, (Alte-		
— (Winder-)	102	5	rum)	91	6
Meer-Coot,	90	1	Mergulus,	91	5
— Ent,	107	16	—	91	6
— Ganfs,	112	1	— melanoleucos rostro		
— Rabe,	105	1	acuto brevi D.		
— Rach,	105	1	Brown,	92	2
— Schwalm, (Graver)	102	14	— niger,	91	6
Meeuwe,	102	12	— niger Schwenckfel-		
Meifs,	102	9	dii,	91	6
Merch,	91	4	Mergus,	97	
—	105	3	—	105	1
— (Wyffe)	105	6	— albus,	105	6
Merg,	105	1	— alius major cirrha-		
Merganser,	105		tus,	105	3
—	105	1	— alter,	105	4
—	105	2	— Americanus,	94	1
— Aldrovandi,	105	1	— Americanus, (Acitli)	91	2
— cinereus,	105	7	— Americanus fuscus,		
— cristatus,	105	2	Stultus vulgò dic-		
— cristatus minor,	105	3	tus,	110	1
— foemina,	105	1	— Americanus, subcas-		
— Gefneri,	105	1	taneus, &c.	108	1
— leucomelanus,	105	4	— Arcticus,	97	6
— niger,	105	5	— Arcticus Clusii,	97	6
— stellatus,	105	6	— Arcticus simpliciter,	97	4
— Virginianus crista-			— Argentinensis,	105	3
tus,	105	8	— Bellonii,	91	2
Mergi genus,	90	1	—	94	3
— genus, (Aliud)	91	4	— Bellonii, Aldrovandi,	94	3
—	105	4	— capite griseo, &c.	105	6
— genus, quod in lacu			— cirratus fuscus,	105	2
Lemanno inveni-			— cirratus Jonstoni,	105	1
tur,	91	1	— cirratus minor,	105	2



	G.	V.	S.		G.	S.
Mugg-Ent Gefnero Al-				Nurek czubaty y rogaty,	91	4
drovandi,	107	A.	6	— wiekizy,	90	2
Muggrate,	107	A.	6	—	91	4
Mullet,	93		1		O.	
Mur Endtle,	107	A.	6		G.	S.
Murre,	94		2	O Edel,	107	40
Muscovian-Duck,	107		3	Oca,	102	
— Gander,	106		6	—	106	1
Muscovite Duck,	107		3	— marina,	102	
Muscovy-Duck,	107		3	— salvatica,	106	2
				Ocha,	106	1
				Ochie,	106	1
				Ocho,	106	1
				Oelb,	106	11
				Oelbs,	106	11
				Oelbsch,	106	11
				Ohn-Vogel,	112	1
				Oie aux ailes blues,	106	5
				— de Canada,	106	4
				— moqueuse,	106	3
				Oiseau à bec tranchant,	94	2
				— appelé Diable,	102	15
				— appelé Diablotin,	102	15
				— appelé en Islande		
				Huubryre,	97	6
				— Arctique,	101	2
				—	101	3
				— (Bievre)	105	7
				— de Frégates,	110	6
				— de tempête,	99	3
				— des Tropiques,	109	1
				—	109	2
				— du Tropic,	109	1
				— Tropicque,	109	2
				Olor,	106	11
				—	106	12
				On-Vogel,	112	1
				Onocrotalus,	112	
				—	112	1
				— albus,	112	1
				— Aldrovandi,	112	1
				— Avis,	112	1
				— fuscus,	112	2



G. V. S.

Onocrotalus Gefneri,	112	1
— gula faccata,	112	1
— Mexicanus dentatus,	112	A. 1
— Mexicanus non den-		
tatus,	112	1
— pedibus coeruleis,		
&c.	112	2
— Philippenfis,	112	3
— Plinio,	112	1
— rostro denticulato,	112	A. 1
— Willughbei,	112	1
ὄνακρόταλος,	112	1
Opano,	107	24
ὄρις, (Κασοργς)	105	7
Orre, (Sjoe-)	92	3
ὄσμη,	106	11
Ouze,	106	1
Oye,	106	
—	106	1
— à duvet,	106	13
— d'Egypte,	106	9
— d'Espagne,	106	7
— de Ballan,	110	5
— de Brenta,	106	16
— de Canada,	106	4
—	106	15
— de Gambie,	106	8
— de Guinée,	106	7
— de mer,	105	1
— de Moscovie,	106	6
— de neige,	106	10
— de Soland,	110	5
— domestique,	106	1
— hupée,	106	A. 1
— nonnette,	106	14
— privée,	106	1
— sauvage,	106	2
— sauvage de Canada,	106	4
— sauvage de la Baye		
de Hudfon,	106	5
— sauvage du Nord,	106	3
Oyson,	106	1
ὄπρις,	92	1

P.

P Agala,  
Paille-en-cul,

—

—

— -en-cul blanc,

— -en-cul fauve,

Papara,

Papegey Duycker,

Papera,

παπίτζα,

παπίτζα,

Passer stultus,

Pata,

Patico,

Patines de Oviedo,

Pato,

— (Hijo de)

Pavara,

Pelecan,

Pelecane,

—

Pelecano,

Pelecanus,

— Aldrovandi,

— Bellonii,

— cauda æquali, &amp;c.

— cauda cuneiformi,

&amp;c.

—

— cauda forficata, &amp;c.

— fuscus,

— gula faccata,

—

— subfuscus, &amp;c.

— subtrus albicans, &amp;c.

— subtrus fuscus, &amp;c.

— Willughbei,

Πελεκαν,

Πελεκάνες,

Pélican,

—

G. S.

112 3

109 1

109 1

109 2

109 2

109 3

106 1

93 1

106 1

107 1

107 1

102 15

107 3

106 1

103 1

106 1

106 1

106 1

106 1

112 2

112 1

112 2

112 1

112 1

112 1

111 1

110 1

110 5

110 6

112 2

112 1

112 2

112 2

111 1

111 2

112 1

112 1

112 1

112 1



			G.	S.
Plancus Corvus aquati-		Plongeon hupé ;	91	4
cus, Gefneri ,	111	— marqueté ,	97	4
— Corvus lacustris ,	111	— noir & blanc , ( Pe-		
— Corvus minor aqua-		tit )	92	2
ticus ,	111	— ordinaire ,	108	1
— Gulo ,	112	— ( Petit )	91	9
—	112	—	97	2
— Morus, simpliciter ,	110	—	107	26
— Tropicus ,	109	—	107	27
Plantane Coote ,	90	— rouge-gorge ,	97	3
Plas Endte ,	107	— tacheté ,	97	5
Plautus Albatros spu-		— tacheté , ( Grand )	97	2
rius major ,	99	—	97	6
— Albatros spurius mi-		Plotus recurviroster ,	114	1
nimus ,	100	— rostro conico inæ-		
— Albatros, spurius mi-		quali ,	104	1
nor , &c.	100	Plungeon ,	102	4
— Albatrus ,	98	Plunging Gull ,	103	2
— Arcticus ,	93	non ,	106	11
— Columbarius ,	92	Pochard ,	107	19
—	92	Podiceps ,	91	10
— minimus procella-		Podicipes cinereus D.		
rius ,	100	Brown ,	91	3
— pinguis ,	95	— minor ,	91	5
— præconful ,	102	Polon ,	90	1
— rostro Larino ,	92	Polono ,	105	4
— Stercorarius ,	101	Pope ,	93	1
— tonfor ,	94	Porzana ,	88	3
Plongeon ,	97	Poule-d'eau ,	88	
— à gorge noire ,	97	—	88	1
— à gorge rouge ,	97	—	90	1
— à la poitrine rouge ,	105	— d'eau , ( Autre Espece		
— de mer ,	94	de )	90	2
—	105	— d'eau , ( Espece de )	107	3
— de mer à gros bec ,	93	— d'eau , ( Grande )	88	1
— de mer de Terre-neu-		— -d'eau , ( Grande )	88	3
ve , ( Grand )	97	— -d'eau , ( Petite )	88	2
— de mer , ( Grand )	91	— d'eau , ( Tringa gris de		
— de mer , ( Petit )	91	fer au pied de )	89	1
— de riviere ,	91	— de marais ,	88	1
— de riviere , ( Grand )	91	— de marais , ( Grande )	88	1
— ( Espece de )	91	— de mer ,	92	1
— ( Grand )	97	Poulette d'eau ,	88	2



	G.	S.	Q.	G. V. S.
Procellaria,	100			
—	100	1		
— æquinoctialis,	99	3	Q Uacula, ( Anas )	107 36
— albo fuscoque varia,	100	3	Q uædam Avis Co-	
— Capensis,	100	3	lymbiscongener,	97 1
— cinerea,	100	2	Quapachcanauhtli,	107 20
— fusca immaculata,			Quattr' occhii,	107 27
&c.	99	3	Quattro occhi,	107 27
— nævia,	100	3	— occhi Italis,	107 27
— nigra, &c.	100	1	— occhii,	107 27
— pelagica,	100	1	Querquedula,	107 31
Procellarius, ( Plaurus			—	107 32
minimus )	100	1	— æstiva,	107 33
Prinx,	108	1	— altera,	107 31
Puffin,	93	1	— Americana,	107 35
—	99		— Americana variega-	
—	99	1	ta, ( Anas )	107 35
— du Brésil,	99	4	— Carolinensis,	107 39
— du Cap de Bonne Es-			— cristata,	107 26
pérance,	99	3	— cristata, quam Bel-	
— cendré,	99	2	lonius Colymbim	
— ( Lesser )	111	1	vocat,	107 26
— ( Manks )	99	1	— Dominicensis,	107 42
— of The Isle of Man,	99	1	— erythrocephalos,	107 A. 31
Puffinus,	93	1	— Ferroensis,	107 40
—	99		— Francia, ( Anas )	107 32
—	99	1	— Freti Hudsonis,	107 41
— Anglicus,	93	1	— fusca,	107 33
— Anglorum,	99	1	— Indica,	107 34
— Brasiliensis,	99	4	— Kernell circa Argen-	
— Capitis Bonæ Spei,	99	3	toratum dicta,	107 31
— cinereus,	99	2	— Ludoviciana,	107 38
Pullon,	88	2	— major,	107 32
—	90	1	— Mexicana,	107 37
Pullus aquæ Alberto,	90	1	— minor,	107 32
Puphinus Anglicus,	93	1	— minor varia,	107 35
— vulgò ab Anglis dic-			— prima,	107 31
tus,	93	1	— prima Aldrovandi,	107 31
Pygoscelis major,	91	4	— secunda,	107 32
— minor,	91	5	— secunda Aldrovandi,	107 32
Pylstert,	105	6	— secunda Aldrovandi,	
			( Anas )	107 32
			— Sinenfis,	107 34



	G.	S.		G. V. S.
Querquedula sylvestris,	107	32	Red Coot-footed Trin-	
— varia,	107	31	ga,	89 4
— varia Gesneri,	107	31	— -faced Coote,	88 1
— Varroni,	107	32	— -headed Diver,	105 7
— Virginiana,	107	36	— -headed Widgeon,	107 19
			— -headed Widgeon,	
	R.		(Great)	107 19
	G.	S.	— throated Loon,	97 3
<b>R</b> Abe, (Meer-)	105	1	Retsch-Ent,	107 4
Rabe, (See)	111	1	Rhyn-Ent,	105 3
— (Waller-)	111	1	Road-Goose,	106 15
Rabihorcado,	110	6	Rod-Gans,	106 14
Rabihorcados todos ne-			Rogis,	105 1
gros de Oviedo,	110	6	Rohr henne,	90 1
Raboforcado,	110	6	— -Schwalm,	103 2
— Lusitanis, (Avis)	110	6	Rohtblaschen,	88 1
Rabos di junco,	109	2	Rondone marino,	103 3
Rach, (Meer-)	105	1	—	103 4
Rache,	105	5	Ror-heunle,	90 1
Radens, (Avis aquæ su-			Rosfz Endte,	107 C. 4
perficiem)	99	1	Rot-Ent,	107 16
Raetsch Endte,	107	4	— Gans,	106 16
Raetsche,	107	1	— Hals,	107 19
Raharè,	102	9	Rote Endte,	107 19
Râle d'eau,	105	6	Roter Teucher,	105 7
Rallus,	88	2	Rotge of Rottetjetgen,	92 2
— aquaticus noster,	88	1	Rotje,	100 1
— cinereus facie Lari,	103	6	— (Petit Oiseau appel-	
— Itatorum,	88	2	lé)	100 1
— Itatorum Aldrovan-			Rotkoeptlichter,	102 14
di,	88	2	Rott-Gans,	106 14
— Lariformis,	103	6	— Hals,	107 22
— subtrus albido-flavif-			— Kopff,	107 22
cens, &c.	103	6	Rottetjetgen, (Rotge of)	92 2
Rasse grand,	88	2	Rottetjetje, (Rottge of)	92 2
Rat-Gans,	106	16	Rottge of Rottetjetje,	92 2
— Goose,	106	15	Round-crested Duck,	105 8
Razor-bill,	94	2	Rubitw morski,	102 9
Recurvirostra,	114	1	Ruchen,	91 5
— albo nigroque varia,	114	1	Ruck,	94 2
— subtrus alba, &c.	114	1	Ruggelen,	91 5
Red-bill'd Whistling			Runner, (Fin-footed)	115 1
Duck,	107	23	Rusgen,	107 26



# ALPHABETICUS.

lix

G. V. S.			G. V. S.		
Rybitw,	103	2	Scharb, ( Neze- )	111	1
— popielasty wiekfy,	102	13	Scheckicht Endtlin,	107	31
Rygchopfalia,	104		Schell-Ent,	107	6
—	104	1	—	107	25
— dorso nigro, &c.	104	1	Schild Endtle,	107	6
— fulva,	104	A. 1	Schilt-Ent,	107	25
— fulva, &c.	104	A. 1	Schlicht Endte,	105	2
Rynchops fulva,	104	A. 1	Schlucht-Ente,	105	2
— fulva, &c.	104	A. 1	Schmael Endte,	107	B. 4
— nigra,	104	1	Schmelichen,	107	B. 4
— nigra, &c.	104	1	Schmey,	107	21
S.			Schmil Endte,	107	B. 4
			Schnabel, ( Breit- )	107	6
Sack-Gans,	112	1	Schnaeblichte Wild		
Sackagusch,	112	1	Endtle, ( Breit- )	107	6
Sarcelle,	107	31	Schnarr Endte,	107	8
— à tête rouge,	107	A. 31	Schnatter Endte,	107	8
— brune de l'Améri-			Schnee Gans,	106	10
que,	107	36	—	112	1
— d'Amérique,	107	35	— Ganss,	106	2
— d'ééré,	107	33	Schnerr Endtlin,	107	8
— de Ferroë,	107	40	Schnirring,	103	1
— de la Baye de Hud-			Scholvær,	97	
son,	107	41	Schotten-Ganss,	110	5
— de la Caroline,	107	39	Schulveren,	111	1
— de la Chine,	107	34	Schwalbe, ( Klein Sch-		
— de la Louisiane,	107	38	wartzer See- )	103	4
— de S. Domingue,	107	42	— ( Klein See- )	103	2
— de Virginie,	107	36	— ( See- )	102	14
— du Mexique,	107	37	—	103	1
— ( Petite )	107	32	— ( Weisser See- )	102	14
—	107	35	Schwalm, Graver Meer- )	102	14
Sartella,	107	31	— ( Groffer See- )	102	14
—	107	32	— ( Rohr- )	103	2
Sassa,	107	1	Schwan,	106	11
Scalveren,	111	1	Schwantz, ( Spietz- )	107	16
Scare-Crow,	103	4	— ( Spitz- )	107	16
Scavolo,	107	31	Schwartz Dücchele,	91	6
—	107	32	— Taeucherlein,	91	6
Scaup Duck,	107	A. 26	— Teucherlin,	91	6
Schall Endtle,	107	6	— Teucherlin, (Klein)	91	6
! chaluchorn,	111	1	Schwartz Mew,	103	4
Scharb,	111	1	— Mewe,	103	4

h ij



	G.	S.		G.	S.
Schwartzzer See-Schwal-			See-Schwalbe, (Weisser)	102	14
be, (Klein)	103	4	— Schwalm, (Großer)	102	14
— Teucher,	105	5	— Vogel,	107	16
Schwemmer-Ganz,	111	1	— Vogel dicta, (Anas)	107	16
Sclover,	97		Seecob,	102	
Scolucheren,	111	1	Seegal,	102	9
Scoluchertiz,	111	1	Seegel,	102	
Scooper,	114	1	—	102	9
Scotch-Goose,	106	14	Seepferd,	100	2
Scoter,	107	28	Semag,	97	
— (Eboracensibus)	107	28	Serrator,	105	2
Scout,	94	2	— cirratus,	105	2
Scraye,	103	1	— cucullatus,	105	8
Sea-crow,	102	14	— minimus,	105	3
—	104	1	— simpliciter,	105	1
—	111	2	Serula,	105	2
— Gull, (Common)	102	10	— Venetorum,	105	2
— Hen,	92	1	Sfogel, (Stromwae)	100	1
— Loon, (Great)	91	2	Shag,	111	2
— Mall, (Common)	102	10	Shagg,	111	1
— Mew,	102	9	Shagge,	111	2
— Mew, (Common)	102	10	Shear-Water,	99	1
— Mewe,	102		—	103	4
— Pheasant,	107	16	— Water, (Larger)	99	3
— Swallow,	103	1	— Water, (White-fa-		
— Swallow, (Greater)	103	1	ced)	99	1
— Swallow, (Lesser)	103	2	Sheldrake,	107	9
—	103	5	— D. Johnson, (Swal-		
— Swallow, (Small			low-tail'd)	107	17
Black cloven-			Shoveler,	107	6
footed)	103	4	Siaer-flaecka,	114	1
— Turtle,	92	2	Siberisk Goas,	106	7
— Turtle-Dove,	92	3	Sichkeekin,	97	
Secob,	102	9	Signe,	106	12
See-Meb, (Grosse)	102	13	Singularis Hirundinis a-		
— Meb Leonardi Balt-			quaticæ exoticæ		
neri, (Grosse grau)	102	5	species,	97	4
— Rabe,	111	1	Sjoe-orre,	92	3
— Schwalbe,	102	14	Skary,	111	1
—	103	1	Skel-Endt,	107	25
— Schwalbe, (Klein)	103	2	Skjaer-flaecka,	114	1
— Schwalbe, (Klein			Skout,	92	1
Schwartzzer)	103	4	Skraka,	105	2



# ALPHABETICUS.

lxj

G. V. S.

G. V. S.

Skua,	102	5	Sponfa,	107	11
— Hoieri,	102	5	Spoon-bill'd Duck,	107	25
— Hoyeri,	102	5	Sprenglicht Endte,	107	31
Small black cloven-footed Sea-Swallow,	103	4	Spur-wingd Goose,	106	8
— -Loon,	91	5	Spurre,	103	1
Smergo,	97		Spyrer,	103	1
Smew,	105	3	Stercoraire,	101	
Snipe,	89	1	—	101	1
Socke,	107	32	— à longue queue,	101	3
Soland Goose,	110	5	— rayé,	101	2
Solend-Ganss,	110	5	Stercorarius,	101	
— Guse,	110	5	—	101	1
Sor-Entle,	107	32	— longicaudus,	101	3
Souchet,	107	6	— (Plautus)	101	3
— à ventre blanc,	107	A. 6	— striatus,	101	2
— du Mexique,	107	7	Sterna,	103	
Soukourourou,	107	35	—	103	1
Spanish Goose,	106	7	— atricapilla,	103	5
Sparling Foul,	105	1	— cauda cuneiformi,		
Sparrow of Brasil, (Foolish)	102	15	&c.	102	15
Speckled Diver,	97	4	— cauda forcipata, &c.	103	1
— Diver, (Greatest)	97	2	&c.	103	2
— Loon,	97	4	— cinerea,	103	3
— Loon from Newfoundland, (Great)	97	6	— fusca,	103	7
— Loon, (Greatest)	97	2	— major,	103	1
Sperga,	91	2	— major fusca, &c.	99	3
—	91	4	— media, dorso fusco,		
Speürer,	103	1	&c.	99	1
— Baltneri,	103	1	— minor,	103	2
Spheniscus,	93	1	— nævia,	103	6
—	95		— nigra,	103	2
—	95	1	—	103	4
— nævius,	95	2	— rectricibus extimis		
Spiegel Endte,	107	4	maximis, &c.	103	1
— Ent,	107	4	— rectricibus maximis		
Spies Endte,	107	16	nigris,	101	3
Spierz-Schwantz,	107	16	— stolidi,	102	15
Spinzago d'acqua,	114	1	— supra cana, &c.	103	2
Spitz-Schwantz,	107	16	— Turneri,	103	1
			Stertz Endte,	107	A. 4
			Stirn,	103	1
			Stirna,	103	1



	G.	V.	S.		G.	S.
Stor Endte;	107	A.	4	Swan,	106	11
—-Ent,	107	A.	4	—-Goose,	106	7
Stortz-Ent,	107	A.	4	— (Tame)	106	11
Straule,	102		8	— (Wild)	106	12
Straus-Ende,	107	27		Swartlasse,	101	3
— Endte,	107	27				
— Endte, (Gescheckte)	105	2		T.		
— Teucher,	91	4		G.	S.	
Straufz Endt,	107	26		Abellaria Aldro-		
Strepera,	107	8		vandi,	115	1
— (Anas)	107	8		Tadorna,	107	9
— Schwenckfeldii, (A-				— Bellonii,	107	9
nas)	107	8		— Bellonii, (Anas)	107	9
Stromfinck,	100	1		Tadorne,	107	9
Stromwae Sfogel,	100	1		— Gallis dicta,	107	9
Stromwaeders Fogelen,	100	1		Taerna,	103	1
Strundt-jager,	101	3		Taefchenmul,	107	6
Stultus vulgò dicta,				Taeucher, (Grosser Ko-		
(Anas angustiro-				bel-)	91	4
rostra)	110	1		Taeucherlein, (Sch-		
— vulgò dictus, (Mer-				wartz)	91	6
gus Americanus				Tailed Diver, (Grea-		
fuscus)	110	1		test)	97	2
Sula,	110			Taling,	107	32
—	110	1		Tame Duck, (Com-		
—	110	5		mon)	107	1
— Bassana,	110	5		— Goose,	106	1
— candida,	110	4		— Swan,	106	11
— fusca,	110	3		Tamme End-Vogel,	107	1
— Hoieri,	110	5		Tarrock,	102	9
— Hoieri, Clusii,	110	5		Tauch Endte,	105	5
— major,	110	2		Taucher,	97	
Summer-Teal,	107	33		— (Gchornter)	91	4
Summoodra Cauky,	104	1		Taucherlein,	90	1
Swaerta,	107	29		Taya-Taya,	104	1
Swallow, (Greater Sea-)	103	1		Teal,	107	32
— (Lesser Sea-)	103	2		—	107	35
—	103	5		— (Blue-wing)	107	36
— (Sea-)	103	1		— (Common)	107	32
— (Small black clo-				— (Summer-)	107	33
ven-footed Sea-)	103	4		— (White-face)	107	35
—-tail'd Sheldrake D.				Teale,	107	32
Johnson,	107	17		Tempatlahoac,	107	5
				—	107	7



lxiii

	G.	S.		G.	S.	
Tempatlahoac altera ,	107	5	Tringa , ( Red Coot-			
Tern ,	103	1	footed ,	89	4	
Tertium Mergi varii ge-			— rostro recto , &c.	89	4	
nus ,	105	6	— rostro subulato , &c.	89	2	
— Urinatricum genus			—	89	3	
Bellonii ,	91	9	— rouge aux pattes de			
Teucher ,	91	4	la Foulque d'eau ,	89	4	
—	97		Trochilus ,	115	1	
—	105	2	Trochilus ,	114	1	
— ( Groffer )	105	5	—	115	1	
— ( Groffer Kobel )	91	4	— Aldrovandi ,	115	1	
— ( Roter )	105	7	Troessel ,	107	32	
— ( Schwartz )	105	5	Tropick Bird ,	109	1	
— ( Straus )	91	4	—	109	2	
Teucherlin , ( Klein			Truo ,	112	1	
Schwartz )	91	6	— Festi ,	112	1	
— ( Schwartz )	91	6	— Festo ,	112	1	
Teuchterlin ,	91	5	Tuch Endte , ( Weisse )	105	2	
Teurckifch Endte ,	107	3	— -Ent , ( Wiffe )	105	4	
Thouarou ,	102	15	Tucher ,	97		
Tjaeder , ( Hafs- )	111	1	Tufted Duck ,	107	26	
Tiers ,	105	4	Turckisk Goas ,	106	7	
Tinfchemet ,	106	11	Turtle-Dove , ( Sea- )	92	3	
Tlalacatl ,	106	2	— ( Sea )	92	2	
Tococo ,	113	1	Tzitzihua ,	107	16	
Toltecocloctli ,	107	37		V.		
Tord ,	94	2		G.	S.	
Torda ,	94	2	V	Aiffeau de guerre ,	98	1
Tordmule ,	94	2		Vautour d'Islande ,	105	1
Tourterelle de mer ,	92	2		Uccello d'el Ducha ,	112	1
Trapazorola ,	91	5		Vielfras ,	112	1
Treiber , ( Fifch )	107	9		Voegelin , ( Mey- )	103	4
Tringa ,	89	1		Vogel , ( Ant- )	107	1
— au pié-de-Foulque ,	89	3		— ( Brand- )	103	4
— ( Cock coot-footed )	89	2		— dicta , ( Anas See- )	107	16
— ( Coot-footed )	89	3		— ( Eder- )	106	13
— ( Grey Coot-footed )	89	1		— ( Fremdbder Wasser- )	114	1
— gris de fer au pied de				— -Heine ,	112	1
Poule d'eau ,	89	1		— Leonardi Baltneri ,		
— lobata ,	89	2		( Brand- )	103	4
—	89	3		— Leonardi Baltneri ,		
— mâle aux pattes de la				( Mey- )	103	4
Foulque d'eau ,	89	2		— ( Mey- )	103	4



## I N D E X

	G.	S.		G. V. S.
Vogel, (Ohn-)	112	1	Vucht-Arfz;	111 1
— (On-)	112	1	Weazel Coor;	105 6
— (See-)	107	16	Weiher, (Fisch-)	103 2
— (Tamme End-)	107	1	Weisse Tuch Endre,	105 2
— Weisser Dritt-)	107	27	Weisser Dritt Vogel,	107 27
Vokel van Etna,	112	1	— See-Schwalbe,	102 14
Voll-Enten,	107	26	Wellich,	88 2
Uria,	92		Weltlich-Eent,	105 1
—	92	1	Whewer,	107 21
—	92	3	— (Common)	107 21
— Bellonii,	91	2	Whilk,	107 30
— major,	91	4	— dictus, (Anser ma-	
— minor,	91	5	ximus niger,	
—	92	2	The)	107 30
— minor nigra,	92	3	Whim,	107 21
— minor striata,	92	4	Whistling Duck,	107 24
Urinatricum genus Bel-			— Duck, (Black bill'd)	107 24
lonii, (Tertium)	91	9	— Duck, (Red-bill'd)	107 23
Urinatrix,	91	9	White-bellied Duck,	107 16
— major,	91	4	— face Teal,	107 35
— minor,	91	5	— faced Shear-Water,	99 1
Utumania,	94	3	— Nun,	105 3
Waerdts,	107	1	— Nun-Diver,	105 3
Wagell,	102	5	— web footed Gull,	102 8
— Cornubiensium;	102	5	Widgeon, (Common	
Wagellus Cornubien-			Grey)	107 19
sium,	102	5	— (Great Red-headed)	107 19
War Bird, (Man of)	110	6	— (Red-headed)	107 19
—	110	7	Wieselchen,	105 2
Wark-Fogel,	105	2	Wigeon,	107 21
Wasser houn,	88	2	—	107 31
—	90	1	— (Common)	107 21
— hun,	90	1	Wigge,	107 26
— -Rabe,	111	1	Wild-blauw Eent;	107 4
— Vogel, (Frembder)	114	1	— Duck,	107 4
Water Coude,	88	1	— Duck, (Common)	107 4
— (Cut)	104	1	— Endte,	107 4
— Hen, (Common)	88	1	— Endte, (Grosse)	107 A. 4
— (Larger Shear-)	99	3	— Endtle, (Breit-Sch-	
— (Shear-)	99	1	naeblichte)	107 6
—	103	4	— Hatsche,	107 4
— (White faced Shear-)	99	1	— Goose,	106 2
Wattudragaren,	112	1	— Goose, (Common)	106 2

Wild



# ALPHABETICUS.

lxv

	G. V. S.			G.	S.
Wild Swan,	106	12	Wószhe,	106	1
Wilde blaw Endte,	107	4	Wri-And,	107	21
— Eende,	107	4	Wyffe Merch,	105	6
— Ende,	107	4	— Nonn,	105	3
— Endte, (Grosse)	107	C. 1	Uze,	106	1
— Enten,	107	4			
— Gans,	106	2	Y.		
— Ganss,	106	2			
— Graw Endte,	107	19	Y Acapatlahoac,	107	7
— Grawe Ent,	107	19	Yacapitzahoac,	91	5
Will Goas,	106	2	Yohoalcoachillin,	90	3
Winder-Meb,	102	5	— dicta, (Fulicæ Me-		
Winter-And,	107	17	xicanæ altera spe-		
— Mew,	102	12	cies)	90	3
Wiselgen,	105	3	Yfente,	105	3
Wisse Tuch-Ent,	105	4	Yfentle,	105	6
Wlasto wige,	102		Yszenten,	105	3
Vulpanas,	107	32	Yztactzonyayauhqui,	107	11
Vulpanser,	107	9			
— quibuldam,	107	9	Z.		
— quorumdam,	107	9			
Vultur marinus leucoce-				G.	S.
phalos,	110	6	Z Am Endte,	107	1
— piscarius,	102	11	Zame Gans,	106	1
Wood Duck, (Ameri-			Zapp,	90	1
can)	107	11	Zee-Fluder, (Grosse)	97	1
Woordt,	107	1	Zeluk,	114	1
			Zoucet,	91	9





---

## AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées de manière qu'en s'ouvrant, elles puissent sortir du Livre, & se voir à droite dans l'ordre qui suit.

Page	10. Planche I.
32. . . . .	II.
68. . . . .	III, IV & V.
84. . . . .	VI.
94. . . . .	VII & VIII.
102. . . . .	IX.
124. . . . .	X & XI.
156. . . . .	XII & XIII.
202. . . . .	XIV, XV, XVI, XVII & XVIII.
222. . . . .	XIX & XX.
228. . . . .	XXI.
260. . . . .	XXII, XXIII, XXIV & XXV.
306. . . . .	XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX & XXXI.
474. . . . .	XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL & XLI.
492. . . . .	XLII.
510. . . . .	XLIII & XLIV.
518. . . . .	XLV.
530. . . . .	XLVI.
544. . . . .	XLVII.

---

## E R R A T A.

Page	13 ligne	26. grandes	lisez	grands
16	15.	grandes	lisez	grands
73	10.	re-	lege	ru.
75	36. & 37	Thuro	lisez	Thuroc
97	38.	des	lege	dæ
98	15.	gides	lege	gidæ
100	12.	rigides	lege	rigidæ
101	9.	rigides	lege	rigidæ
105	10.	καθαριζέ. lisez	καλιχαριζέ.	
159	29.	triginti	lege	triginta
197	34.	de	lisez	des
198	19.	son	lisez	font
209	24.	cinero	lege	cinereo
244	39.	quidecim	lege	quindecim
287	38.	quem	lege	quod



# *E R R A T A.*

297	22. prior vigesima <i>lege</i> prior , vigesima
300	3. maximamque <i>lege</i> maximumque
365	11. cœruleæ <i>lege</i> cœruleæ
395	22. le <i>lisez</i> les
499	35. un <i>lisez</i> une
529	7. le <i>lisez</i> les
540	7. tut <i>lege</i> tur
xxxix	35. ( Schwemmenr ) <i>lege</i> ( Schwemmer )



---

A P A R I S,  
DE L'IMPRIMERIE D'ANTOINE BOUDET,  
IMPRIMEUR DU ROI.



# SUPPLEMENTUM ORNITHOLOGIÆ

S I V E

CITATIONES , DESCRIPTIONESQUE  
antea omiffæ , & species de novo adjectæ ,  
ad fuaquaque genera redactæ.

*A D. BRISSON, Regiæ Scientiarum Academia Socio ;  
necnon Cenfore Regio.*

---

# SUPPLÉMENT D'ORNITHOLOGIE

O U

CITATIONS ET DESCRIPTIONS  
précédemment omifes , auxquelles on a joint les  
efpeces nouvellement découvertes , rapportées  
chacune à leur genre.


*Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences, &  
Cenfeur Royal.*



ainsi que la plus grande partie des citations de la dixième édition du *Systhema Naturæ Linnæi* ; n'ayant pu avoir ces Ouvrages que longtemps après le commencement de l'impression du mien.







SUPPLEMENTUM SUPPLÉMENT  
ORNITHOLOGIÆ. D'ORNITHOLOGIE.

ORDO I. ORDRE I.

I. *Genus Columbinum.* I. *Le Genre du Pigeon.*

1. LE PIGEON DOMESTIQUE.

*Columba coerulescens*, collo supra viridi-nitente, fascia alarum apiceque caudæ nigricante. *Columba domestica*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 1. var. 1.*

2. E. LE PIGEON NONAIN.

*Columba pennis occipitis reflexo-erectis. Columba cucullata. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 3.*

2. F. LE PIGEON A GORGE FRISÉE.

*Columba pennis in pectore recurvatis. Turbita. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 4.*

2. G. LE PIGEON FRISÉ.

*Columba plumis minimis erectis per dorsum alasque dispersis. Columba hispida. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 19.*

2. I. LE PIGEON MESSENGER.

*Columba cera lata verrucosa, palpebris nudis. Columba Tabellaria. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 6.*



## 2. K. LE PIGEON GRAND GOSIER.

*Columba pectore inflato. Columba gutturosa. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 2.*

## 2. P. LE PIGEON-PAON.

*Columba cauda erecta multipenni patula. Columba tremula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 5.*

## 5. LE PIGEON SAUVAGE.

*Columba coerulescens, collo supra viridi-nitente, fascia alarum apiceque caudæ nigricante. Oenas. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 1.*

## 6. LE PIGEON RAMIER.

*Columba rectricibus posticè atris, remigibus primoribus margine exteriori albidis, collo utrinque albo. Palumbus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 11.*

## 7. LA TOURTERELLE.

*Columba rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli. Turtur. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 20.*

## 8. LA TOURTERELLE A COLLIER.

*Columba supra lutescens, lunula cervicali nigra. Columba risoria. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 21.*

## 12. LE PIGEON SAUVAGE D'AMÉRIQUE.

*Columba cauda cuneiformi longa, pectore purpurascence. Columba macroura. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 16.*

## 13. LA TOURTERELLE D'AMÉRIQUE.

*Columba cauda cuneiformi longa, pectore purpurascence. Columba macroura. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 16.*

## 15. LE PIGEON DES INDES.

*Columba rectricibus cinereis, apice albis: intermediis fuscis, orbita*



oculorum nuda cœrulea. Columba Asiatica. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 8.*

Columba palpebris nudis cœruleis, iridibus oculorum fulvis. Columba leucoptera. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 14.*

16. LA TOURTERELLE RAYÉE DE LA CHINE.

Columba rectricibus dorsoque fuscis, abdomine sanguineo, alis flavis, remigibus nigris. Columba Sinica. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 17.*

19. LA PETITE TOURTERELLE D'AMÉRIQUE.

Columba rectricibus remigibusque obscurioribus corpore purpurascence, rostro pedibusque flavis. Columba Passerina. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 22.*

29. LE PIGEON ROUX DE CAYENNE.

Columba obscurè rufa, subtus flava, orbita oculorum nuda sanguinea. Columba montana. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 7.*  
 Perdrix de montagne. *Edwards. Tom. III. pag. CXIX; avec une figure exacte Pl. 119.*

30. LE PIGEON DE GUINÉE.

Columba rectricibus cinereis apice nigris, orbita oculorum nuda rubra. Columba Guinea. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 9.*

32. LA TOURTERELLE DE LA JAMAÏQUE.

Columba capite cœruleo. Columba cyanocephala. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 12.*

33. LE PIGEON DE ROCHE DE LA JAMAÏQUE.

Columba cœrulescens, vertice depresso albo. Columba leucocephala. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 13.*

42. LE PIGEON RAMIER D'AMBOINE.

Columba corpore purpureo, humeris viridibus, superciliis albis. Columba Indica. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 18.*



## 44. LE PIGEON DE NICOBAR.

*Columba cauda alba, corpore nigro, remigibus cœruleis, dorso viridi-nitente, pennis colli elongatis. Columba Nicobarica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 92. sp. 15.*

---

## ORDRE II.

## ORDO II.

## SECTION I.

## SECTIO I.

II. *Le Genre du Dindon.*II. *Genus Gallo-pavonis.*

## I. LE DINDON.

*Meleagris capite caruncula frontali, cristaque gulari, maris pectore barbato, Gallopavo. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 88. sp. 1.*

## I. A. LE DINDON HUPÉ.

*Meleagris capite caruncula frontali, cristaque gulari, maris pectore barbato. Gallopavo cristatus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 88. sp. 1. var. 2.*

## I, B. LE DINDON SAUVAGE.

*Meleagris capite caruncula frontali, cristaque gulari, maris pectore barbato. Gallo-pavo sylvestris Novæ Angliæ. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 88. sp. 1. var. 1.*

## 2. LE DINDON DU BRÉSIL.

*Meleagris capite pennis erectis cristato, temporibus violaceis. Meleagris cristata. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 88. sp. 2.*

III. *Le genre du Coq.*III. *Genus Gallinaceum.*

## I. LE COQ ET LA POULE.

*Phasianus cauda compressa adscendente. Gallus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 1.*

## I. A. LE COQ HUPÉ.

*Phasianus cauda compressa adscendente. Gallus cristatus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 1. var. 1.*

## 2. A. LE



# D'ORNITHOLOGIE.

## 2. A. LE COQ PATU.

Phasianus cauda compressa adscendente. Gallus pusillus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 1. var. 4.*

## 3. LE COQ FRISÉ.

Phasianus cauda compressa adscendente. Gallus crispus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 1. var. 3.*

## 5. LE COQ SANS CROUPION OU DE PERSE.

Phasianus cauda compressa adscendente. Gallus ecaudatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 1. var. 2.*

IV. Genus Meleagridis.

IV. Le genre de la Peintade.

## 1. LA PEINTADE.

Phasianus vertice calloso, temporibus carunculatis. Meleagris. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 2.*

## SECTION II.

## SECTION II.

V. Genus Lagopodis.

V. Le Genre de la Gelinote.

## 1. LE COQ-DE-BRUYERES.

Tetrao pedibus hirsutis, rectricibus exterioribus subbrevioribus, axillis albis. Urogallus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 1.*

Tetrao pedibus hirsutis, cauda cuneiformi, rectricibus tribus lateralibus albis. Phasianellus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 5. (femina.)*

Coq de Bruyere à longue queue de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXVII; avec une figure exacte de la femelle Pl. 117.*

## 2. LE COQ-DE-BRUYERES A QUEUE FOURCHUE.

Tetrao pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis. Tetrix. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 2.*

## 3. LA GELINOTE.

Tetrao pedibus hirsutis, rectricibus cinereis punctis nigris fascia nigra: exceptis intermediis duabus. Bonasia. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 7.*

Suppl.

B



## 6. LA GELINOTE DE LA BAYE DE HUDSON.

Tetrao pedibus hirsutis, rectricibus nigris apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos. Tetrao Canadensis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91.*

*Sp. 3.*

Coq de Bruyere noir & marqueté. *Edwards. Tom. III. pag. CXVIII ; avec une figure exacte Pl. 118.*

Celle que j'ai décrite, est la femelle. Le mâle est un peu plus gros qu'elle ; & il en diffère par ses couleurs. La partie antérieure de la tête & la gorge sont noires. Au-dessus des narines il y a de petites plumes de la même couleur, tournées en-devant. De chaque côté de la tête sont deux petites taches blanches, dont l'une est placée entre le bec & l'œil, & l'autre derrière l'œil. De chaque côté est aussi une bande blanche, qui part des coins de la bouche, passe par-dessous l'œil, descend le long du col, & va ensuite, en tournant, se réunir à l'autre au-dessous de la gorge. La partie postérieure de la tête, le dessus du col, le dos & le croupion sont variés de rayes transversales en forme de croissant, alternativement noires & cendrées. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont noirs. Les côtés sont rayés

*Fœminam tantummodo descripsi. Mas illam crassitie paululum superat ; ab illa quoque coloribus discrepat. Caput anterius & guttur nigra sunt. Supra nares plumulae extant concolores, antrorsum versa. In utroque capitis latere binæ sunt minutæ maculae candidæ, una scilicet rostrum inter & oculum posita, altera ponè oculum collocata. Utrinque etiam adest tænia alba, ab oris angulis orta, infra oculum ducta, secundum colli longitudinem protensa, quæ deinde, reflexa, alteram sub gutture pertingit. Capitis posterior pars, collum superius, dorsum & uropygium tæniis variegantur transversis, lunulatis, alternatim nigris & cinereis. Superiores caudæ rectrices concolores. Partem colli inferiorem, pectus & ventrem supremum tingit color niger. Latera sunt fusco-rufescente & nigricante transversim striata. Pectus in-*



ter & latera exigua extant  
tania transversa candida,  
colori nigro admixta. Ven-  
ter imus & crura nigro im-  
buuntur colore, fusco-rufes-  
cente & albo variegato. Pe-  
des ad exortum usque digi-  
torum obtegunt plumula  
fusco-rufescentes, nigro  
transversim striata. Penna  
caudam subtus cooperientes  
sunt candida, maculis lu-  
nularis nigris insignita. Tec-  
trices alarum inferiores fus-  
cescentes, albo terminata :  
superiores taniis transversis  
lunularis, alternatim nigris  
& fusco-rufescentibus varia.  
Remiges alarum nigrae, fus-  
co-rufescente marginata.  
Cauda rectrices nigro quo-  
que imbuta, apicibus auran-  
tiis praedita. Supra oculos  
cutis extat coccinea, plumis  
denudata. Rostrum plumbeo  
colore imbutum, attamen in  
extremitate nigricans. Digi-  
ti, unguisque fusci; digiti  
autem appendicibus squamo-  
sis utrinque obfiti sunt. Ha-  
bitat in *Freto Hudsonis*.

transversalement de brun-rouf-  
sâtre & de noirâtre. Entre la  
poitrine & les côtés sont de  
petites rayes transversales blan-  
ches, qui se mêlent avec la  
couleur noire. Le bas-ventre  
& les jambes sont d'un noir va-  
rié de brun-roussâtre & de  
blanc. Les pieds sont couverts  
jusqu'à l'origine des doigts de  
petites plumes d'un brun-rouf-  
sâtre, rayé transversalement de  
noir. Les couvertures du des-  
sous de la queue sont blanches,  
& marquées de taches noires  
en forme de croissant. Celles  
du dessous des ailes sont brunâ-  
tres, & terminées de blanc :  
celles du dessus sont variées de  
rayes transversales en forme de  
croissant, alternativement noi-  
res & d'un brun-roussâtre. Les  
plumes de l'aile sont noires, &  
bordées de brun-roussâtre. Cel-  
les de la queue sont noires, &  
terminées d'orangé. Au-dessus  
des yeux est une peau d'un  
rouge vif, dégarnie de plumes.  
Le bec est de couleur de  
plomb, excepté son extrémité,  
qui est noirâtre. Les doigts &  
les ongles sont bruns; les pre-

miers sont garnis de chaque côté d'appendices écailleux. On  
la trouve à la *Baye de Hudson*.

#### 10. LA GELINOTE HUPÉE D'AMÉRIQUE.

Tetrao pedibus hirsutis, alis succenturiatis cervicalibus. Cupido. Linn.  
*Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 6.*

Bij



## 12. LA GELINOTE BLANCHE.

*Tetrao pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris apice albis: intermediis totis albis. Lagopus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 4.*

VI. *Le genre de la Perdrix.*

VI. *Genus Perdix.*

## 1. LA PERDRIX GRISE.

*Tetrao pedibus nudis, macula nuda coccinea ponè oculos, cauda ferruginea, sterno brunneo. Perdix. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 9.*

## 5. LA GROSSE PERDRIX DU BRÉSIL.

*Pfophia. Pfophia crepitans. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 84. sp. 1.*

## 6. LA PERDRIX DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

*Tetrao pedibus nudis, cervice albo nigroque punctata. Tetrao Mariandicus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 11.*

## 7. LA PERDRIX D'AMÉRIQUE.

*Tetrao pedibus nudis, fascia nigra supra & infra oculos, linea verticali fulva. Tetrao Virginianus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 10.*

## 12. LA BARTAVELLE.

*Tetrao rostro pedibusque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo-punctata. Tetrao rufus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 8.*

## 13. LE FRANCOLIN.

*Tetrao pedibus anticè pilosis: abdomine gulaque atra, collari ferrugineo, cauda cuneiformi. Tetrao Orientalis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 12.*

## 14. LA CAÏLLE.

*Tetrao pedibus nudis, corpore griseo-maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea. Coturnix. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 91. sp. 13.*



VII. Genus *Phasiani*.

## VII. Le Genre du Faisan.

## 1. LE FAISAN.

*Phasianus rufus*, capite cœruleo. *Phasianus Colchicus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 3.*

## 4. LE FAISAN DORÉ DE LA CHINE.

*Phasianus cristâ flava*, pectore coccineo, remigibus secundariis cœruleis. *Phasianus pictus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 4.*

## 5. LE FAISAN BLANC DE LA CHINE.

*Phasianus albus*, cristâ abdomineque nigris. *Phasianus nyctemerus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 90. sp. 5.*

## 7. LE PAON.

*Pavo capite cristâ erecta*. *Pavo cristatus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 87. sp. 1.*

## 9. LE PAON DE LA CHINE.

*Pavo capite lævi*, calcaribus duobus. *Pavo bicalcaratus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 87. sp. 2.*

## 12. LE HOCCO DE LA GUIANE.

*Crax nigra*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 89. sp. 1.*

Oiseau du Curassau. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 181. chap. LXXXV* ; avec une figure assez exacte *Pl. 295. fig. 1.*

Les Anglois l'appellent CURASSO-BIRD. *Edwards.*

## 13. LE HOCCO DE CURASSOW.

*Crax nigra*. *Gallus Curassavicus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 89. sp. 1.*

## 14. LE HOCCO DU MEXIQUE.

*Cusco*. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 181. chap. LXXXV* ; avec une figure exacte *Pl. 295. fig. 2.*

Les Anglois l'appellent CUSHEW-BIRD. *Edwards.*



Celui-ci diffère de celui que j'ai décrit ; en ce que les plumes de sa queue sont terminées de blanc. Ab illo cujus descriptionem dedi, differt caudæ rectricibus albo terminatis.

#### 16. LE HOCCO DU PÉROU.

*Crax rubra*, capite cœrulescente. *Crax rubra*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 89. sp. 2.*

#### 17. LE FAISAN CORNU DE BENGALÉ.

*Phasianus fusco-rufescens*, maculis oblongis albis, nigro circumdatis, varius, superne lineolis transversis fuscis striatus ; capite antèrius nigro, superius rubro ; collo & pectore rubro-aurantiis, maculis rotundis albis, nigro circumdatis, varius ; rectricibus fusco-rufescentibus ; cornibus in capite binis callosis, cylindræis, cœruleis ; membrana nuda sub gutture pendula, cœrulea, aurantio maculata, membranâ nigricante pilosâ superius prædita . . . .  
PHASIANUS BENGALENSIS CORNUTUS.

*Meleagris capite cornubus duobus*, corpore rubro punctis nigris albo fœctis. *Satyra. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 88. sp. 3.*  
*Phaïsan cornu des Indes. Edwards. Tom. III. pag. CXVI ; avec une figure exacte Pl. 116.*

Il tient le milieu pour la grandeur entre la *Poule* & le *Dindon*. La partie antérieure de la tête & les joues sont couvertes de petites plumes noires, qui ressemblent assez à des poils courts : ces plumes s'étendent jusque sur les narines. Le dessus de la tête est rouge. Derrière chacun des yeux s'élève une corne cylindrique, d'une substance calleuse, & d'un beau bleu, qui se dirige vers le der-

Quoad magnitudinem *Gal-  
linam* inter & *Gallo-pavonem*  
medium locum tenet. Par-  
tem capitis anteriorem &  
genas cooperiunt plumulæ  
nigræ, pilorum breviorum  
æmulæ : quæ plumulæ nares  
quoque obtegunt. Caput su-  
perius tingit color ruber.  
Ponè utrumque oculum  
cornu erigitur cylindricum,  
substantiâ callosâ conflatum,  
elegantè cœruleum, cujus



directio caput posterius petit. Supra partem colli inferiorem membrana extat sub gutture pendula, elegantissimè cœrulea, maculis aurantiis insignita : quæ membrana plumis superne nudatur, infernè verò plumulis nigris obsita est. In cujus membranæ medio altera adest, illi per totam longitudinem coadunata : quæ novissima membrana est rugosa, nigricans, exiguisque pilis nigris obsita. Collum & pectus rubro-aurantio tinguntur : pars colli superior aliquid nigri admixtum habet ; collum inferius & pectus minutis asperguntur maculis rotundis albis, nigro circumdatis. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superiores caudæ tectrices & venter ex fusco rufescunt, maculisque variegantur oblongis albis, nigro circumdatis ; quarum macularum extremitas caput spectans in acumen desinit, altera autem est rotundata : dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque alarum tectrices lineolis transversis fuscis insuper striantur. Crura sunt fuscorufescentia, lineolis trans-

rière de la tête. De dessous la gorge pend sur la partie inférieure du col une membrane d'un très-beau bleu, & marquée de taches orangées : elle est dégarnie de plumes en-dessus, mais en-dessous elle est garnie de petites plumes noires. Sur le milieu de cette membrane en est une autre, qui lui est réunie dans toute sa longueur : cette dernière est ridée, noirâtre & garnie de petits poils noirs. Le col & la poitrine sont d'un rouge-orangé : la partie supérieure du col est mêlée d'un peu de noir ; la partie inférieure du col & la poitrine sont parsemées de petites taches rondes blanches, & entourées de noir. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, celles du dessus de la queue & le ventre sont d'un brun-roussâtre, varié de taches oblongues blanches, & entourées de noir ; l'extrémité de ces taches qui est tournée vers la tête, se termine en pointe, & l'autre est arrondie : le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont de plus rayés de petites lignes transversales brunes. Les jambes sont d'un brun-roussâtre, rayé de même de petites



lignes transversales brunes. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur que leurs couvertures. Celles de la queue sont d'un brun - roussâtre. Le bec est brun. Les pieds & les ongles sont blanchâtres. Il y a un éperon à chaque pied. On le trouve dans le royaume de *Bengale*.

versis fuscis similiter striata: Alarum remiges ipsarum tectricibus concolores. Caudæ rectrices fusco-rufescentes. Rostrum fusco colore imbutum. Pedes unguisque candicantes. Pes autem uterque uno calcari donatur. Habitat in *Bengalensi* regno.

## ORDRE III.

## ORDO III.

## SECTION I.

## SECTIO I.

VIII. *Le genre de l'Epervier.*VIII. *Genus Accipitrinum.*

## 1. L'EPERVIER.

Falco cera viridi, pedibus flavis, pectore albo fusco undulato, cauda fasciis nigricantibus. Nisus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 26.*

## 3. L'AUTOUR.

Falco cera nigra margine pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis. Falco Palumbarius. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 25.*

## 5. LE FAUCON GENTIL.

Falco cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. Falco gentilis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 12.*

## 6. A. LE FAUCON DE BARBARIE.

Falco cera pedibusque luteis, corpore cœrulescente fuscoque maculato, pectore immaculato, cauda fasciata. Falco barbatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 6.*

## 7. LE FAUCON A COLLIER.

Falco cera flava, corpore cinereo, abdomine pallido maculis oblongis  
rulis,



rufus, oculorum orbita alba. Pygargus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 9.*

Faucon de marais. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 173. chap. LXXXI; avec une figure exacte de la femelle Pl. 291.*

Les Anglois l'appellent MARSH-HAWK. *Edwards.*

16. LE LANIER.

Falco cera lutea, pedibus rostroque cœruleis, corpore subtus maculis nigris longitudinalibus. Lanarius. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 20.*

19. A. LE GERFAULT D'ISLANDE.

Falco cera cœrulea, pedibus luteis, corpore fusco : subtus fasciis cinereis, caudæ lateribus albis. Gyrfalco. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 22.*

20. LE HOBREAU.

Falco cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido maculis oblongis fuscis. Subbuteo. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 13.*

21. L'EPERVIER DE LA CAROLINE.

Falco cera lutea, corpore fusco subtus albido, cauda fusca fasciis linearibus quatuor albis. Falco columbarius. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 19.*

25. L'EMERILLON DE LA CAROLINE.

Falco cera lutea, capite fusco, vertice abdomineque rubro, alis cœrulescentibus. Falco sparverius. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 18.*

27. LA CRESSERELLE.

Falco cera pedibusque flavis, dorso rufo punctis nigris, pectore maculis longitudinalibus fuscis, cauda rotundata. Tinnunculus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 15.*

29. LE BUSARD DE MARAIS.

Falco cera fusca, corpore griseo, vertice gula axillis pedibusque luteis. Falco æruginosus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 24.*  
Suppl. C



32. LA BUSE.

Falco cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido maculis fuscis. Buteo. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 14.*

33. LA BONDRÉE.

Falco cera nigra, pedibus seminudis flavis, capite cinereo, cauda fascia cinerea apice albo. Falco apivorus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 23.*

35. LE MILAN ROYAL.

Falco cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidior: Milvus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 10.*

36. LE MILAND DE LA CAROLINE.

Falco cera flava, cauda forficata longissima, corpore supra fusco subtus albido. Falco forficatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 11.*

47. L'EPERVIER DE LA BAYE DE HUDSON.

Accipiter superne obscurè fuscus, infernè albus, maculis fusco-rufescentibus varius; taniâ supra oculos & uropygio candidis; capite posteriore & collo inferiore griseo-fuscis, fusco obscuriore variegatis; rectricibus binis intermediis fuscescentibus, utrinque proximè sequenti cinereo-cœrulescente, extimis candidis, omnibus superne fusco transversim striatis . . . . ACCIPITER Freti HUDSONIS.

Faucon à queue annelée. *Edwards. Tom. III. pag. CVII ; avec une figure exacte Pl. 107.*

Il est à peu près de la grosseur du *Gerfault*; mais il a les jambes & les pieds beaucoup plus allongés. Ses ailes, depuis le pli qui répond à celui du poignet jusqu'à leur extrémité, ont environ treize pouces de long. Le dessus de la tête est

Cum *Gyrfalcone* crassitie circiter convenit; sed cruribus, pedibusque donatur multò magis elongatis. Alæ, ab articulo carpo humano respondente ad ipsarum extremitatem usque, tredecim circiter pollicum longitudi-



nem obtinent. Caput superius est obscurè fuscum. Caput posterius & collum inferius tingit color griseofuscus, fusco obscuriore variegatus. Synciput & guttur aliquid albi admixtum habent. In utroque capitis latere exigua extat tænia pariter candida, supra oculos ducta. Pars colli superior, dorsum, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices sunt obscurè fuscæ. Uropygium & pennæ caudam superne vestientes candidæ. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices albescent, & fusco-rufescentibus variegantur maculis, in pectore & cruribus transversis, in ventre supremo cordiformibus, in infimo ventre & inferioribus caudæ tectricibus lunulatis. Pennæ alas subtus obregentes albæ sunt, minutis maculis fuscis aspersæ; ex illis tamen excipiendæ sunt minimæ, marginum alarum partem inferiorem cooperientes, penitus fuscæ. Alarum remiges sunt obscurè fuscæ, fusco dilutiore transversim striatæ, sed in latere interiore tantum: quædam intermedie sunt insuper exterius cinereo fimbriatæ. Caudam

d'un brun obscur. La partie postérieure de la tête & le dessous du col sont d'un gris-brun, varié d'un brun plus sombre. Le synciput & la gorge sont mêlés d'un peu de blanc. De chaque côté de la tête est une petite bande de la même couleur, qui passe par-dessus les yeux. La partie supérieure du col, le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un brun obscur. Le croupion est blanc, ainsi que les couvertures du dessus de la queue. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc varié de taches d'un brun-roussâtre, lesquelles sont transversales sur la poitrine & les jambes, en forme de cœur sur le haut du ventre, & en forme de croissant sur le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc parsemé de petites taches brunes; il faut cependant en excepter les plus petites qui couvrent le dessous du bord de l'aile, qui sont entièrement brunes. Les plumes de l'aile sont d'un brun obscur, & rayées transversalement de brun plus clair, mais du côté intérieur seulement: quelques-



unes du milieu sont de plus bordées extérieurement de cendré. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont brunâtres : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est d'un cendré-bleuâtre : les quatre plus extérieures de chaque côté sont blanches : toutes sont en-dessus rayées transversalement de brun. La membrane qui couvre la bête du bec, est jaune, & garnie de quelques petites plumes noires, fort roides. Le bec est noirâtre. Les pieds sont d'un jaune vif ; & les ongles noirs. On le trouve à la *Baye de Hudson*.

componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ fuscescentes : utrinque proximè sequens cinereo-cœrulescens : quatuor utrinque extimæ candidæ : omnes autem superne fusco transversim striantur. Membrana basim rostri cooperiens est lutea, & quibusdam plumulis nigris, valdè rigidis, obsita. Rostrum nigricat. Pedes sunt vividè lutei ; ungues verò nigri. Habitat in *Freto Hudsonis*.

### 38. LE FAUCON DE BENGAL.

Accipiter superne splendide niger, infernè aurantius ; oculorum ambitu nudo, luteo ; syncipite & genis candidis, genis taniâ longitudinali nigrâ notatis ; rectricibus nigris, lateralibus interiùs albo transversim striatis . . . FALCO BENGALENSIS.

Falco cera palpebris pedibus subrusque luteus, dorso nigro-cœrulescente, temporibus lineâ alba inclusis. Falco cœrulescens. *Linn. Syst. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 7.*

Petit Faucon noir & orangé des Indes. *Edwards. Tom. III. pag. CVIII ; avec une figure exacte Pl. 108.*

C'est la plus petite espece que je connoisse dans ce genre. Il est tout au plus de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à

Hæc est hujus generis species quam noverim minima. Crassitie *Merulam* non antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extre-



mitatem sex pollices & totidem circiter lineas explet. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Rostrum habet validum ; pedes crassos & breves ; unguesque validos & acutos. Partes capitis & colli superiores , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices sunt splendide nigræ. Synciput est candidum : candor autem supra genas protenditur , supra colli latera paululum descendit , & latiusculâ taniâ longitudinali nigrâ utrinque notatur. In suprema hujusce taniæ parte oculi siti sunt , & cute luteâ , plumis nudatâ , circumdati. Guttur , partem colli inferiorem , pectus , ventrem , latera , crura , inferioresque caudæ rectrices tingit color eleganter auran-  
tius , in pectore tamen dilutior quàm in reliquis prædictis partibus. Pennæ alas subtus obregentes sunt candidæ. Alarum remiges splendide nigræ , taniis transversis albis interiùs striatæ. Cauda duodecim constat rectricibus splendide nigris , quarum laterales omnes sunt in

celui de la queue est d'environ six pouces six lignes. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Son bec est fort ; ses pieds gros & courts ; & ses ongles forts & aigus. Les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un noir brillant. Le synciput est blanc : cette couleur s'étend sur les joues , descend un peu sur les côtés du col , & est marquée de chaque côté d'une assez large bande longitudinale noire. Les yeux sont placés à la partie supérieure de cette bande , & entourés d'une peau jaune , dégarnie de plumes. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un bel orangé : cette couleur est cependant plus claire sur la poitrine qu'ailleurs. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches. Les plumes de l'aîle sont d'un noir brillant , & rayées intérieurement de bandes transversales blanches. La queue est composée de douze plumes d'un noir brillant : toutes les latérales sont rayées sur



le côté intérieur de bandes transversales blanches. La peau nue ou membrane qui couvre la base du bec, est jaunâtre. Le bec est d'un cendré tirant sur le couleur de chair. Les pieds sont d'un très-bel orangé; & les ongles noirs. On le trouve dans le royaume de *Bengale*.

latere interiore taniis transversis albis striatæ. Cutis nuda sive membrana basim rostri cooperiens flavicat. Rostrum cinereum est ad carneum colorem inclinans. Pedes eleganter aurantii; ungues verò nigri. Habitat in *Bengalensi* regno.

\*\* 39. LE FAUCON PATU.

Voyez *Pl. I.*

*Accipiter superne fusco-nigricante, violaceo adumbrato, & sordidè griseo variegatus, infernè fulvo-fuscescens, lineolis longitudinalibus nigricantibus varius; capite & collo superiore fulvo-griseis, lineolis nigricantibus variegatis; taniâ supra oculos nigrâ; rectricibus fuscis, versùs extremitatem nigricantibus, sordidè griseo in apice marginatis, lateralibus interiùs albido maculatis; pedibus pennatis...*  
FALCO PEDIBUS PENNATIS.

Il est à peu près de la grosseur du *Gerfault*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue huit pouces trois lignes; son pied deux pouces quatre lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes : les

Crassitie *Gyrifalconem* circiter æmulator. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem septem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues sexdecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda octo pollices & tres lineas; pes duos pollices cum quatuor lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos



pollices & tres lineas : laterales multò sunt breviores ; posticus autem anticum intimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum ; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ ferè pertingunt. Caput & partem colli superiorem vestiunt pennæ fulvo-griseæ , lineâ nigricante , secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ , notatæ. Quæ guttur , partem colli inferiorem , pectus , ventrem & latera cooperiunt , ex fulvo fuscescunt , & lineâ nigricante , secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ , similiter insigniuntur. Quæ lineæ nigricantes majorem in gutture obtinent latitudinem quàm in reliquis prædictis partibus ; in occipite verò , collo superiore & imo ventre sunt valdè strictæ. In utroque capitis latere exigua extat tænia nigra , ab oris angulis orta , & supra oculos protensa. Dorsum & uropygium sordidè griseo & fusco-nigricante , violaceo adumbrato , variegantur. Scapulares pennas iidem colores variegant. Tectrices caudæ superiores minores sunt

latéraux sont beaucoup plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a quatre pieds de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes d'un fauve tirant sur le gris , marquées chacune d'une ligne noirâtre , qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent la gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre & les côtés , sont d'un fauve tirant sur le brun , & marquées pareillement d'une ligne noirâtre , qui s'étend selon la longueur de leur tige. Ces lignes noirâtres sont plus larges à la gorge qu'ailleurs ; & elles sont fort étroites sur l'occiput , à la partie supérieure du col & sur le bas-ventre. De chaque côté de la tête est une petite bande noire , qui part des coins de la bouche , & passe au-dessus des yeux. Le dos & le croupion sont variés de gris sale & de brun-noirâtre nuancé de violet. Les plumes scapulaires sont variées des mêmes couleurs. Les petites couvertures du dessus de la queue sont entièrement d'un brun-noirâtre nuancé de violet ; les grandes sont d'un



gris sale. Les jambes sont couvertes de plumes fauves, & dont la tige est d'une couleur un peu plus foncée. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes de la même couleur que celles des jambes. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve clair, & terminées de blanchâtre. Celles du dessous des ailes sont variées de brun, de fauve clair & d'un peu de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un brun qui est en quelques endroits un peu plus foncé & nuancé de violet : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur, si l'on en excepte les trois plus proches du corps, qui sont d'un gris sale : les moyennes sont aussi bordées de gris sale par le bout ; & celles qui occupent le milieu de l'aile, sont marquées sur le côté intérieur de quelques bandes transversales blanchâtres, mais peu apparentes. Les barbes intérieures de la première & de la seconde des plumes de l'aile, les barbes extérieures & intérieures de la troisième, de la quatrième & de la cinquième, & les barbes extérieures de la sixième

penitus fusco - nigricantes ; violaceo adumbrata : majores sordide griseæ. Crura obtegunt pennæ fulvæ, scapo colore nonnihil saturatiore imbuto præditæ. Pedes ad exortum usque digitorum vestiunt plumæ pennis crurum concolores. Inferiores caudæ tectrices sunt dilute fulvæ, albido terminatæ. Pennæ alas subtus cooperiescentes fusco, fulvo diluto & pauco albo variegatæ. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, fusco imbutæ colore, quibusdam in locis nonnihil saturatiore & violaceo adumbrato : majores à corpore remotiores nigricantes. Alarum remiges similiter nigricant, exceptis tamen tribus corpori vicinioribus sordide griseis : minores sunt quoque in extremitate sordide griseo fimbriatæ ; quæ verò in ala medium locum obtinent, in latere interiore quibusdam insigniuntur tæniis transversis candicantibus, sed haud multum conspicuis. Primæ & secundæ remigis pinnulæ interiores, tertiæ, quartæ & quintæ pinnulæ sive exteriores sive interiores, sextæ tandem pinnulæ exteriores fiunt



sunt subito reliquis multo breviores, idque versus cun-  
jusque remigis extremitatem. Caudam componunt duodecim rectrices fuscae, versus extremitatem nigricantes, & sordide griseo in apice marginatae; laterales sunt insuper in latere interiore albido maculatae: duodecim autem rectrices sunt subtilius dilute cinereae. Cutis nuda sive membrana basim rostri cooperiens, palpebrae & digiti lutei; rostrum, unguisque nigricantes. *Ex museo D. de Bandeville.*

deviennent tout-à-coup plus courtes que les autres, & cela vers le bout de chaque plume. La queue est composée de douze plumes d'un brun qui devient noirâtre vers leur extrémité, & bordées de gris sale par le bout; les latérales sont de plus tachetées de blanchâtre sur leur côté intérieur: le dessous des douze plumes de la queue est d'un cendré clair. La peau nue ou membrane qui couvre la base du bec, les paupières & les doigts sont jaunes; le bec & les ongles sont noirâtres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

IX. Genus *Aquilinum.*

IX. Le genre de l'Aigle.

1. L'AIGLE.

*Falco cera flava, pedibus lanatis, dorso fusco, cauda fascia alba. Falco fulvus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 3.*

*Falco cera flava pedibusque lanatis, corpore fusco, cauda alba apice fusco. Falco Canadensis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 4.*

2. L'AIGLE A TESTE BLANCHE.

*Falco cera flava, rectricibus albis: intermediis apice nigris. Aquila capite albo. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 8. var. 1.*

5. L'AIGLE A QUEUE BLANCHE.

*Falco cera flava, rectricibus albis: intermediis apice nigris. Albicilla. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 8.*

7. L'AIGLE DORÉ.

*Falco. cera lutea, pedibus lanatis, corpore fusco ferrugineo vario, Suppl.*



cauda nigra basi cinereo-undulata. Chrysaëtos. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 2.*

### 8. L'AIGLE NOIR.

Falco cera lutea, pedibus semilatis, corpore ferrugineo-nigricante striis flavis. Melanætos. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 1.*

### 10. L'AIGLE DE MER.

Falco cera pedibusque cœruleis, corpore supra fusco subtus albo, capite albido. Haliaëtus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 41. sp. 21.*

### 13. L'AIGLE HUPÉ DU BRÉSIL.

Vultur occipite subcristato. Harpyja. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 40. sp. 2.*

X. Le genre du Vautour. X. Genus Vulturinum.

### 8. LE VAUTOUR DES ALPES.

Vultur remigibus nigris margine exteriori ( præter extimas ) canis. Percnopterus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 40. sp. 6.*

### 10. LE VAUTOUR DU BRÉSIL.

Vultur fusco-griseus, remigibus nigris, rostro albo. Aura. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 40. sp. 4.*

### 11. LE ROI DES VAUTOURS.

Vultur naribus carunculatis, vertice colloque denudato. Papa. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 40. sp. 3.*

### 12. LE CONDOR.

Vultur maximus, caruncula verticali longitudine capitis. Gryphus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 40. sp. 1.*

### 13. LE VAUTOUR BARBU.

Vultur superne fusco-nigricans, marginibus pennarum dilutioribus, infernè albus, fusco-rubescens adunatus; barba nigrâ sub gutture pendulâ; sincipite, genis & duplici





*Falcon patu.*









Desiné & Gravé par Martinet

*Faucon patu.*







utrinque in capite taniâ nigris; reliquo capite & collo candidis; pennis colli strictioribus, longioribus, acutis; rectricibus fusco-nigricantibus, scapis albis præditis; pedibus albâ lanugine vestitis . . . . VULTUR BARBATUS.

Vultur albidus, dorso fusco, jugulo barbato, rostro incarnato; capite linea nigra cincto. Vultur barbatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 40. sp. 5.*

Vautour barbu. *Edwards. Tom. III. pag. CVI; avec une figure exacte Pl. 106.*

*Aquilam* crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tres pedes unum pollicem & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues duos pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est. Alis expansis, extremitates majorum remigum septem pedum & paulò plus intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Synciput & genæ nigre sunt. In media nigredine oculi sunt collocati. Ponè utrumque oculum tænia oritur nigra, quæ binæ tæniæ assurgunt, & in posteriore capitis parte coadunantur. Infra utrumque oculum, non procul ab oris angulis, altera oritur tænia nigra, quæ, nonnihil inflexa, versùs col-

Il est à peu près de la grosseur d'un *Aigle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ trois pieds un pouce six lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds six pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de longueur. Il a un peu plus de sept pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le synciput est noir, ainsi que les joues. Les yeux sont placés au milieu de cette couleur. Derrière chacun d'eux part une bande noire, qui remontent toutes deux, & vont se réunir sur le derrière de la tête. Au-dessous de chaque œil, tout près des coins de la bouche, part une autre bande noire, qui, en s'inclinant un peu, descend vers le col. Les narines sont couvertes de plumes noires, roides & tournées en-



devant. Au-deffous de la gorge pend un paquet de petites plumes de la même couleur, qui forme une espece de barbe. Le reste de la tête est couvert d'un duvet blanc. Les plumes qui couvrent le col, sont de la même couleur, longues, étroites & pointues. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre, chaque plume étant bordée d'une couleur un peu plus claire. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc nuancé d'un peu de brun-rougeâtre. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts d'un duvet blanc. Toutes les couvertures du dessus & du dessous des aîles sont d'un brun-noirâtre : toutes les petites sont marquées le long de leur tige d'une ligne d'un rougeâtre vif, fort étroite sur celles du dessus, beaucoup plus large & tirant sur le blanchâtre sur celles du dessous. Toutes les plumes de l'aîle sont de la même couleur que le dos; mais leur tige est blanche. La queue est composée de douze plumes, qui sont pareillement d'un brun-noirâtre, & ont leur tige blanche. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les la-

lum ducitur. Nares cooperiunt pennæ nigræ, rigidæ, antrorsum versæ. Plumularum pariter nigrarum fasciculus extat sub gutture pendulus, barbam quodammodo efficiens. Reliquum caput obtegit alba lanugo. Collum vestiunt pennæ concolorēs, longiusculæ, strictæ & in acumen desinentes. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt fusco-nigricantes, marginibus pennarum colore nonnihil dilutius tinctis. Pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obtegentes albescent, paucoque fusco-rubesciente adumbrantur. Pedes ad exortum usque digitorum albâ lanugine vestiuntur. Rectrices alarum superiores & inferiores omnes ex fusco nigricant : omnes autem minores secundum ipsarum scapi longitudinem lineâ notantur vividè rubescente, in superioribus strictissimâ, in inferioribus verò multò latiore & ad albidum inclinante. Omnes alarum remiges eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur; sed scapo albo præditæ sunt. Caudam componunt duodecim rectrices similiter fusco-



nigricantes, & scapo albo præditæ. Binæ intermedia lateralium longitudinem excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Oculorum irides vividissimè luteæ: palpebræ saturatè rubræ. Os intus coeruleum. Rostrum carneo-purpureum, in extremitate saturatius quàm in exortu. Digiti plumbeo colore imbuti; ungues verò fusci. Habitat in *Barbaria*.

térales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est d'un jaune très-vif: les paupieres sont d'un rouge foncé. Le dedans de la bouche est bleu. Le bec est d'un couleur de chair pourpré, plus foncé à son extrémité qu'à son origine. Les doigts sont de couleur de plomb; & les ongles bruns. On le trouve en *Barbarie*.

14. LE VAUTOUR D'ARABIE.

Vultur fusco-nigricans, superne saturatius, infernè dilutius; capite gibbofo; capite, collo supremo & torque cinereis; oculorum ambitu & maculâ in genis candidis; rectricibus alarum superioribus minimis apice albis, rectricibus fusco-nigricantibus; pedibus nudis . . . VULTUR ARABICUS.

Vautour noir couronné ou chaperonné. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 171. chap. LXXX; avec une figure exacte Pl. 290.*  
Les Anglois l'appellent CRESTED BLACK VULTURE ou COPEL BLACK VULTURE. *Edwards.*

*Aquila crassitiem tertiâ parte superat. Caput & partem colli ipsi finitimam obvestit lanugo cinerea. Oculorum ambitus albicat. In utraque gena macula quocunque extat candida. In summo capite gibbus attollitur satis crassus. Infra colli partem lanugine oblitam qui-*

Il est d'un tiers plus gros qu'un *Aigle*. La tête & la partie du col qui en est la plus voisine, sont couvertes d'un duvet cendré. Le tour des yeux est blanc. Il y a aussi sur chaque joue une tache de la même couleur. Sur le sommet de la tête s'élève une bosse assez grosse. Au-dessous de la partie

Dij



du col qui est couverte de duvet, est une espece de collier, formé par des plumes cendrées, assez longues & pointues. Ce collier entoure tout le col, en descendant un peu vers la poitrine. Le reste du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun-noirâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur, mais un peu plus claire. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un brun-noirâtre, & terminées de blanc: les moyennes & les grandes sont de la même couleur que le dos. Toutes les plumes de l'aile sont pareillement d'un brun-noirâtre. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est couvert à son origine d'une peau d'un bleuâtre clair; & il est noirâtre vers son extrémité. Les pieds sont bleuâtres; & les ongles noirs. On le trouve en *Arabie*.

dam extat torquis; pennis conflatus cinereis, longiusculis & acutis. Qui torquis; collum universum ambiens, paululum versùs pectus descendit. Reliquum collum; dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt fusconigricantes. Pectus, ventrem, latera, crura, & pennas caudam superne & infernè cooperientes tingit idem color, sed nonnihil dilutior. Tectrices alarum superiores minimæ sunt fusconigricantes, albo terminatæ: mediæ & majores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Remiges alarum omnes ex fusco quoque nigricant. Caudam componunt duodecim rectrices concolores. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum ad exortum cute obducitur dilutè cœrulescente; versùs extremitatem nigricat. Pedes sunt cœrulescentes; ungues verò nigri. Habitat in *Arabia*.

## SECTION II.

## XI. Le genre du Hibou.

## I. LE GRAND DUC.

*Strix capite auriculato, corpore rufo. Bubo. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 1.*

## SECTIO II.

XI. Genus *Afsonis*.



## 3. LE GRAND DUC DE LAPONIE.

*Strix capite auriculato, corpore albido. Strix Scandiaca. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 2.*

## 4. LE MOYEN DUC OU LE HIBOU.

*Strix capite auriculato, pennis senis. Otus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 4.*

## 5. LE PETIT DUC.

*Strix capite auriculato penna solitaria. Scops. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 5.*

## 6. LE PETIT DUC DE LA CAROLINE.

*Strix capite aurito corpore supra ferrugineo subtus cinereo, alis punctis quinque albis. Alio. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 3.*

XII. Genus *Strigis.*

XII. Le genre du Chathuant.

## 1. LE CHATHUANT.

*Strix capite lævi, corpore ferrugineo, remige tertia longiore. Strix stridula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 9.*

## 3. LA HULOTE.

*Strix capite lævi, corpore ferrugineo, iridibus atris; remigibus primoribus ferratis. Aluco. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 6.*

## 4. LA GRANDE CHOUETTE.

*Strix capite lævi, corpore supra fusco albo maculato, rectricibus fasciis albis. Ulula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 10.*

*Strix capite lævi, corpore fusco iridibus flavis. Strix funerea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 7. (hujus speciei varietas.)*

## 5. LA PETITE CHOUETTE OU LA CHEVECHE.

*Strix capite lævi, remigibus albis: maculis quinque ordinum. Strix passerina. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 11.*



## 8. LE CHATHUANT BLANC DE LA BAYE DE HUDSON.

*Strix capite lævi, corpore albido maculis lunatis distantibus fuscis.*  
*Nyctea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 42. sp. 8.*

---

## ORDRE IV.

## ORDO IV.

## SECTION I.

## SECTIO I.

XIII. *Le Genre du Coracias.*XIII. *Genus Coraciæ.*

## 1. LE CORACIAS.

*Upupa atra, rostro pedibusque rubris. Pyrrhocorax. Linn. Systh. Nat.*  
*ed. 10. Gen. 58. sp. 4.*

## 2. LE CORACIAS HUPÉ.

*Upupa viridis, capite flavo, cervice jubata. Eremita. Linn. Systh. Nat.*  
*ed. 10. Gen. 58. sp. 3.*

XIV. *Le genre du Corbeau.*XIV. *Genus Corvinum.*

## 1. LE CORBEAU.

*Corvus ater, dorso cœrulescente, cauda subrotundata. Corax. Linn.*  
*Systh. Nat. ed. 10. Gen. 48. sp. 1.*

## 2. LA CORNEILLE.

*Corvus atro-cœrulescens, cauda rotundata, rectricibus acutis. Corone.*  
*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 48. sp. 2.*

## 3. LA CORNEILLE MOISSONNEUSE.

*Corvus ater, fronte cinerascens. Corvus frugilegus. Linn. Systh. Nat.*  
*ed. 10. Gen. 48. sp. 3.*

## 4. LA CORNEILLE MANTELÉE.

*Corvus cinerascens, capite gula alis caudaque nigris. Cornix. Linn.*  
*Systh. Nat. ed. 10. Gen. 48. sp. 4.*

## 6. LE



## 6. LE CHOUCAS.

*Corvus fuscus*, occipite incano, fronte alis caudaque nigris. Monedula.  
*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 48. sp. 5.*

## \*\* 11. LE CORBEAU BLANC DU NORD.

*Voyez Pl. II. Fig. 1.*

*Corvus superne splendide niger, inferne albus; capite albo, nigris maculis vario; pectore splendide nigro; remigibus candidis, priore nigricante marginatâ; rectricibus albo & nigricante variegatis . . . . CORVUS BOREALIS ALBUS.*

Cum *Corvo nostrati* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes explet, & ad extremos unguis unum pedem & novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & lineam unam longum est; cauda octo pollices & sex lineas; pes duos pollices cum tribus lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & quinque lineas, extimus unum pollicem cum novem lineis, intimus unum pollicem & octo lineas; posticus autem anticorum extimus longitudine adæquans. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extre-

Il est à peu près de la longueur de *notre Corbeau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds, & jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces une ligne de long; sa queue huit pouces six lignes; son pied deux pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces cinq lignes, l'extérieur un pouce neuf lignes, l'intérieur un pouce huit lignes; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a trois pieds dix pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & la partie inférieure du col sont blanches, & variées de quelques petites

*Suppl.*

E



taches noires. La partie supérieure & les côtés du col, la poitrine, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir brillant. Le ventre & les côtés sont blancs. Les jambes sont noirâtres. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, & variées d'un peu de blanc. Celles du dessus & du dessous des ailes sont blanches; quelques-unes des grandes sont cependant variées d'un peu de noirâtre. L'aile est composée de vingt-une plumes: la première est blanche dans son milieu, & bordée de noirâtre dans toute sa circonférence; cette bordure est très-large sur le côté intérieur: les dix-huit suivantes, savoir depuis la seconde jusqu'à la dix-neuvième inclusive-ment, sont blanches: la vingtième est noirâtre; & la vingtunième est blanche. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont blanches: les trois qui les suivent immédiatement à droite, sont de la même couleur: & les deux plus extérieures sont noirâtres: celle qui suit à gauche les deux du milieu, est blanche dans son milieu, & noirâtre sur ses côtés: & les quatre plus extérieures sont entière-

ment attingunt. Caput, guttur & collum inferius alba sunt, minutis quibusdam maculis nigris varia. Collum superius & ad latera, pectus, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt splendide nigræ. Venter & latera albicant. Crura sunt nigricantia. Pennæ caudam subtus obtegentes concolores, paucò albo variegatæ. Rectrices alarum superiores & inferiores candidæ, quibusdam tamen majoribus paucò nigricante variegatis. Vingtinti & unâ remigibus ala conflatur: prior est in medio candida, nigricante in tota circumferentia marginata; quæ margo nigricans maximam in latere interiore latitudinem obtinet: octodecim proximè sequentes, à secunda scilicet ad decimam nonam usque inclusive, candidæ: vigesima nigricans; & vigesima prima alba. Caudam componunt duodecim rectrices: binæ intermediae albæ: tres ad dexteram proximè sequentes concolores: & binæ extremae nigricantes; quæ ad sinistram binas intermedias proximè sequitur, est in medio alba, ad latera nigricans; & quatuor exti-



*ina* penitus nigricantes. Bina rectrices intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Pennae nares obtegentes sunt candidae, longiusculae, strictiores & valde rigidae. Rostrum nigrum, excepta extremitate candicante. Pedes nigri; digiti tamen sunt subtus albidii: ungues quoque candicantes. In Septentrionalibus regionibus habitat. In montibus nidificat, & quatuor aut quinque ova unâ vice ponit. A *Ferroensi Insula* ad *D. de Marigny* missus est à *D. Thurot*. Nunc in museo *D. Aubry* servatur.

ment noirâtres. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les plumes qui couvrent les narines, sont blanches, longues, étroites & fort roides. Le bec est noir; excepté son bout, qui est blanchâtre. Les pieds sont noirs; le dessous des doigts est cependant blanchâtre: les ongles sont de cette dernière couleur. On le trouve dans les pays du Nord. Il fait son nid sur les montagnes, & pond à chaque couvée quatre ou cinq œufs. Il a été envoyé de l'*Isle Ferroë* à *M. le Marquis de Marigny* par *M. Thurot*. Il est actuellement dans le cabinet de *M. l'Abbé Aubry*.

XV. Genus *Picæ*.

XV. Le genre de la Pie.

1. LA PIE.

*Corvus* albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *Pica*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 48. sp. 10.*

3. LA PIE DE LA JAMAÏQUE.

*Gracula* nigro-violacea, cauda subcuneiformi. *Quiscalus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 50. sp. 6.*

XVI. Genus *Garruli*.

XVI. Le genre du Geay.

1. LE GEAY.

*Corvus* tectricibus alarum coeruleis: lineis transversis albis nigrisque,  
E ij



corpore ferrugineo variegato. *Corvus glandarius*. Linn. *Systh. Nat.* ed. 10. Gen. 48. sp. 7.

#### 4. LE GEAY BLEU DE CANADA.

*Corvus rectricibus alarum lineis transversis nigris, corpore cœruleo, collari nigro. Corvus cristatus*. Linn. *Systh. Nat.* ed. 10. Gen. 48. sp. 8.

XVII. *Le genre du Cassé-noix.*

XVII. *Genus Nucifraga.*

#### 1. LE CASSE-NOIX.

*Corvus fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris : rectricibus apice albis : intermediis apice detritis. Caryocatactes*. Linn. *Systh. Nat.* ed. 10. Gen. 48. sp. 9.

#### SECTION II. SECTION II.

XVIII. *Le genre du Rollier.*

XVIII. *Genus Galguli.*

#### 1. LE ROLLIER.

*Coracias cœrulea, dorso rubro, remigibus nigris. Garrulus*. Linn. *Systh. Nat.* ed. 10. Gen. 49. sp. 1.

Corneille bleue. Edwards. Tom. III. pag. CIX; avec une figure exacte Pl. 109.

#### 2. LE ROLLIER DE MINDANAO.

*Corvus vertice alis caudaque cœruleis, collo griseo. Corvus Benghalensis*. Linn. *Systh. Nat.* ed. 10. Gen. 48. sp. 6.

XIX. *Le genre du Troupiale.*

XIX. *Genus Icteri.*

#### 19. LE BALTIMORE.

*Coracias fulva, capite dorso remigibusque nigris. Galbula*. Linn. *Systh. Nat.* ed. 10. Gen. 49. sp. 4.

#### 29. LE CAROUGE TACHETÉ.

*Fringilla grisea nigro punctata, area à rostro per latera colli atra. Fringilla melancholica*. Linn. *Systh. Nat.* ed. 10. Gen. 98. sp. 7.



## 31. LE TROUPIALE DES INDES.

*Icterus superne aurantius, infernè luteus; pennis basim rostri ambientibus, gutture & tectricibus alarum superioribus minoribus nigris; rectricibus nigris, luteo in apice marginatis . . . .* ICTERUS INDICUS.

*Coracias flavo-fulva, gula tectricibus primariis extremitateque rectricum nigris. Coracias aurea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 49. sp. 5.*

Oiseau de Paradis de couleur d'or. *Edwards. Tom. III. pag. CXII; avec une figure passable Pl. 112.*

Magnitudine & crassitie *Icterus Guianensem* circiter æmulator. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices eleganti aurantio tinguntur. Plumulæ basim rostri ambientes, gutturque sunt nigre, holoserici villosi instar, splendentes. Colli inferioris partem infimam, pectus, ventrem, latera, crura, pennasque caudam subtus obtegentes tingit color eleganter luteus. Superiores alarum tectrices minores sunt nigre, quibusdam luteo marginatis: majores penitus luteæ. Cuius coloris sint remiges alarum majores prorsus me latet: minores verò sunt luteæ. Caudam componunt duodecim rectrices superne saturatè, infernè obscurè nigre, luteo in apice

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur du *Troupiale de la Guianè*. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bel orangé. Les petites plumes qui entourent la bête du bec, & la gorge sont d'un noir de velours. Le bas de la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau jaune. Les petites couvertures du dessus des ailes sont noires, quelques-unes étant bordées de jaune: les grandes sont entièrement de cette dernière couleur. J'ignore de quelle couleur sont les grandes plumes de l'aile: les moyennes sont jaunes. La queue est composée de douze plumes d'un noir foncé en-dessus, terni en-



deffous, & bordées de jaune par le bout : leurs riges paroissent jaunâtres en - deffous. Le bec est d'un brun - rouffatre à son origine & noir à son extrémité. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

marginata : ipsarum scapi subtus videntur flavicantes. Rostrum ad exortum fuscorufescens, in extremitate nigrum. Habitat in *India Orientali*.

**\*\* 32. LE CAROUGE A TESTE JAUNE D'AMÉRIQUE;**

*Voyez Pl. II. Fig. 2.*

*Icterus splendidè niger; capite superiore, testricibus alarum & caudæ minoribus, infimisque cruribus luteis; remigibus, rectricibusque nigricantibus . . . . XANTHORUS ICTEROCEPHALUS AMERICANUS.*

Il est à peu près de la grosseur du *Carouge de Cayenne*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces deux lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; son pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes & demie : les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a douze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la lon-

Cum *Xanthorno Cayennensi* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & lineas binas æquat, & ad extremos unguës sex pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda tres pollices cum decem lineis; pes decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem cum semi lineas; laterales multò sunt breviores; posticus autem lateralium longitudinem paululum excedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim polli-



cum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput superius tingit color eleganter luteus. Synciput , caput ad latera , guttur , collum , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , pectus , venter , crurum suprema pars & latera splendido imbuuntur nigro. Crurum infima pars est lutea. Tectrices caudæ minores superiores & inferiores concolores : majores eodem imbuuntur nigro ac dorsum ipsum tingitur. Tectrices alarum inferiores minores sunt pallidè flavæ : majores cineræ , flavo & nigricante mixtæ. Superiores minores vividè luteæ : majores nigricantes. Omnes alarum remiges similiter nigricant ; in margine tamen interiorè colore tinguntur , præsertim versùs ipsarum exortum , multò dilutiorè. Remix tertia , sicut & quarta , reliquas omnes longitudine excedit. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum antecellunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis

gueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un beau jaune. Le synciput , les côtés de la tête , la gorge , le col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , la poitrine , le ventre , le haut des jambes & les côtés sont d'un noir brillant. La partie inférieure des jambes est jaune. Les petites couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur : les grandes sont du même noir que le dos. Les petites couvertures du dessous des ailes , sont d'un jaune pâle ; les grandes sont d'un cendré mêlé de jaune & de noirâtre. Les petites du dessus sont d'un jaune vif : les grandes sont noirâtres. Toutes les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur , cependant leur bord intérieur est beaucoup plus clair , sur-tout vers leur origine. La troisième & la quatrième plume de l'aile sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est plus courte de dix lignes que les deux du milieu. Le bec est noir. Les pieds sont de couleur de plomb ; & les ongles



noirâtres. On le trouve en Amérique. Du cabinet de M. Mauduyt.  
*decem linearum longitudine cedentem. Rostrum nigrum. Pedes plumbeo colore imbuti; ungues verò nigricantes. Habitat in America. Ex museo D. Mauduyt.*

XX. Le genre de l'Oiseau-de-Paradis.

XX. Genus *Manucodiata*.

### 1. L'OISEAU-DE-PARADIS.

*Paradisæa pennis hypochondriis corpore longioribus, rectricibus intermediis longis setaceis. Paradisæa apoda. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 51. sp. 1.*

Grand Oiseau de Paradis. *Edwards. Tom. III. pag. CX; avec une figure exacte Pl. 110.*

### 2. LE PETIT OISEAU-DE-PARADIS.

*Paradisæa cirrhis caudalibus filiformibus apice lunato-pennaceis. Paradisæa regia. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 51. sp. 2.*

Roy des Oiseaux du Paradis. *Edwards. Tom. III. pag. CXI; avec une figure assez exacte Pl. 111.*

## ORDRE V.

## ORDO V.

### SECTION I.

### SECTIO I.

XXI. Le genre de la Pie-grièche.

XXI. Genus *Lanii*.

### 1. LA PIE-GRIESCHE GRISE.

*Lanius cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba. Excubitor. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 43. sp. 2.*

### 3. LA PIE-GRIESCHE ROUSSE.

*Lanius cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo. Collurio. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 43. sp. 3.*

*Lanius cauda integra, corpore supra nigro subtus albo, occipite purpureo. Senator. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 43. sp. 7.*





*2. Carouge à tête jaune d'Amérique*









Desmés et Gravé par Martinet.

1. Corbeau blanc du Nord.

2. Carouge à tête jaune d'Amérique.







## 13. LA PIE-GRIESCHE ROUSSE DE BENGALÉ.

*Lanius cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente, subtus fulvo fulcoque undulato. Lanius cristatus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 43. sp. 1.*

## 14. LA PIE-GRIESCHE BRUNE DE BENGALÉ.

*Motacilla grisea, subtus alba, temporibus uropygioque rubris. Emericia. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 20.*  
Rouge queue des Indes. *Edwards. Tom. IV. pag. CXC ; avec une figure assez exacte Pl. 190.*

Ille cujus descriptionem dedit *Edwardus*, ad colli latera macularum nigrarum majori numero donatur quàm ille quem descripsit *Albinus*. Uropygio quoque & superioribus caudæ rectricibus rubris præditus est.

Celle qu'a décrite *Edwards* ; a un plus grand nombre de taches noires sur les côtés du col que n'en a celle qui est décrite par *Albin*. Elle a aussi le croupion & les couvertures du dessus de la queue rouges.

## 19. LA PIE-GRIESCHE NOIRE DE BENGALÉ.

*Gracula nigro-cœrulescens, abdomine macula alarum rectricibusque lateralibus albis. Saularis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 50. sp. 5.*  
*Saulary mas Mad. ex albo nigroque mixtus. Raj. Syn. Avi. pag. 197. N°. 19. hujus icon minimè accurata Tab. II. fig. 19.*  
*Saulary foemina Mad. fusco alboque varia. Raj. Syn. Avi. pag. 197. N°. 20. hujus icon minimè accurata Tab. II. fig. 20.*  
*Petite Pie des Indes. Edwards. Tom. III. pag. CLXXXI ; avec une figure exacte Pl. 181.*  
*Les Anglois l'appellent SAULARY. Raj.*

Secundùm *Edwardum*, in hujus speciei mare color niger est splendens, purpureoque & cœruleo varians. Ex minoribus alarum remigibus quædam tantùm al-

Selon *Edwards*, dans le mâle de cette espece le noir est brillant, & changeant en pourpre & en bleu. Il n'y a que quelques - unes des moyennes plumes de l'aîle qui soient blan-

*Suppl.*

F



ches. Celles du milieu de la queue sont noires, & les latérales blanches. bicant. Caudæ rectrices intermediae sunt nigrae, laterales verò candidae.

## 22. LA PIE-GRIESCHE A QUEUE FOURCHUE DE BENGALÉ.

*Lanius cauda forficata*, corpore nigro-cœrulescente, abdomine albo.  
*Lanius cœrulescens*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 43. sp. 8.*

XXII. *Le genre de la Grive.*

XXII. *Genus Turdinum.*

### 1. LA GROSSE GRIVE.

*Turdus dorso fusco*, collo maculis albis, rostro flavescente. *Turdus viscivorus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 1.*

### 2. LA PETITE GRIVE.

*Turdus alis subtus flavescens*, rectricibus tribus lateralibus apice utrinque albis. *Turdus iliacus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 3.*

### 3. LE MAUVIS.

*Turdus alis subtus ferrugineis*, linea superciliarum albicante. *Turdus musicus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 4.*

### 4. LE MAUVIS DE LA CAROLINE.

Petite Grive. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 183. chap. LXXXVI ; avec une figure exacte Pl. 296.*  
*Les Anglois l'appellent LITTLE THRUSH. Edwards.*

### 5. LA LITORNE OU TOURDELLE.

*Turdus rectricibus nigris*: extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano. *Turdus pilaris*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 2.*

### 6. LA ROUSSEROLLE OU ROUCHEROLLE.

*Turdus griseus*, subtus albidus lineolis transversis lunatis fuscis, pedibus cœrulescentibus. *Turdus arundinaceus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 15.*



## 8. LA GRIVE DE LA CAROLINE.

*Turdus ferrugineus subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata. Turdus rufus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 6.*

## 10. LE MERLE.

*Turdus ater, rostro palpebrisque fulvis. Merula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 12.*

## 12. LE MERLE A COLLIER.

*Turdus nigricans, torque albo, rostro flavescente. Turdus torquatus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 13.*

## 13. LE MERLE DE ROCHE.

*Corvus dorso cinereo, rectricibus rufis: intermediis duabus cinereis; fascia nigricante. Corvus infautus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 48. sp. 12.*

## 15. LE MERLE A COLLIER D'AMÉRIQUE.

*Alauda subtus flava, fascia pectorali curva nigra: rectricibus tribus lateralibus albis. Alauda magna. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 9.*

## 20. LE MERLE COULEUR DE ROSE.

*Turdus subincarnatus, capite alis caudaque nigris occipite cristato; Turdus roseus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 11.*

## 21. LE MERLE HUPÉ DE LA CHINE.

*Gracula nigra, remigibus primoribus basi rectricibusque apice albis, rostro flavo. Gracula cristatella. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 50. sp. 4.*

## 25. LE MERLE DE BENGALÉ.

*Turdus griseus, subtus ferrugineus, linea alba ad latera capitis, cauda rotundata. Canorus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 5.*

*Grive brune des Indes. Edwards. Tom. IV. pag. CLXXXIV; avec une figure exacte Pl. 184.*

*Les Habitans de Bengale l'appellent BANIAHBOW. Edwards.*



Selon *Edwards*, il est d'un brun foncé sur le dessus du corps, & d'un brun clair en-dessous. La bordure des plumes de ses ailes est un peu plus claire que le reste, & non pas blanche. Les plumes de la queue sont plus foncées en-dessous qu'en-dessus. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte d'un pouce que les deux du milieu. Le bec, les pieds & les ongles sont jaunes.

Secundum *Edwardum*, est in corpore superiore saturatè fusca, in inferiore fusco dilutiorè imbuta. Alarum remigum margines sunt reliquo remige nonnihil dilutiores, non autem candidæ. Caudæ rectrices magis subtus quàm superne saturatæ. Binæ intermediae lateralium longitudinem excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis unius pollicis longitudine cedentem. Rostrum, pedes, unguesque lutei.

#### 27. LE MOQUEUR.

*Turdus dorso fusco, pectore rectricibusque lateralibus albidis, alis fascia alba.* Orpheus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 8.*

#### 29. LE GRAND MOQUEUR.

*Turdus obscurè cinereus, subtus pallidè cinereus, macula alarum albidæ.* *Turdus polyglottos.* *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 7.*

#### 37. LE MERLE BLEU.

*Turdus cœruleus, remigibus rectricibusque nigris, abdomine lineolis cinereis undulato.* *Turdus solitarius.* *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 14.*

#### 40. LE MERLE CENDRÉ D'AMÉRIQUE.

*Turdus cœrulescens, gula atra.* *Turdus plumbeus.* *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 9.*

#### 49. LE MAINATE.

*Gracula nigro-violacea, macula alarum alba fascia occipitis nuda*



flava. Gracula religiosa. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 50. sp. 1.*

55. LE MERLE VERD DE LA CAROLINE.

*Turdus nigro-virens, subtus lutescens, supercilliis albis. Turdus virens. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 95. sp. 16.*

58. LE LORIOT.

*Coracias flava alis caudaque nigris. Oriolus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 49. sp. 3.*

Grive dorée, Icterus. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXXV ; avec une figure exacte Pl. 185.*

61. LE LORIOT DE BENGAL.

*Sturnus luteus, capite fusco, pectore maculato, alis fusco-luteis. Luteolus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 94. sp. 2.*

*Coracias flava, capite remigibusque primoribus nigris. Xanthornus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 49. sp. 6.*

Etourneau jaune des Indes. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXXVI ; avec une figure exacte Pl. 186.*

Quem novissimè descripsit *Edwardus*, idem est quem delineavit *Albinus Vol. II. Tab. 41.* Hæc est forsan hujus speciei *fœmina*. Ab illo solummodo discrepat gutture albedo, gutture scilicet, sicut & pectore, minutis maculis nigris vario ; & rectricibus binis intermediis ex fusco ad flavum inclinantibus, luteo terminatis.

Ce dernier d'*Edwards* est le même que celui qu'a figuré *Albin Tom. II. Pl. 41.* Ce pourroit bien être la *femelle* de cette espece. Il n'en diffère que parce qu'il a la gorge blanchâtre, variée, ainsi que la poitrine, de petites taches noires ; & en ce que les deux plumes du milieu de sa queue sont d'un brun tirant sur le jaune, & terminées de jaune.

63. LE JASEUR DE BOHEME.

*Lanius remigibus secundariis apice membranaceo colorato, cauda integra. Garrulus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 43. sp. 10.*

64. LE JASEUR DE LA CAROLINE.

*Lanius remigibus secundariis apice membranaceo colorato, cauda in-*



tegra. Garrulus Carolinensis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 43.  
sp. 10. var. 1.

\*\* 25. LE MERLE DE SURINAM.

Voyez Pl. III. Fig. 1.

Turdus splendidè niger ; vertice , maculâ utrinque in pectore , & uropygio fulvo-lutescentibus ; maculâ in alis superius candida ; remigibus nigricantibus , interiùs in exortu fulvo-lutescentibus ; rectricibus nigris . . . . MERULA SURINAMENSIS.

Il n'est pas plus gros qu'une Alouette. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long ; sa queue deux pouces onze lignes ; son pied sept lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , sept lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est d'un fauve-jaunâtre assez foncé. Tout le reste de la tête , la gorge , le col , le dos , les plumes scapulaires , la poitrine , le ven-

Crassitie Alaudam non antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas æquat , & ad extremos ungues quinque pollices cum linea unica. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo lineas longum est ; cauda duos pollices & undecim lineas ; pes septem cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem anticorum intimum longitudine æmulatur. Alis expansis , extremitates majorum remigum novem pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Vertex capitis est saturatè fulvo-lutescens. Reliquum caput , guttur ,



collum, dorsum, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crura, rectricesque caudæ superiores & inferiores nigro tinguntur splendido; attamen in utroque pectoris latere macula extat dilutè fulvo-lutescens. Uropygium fulvo-lutescente diluto quoque tingitur. Pennæ omnes alas subtus obtegentes sunt candidæ. Superiores alarum rectrices minimæ, istæ scilicet quæ alam ab ipsius exortu ad articulum carpo humano respondentem usque cooperiunt, eodem imbuuntur candido; unde fit in utraque ala macula concolor: reliquæ omnes sunt splendide nigræ. Remiges alarum nigricantes; omnes autem, binis primoribus & corpori finitimâ exceptis, sunt in exortu fulvo-lutescentes, sed interius tantum. Caudam componunt duodecim rectrices nigræ. Rostrum nigricans. Pedes, unguesque fusci. Habitat in Surina. Ex museo D. Aubry.

tre, les côtés, les jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un noir brillant; il y a cependant de chaque côté de la poitrine une tache d'un fauve-jaunâtre assez clair. Le croupion est de la même couleur. Toutes les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les plus petites du dessus, sçavoir celles qui sont depuis l'origine de l'aile jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, sont du même blanc; ce qui forme sur chaque aile une tache de cette couleur: toutes les autres sont d'un noir brillant. Les plumes de l'aile sont noirâtres; & toutes, excepté les deux premières & la plus proche du corps, sont d'un fauve-jaunâtre à leur origine du côté intérieur seulement. La queue est composée de douze plumes noires. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve à Surinam. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

\*\* 66. LE MERLE A TESTE NOIRE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Planche III. Fig. 2.

Turdus superne saturatè fuscus, infernè rufescens, lateribus lineolis transversis fuscis striatis; capite & collo superiore



splendidè nigris; uropygio rufo; maculâ in alis candidâ; rectricibus nigris, lateralibus apice albis . . . .  
MERULA ATRICAPILLA CAPITIS BONÆ SPEI.

Il est à peu près de la grosseur du *Merle de Madagascar*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces onze lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue trois pouces huit lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, douze lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a neuf pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un noir brillant. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un brun foncé. Le croupion est roux. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres; les côtés sont de plus

*Merulam Madagascariensem* crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices explet, & ad extremos ungues septem pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda tres pollices & octo lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem lateralium longitudinem paululum excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est novem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput & collum superius nigro splendido tinguntur. Dorsum & scapulares pennæ sunt saturatè fuscæ. Uropygium rufum. Superiores caudæ tectrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices rufescente tinguntur



guntur colore; latera lineolis transversis fuscis insuper striantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt quoque fusca, quibusdam rufescente marginatis. Superiores alarum rectrices omnes eodem imbuuntur fusco ac dorsum ipsum tingitur, majorum autem corpori viciniorum margines nonnihil ad rufescentem colorem vergunt. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, cooperiunt pennæ fusca, albido fimbriatæ. Alarum componunt novemdecim remiges, quarum binæ primores sunt fusca, attamen ad exortum candidæ, sed interiùs tantùm : septem proximè sequentes, à tertiâ scilicet ad nonam usque inclusivè, in exortu albæ, in extremitate fusca, albore eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior; unde fit in utraque ala complicata exigua macula concolor: decem corpori finitimæ penitus fusca, ad margines tamen nonnihil ad rufescentem colorem incli-nantes. Remix prima est breviuscula : quarta & quinta reliquas omnes longitudine excedunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ

*Suppl.*

rayés de petites lignes transversales brunes. Les couvertures du dessous des ailes sont de cette dernière couleur, quelques-unes étant bordées de roussâtre. Toutes celles du dessus sont du même brun que celui du dos, les bords des grandes les plus proches du corps tirant un peu sur le roussâtre. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de plumes brunes, & bordées de blanchâtre. L'aile est composée de dix-neuf plumes : les deux premières sont brunes, excepté leur origine qui est blanche, mais du côté intérieur seulement : les sept suivantes, sçavoir depuis la troisième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont blanches à leur origine, & brunes à leur extrémité, le blanc occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps ; ce qui forme sur chaque aile, lorsqu'elle est pliée, une petite taché de cette couleur : les dix plus proches du corps sont entièrement brunes, mais leurs bords tirent un peu sur le roussâtre. La première des plumes de l'aile est assez courte : la quatrième & la cinquième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes : les

G



capite , gutture & collo saturatè cinereis , pennis in gutture & collo inferiore albido marginatis ; pectore , uropygio & rectricibus splendidè rufis....MUSCICAPA CAYANENSIS RUFA.

Il est un peu plus gros que l'*Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de sept pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes & demie de long ; sa queue deux pouces dix lignes ; son pied onze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , onze lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a onze pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure & les côtés du col sont d'un cendré assez foncé , le milieu des plumes du dessus de la tête étant d'une couleur encore plus foncée , & cela selon la longueur de la tige. La gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plumes cendrées dans leur milieu , & blanchâtres sur leurs bords. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un roux

Crassitie *Alaudam cristatam* paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues septem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quindecim cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices & decem lineas ; pes undecim lineas ; trium digitorum anteriorum medius cum ungue undecim cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem lateraliùm longitudinem nonnihil excedit. Alis expansis , extremitates majorum remigum undecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput , collumque superius & ad latera sunt saturatè cinerea , mediis pennis caput superius vestientibus secundùm scapi longitudinem adhuc saturatioribus. Guttur & partem colli inferiorem cooperiunt pennæ in medio cinereæ , ad margines albidæ. Dorsum &



scapulares pennæ ex rufo fuscescunt. Uropygium, superiores caudæ tectrices, pectusque rufo splendido tinguntur. Ventrem, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennas alas subtus obtegentes tingit color rufus quidem, sed dilutior. Tectrices alarum superiores minimæ sunt dorso concolores : mediæ omnes, sicut & majores corpori finitimæ, fuscæ, rufo-fuscescente marginatæ & terminatæ : majores tandem à corpore remotiores penitus fuscæ. Remiges sunt simili fusco imbutæ, attamen in latere interiore maximâ parte dilutè rufæ ; rufo-fuscescente exteriorius insuper marginantur : quæ margo est in remigibus majoribus strictissima, & deinde eò majorem acquirit latitudinem, quò remix fit corpori vicinior ; ita ut binæ corpori finitimæ sint penitus, dorso instar, rufo-fuscescentes. Remix prior est breviuscula : quarta reliquarum omnium longitudinem excedit. Caudam componunt duodecim rectrices splendide rufæ. Mandibula superior nigricat ; inferior est grisea. Mandibulæ superioris basis pennis obsita est rigidis, an-

rembruni. Le croupion, les couvertures du dessus de la queue & la poitrine sont d'un roux brillant. Le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un roux plus clair. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos : toutes les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes, bordées & terminées de roux rembruni : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont entièrement brunes. Les plumes de l'aile sont pareillement brunes, excepté la plus grande partie de leur côté intérieur, qui est d'un roux clair ; elles sont de plus bordées extérieurement de roux rembruni : cette bordure est extrêmement étroite sur les grandes plumes, & elle s'élargit de plus en plus à mesure que la plume est plus proche du corps ; de sorte que les deux plus proches du corps sont entièrement d'un roux rembruni, comme celui du dos. La première plume de l'aile est assez courte : la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un roux brillant. Le demi-bec supérieur est noirâtre ; l'infé-



rieur est gris. La bête du demi-bec supérieur est garnie de plus roides & tournées en-devant, qui imitent assez bien des poils. Les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. On le trouve à Cayenne. Du cabinet de Madame de Bandeville.

trorsum versis, pilorum amul-  
lis. Pedes, unguesque griseo-  
fusci. Habitat in Cayana.  
Ex museo D. de Bandeville.

## ORDRE VI.

## SECTION II.

XXVI. Le Genre de l'Etourneau.

## ORDO VI.

## SECTIO II.

XXVI. Genus Sturni.

## I. L'ETOURNEAU.

*Sturnus* rostro flavescente, corpore nigro punctis albis. *Sturnus* vulgaris. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 94. sp. 1.*

## 2. L'ETOURNEAU DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

*Sturnus*, macula oculari fascia alari abdomineque albis. Contra. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 94. sp. 3.*

Etourneau noir & blanc des Indes. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXXVII; avec une figure exacte. Pl. 187.*

Je crois, comme le dit *Edwards*, que cette espece est la même que celle qu'*Albin* a décrite & figurée *Tom. III. Pl. 21*, & que j'ai appelée *Tropicale de Bengale*. La description & la figure qu'*Albin* en a donné, sont si imparfaites, que je n'ai pu la reconnoître.

Puto, ut rectè *Edwards*, hanc speciem eandem esse cum illa quam descripsit, & cujus iconem dedit *Albinus Vol. III. Tab. 21*, quamque *Ideri Pengalensis* nomine donavi. Illius speciei *Albini* descriptio & icon ita sunt imperfectæ, ut eam noscere nequiverim.





de Bonne Espérance ..

3. Gobe-mouche roux de Cayenne.









Designé et Gravé par Martinet.

1. Merle de Surinam.

2. Merle à tête noire du Cap de Bonne Espérance..

3. Gobe-mouche roux de Cayenne.







## ORDO VII.

## ORDRE VII.

## SECTIO I.

## SECTION I.

XXVII. Genus *Upupa*.

XXVII. Le Genre de la Hupe.

## 1. LA HUPE OU PUPUT.

*Upupa cristata variegata*. Epops. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 58. sp. 1.*

## SECTIO II.

## SECTION II.

XXVIII. Genus *Promeropsis*.

XXVIII. Le genre du Promerops.

## 3. LE PROMÉROPS HUPÉ DES INDES.

*Upupa rectricibus duabus longissimis*. *Upupa paradisea*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 58. sp. 2.*

## ORDO VIII.

## ORDRE VIII.

XXIX. Genus *Caprimulgi*.

XXIX. Le genre du Tette-chèvre.

## 1. LE TETTE-CHÈVRE OU CRAPAUD-VOLANT.

*Caprimulgus narium tubis obsoletis*. *Caprimulgus Europæus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 102. sp. 1.*

## 3. LE TETTE-CHÈVRE DE VIRGINIE.

*Caprimulgus narium tubis obsoletis*. *Caprimulgus minor Americanus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 102. sp. 1. var. 1.*

## 4. LE TETTE-CHÈVRE DE LA JAMAÏQUE.

*Caprimulgus narium tubulis eminentibus*. *Caprimulgus Americanus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 102. sp. 2.*

XXX. Genus *Hirundinis*.

XXX. Le genre de l'Hirondelle.

## 1. L'HIRONDELLE DE CHEMINÉE.

*Hirundo rectricibus*, exceptis duabus intermediis, macula alba no-



ratis. *Hirundo rustica*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 101. sp. 1.*

2. LA PETITE HIRONDELLE OU LE MARTINET A CUL BLANC.

*Hirundo rectricibus immaculatis, dorso nigro-cœrulescente. Hirundo urbica*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 101. sp. 3.*

9. L'HIRONDELLE DE LA CAROLINE.

*Hirundo rectricibus æqualibus apice subulatis, nudis. Hirundo pelagica*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 101. sp. 7.*

11. LA GRANDE HIRONDELLE D'ESPAGNE.

*Hirundo fusca, gula abdomineque albis. Melba*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 101. sp. 8.*

12. L'HIRONDELLE DE RIVAGE.

*Hirundo cinerea, gula abdomineque albis. Hirundo riparia*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 101. sp. 4.*

14. L'HIRONDELLE DE RIVAGE DE LA COCHINCHINE.

*Hirundo rectricibus omnibus macula alba notatis. Hirundo esculenta*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 101. sp. 2.*

15. LE MARTINET.

*Hirundo nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis. Apus*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 101. sp. 5.*

18. L'HIRONDELLE DE LA BAYE DE HUDSON.

*Hirundo superne nigro-purpurascens, infernè alba, fusco adumbrata; plumulis basim rostri ambientibus albidis; collo inferiore & pectore saturatè griseis; rectricibus superne nigricantibus, fuscescente marginatis, infernè obscurè cinereis . . . .* HIRUNDO Freti HUDSONIS.

*Hirundo nigro-cœrulescens, ore subtusque cinereo-exalbida. Subis*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 101. sp. 6.*

Grand



Grand Martin de l'Amérique. *Edwards. Tom. III. pag. CXX; avec une figure exacte Pl. 120.*

*Les Habitans de l'Amérique Septentrionale l'appellent SASHAUN PASHU. Edwards.*

*Hirundinem apodem* paululum crassitie superat; sed alis non æquè longis prædita est. Rostro, pedibusque donatur magis quàm cæteræ hujus generis species crassis & validis. Mandibulæ superioris apex est ad margines utrinque nonnihil emarginatus. Basim rostri circumdant plumulæ albidæ. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ rectrices sunt splendide nigro-purpurascens. Guttur, collum inferius & pectus saturatè grisea. Venter, crura, & rectrices caudæ inferiores albescentes, & fusco adumbrantur. Latera fuscescunt. Margines alarum sunt candicantes. Remiges omnes subtus obscurè cinereæ; superne verò majores nigricantes, & fuscescente fimbriatæ: minores splendide nigro-purpurascens. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus majoribus concolores. Binæ intermediæ reliquis omnibus longitudine cedunt; laterales verò sensim atque

*Suppl.*

Elle est un peu plus grosse que le *Martinet*; mais ses ailes ne sont pas si longues. Son bec & ses pieds sont plus gros & plus forts que dans les autres espèces de ce genre. Les bords de la mandibule supérieure sont un peu échancrés de chaque côté vers le bout. La base du bec est entourée de petites plumes blanchâtres. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un noir-pourpre brillant. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris foncé. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc nuancé de brun. Les côtés sont brunâtres. Les bords des ailes sont blanchâtres. Toutes les plumes de l'aile sont en-dessous d'un cendré obscur; mais en-dessus les grandes sont noirâtres, & bordées de brunâtre: les moyennes sont d'un noir-pourpre brillant. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les grandes plumes de l'aile. Les deux

H



du milieu sont les plus courtes : toutes les latérales vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus longue ; ce qui rend la queue un peu fourchue. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve à la *Baye de Hudson*.

sensim majorem acquirunt longitudinem ad utrinque extremam usque longiorem ; unde fit cauda paululum bifurca. Rostrum, pedes, unguesque nigricant. Habitat in *Freto Hudsonis*.

## ORDRE IX.

## ORDO IX.

## SECTION I.

## SECTIO I.

XXXI. *Le genre du Tangara.*XXXI. *Genus Tangara.*

## 11. LE TANGARA VERD PIQUETÉ DES INDES.

Mélange verte tachetée. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 110. chap. LII ; avec une figure exacte Pl. 262.*

*Les Anglois l'appellent SPOTTED GREEN TIT-MOUSE. Edwards.*

Selon *Edwards*, on le trouve à *Surinam*.

Secundùm *Edwardum*, habitat in *Surina*.

## 13. LE TANGARA VERD DU PÉROU.

*Fringilla viridis, capite rubro, collari flavo, pectore cœruleo. Gyrola. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 12.*

## 16. LE TANGARA NOIR DU BRÉSIL.

*Jacarini. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 202. chap. XCVI ; avec une figure passable Pl. 306. fig. 2.*

*Les Portugais l'appellent NEGRETTO. Edwards.*

*Les Anglois, JACARINI. Edwards.*

## 18. LE TANGARA NOIR ET JAUNE DU BRÉSIL.

*Fringilla violacea, fronte subrufesque flavissima. Fringilla violacea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 25.*



Mélangé dorée. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 112. chap. LIII ; avec une figure exacte Pl. 263.*

*Les Anglois l'appellent GOLDEN TIT-MOUSE. Edwards.*

29. LE CARDINAL POURPRÉ.

Merle à gorge rouge. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 120. chap. LVII ; avec une figure exacte Pl. 267.*

*Les Anglois l'appellent RED-BREADED BLACK-BIRD. Edwards.*

30. LE CARDINAL BRUN.

*Emberiza fusca , pectore gula humerisque sanguineis. Emberiza militaris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 7.*

\*\* 31. LE TANGARA VARIÉ A TESTE VERTE DE CAYENNE.

*Voyez Pl. IV. Fig. 1.*

Tangara viridi-lutescens ; plumulis basim rostri ambientibus , dorso supremo & gutture infimo splendide nigris ; capite viridi-beryllino ; collo superiore viridi , ad aureum colorem vergente ; collo inferiore & pectore cœruleo-beryllinis ; dorso infimo & uropygio luteo-aurantiis ; rectricibus quatuor intermediis nigro-virescentibus , quatuor utrinque extimis nigris , omnibus exterius dilute viridi marginatis , binis intermediis maculâ cœruleo-violaceâ exterius versùs apicem notatis . . . . TANGARA CAYANENSIS VARIA CHLOROCEPHALOS.

Cum *Passere domestico* crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues quatuor pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex lineas longum est ;

Il est à peu près de la grosseur du *Moineau franc*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long ; sa queue un pouce



onze lignes ; son pied sept lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , sept lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a sept pouces dix lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au - delà de la moitié de la longueur de la queue. La b  se du bec est entour  e de petites plumes d'un noir de velours. La t  te est d'un verd-d'Aigue-marine brillant. La gorge est de la m  me couleur dans sa partie sup  rieure ; mais sa partie inf  rieure est d'un noir de velours. La partie sup  rieure & les c  t  s du col sont d'un verd tirant sur la couleur d'or. La partie sup  rieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un noir de velours. La partie inf  rieure du dos & le croupion sont d'un jaune tirant sur l'orang  . Le dessous du col & la poitrine sont d'un bleu - d'Aigue - marine : cette couleur est s  par  e du noir de la gorge par un peu de bleu-violet. Le ventre , les c  t  s , les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un verd brillant , tirant sur le jaune. Les couvertures du dessous des ailes sont cen-

cauda unum pollicem cum undecim lineis ; pes septem cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas : laterales paul   sunt breviores ; posticus autem laterali   longitudinem paulul  m excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pollicum & decem linearum ; al  e ver   complicat  e nonnihil ultra mediam caud   longitudinem extenduntur. Basim rostri ambiunt plumul  e nigr  e , holoserici villosi instar , splendentes. Caput est splendide viridi-beryllinum. Guttur in parte suprema eodem colore tingitur ; in parte ver   infima nigro imbuitur , holoserici villosi instar , splendens. Collum superius & ad latera ex viridi ad aureum colorem vergit. Dorsi suprema pars & scapulares penn  e sunt nigr  e , holoserici villosi instar , splendentes. Dorsum infimum & uropygium ex luteo ad aurantium inclinant. Collum inferius & pectus sunt c  eruleo - beryllina : quem colorem    nigro guttur tingente distinguit color c  eruleo-violaceus. Venter , latera , crura , tectricesque caud  e superiores & inferiores



*Sunt splendide viridi-lutescentes. Pennæ alas subtus cooperientes cinereæ. Superiores alarum rectrices minimæ & mediæ cœruleo-violaceæ : majores corpori viciniores in latere interiore nigre, in exteriore verò virides, versùs ipsarum extremitatem paucò cœruleo-violaceo mixtæ : majores à corpore remotiores nigre, exterius viridi fimbriatæ. Omnes alarum remiges sunt subtus saturatè cinereæ; superne verò nigre; marginibus exterioribus majorum viridibus, marginibus autem exterioribus minorum ex viridi nonnihil ad luteum inclinantibus: margines autem istæ eò majorem acquirunt latitudinem, quò remix sit corpori vicinior. Caudam componunt duodecim rectrices subtus cinereo-cœrulescentes, & scapo candicante præditæ; superne verò binæ intermediae sunt obscurè nigro-virescentes, diluto & splendido viridi exterius marginatæ, & minutâ maculâ cœruleo-violaceâ, ad marginem exteriorem versùs ipsarum extremitatem positâ, notatæ: utrinque proximè sequens ex nigro ad viride obscurum vergens, diluto similiter &*

*drées. Les petites & les moyennes du dessus sont d'un bleu-violet: les grandes les plus proches du corps sont noires du côté intérieur; mais du côté extérieur elles sont vertes, & mêlées d'un peu de bleu-violet vers leur extrémité: les grandes les plus éloignées du corps sont noires, & bordées extérieurement de verd. Toutes les plumes de l'aile sont en-dessous d'un cendré foncé; mais en-dessus elles sont noires, les grandes étant bordées extérieurement de verd, & les moyennes bordées extérieurement d'un verd tirant un peu sur le jaune: cette bordure est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps. La queue est composée de douze plumes, qui en-dessous sont d'un cendré-bleu, & ont leur tige blanchâtre; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un noir-verd obscur, bordées extérieurement de verd clair & brillant, & marquées d'une petite tache de bleu-violet, placée sur le bord extérieur vers leur extrémité: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est d'un noir tirant sur le verd obscur, & bordée de même extérieurement de verd clair & brillant: les quatre plus extérieures de chaque côté sont noires, & bordées extérieurement*



ment comme les précédentes. La queue est un peu fourchue. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont de couleur de plomb. On le trouve à *Cayenne*. Du cabinet de *Madame de Boisjourdain*.

splendido viridi exterius fimbriata : quatuor utrinque extimæ nigræ , præcedentium instar , exterius marginatæ. Cauda est nonnihil bifurca. Rostrum nigrum. Pedes ; unguisque plumbeo colore tincti. Habitat in *Cayana*. Ex museo *D. de Boisjourdain*.

\*\* 32. LE TANGARA VARIÉ A TESTE BLEUE DE CAYENNE.

*Voyez Pl. IV. Fig. 2.*

Tangara dilutè viridis ; plumulis basim rostri ambientibus & dorso supremo splendide nigris ; syncipite viridi-beryllino ; capite superiore & gutture cœruleo - violaceis ; genis & collo superiore rubro - aurantiis ; tæniâ transversâ in alis aurantiâ ; rectricibus quatuor intermediis obscurè viridibus , quatuor utrinque extimis nigris , omnibus exterius dilutè viridi marginatis . . . . . TANGARA CAYANENSIS VARIA CYANOCEPHALOS.

Il est de la même grosseur que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long ; sa queue un pouce onze lignes ; son pied huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , sept lignes : les latéraux sont un peu plus courts ;

Crassitie præcedentem æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quinque pollices & tres lineas æquat , & ad extremos unguës quatuor pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex lineas longum est ; cauda unum pollicem cum undecim lineis ; pes octo lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas : laterales paulo sunt brevior-



res ; posticus autem lateraliū longitudinem paululū excedit. Alis expansis , extremitates majorum remigum septem pollicum & decem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Basim rostri circumdant plumulæ nigræ , holoserici villosi instar , splendentes. Synciput tingit color viridi-beryllinus splendidissimus. Caput superius est splendide cœruleo - violaceum : quælibet tamen penna est in medio nigra , ad latera splendide viridis , cœruleo - violaceo terminata ; ita tamen ut , dum pennæ aliæ aliis incumbunt , cœruleo - violaceus color ferè solus sit conspicuus. Caput ad latera sive genæ , collumque superius & ad latera ex rubro nonnihil ad aurantium inclinant. Dorsi suprema pars est nigra , holoserici villosi instar , splendens. Pennæ scapulares concolores , majoribus tamen pauco viridi variegatis. Guttur cœruleo-violaceum ; qui color , versùs imam partem procedendo , gradatim cœruleo-beryllino colore variat. Pars colli inferior , pectus , venter , late-

& celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a sept pouces dix lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La bāse du bec est entourée de petites plumes d'un noir de velours. Le synciput est d'un verd-d'Aigue-marine très-brillant. Le dessus de la tête est d'un bleu-violet éclatant : chaque plume est cependant noire dans son milieu , d'un verd brillant sur les côtés , & terminée de bleu-violet ; mais de façon que cette dernière couleur est presque la seule qui paroisse , lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. Les côtés de la tête ou les joues , la partie supérieure & les côtés du col sont d'un rouge tirant un peu sur l'orangé. La partie supérieure du dos est d'un noir de velours. Les plumes scapulaires sont de la même couleur : mais les plus grandes sont variées d'un peu de verd. La gorge est d'un bleu-violet , qui , en descendant , se change par degrés en bleu-d'Aigue-marine. La partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , la partie inférieure du dos , le croupion & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un verd clair



& brillant. Les jambes sont d'un fauve clair, excepté sur le côté extérieur, où elles sont d'un verd-jaune. Le bord de l'aile est du même verd que le dessous du corps. Les couvertures du dessous des ailes sont blanchâtres. Les petites & les moyennes du dessus sont d'un noir de velours; mais celle du dernier rang des moyennes sont terminées d'orangé; ce qui forme sur chaque aile une bande transversale de cette couleur: les grandes sont du côté extérieur d'un verd tirant un peu sur le jaune, & d'un noir de velours du côté intérieur. Les plumes de l'aile, ainsi que celles de l'aile bâtarde, sont en-dessous d'un cendré-foncé; mais en-dessus elles sont noires, & bordées extérieurement d'un verd tirant un peu sur le jaune: cette bordure est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps. La queue est composée de douze plumes, qui sont en-dessous d'un cendré-bleu, & ont leur tige blanchâtre; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un verd obscur, bordées extérieurement de verd clair & brillant: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est d'un noir tirant sur le verd obscur, & bordée de même extérieurement

ra, dorsum infimum; uropygium, tectricesque caudæ superiores & inferiores sunt dilutè quidem, sed splendè, virides. Crura dilutè fulva, attamen in latere exteriori viridi-lutea. Alarum margines eodem imbutæ viridi ac corpus inferius ipsum tingitur. Pennæ alas subtus obtegentes albidæ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ nigræ, holoserici villosi instar, splendentes; mediarum autem ultima series aurantio terminatur; unde fit in utraque ala tænia transversa concolor: majores sunt in latere exteriori ex viridi nonnihil ad luteum vergentes, in interiori nigræ, holoserici villosi instar, splendentes. Alarum remiges, sicut & alæ nothæ pennæ, subtus saturatè cinereæ; superne verò nigræ, exterius viridi-lutescente marginatæ: quæ margo eò majorem acquirit latitudinem, quò remix fit corpori vicinior. Caudam componunt duodecim rectrices subtus cinereo-cœrulescentes, & scapo albido præditæ; superne verò binæ intermediæ sunt obscurè virides, diluto & splendido viridi exterius marginatæ: utrinque proximè sequens ex nigro



gro ad viride obscurum vergens, diluto similiter & splendido viridi exteriùs fimbriata: quatuor utrinque extimæ nigrae, præcedentium instar, exteriùs marginatæ. Cauda est nonnihil bifurca. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque plumbeo colore imbuti. Habitat in Cayana. Ex museo D. de Boisjournain.

de verd clair & brillant : les quatre plus extérieures de chaque côté sont noires, & bordées extérieurement comme les précédentes. La queue est un peu fourchue. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont de couleur de plomb. On le trouve à Cayenne. Du cabinet de Madame de Boisjournain.

\*\* 33. LE TANGARA NOIR HUPÉ DE CAYENNE.

Voyez Pl. IV. Fig. 3.

Tangara cristata, nigricans; cristâ aurantiâ; pennis basim rostri ambientibus nigris; gutture, dorso infimo & uropygio dilutè fulvis; maculâ in alis candidâ; rectricibus nigricantibus.... TANGARA CAYANENSIS NIGRA CRISTATA.

Cum *Passere domestico* crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices, & tres lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices cum linea unica. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices cum novem lineis; pes octo cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas: laterales paulo sunt breviores; post-

Suppl.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Moineau franc*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes & demie de long; sa queue deux pouces neuf lignes; son pied huit lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même



longueur que ces derniers. Il a huit pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La b  se du bec est entour  e de plumes noires. Celles qui couvrent le dessus de la t  te, sont longues &   troites, d'un orang   vif, & forment une jolie huppe. Le reste de la t  te, le col, la partie sup  rieure du dos, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les c  t  s, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont noir  tres. La gorge, la partie inf  rieure du dos, le croupion & les petites couvertures du dessus de la queue sont d'un fauve clair. Les grandes couvertures du dessus de la queue sont noir  tres. Toutes les couvertures du dessous des a  les sont blanches. Les plus petites du dessus des a  les, savoir celles qui sont plac  es depuis le pli qui r  pond    celui du coude jusqu'au pli qui r  pond    celui du poignet, sont pareillement blanches; ce qui forme sur chaque a  le une petite tache de cette couleur: toutes les autres sont noir  tres. Les plumes de l'a  le sont de cette derniere couleur, & bord  es int  rieurement de blanc: cette bordure est fort   troite

cus autem lateralium longitudinem ad  quat. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum & totidem linearum intervallo distant; al   ver   complicat   nonnihil ultra tertiam longitudinis caud   partem extenduntur. Basim rostri circumdant penn   nigr  . Qu   caput superius obtegunt, sunt longiuscul  , strict  , vividissim   auranti  , elegantemque cristam efficiunt. Reliquum caput, collum, dorsi suprema pars, penn   scapulares, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caud   te  trices nigricant. Guttur, dorsum infimum, uropigium, te  tricesque caud   superiores minores sunt dilute fulv  . Superiores caud   te  trices majores nigricantes. Penn   omnes alas subtus obtegentes, sunt candid  . Superiores alarum te  trices minim  , ist   scilicet qu   ab articulo cubito humano respondente ad articulum carpo humano respondentem posit   sunt, similiter candid  ; unde fit in utraque ala minuta macula concolor: reliqu   omnes nigricantes. Alarum remiges pariter nigricant, & albo interi  s marginantur: qu   margo in



remigibus primoribus est strictissima, & deinde eò majorem acquirit latitudinem, quo remix fit corpori vicinior. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda confatur. Rostrum nigrum: mandibulæ superioris margines versùs mediam illius longitudinem sunt angulosæ. Pedes, unguesque nigricant. Habitat in Cayana. Ex musæo D. de Bandeville.

sur les premières plumes, & devient ensuite d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le bec est noir : les bords du demi - bec supérieur sont anguleux vers le milieu de sa longueur. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à Cayenne. Du cabinet de Madame de Bandeville.

\*\* 34. LE CARDINAL D'AMÉRIQUE.

Voyez Pl. IV. Fig. 4.

Tangara superne splendide nigra, inferne nivea; capite & gutture supremo coccineis, gutture infimo obscure purpurascente; rectricibus nigricantibus . . . . CARDINALIS AMERICANUS.

*Cardinali Dominicano* crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem lineas longum est; cauda duos pollices cum septem lineis; pes novem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales paulò sunt

Il n'est pas si gros que le *Cardinal Dominiquain*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue deux pouces sept lignes; son pied neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts:



& celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces trois lignes de vol ; & les aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête & la gorge dans sa partie supérieure sont d'un rouge très-vif : la partie inférieure de la gorge est d'un pourpre obscur. L'occiput, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir brillant. La partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un blanc de neige. Les petites couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que le dos : les grandes sont d'un noirâtre brillant. L'aîle est composée de dix-huit plumes : les quatre premières sont brunes : les six suivantes, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la dixième inclusivement, sont d'un noirâtre brillant : les quatre qui suivent ces dernières, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont brunes : les quatre plus proches du corps sont d'un noirâtre

breviores ; posticus autem anticorum extimi longitudinem æquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum novem pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput & guttur supremum tingit color vividissimè coccineus : guttur infimum obscurè purpureascit. Occipitium, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt splendidè nigræ. Collum inferius & ad latera, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes niveo candore nitent. Superiores alarum tectrices minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores splendidè nigricant. Alam componunt octodecim remiges : quatuor primores sunt fuscæ : sex proximè sequentes, à quinta scilicet ad decimam usque inclusivè, splendidè nigricantes : quatuor quæ novissimas istas proximè sequuntur, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, fuscæ : quatuor corpori



finitimæ splendide nigricantes : omnes autem remiges sunt infuper versùs ipsarum exortum candicantes , sed in latere interiore tantùm. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda constat. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Mandibula superior fusca ; inferior albida , exceptâ extremitate fuscâ. Pedes , unguesque grisei. Habitat in America. Ex museo D. Mauduyt.

brillant : de plus toutes les plumes de l'aîle sont blanchâtres vers leur origine & du côté intérieur seulement. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le demi-béc supérieur est brun ; l'inférieur est blanchâtre, excepté son extrémité, qui est brune. Les pieds & les ongles sont gris. On le trouve en Amérique. Du cabinet de M. Mauduyt.

XXXII. Genus Carduelis.

XXXII. Le genre du Chardonneret.

### 1. LE CHARDONNERET.

Fringilla remigibus antrorsum luteis : extima immaculata , rectricibus duabus extimis medio reliquisque apice albis. Carduelis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 9.

### 2. LE CHARDONNERET DE SUÉDE.

Fringilla fusca , pectore humerisque rufis , alis nigris macula rufa. Fringilla Lulensis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 4.

### 3. LE CHARDONNERET D'AMÉRIQUE.

Fringilla flava , fronte nigra , alis fuscis. Fringilla tristis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 14.

Chardonneret Amériquin. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 133. chap.

LXIV ; avec des figures exactes du mâle & de la femelle Pl. 274.

Les Anglois l'appellent AMERICAN GOLD-FINCH. Edwards.



## 4. LE TARIN.

*Fringilla remigibus medio luteis : primis quatuor immaculatis , re-  
trixibus basi flavis apice nigris. Spinus. Linn. Systh. Nat. ed. 10.  
Gen. 98. sp. 19.*

## 7. LE CHARDONNET VERD.

*Carduelis superne viridi-flavicans , infernè alba , fusco trans-  
versim striata ; capite anteriore & gutture coccineis ; pec-  
tore viridi-olivaceo ; reatricibus superne coccineis , subtus  
• cinereis . . . . CARDUELIS VIRIDIS.*

*Fringilla facie caudaque rubris . abdomine albo nigroque undato ; dorso  
viridi. Melba. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 10.*

*Chardonneret verd. Edwards. Tom. III. pag. CXLVIII ; avec une figure  
peu exacte Pl. 128.*

*Edwards. Glanur. Part. II. pag. 130. chap. LXII ; avec une figure  
exacte Pl. 272.*


*Les Portugais l'appellent MARACAXAO. Edwards.*

*Les Anglois , GREEN GOLD-FINCH. Edwards.*

Il est à peu près de la gros-  
seur de notre *Chardonneret*. La  
partie antérieure de la tête &  
la gorge sont d'un rouge vif.  
De chaque côté de la tête ,  
entre le bec & l'œil , est un  
petit espace dégarni de plu-  
mes , & couvert seulement  
d'une peau d'un cendré-bleuâtre.  
La partie postérieure de la  
tête , le col , le dos , le crou-  
pion & les plumes scapulaires  
sont d'un verd - jaunâtre. Les  
couvertures du dessus de la  
queue sont d'un rouge vif. La  
poitrine est d'un verd - d'olive.  
Le ventre , les côtés , les jam-  
bes & les couvertures du des-

*Cum Carduele nostrati craf-  
sitie circiter convenit. Ca-  
put anterius & guttur sunt  
vividè coccinea. In utroque  
capitis latere , rostrum inter  
& oculum , parvum ex-  
tat spatium plumis denuda-  
tum , & cute solummodo  
cinereo - cœrulescente coo-  
pertum. Capitis posterior  
pars , collum , dorsum , uro-  
pygium & pennæ scapulares  
ex viridi flavicant. Supe-  
riores caudæ rectrices sunt  
splendidè coccinæ. Pectus  
tingit color viridi-olivaceus.  
Venter , latera , crura &  
pennæ alas subtus obregen-*






3. *Tangara noir hupé de Cayenne*.  
4. *Cardinal brun d'Amérique*.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. *Tangara varié à tête verte de Cayenne.*
2. *Tangara varié à tête bleue de Cayenne.*

3. *Tangara noir hupé de Cayenne.*
4. *Cardinal brun d'Amérique.*







tes albicant, & fusco transversim striantur. Superiores alarum rectrices sunt viridiflavicantes, rubro adumbratæ: quæ rubri tinctura in rectricibus minoribus magis est conspicua quàm in majoribus. Remiges majores sunt nigricantes: minores viridiflavicantes, exterius rubro fimbriatæ. Caudam component duodecim rectrices superne vividè coccineæ, subtus cinereæ. Rostrum ex carneo colore rubescit. Pedes, unguesque sunt grisei. In qua regione habitat prorsus ignoro.

sous de la queue sont d'un blanc rayé transversalement de brun. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un verd-jaunâtre, nuancé de rouge: cette nuance est plus forte sur les petites couvertures que sur les grandes. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres: les moyennes sont d'un verd-jaunâtre, & bordées extérieurement de rouge. La queue est composée de douze plumes d'un rouge vif en-dessus, & cendrées en dessous. Le bec est d'un couleur de chair rougeâtre. Les pieds & les ongles sont gris. Je ne sçais en quel pays on le trouve.

XXXIII. Genus *Passerinum*.

XXXIII. Le genre du Moineau.

### 1. LE MOINEAU FRANÇOIS.

*Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria. Fringilla domestica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 27.*

### 2. LE MOINEAU DE MONTAGNE.

*Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina. Fringilla montana. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 28.*

Moineau de montagne. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 124. chap. LIX; avec des figures exactes du mâle & de la femelle Pl. 269.*

*Les Anglois l'appellent MOUNTAIN SPARROW. Edwards.*

### III. LE MOINEAU DE BENGAL.

*Loxia grisea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fuscomaculato. Loxia Benghalensis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 23.*



Moineau des Indes à tête jaune. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXXIX; avec une figure exacte Pl. 189.*

## 12. LE MOINEAU DU MEXIQUE.

*Loxia grisea*, fronte gula uropygio superciliisque luteis. *Loxia Mexicana. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 19.*

## 14. LE MOINEAU DE VIRGINIE.

*Linotte brune. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 126. chap. LX; avec une figure exacte Pl. 270.*

*Les Anglois l'appellent DUSKY LINNET. Edwards.*

## 17. LE PETIT MOINEAU DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

*Emberiza capite pectoreque atro, abdomine albo, alis rubris. Alario. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 14.*

## 19. LE MOINEAU A BEC ROUGE DU SÉNÉGAL.

*Moineau du Brésil. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 128. chap. LXI; avec une figure exacte Pl. 271.*

*Les Anglois l'appellent BRASILIAN SPARROW. Edwards.*

## 21. LE CARDINAL DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

*Emberiza grisea*, fronte abdomineque nigris, collo uropygioque fulvis, rostro nigro. *Orix. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 5.*  
*Grenadier. Edwards. Tom. IV. pag. CLXXVIII; avec une figure exacte Pl. 178.*

## 22. LE CARDINAL DOMINQUAIN.

*Loxia nigra*, capite gulaque coccineis, pectore abdomine remigumque margine albis. *Dominicana. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 6.*

*Dominicain Cardinal. Edwards. Tom. III. pag. CXXVII; avec une figure exacte Pl. 127.*

## 25. LA VEUVE.

*Emberiza fusca*, pectore rubro, rectricibus duabus longioribus acuminatis, intermedium duabus longissimis. *Emberiza paradisea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 12.*



## 30. LA GRANDE LINOTTE DE VIGNES.

*Fringilla remigibus primoribus rectricibusque nigris utroque margine albis. Fringilla cannabina. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 22.*

## 31. LA PETITE LINOTTE DE VIGNES.

*Fringilla remigibus rectricibusque fuscis margine obsoletè pallido, litura alarum albida. Linaria. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 23.*

## 35 LA LINOTTE A LONGUE QUEUE DU BRÉSIL.

*Emberiza cinereo-fusca, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis. Emberiza Psittacea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 11.*

## 36. LE PINÇON.

*Fringilla artubus nigris, remigibus utrinque albis : tribus primis immaculatis, rectricibus duabus obliquè albis. Fringilla cœlebs. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 2.*

## 36. A. LE PINÇON A AISLES ET QUEUE NOIRES.

*Fringilla artubus remigibus rectricibusque nigris : duabus utrinque extimis à medio extrorsum albis. Fringilla sylvatica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 6.*

## 36. B. LE PINÇON BRUN.

*Fringilla fusca, rostro flavicante. Fringilla flavirostris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 21.*

## 36. E. LE PINÇON HUPÉ.

*Fringilla fusca, crista flammea. Fringilla flammea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 20.*

## 37. LE PINÇON D'ARDENNES.

*Fringilla alarum basi subtus flavissima. Montifringilla. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 3.*  
*Suppl.* K



## 38. LE PINÇON DE MONTAGNE.

*Fringilla capite nigricante maculato : macula ponè oculos alba. Fringilla Lapponica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 5.*

## 40. LE PETIT PINÇON ROUGE.

*Loxia fusca subtus rubra. Loxia bicolor. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 32.*

## 43. LE PINÇON DE BAHAMA.

*Fringilla capite nigro fascia alba alarum supra infraque oculos, pectore fulvo. Zena. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 15.*

## 44. LE PINÇON DE LA CAROLINE.

*Fringilla nigra rubro relucens, abdomine rufescente, macula alarum alba. Fringilla erythrophthalma. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 8.*

## 52. LE SERIN DES CANARIES.

*Fringilla rostro corporeque albicante, rectricibus remigibusque virentibus. Canaria. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 18.*

## 54. LE VERDIER.

*Loxia flavicanti-virens, remigibus primoribus anticè luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis. Chioris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 20.*

## 55. LE VERDIER DES INDES.

*Fringilla virens, superciliis pectore abdomineque flavis, remigibus primoribus margine exteriori albis. Fringilla butyracea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 17.*

## 58. LE VERDIER DE LA LOUISIANE OU LE PAPE.

*Emberiza capite cœruleo, abdomine fulvo, dorso viridi, pennis viridi-fuscis. Ciris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 13.*  
*Oiseau peint. Edwards. Tom. III. pag. CXXX ; avec deux figures assez exactes. Pl. 130. (L'une de ces figures est d'un Oiseau du moyen âge).*



Pinçon peint. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 132. chap. LXIII; avec des figures pas trop exactes du mâle & de la femelle Pl. 273.*

*Les Espagnols l'appellent MARIPOSA PINTADA. Edwards.*

*Les Anglois, PAINTED FINCH. Edwards.*

*On l'appelle à Londres NONPAREIL ou MARIPOSA. Edwards.*

Primo ætatis anno hæc Avis in universo corpore fusca est. In secundo ætatis anno caput habet vividè cœruleum, & reliquum corpus cœruleo-viridescens: alarum tamen remiges & caudæ rectrices sunt subtus cinereæ, superne fuscæ, cœruleo-viridescente fimbriatæ. Tertio tandem ætatis anno talis est qualem eam descripsimus *Vol. III. Pag. 200.*

*Fœmina* formâ & magnitudine cum *mare* convenit; sed ab illo coloribus discrepat. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ rectrices ex viridi ad cœruleum vergunt. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices ex viridi ad luteum inclinant. Alarum remiges & caudæ rectrices eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur.

Cet Oiseau est tout brun la première année. Dans la seconde année il est d'un bleu vif sur la tête, & d'un bleu-verdâtre sur le reste du corps, ayant cependant les plumes de l'aîle & celles de la queue cendrées en - dessous, brunes & bordées de bleu-verdâtre en - dessus. Enfin la troisième année il est tel que nous l'avons décrit *Tom. III. pag. 200.*

La *femelle* ressemble au *mâle* par sa forme & sa grandeur; mais elle en diffère par ses couleurs. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un verd tirant sur le bleu. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd tirant sur le jaune. Les plumes de l'aîle & celles de la queue sont de la même couleur que le dos.



## 59. LE VERDIER DE BAHAMA:

*Fringilla capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque obscure virefcentibus.* Zena. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 31.*

## 60. LE BENGALI.

*Fringilla dorso fusco, abdomine caudaque cœruleis.* *Fringilla Angolensis.* *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 24.*

Pinçon au ventre bleu. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXI; avec une figure pas assez exacte Pl. 131.*

## 62. LE BENGALI PIQUETÉ.

*Fringilla rectricibus purpureis medietate postica atris.* *Amandava.* *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 11.*

## 64. LE SÉNÉGALI RAYÉ.

*Loxia grisea fusco-undulata, rostro temporibus pectoreque coccineis.* *Astrild.* *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 16.*

Bec de cire. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXIX; avec une figure assez exacte Pl. 179.*

## 65. LE MAIA DE LA CHINE.

Gros-bec de Malacca. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 202. chap. XCVI; avec une figure exacte Pl. 306. fig. 1.*

*Les Anglois l'appellent MALACCA GROS-BEAK.* *Edwards.*

## 67. LE GRENADIN.

*Fringilla cauda cuneiformi, corpore rufescente, temporibus uropygio abdomineque violaceis, rostro rubro.* *Fringilla Brasiliana.* *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 16.*

Pinçon rouge & bleu du Brésil. *Edwards. Tom. IV. pag. CXCI; avec une figure exacte (excepté le bec, qui est trop alongé) Pl. 191.*

*Edwards* dit qu'il vient du  
*Bresil.*

*Secundum Edwardum*  
*habitat in Brasilia.*



## 68. LE MOINEAU DE PENSILVANIE.

*Passer superne nigricante & rufescente varius, infernè cinereo-albus ; tanià utrinque per oculos nigricante ; fasciâ utrinque supra oculos primùm aurantiâ , dein albâ ; gutture candido ; marginibus alarum luteis ; rectricibus rufescentibus , in medio obscurioribus . . . .* PASSER PENSILVANICUS.

Moineau à gorge blanche. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 198. chap. XCIV ; avec une figure exacte Pl. 304.*

*Les Anglois l'appellent WHITE-THROATED SPARROW. Edwards.*

*Passerem sylvestrem* multum crassitie superat. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ rectrices sunt nigricante & rufescente variæ, nigricante scilicet cujuslibet pennæ medium occupante, & rufescente ad margines posito In utroque capitatis latere tania extat nigricans, ab oris angulis orta, & per oculos ducta. Supra quam taniam altera adest fascia paulò majorem latitudinem obtinens, prope rostri exortum orta, supra oculum ducta, & versùs occipitium usque protensa : quæ fascia à rostro supra oculos usque est aurantia, inde ad ipsius extremitatem alba. Guttur quoque albicat. Pars colli inferior, pectus, venter, la-

Il est beaucoup plus gros que le *Moineau de bois*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont variés de noirâtre & de rouffâtre, le noirâtre occupant le milieu de chaque plume, & le rouffâtre en occupant les bords. De chaque côté de la tête est une bande noirâtre, qui part des coins de la bouche, & passe par les yeux. Audessus de celle-là est une autre bande un peu plus large, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par-dessus l'œil & s'étend jusque vers l'occiput : elle est orangée depuis le bec jusqu'audessus des yeux, & de là jusqu'à son extrémité elle est blanche. La gorge est de cette dernière couleur. La partie inférieure du col, la poitrine, le



ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-blanc. Le bord de l'aîle, depuis le pli qui répond à celui du poignet jusqu'à son extrémité, est jaune. Les plumes de l'aîle sont noirâtres, & bordées de roussâtre. La queue est composée de douze plumes roussâtres, & dont le milieu est d'une couleur un peu plus obscure. Le bec est noirâtre. Les pieds sont de couleur de chair-rougeâtre. On le trouve en *Pensylvanie*.

tera; crura, inferioresque caudæ teatrices ex cinereo alben. Alarum margines, ab articulo carpo humano respondente ad illarum extremitatem usque, sunt luteæ. Remiges nigricantes, rufescente marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices rufescentes, in medio tamen colore nonnihil obscuriore imbutæ. Rostrum nigricat. Pedes ex carneo colore rubescunt. Habitat in *Pensylvania*.

#### 69. LE CARDINAL D'ANGOLA.

*Passer superne saturatè cinereo-cœrulescens, infernè albus, maculis nigris varius; capite & guttore coccineis; taniâ duplici in alis transversâ cinereo-albâ; maculis ad latera rufescentibus; remigibus, rectricibusque saturatè cinereo-cœrulescentibus, apice cinereo-albis . . . CARDINALIS ANGOLENSIS.*

*Loxia cinerascens, capite purpurascente pectorè albo maculato. Loxia erythrocephala Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 9. Moineau de Paradis. Edwards. Tom. IV. pag. CLXXX; avec une figure exacte Pl. 180.*

*Les Portugais l'appellent PASSERO DE PARADISO. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur du *Moineau franc*. La tête & la gorge sont d'un rouge vif. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les plus petites couvertures du dessus des

Cum *Passere domestico* crassitie circiter convenit. Caput & guttur coccineo colore tinguntur. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque alarum teatrices



minimæ sunt saturatè cinereo - cœrulescentes. Pennæ caudam superne cooperientes concolores, sed cinereo-albo terminatæ. Pectus, venter supremus & latera albicant, & maculis nigris squamæformibus variegantur. Latera insuper maculis rufescentibus insigniuntur. Venter imus, latera & pennæ caudam subtus obtegentes albennt quidem, sed maculis destituuntur. Superiores alarum rectrices mediæ & majores sunt saturatè cinereo-cœrulescentes, cinereo-albo terminatæ; unde fit in utraque ala duplex tænia transversa cinereo-alba. Remiges omnes sunt quoque saturatè cinereo-cœrulescentes, apicibus cinereo-albis præditæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum album aut carneo colore imbutum. Pedes, unguesque similiter carneo colore tincti. Habitat in *Angolensi* regno.

aîles sont d'un cendré-bleu foncé. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, & terminées de gris-blanc. La poitrine, le haut du ventre & les côtés sont blancs, & variés de taches noires en forme d'écailles. Les côtés sont de plus marqués de taches roussâtres. Le bas-ventre est blanc & sans taches, ainsi que les jambes & les couvertures du dessous de la queue. Les moyennes & les plus grandes couvertures du dessus des aîles sont d'un cendré - bleu foncé, & terminées de gris-blanc; ce qui forme sur chaque aîle deux bandes transversales de cette dernière couleur. Toutes les plumes de l'aîle sont aussi d'un cendré-bleu foncé, & terminées de gris-blanc. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aîle. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est blanc ou de couleur de chair. Les pieds & les ongles sont de cette dernière couleur. On le trouve dans le royaume d'*Angola*.



## 70. LA VEUVE D'ANGOLA.

Passer superne nigro & rufo varius, infernè albus; pectore dilutè rufo; tectricibus alarum superioribus minoribus candidis; rectricibus quatuor intermediis longissimis nigris, quatuor utrinque extimis obscurè fuscis, fusco dilutiore exteriùs marginatis, albo interiùs maculatis; rostro cocci-neo . . . . VIDUA ANGOLENSIS.

Moineau à longue queue. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 126. chap. LX; avec une figure exacte Pl. 270.*

*Les Anglois l'appellent LONG-TAILED SPARROW. Edwards.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *petite Veuve*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont variés de noir & de roux, le noir occupant le milieu de chaque plume, & le roux en occupant les bords. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. La poitrine est d'un roux clair. Les petites couvertures du dessus des ailes sont blanches : les grandes sont noires, & bordées de roux. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que ces dernières couvertures. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu

Cum *Vidua minore* crassitie circiter convenit. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium nigro & rufo variegantur, nigro scilicet colore uniuscujusque pennæ medium occupante; rufo verò ad margines posito. Pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices concolores. Caput ad latera sive genæ, guttur, pars colli inferior, venter, latera, crura & inferiores caudæ tectrices alben. Pectus tingit color dilutè rufus. Superiores alarum tectrices minores sunt candidæ : majores nigræ, rufo simbriatæ. Alarum remiges novissimis istis tectricibus concolores. Duodecim rectricibus cauda conflatur : quatuor intermediae sunt saturatè nigræ : quatuor utrinque extremae obscurè



curæ fuscæ, fusco dilutiore  
 exterius marginatæ, & maculâ albâ, in ipforum latere  
 interiore positâ, notatæ.  
 Quatuor intermediæ maximam longitudinem obtinent; binæ enim intermediæ quinque pollicum & sex circiter linearum longitudine laterales excedunt; utrinque autem proximè sequens illis unius tantummodo pollicis longitudine cedit. Rostrum coccineum. Pedes carneo colore imbuti. Habitat in *Angolensi* regno.

sont d'un noir foncé : les quatre plus extérieures de chaque côté sont d'un brun obscur, bordées extérieurement de brun plus clair, & marquées chacune d'une tache blanche, placée sur leur côté intérieur. Les quatre du milieu sont extrêmement longues, les deux du milieu ayant environ cinq pouces six lignes de longueur de plus que les latérales, & celle qui les suit immédiatement de chaque côté, n'étant plus courte qu'elles que d'environ un pouce. Le bec est d'un rouge vif. Les pieds sont de couleur de chair. On la trouve dans le royaume d'*Angola*.

#### 71. LA LINOTTE D'ANGOLA.

*Passer superne cinereo-fuscescens, maculis fuscis variis, infernè spadiceus, pectore dilutiore; plumulis basim rostri ambientibus & gutture nigris; genis & gutture albo maculatis; uropygio luteo; rectricibus fuscis, cinereo-albo in apice marginatis. (Mas).*

*Passer superne fusco-rufescens, infernè rufescens, maculis fuscis superne & infernè variis; tæniâ utrinque per oculos fuscâ; genis dilutè rufescentibus; uropygio luteo; rectricibus fuscis, cinereo-albo in apice marginatis. (Fœmina).*

. . . . LINARIA ANGOLENSIS.

*Linotte d'Angola. Edwards. Tom. III. pag. CXXIX; avec des figures exactes du mâle & de la femelle Pl. 129.*

*Les Portugais appellent le mâle NEGRAL ou TOBAQUE, & la femelle BENGUELINHA. Edwards.*

*Linariam vulgarem* crassitie circiter æmulatur. Ca-  
 Suppl.

Elle est à peu près de la grosseur de la *Linotte ordinaire*. La  
 L



partie supérieure de la tête, le col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un cendré-brunâtre, varié de taches brunes, qui occupent le milieu de chaque plume. Les petites plumes qui entourent la bête du bec, & la gorge sont noires. De chaque côté de la tête, ainsi que sur chaque côté de la gorge, sont quelques taches blanches. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge-bai : cette couleur est plus claire sur la poitrine qu'ailleurs. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un jaune brillant. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes sont brunes, & bordées de jaune. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que ces dernières couvertures. La queue est composée de douze plumes brunes, bordées de gris-blanc par le bout. Le bec est d'un brun tirant sur le couleur de chair. Les pieds & les ongles sont de cette dernière couleur.

La *femelle* diffère un peu du *mâle* par ses couleurs. Le dessus de la tête, le col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un brun-roussâtre, varié de

pitius superior pars, collum, dorsum & scapulares pennæ ex cinereo fusciscunt, & fuscis variegantur maculis, cujuslibet pennæ medium occupantibus. Plumula basim rostri ambientes, gutturque sunt nigræ. In utroque capitis latere, sicut & utrinque in gutture, quædam extant maculæ albæ. Pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obtegentes spadiceo imbuuntur colore, in pectore dilutior quàm in reliquis prædictis partibus. Uropygium & pennæ caudam superne vestientes sunt splendide luteæ. Superiores alarum rectrices minores pennis dorsum vestientibus concolores : majores fuscæ, luteo fimbriatæ. Alarum remiges novissimis istis rectricibus concolores. Caudam componunt duodecim rectrices fuscæ, cinereo-albo in apice marginatæ. Rostrum fuscum, ad carneum colorem inclinans. Pedes, unguisque carneo colore imbuti.

*Fæmina* coloribus paululum à *mare* discrepat. Caput superius, collum, dorsum & scapulares pennæ sunt fusco-rufescentes, maculis sa-



turatiùs fuscis variegatæ. Caput ad latera sive genas tingit color dilutè rufescens. In utroque capitis latere tania extat fusca, propè rostri exortum orta, per oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices rufescunt, maculisque fuscis variegantur. Superiores alarum tectrices minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores sunt fuscæ, cinereo-albo marginatæ. Alarum remiges novissimis istis tectricibus concolores. In reliquis cum *mare* convenit.

Habitant in *Angolensi* regno.

taches d'un brun plus foncé. Les côtés de la tête ou les joues sont d'un roussâtre clair. De chaque côté de la tête est une bande brune, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roussâtre varié de taches brunes. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos : les grandes sont brunes, & bordées de gris-blanc. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que ces dernières couvertures. Le reste est comme dans le *mâle*.

On les trouve dans le royaume d'*Angola*.

## 72. LE PINÇON CENDRÉ DES INDES.

*Passer superne saturatè cinereus, uropygio dilutiorè, infernè dilutè cinereo-coerulescens; mandibulæ inferioris basi albo circumdatâ; remigibus majoribus in exortu albis, in extremitate nigricantibus; rectricibus nigricantibus, dilutè cinereo marginatis . . . FRINGILLA CINEREA INDICA.*

*Loxia cana, remigibus rectricibusque fuscis pedibus rubris. Loxia cana: Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 27.*

Pinçon gris. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXIX; avec une figure exacte Pl. 179.*

Cum *Linaria nostrate* crassitie circiter convenit. Partes capitis & colli superio-

Il est à peu près de la grosseur de notre *Linotte*. Les parties supérieures de la tête & du



col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un cendré foncé. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, mais beaucoup plus claire. La bête du demi-bec inférieur est entourée de petites plumes blanches : cette couleur remonte de chaque côté jusqu'aux yeux. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré très-clair & bleuâtre. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré foncé, leur milieu étant d'une couleur un peu plus obscure : les grandes sont noirâtres, & bordées de cendré clair. Les grandes plumes de l'aile sont blanches à leur origine, & noirâtres à leur extrémité, le blanc formant sur chaque aile, lorsqu'elle est pliée, une assez grande tache de cette couleur : les moyennes sont noirâtres, & bordées extérieurement de cendré clair. La queue est composée de douze plumes pareillement noirâtres, & bordées de cendré clair. Les yeux sont noirâtres. Le bec est d'un cendré obscur. Les pieds & les ongles sont de couleur de chair sombre. On le trouve aux *Indes Orientales*.

res, dorsum & scapulares pennæ sunt saturatè cinereæ. Uropygium & superiores caudæ rectrices tingit idem color, sed multò dilutior. Basim mandibulæ inferioris circumdant plumulæ albæ : albedo autem utrinque ad oculos usque producitur. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obtegentes dilutissimo imbuuntur cinereo-cœrulescente. Superiores alarum rectrices minores sunt saturatè cinereæ, in medio tamen colore nonnihil obscuriore imbutæ : majores nigricantes, cinereo diluto fimbriatæ. Remiges alarum majores in exortu albæ, in extremitate nigricantes ; albedine in utraque ala complicata majusculam maculam concolorem efficiunt : minores nigricantes, cinereo diluto exterius fimbriatæ. Cauda duodecim constat rectricibus pariter nigricantibus, dilutè cinereo marginatis. Oculi nigricant. Rostrum obscurè cinereum. Pedes, unguisque obscuro colore carneo tincti. Habitat in *India Orientali*.



## 73. LE PINÇON A COLLIER DES INDES.

*Passer superne cinereo-fuscus, infernè albus, rufescente adumbratus; capite & taniâ transversâ in colli inferioris parte infima nigris; plumulis basim rostri ambientibus, oculorum ambitu & gutture candidis; torque candicante; remigibus nigris, minoribus rufescente marginatis; rectricibus cinereo-fuscis . . . . FRINGILLA TORQUATA INDICA.*

*Pinçon à collier. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 130. chap. LXII; avec une figure exacte Pl. 272.*

*Les Portugais l'appellent COLHEIRINHO. Edwards.*

*Les Anglois, COLLARED FINCH. Edwards.*

*Crassitie Fringillam nostratē circiter æquat. Caput tingit color niger: plumulæ tamen basim rostri circumdantes, oculorumque ambitus albet. Guttur similiter albicat: ex albedine autem taniâ oritur candicans, partem colli superiorem ambiens, & torquem quodammodo efformans. In colli inferioris infima parte taniâ extat transversa nigra. Pars colli superior, dorsum & scapulares pennæ sunt cinereo-fusæ. Superiores caudæ rectrices nonnihil dilutiores. Pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus cooperientes albicant, & rufescēte adumbrantur. Superiores alarum rectrices sunt nigra, rufescēte splen-*

*Il est à peu près de la grosseur de notre Pinçon. La tête est noire: cependant les petites plumes qui entourent la base du bec, & le tour des yeux sont blancs. La gorge est pareillement blanche: de cette couleur part une bande blanche, qui entoure la partie supérieure du col, & forme une espèce de collier. Au bas de la partie inférieure du col est une bande transversale noire. Le dessus du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un cendré-brun. Les couvertures du dessus de la queue sont un peu plus claires. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc nuancé de roussâtre. Les couvertures du dessus des ailes*



sont noires, & bordées de roussâtre brillant. Les moyennes plumes de l'aile sont de la même couleur : les grandes sont entièrement noires. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brun. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve dans les *Indes*.

dido fimbriatæ. Remiges alarum minores concolores : majores penitus nigra. Duodecim rectricibus cinereofuscis cauda constat. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque fusci. Habitat in *India*.

#### 74. LE PINÇON FRISÉ.

*Passer pennis crispis vestitus, superne obscurè olivaceus, infernè luteus; capite & collo nigris; rectricibus obscurè olivaceis; rostro candido . . . . FRINGILLA CRISPA.*

Moineau frisé jaune & noir. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 128. chap. LXI; avec une figure exacte Pl. 271.*

*Les Portugais l'appellent BECO DE PRATA. Edwards.*

*Les Anglois BLACK AND YELLOW FRIZLED SPARROW. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent. La tête, la gorge & le col sont noirs. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un olive sombre. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont jaunes. Les plumes de l'aile sont d'un olive sombre. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est blanc. Les pieds & les ongles sont d'un brun fon-

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Caput, guttur, collumque nigra sunt. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ rectrices obscurè olivaceæ. Pectus, ventrem, latera, crura & rectrices caudæ inferiores tingit luteus color. Alarum remiges sunt obscurè olivaceæ. Caudam componunt duodecim rectrices concolores. Rostrum candidum. Pedes, unguisque saturatè fusci. Pleræ-



que pennæ, quibus vestitur hæc Avis, sunt crispæ. Habitat in *Angolensi* regno sive *Brasilia*.

cé. La plupart de ses plumes sont frisées. On le trouve dans le royaume d'*Angola* ou au *Brésil*.

XXXIV. Genus *Coccothraustis*.

XXXIV. Le Genre du Gros-bec.

### 1. LE GROS-BEC.

*Loxia linea alarum simplici alba, rectricibus latere tenuiore baseos albis. Coccothraustes. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 2.*

Gros-bec. Edwards. Tom. IV. pag. CLXXXVIII; avec une figure exacte Pl. 188.

Les Allemands l'appellent KERN-BEISSER. Edwards.

### 5. LE GROS-BEC DE GAMBIE.

*Loxia lutea, capite atro. Loxia melanocephala. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 26.*

### 7. LE GROS-BEC DE LA CHINE.

*Fringilla ferruginea, capite atro, rostro cœruleo. Fringilla Chinenfis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 29.*

### 9. LE GROS-BEC TACHETÉ DE JAVA.

*Loxia ferruginea, abdomine nigro albo-maculato. Loxia punctulata. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 13.*

### 12. LE GROS-BEC CENDRÉ DE LA CHINE.

*Loxia fusca, temporibus albis, rostro rubro. Loxia oryzivora. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 11.*

### 15. LE GROS-BEC DE CANADA.

*Loxia linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus. Eucleator. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 3.*

Grosse Pivoine. Edwards. Tom. III. pag. CXXIII & CXXIV; avec des figures exactes, du mâle Pl. 123 & de la femelle Pl. 124. (Le demi-bec supérieur est cependant trop crochu).



Le mâle est d'une couleur beaucoup plus vive que celui que j'ai fait graver. La femelle a un peu de rougeâtre sur la tête & le croupion; & le dessous de son corps est nuancé d'une légère teinte de couleur de rose. Ceux que j'ai vu, n'avoient pas encore pris ces belles couleurs.

*Mas colore imbuitur multò vividiore quàm ille quem æri insculptum esse curavi. Fœmina supra caput & in uropygio nonnihil rubescit; & in corpore inferiore aliquâ rosei coloris mixturâ adumbratur. Hujus speciei Aves quas observavi, splendentes colores istos nondum acquisiverant.*

#### 17. LE GROS-BEC DE VIRGINIE OU LE CARDINAL HUPÉ.

*Loxia rubra, facie nigra. Cardinalis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 5.*

#### 18. LE GROS-BEC DU MEXIQUE.

*Loxia rubra, alis nigris. Loxia Mexicana. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 8.*

#### 19. LE GROS-BEC BLEU D'ANGOLA.

*Coccothraustes saturatè cyanea; plumulis basim rostri ambientibus, oculorum ambitu, gutture, remigibus majoribus, rectricibusque nigris . . . . COCCOTHAUSTES ANGOLENSIS CYANEÆ.*

*Loxia cœrulea, remigibus rectricibusque nigris. Loxia cyanea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96 sp. 17.*

*Gros bec bleu d'Angola. Edwards. Tom. III. pag. CXXV; avec une figure exacte Pl. 125.*

*Les Portugais l'appellent AZULAM. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur de notre Gros-bec. La bête du bec est entourée de petites plumes noires. Le tour des yeux & la gorge sont de la même couleur. Tout le reste de la

*Coccothraustem nostratam crassitie circiter æmulatur. Basim rostri ambiunt plumulae nigrae. Oculorum ambitum & guttur tingit idem color. Reliquum caput, collum,*



lum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura, pennæ scapulares, quæque caudam superne & infernè cooperiunt, elegantissimo imbuuntur cyaneo saturato. Superiores alarum rectrices minimæ & mediæ concolores : majores corpori viciniore nigre, cyaneo fimbriatæ : majores à corpore remotiores penitus nigre. Remiges majores simili nigro tinctæ : minores nigre, cyaneo marginatæ. Duodecim rectricibus nigris cauda conflatur. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides obscurè avellanæ. Rostrum plumbeo colore imbutum ; qui color est in mandibula superiore quàm in inferiore saturior. Pedes, unguisque ex plumbeo colore nigricant. Habitat in *Angolensi* regno.

tête, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un très-beau bleu foncé. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur : les grandes les plus proches du corps sont noires, & bordées de bleu : les grandes les plus éloignées du corps sont entièrement noires. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur : les moyennes sont noires, & bordées de bleu. La queue est composée de douze plumes noires. La prunelle des yeux est noire : leur iris est de couleur de noisette sombre. Le bec est de couleur de plomb ; cette couleur est plus foncée sur le demi-bec supérieur que sur l'inférieur. Les pieds & les ongles sont de couleur de plomb-noirâtre. On le trouve dans le royaume d'*Angola*.

**\*\* 20. LE GROS-BEC BLEU D'AMÉRIQUE.**

*Voyez Pl. V. Fig. 1.*

*Coccothraustes* obscurè cinereo-cœrulescens ; gutture albo ; maxillis, collo inferiore, rectricibusque nigris ; rostro rubro . . . . . *COCCOTHRAUSTES AMERICANA CÆRULEA.*

*Suppl.*

**M**



Il est à peu près de la grosseur du *Gros-bec de Virginie*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long; sa queue trois pouces; son pied dix lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un cendré-bleu obscur. La gorge est blanche. Les plumes qui couvrent le bas des joues ou les mâchoires, & la partie inférieure du col sont noires. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la

*Coccothraustes Virginiana* crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo cum semi lineas longum est; cauda tres pollices; pes decem cum semi lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue octo cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem laterali longitudo paululùm excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudo non attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crura, teatricesque caudæ superiores & inferiores sunt obscurè cinereo-cœrulescentes. Guttur albicat. Pennæ genarum partem infimam sive maxillas, inferioremque colli partem cooperientes sunt nigræ. Pennæ alas subtus obtegentes candidæ. Superiores alarum teatrices minores, sicut & majores



corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores nigricantes, obscuro cinereo-cœrulescente exterius fimbriatæ. Alarum remiges similiter nigricant, & cinereo-cœrulescente obscuro exterius marginantur; attamen in latere interiore maximâ parte albicant versus ipsarum exortum tantum : ipsarum autem margo exterior eò majorem obtinet latitudinem, quò remix fit corpori vicinior. Remiges alarum tertia & quarta reliquas omnes longitudine antecellunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigre. Sex intermedia reliquarum longitudinem paululum excedunt ; reliquæ autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum eleganter rubrum. Pedes, unguisque plumbeo colore imbuti. Habitat in America. Ex museis D. Mauduyt & D. d'Aligny.

même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées extérieurement de cendré-bleu obscur. Les plumes de l'aile sont pareillement noirâtres, & bordées extérieurement de cendré-bleu obscur ; mais une grande partie de leur côté intérieur est blanche vers leur origine seulement : leur bordure extérieure est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps. La troisième & la quatrième plume de l'aile sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes noires. Les six du milieu sont un peu plus longues que les autres, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un beau rouge. Les pieds & les ongles sont de couleur de plomb. On le trouve en Amérique. Du cabinet de M. Mauduyt & de celui de Madame d'Aligny.

XXXV. Genus *Emberizæ*.

XXXV. Le genre du Bruant.

### 1. LE BRUANT.

*Emberiza rectricibus nigricantibus : extimis duabus latere interiore macula alba acuta. Citrinella. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 4.*

Mij



## 4. L'ORTOLAN.

*Emberiza remigibus nigris* : primis tribus margine albidis, rectricibus nigris : lateralibus duabus extrorsum nigris. Hortulana. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 3.*

## 5. L'ORTOLAN DE ROSEAUX.

*Fringilla rectricibus fuscis* : extimis duabus macula alba cuneiformi, corpore griseo nigroque, capite nigro. Schœniclus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 26.*

## 8. L'ORTOLAN DE LA CAROLINE.

*Fringilla fusca*, cervice fulva, macula alarum dorsoque postico albis.  
*Fringilla oryzivora. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 1.*  
 Ortolan de la Caroline. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 173. chap. LXXXI* ; avec des figures exactes du mâle & de la femelle *Pl. 291.*  
*Les Anglois l'appellent REED-BIRD. Edwards.*

## 9. L'ORTOLAN DE NEIGE.

*Emberiza remigibus albis* : primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris : lateralibus tribus albis. *Emberiza nivalis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 1.*  
 Oiseau de neige de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III pag. CXXVI* ; avec une figure exacte *Pl. 126.*

## 9. C. L'ORTOLAN DE NEIGE NOIR.

*Fringilla nigra*, ventre albo. *Fringilla hyemalis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 98. sp. 30.*

## 10. LE PROYER.

*Emberiza grisea nigro-maculata. Calandra. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 97. sp. 2.*

## SECTION II.

## SECTIO II.

XXXVII. *Le genre du Bouvreuil.*

XXXVII. *Genus Pyrrhula.*

## 1. LE BOUVREUIL.

*Loxia arctus nigris*, rectricibus caudæ remigumque posticarum albis. *Pyrrhula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 4.*



## I. A. LE BOUVREUIL NOIR.

*Loxia nigra*, ala spuria alba, rostro incarnato. *Loxia panicivora*. Linn.  
*Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 12.*

## 3. LE BOUVREUIL NOIR DU MEXIQUE.

*Loxia nigra*, macula alba humeri remigumque duarum exteriorum.  
*Loxia nigra*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 28.*

## 7. LE BOUVREUIL BLEU DE LA CAROLINE.

*Loxia coerulea*, alis fuscis fascia baseos purpurea. *Loxia coerulea*. Linn.  
*Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 29.*

## 9. LE BOUVREUIL VIOLET DE BAHAMA.

*Loxia violacea* superciliis gula anoque rubris. *Loxia violacea*. Linn.  
*Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96. sp. 30.*

## SECTIO III.

## SECTION III.

XXXVIII. Genus *Loxia*.

XXXVIII. Le genre du Bec-croisé.

## I. LE BEC-CROISÉ.

*Loxia* rostro forficato. Curvirostra. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 96.*  
*sp. 1.*

Bec croisé. Edwards. *Glanur. Part. II. pag. 196. chap. XCIII; avec des*  
*figures exactes du mâle & de la femelle Pl. 303.*

Les Anglois l'appellent CROSS-BILL. Edwards.

## O R D O X.

## O R D R E X.

## SECTIO I.

## SECTION I.

XXXIX. Genus *Alauda*.

XXXIX. Le Genre de l'Alouette.

## I. L'ALOUE TTE.

*Alauda rectricibus* extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis :  
intermediis interiori latere ferrugineis. *Alauda arvensis*. Linn. *Systh.*  
*Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 1.*



## 2. L'ALOUETTE DE BOIS OU LE CUJELIER.

*Alauda capite vitta annulari alba cincto. Alauda arborea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 3.*

## 3. L'ALOUETTE DE PREZ OU LA FARLOUSE.

*Alauda rectricibus extimis duabus extrorsum albis, linea superciliorum alba. Alauda pratensis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 2.*

## 4. L'ALOUETTE DE BUISSON.

*Alauda rectricibus fuscis : extima dimidiato alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplici albida. Alauda trivialis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 5.*

## 5. L'ALOUETTE DE CHAMP.

*Alauda rectricibus fuscis inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente. Alauda campestris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 4.*

*Alauda rectricibus fuscis : extimis duabus obliquè dimidiato albis. Spizopetia. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 7.*

## 6. LA GROSSE ALOUETTE OU LA CALANDRE.

*Calandre. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 122. chap. LVIII ; avec une figure assez exacte Pl. 268.*

*Les Anglois l'appellent CALANDRA. Edwards.*

## 8. L'ALOUETTE HUPÉE OU LE COCHEVIS.

*Alauda rectricibus nigris : extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato. Alauda cristata. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 6.*

## 12. L'ALOUETTE DE VIRGINIE.

*Alauda rectricibus dimidio inferiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra. Alauda Alpestris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 93. sp. 8.*

## 13. L'ALOUETTE DE PENNSILVANIE.

*Alauda superne obscurè fusca, infernè fulvo-rufescens, ma-*



culis fuscis varia ; genis nigricantibus ; taniâ utrinque supra oculos rufescente ; rectrice extimâ albâ , proximè sequenti apice albâ . . . . ALAUDA PENSILVANICA.

Alouette de Pensilvanie. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 13 ; chap. LXXXVII ; avec une figure exacte Pl. 297.*

Les Anglois l'appellent LARK FROM PENSILVANIA. *Edwards.*

Magnitudine & crassitie cum *Alauda campestri* circiter convenit. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt obscurè fuscæ. Caput ad latera sive genas tingit color nigricans. In utroque capitis latere tænia extat rufescens, prope rostri exortum orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obtegentes ex fulvo rufescunt, & maculis fuscis variegantur. Rectrices alarum inferiores sunt cineræ. Superiores minores eodem imbutæ colore ac dorsum ipsum tingitur : majores obscurè fuscæ, cinereo-albo fimbriatæ. Alarum remiges novissimis istis rectricibus concolores. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum octo intermediæ sunt obscurè fuscæ, cinereo-albo

Elle est à peu près de la grosseur & de la grandeur de l'*Alouette de champ*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-obscur. Les côtés de la tête ou les joues sont noirâtres. De chaque côté de la tête est une bande roussâtre, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par-dessus les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve-roussâtre, varié de taches brunes. Les couvertures du dessous des ailes sont cendrées. Les petites du dessus sont de la même couleur que le dos : les grandes sont d'un brun obscur, & bordées de gris-blanc. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que ces dernières couvertures. La queue est composée de douze plumes : les huit du milieu sont d'un brun



obscur, & bordées de gris-blanc : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur, mais elle est terminée de blanc : enfin la plus extérieure de chaque côté est entièrement blanche. Le bec est noirâtre, excepté la bête de la mandibule inférieure, qui est jaunâtre. Les pieds & les ongles sont d'un brun foncé. On la trouve dans l'*Europe* & l'*Amérique Septentrionale*.

marginatæ : utrinque proximè sequens concolor, sed albo terminata : utrinque tandem extrema penitus alba. Rostrum nigricans, exceptâ mandibulæ inferioris basi flavicante. Pedes, unguisque saturatè fusci. Habitat in *Septentrionalibus Europæ* & *Americæ* regionibus.

XL. Le genre du Becfigue.

XL. Genus *Ficedulæ*.

### 1. LE BECFIGUE.

Motacilla subfusca, subtus alba, pectore cinereo maculato. *Ficedula*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 11.*

### 2. LA FAUVETTE.

Motacilla virefcente-cinerea, subtus flavescens, abdomine albido artubus fuscis. Hippolais. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 7.*

### 4. LA FAUVETTE GRISE OU LA GRISETTE.

Motacilla supra cinerea, subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba. Sylvia. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 9.*

### 5. LA FAUVETTE DE ROSEAUX.

Motacilla cinerea, subtus alba, superciliis albis. Salicaria. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 8.*

### 6. LA FAUVETTE A TÊTE NOIRE.

Motacilla testacea, subtus cinerea, pileo obscuro. *Atricapilla*. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 19.*

### 7. LA



## 7. LA FAUVETTE BABILLARDE.

*Motacilla supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis : extima marginine tenuiore alba. Curruca. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 6.*

*Motacilla supra grisea, subtus cinerea, remigibus primoribus apice obsoletis. Philomela. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 10.*

## 11. LA FAUVETTE DE BOIS OU LA ROUSSETTE.

*Motacilla testaceo-fusca, subtus pallidè testacea capite maculato. Schoenobænus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 4.*

## 12. LA FAUVETTE DE HAYE OU LA PASSE-BUSE.

*Motacilla supra griseo-fusca, rectricibus alarum apice albis, pectore cœrulescente-cinereo. Motacilla modularis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 3.*

## 13. LE ROSSIGNOL.

*Motacilla rufo-cinerea, genuum annulis cinereis. Luscinia. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 1.*

## 15. LE ROSSIGNOL DE MURAILLE.

*Motacilla gula nigra, abdomine rufo, capite dorsoque cano. Phœnicurus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 21.*

*Motacilla remigibus nigricantibus, rectricibus rufis : intermedio pari nigro extrorsum rufescente. Titys. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 23. (fœmina).*

## 17. LE ROUGE-QUEUE.

*Motacilla dorso remigibusque cinereis, abdomine rectricibusque rufis : extimis duabus cinereis. Erithacus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 22.*

## 19. LA GORGE-BLEUE.

*Motacilla pectore ferrugineo fascia cœrulea, rectricibus fuscis versùs basin ferrugineis. Motacilla Suecica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 24.*

## 21. LA ROUGE-GORGE.

*Motacilla grisea, gula pectoreque fulvis. Rubecula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 28.*

*Suppl.*

N



## 23. LA ROUGE-GORGE BLEUE DE LA CAROLINE.

*Motacilla supra cœrulea, subtus tota rubra. Sialis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 25.*

## 24. LE ROITELET.

*Motacilla grisea, alis nigro cinereoque undulatis. Troglodytes. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 29.*

## 26. LE GRAND TRAQUET OU LE TARIER.

*Motacilla nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente. Rubetra. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 18.*

## 33. LE CUL-BLANC OU VITREC OU MOTEUX.

*Motacilla dorso cano, fronte alba, oculorum fascia nigra. Oenanthe. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 17.*

## 34. LE CUL-BLANC GRIS.

*Motacilla subtus pallida, rectricibus introrsum albis, dorso undulato. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 17. var. 1.*

## 37. LE CUL-BLANC ROUX.

*Motacilla ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis. Motacilla Hispanica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 16.*

## 38. LA LAVANDIERE.

*Motacilla pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. Motacilla alba. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 12.*

## 40. LA BERGERONETTE DU PRINTEMPS.

*Motacilla pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. Motacilla flava. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 13.*



## 45. LE POUILLOT OU CHANTRE.

*Motacilla cinereo-virens*, remigibus subtus flavescentibus, superciliis luteis. *Trochilus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 31.*

*Motacilla supra cinereo-virens*, remigibus fulcis; septimo octavo nono apice albis. *Acredula*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 32.*

## 47. LE FIGUIER DE BENGAL.

*Motacilla viridis*, subtus flavescentibus, alis nigris: fasciis duabus albis. *Tiphia*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 14.*

## 48. LE FIGUIER DE LA CAROLINE.

Roitelet jaune. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 142. chap. LXVIII; avec une figure exacte Pl. 278.*

Les Anglois l'appellent YELLOW WREN. *Edwards.*

## 55. LE FIGUIER DE LA LOUISIANE.

Grimpereau de Sapin. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 139. chap. LXVII; avec une figure exacte de la femelle Pl. 277.*

Les Anglois l'appellent PINE-CREEPER. *Edwards.*

<p>Secundum <i>Edwardum</i>, in utroque capitis latere lineolâ donatur nigrâ, ab oris angulis ortâ, &amp; ad oculum usque productâ.</p>	<p>Selon <i>Edwards</i>, il a de chaque côté de la tête une petite ligne noire, qui part des coins de la bouche, &amp; s'étend jusqu'à l'œil.</p>
---	---

## 66. LE FIGUIER CENDRÉ DE LA CAROLINE.

*Parus coerulescens*, temporibus pectore dorsoque flavescentibus, hypochondriis purpurascentibus. *Parus Americanus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 3.*

## 69. LE FIGUIER VARIÉ DE S. DOMINGUE.

Grimpereau noir & blanc. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 190. chap. XC; avec une figure exacte Pl. 300.*

Les Anglois l'appellent BLACK AND WHITE CREEPER. *Edwards.*



## 72. LE PIPIT BLEU DE CAYENNE.

Manaquin bleu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 112. chap. LIII ; avec une figure exacte Pl. 263.*

*Les Anglois l'appellent BLUE MANAKIN. Edwards.*

## 73. LE PIPIT BLEU DE SURINAM.

*Motacilla cœrulea , ventre clunibusque rufescentibus. Velia. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 26.*

## 74. LA FAUVETTE DE HAYE DE LA JAMAÏQUE.

*Ficedula superne fusco - rufescens, infernè alba , fuscescente adumbrata ; capite & collo cinereo-virescentibus ; rectricibus superne fusco-rufescentibus , subtus cinerascens . . .*

*CURRUCA SEPIARIA JAMAÏCENSIS.*

*Motacilla grisea , capite cinereo , rectricibus concoloribus , abdomine albido. Motacilla campestris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 5.*

*Moineau de buisson de l'Amérique. Edwards, Tom. III. pag. CXXII ; avec une figure exacte Pl. 122.*

Elle est à peu près de la grosseur de notre Fauvette de haye. La tête , la gorge & le col sont d'un cendré tirant un peu sur le verd. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun-roussâtre. La poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc nuancé de brunâtre. Toutes les plumes de l'aîle sont d'un brun-roussâtre

*Crassitie Currucam sepia-riam nostratem circiter æmulatur. Caput , guttur & collum ex cinereo nonnihil virescunt. Dorsum , uropygium , pennæ scapulares , superiores alarum rectrices & pennæ caudam superne cooperientes ex fusco rufescunt. Pectus , venter , latera , crura , inferioresque caudæ rectrices albescent , & fuscescente adumbrantur. Omnes alarum remiges sunt superne fusco-rufescentes , subtus ad*



cinereum inclinantes. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concoloris. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque fusci. Habitat in *Jamaica*.

tre en-dessus, & tirent sur le cendré en-dessous. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aile. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve à la *Jamaïque*.

75. LE GRAND FIGUIER DE LA JAMAÏQUE.

*Ficedula superne obscurè fusco-olivacea, infernè rufa; duplici utrinque taniâ, unâ per oculos, alterâ infra oculos fuscâ; reëtrixibus obscurè fusco-olivaceis, lateralibus interioriùs rufis . . . FICEDULA JAMAICENSIS MAJOR.*

*Motacilla supra fusco-virescens, subtrus fulva, linea oculari subocularique nigra. Calidris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 2.*  
*Rosignol de l'Amérique. Edwards, Tom. III. pag. CXXI; avec une figure assez exacte Pl. 121.*

Magnitudine & crassitie *Ficedulam Canadensem majorem* circiter æquat. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium & pennæ scapulares sunt obscurè fusco-olivaceæ. Superiores caudæ rectrices paulò magis ad flavum vergunt. Caput ad latera, guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, crura, inferiores caudæ rectrices, pennas alas subtrus obtegentes & latera tingit color rufus: attamen in utroque capitis latere binæ extant taniæ fuscæ, prope

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur du *grand Figuier de Canada*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un brun-olivâtre sombre. Les couvertures du dessus de la queue tirent un peu plus sur le jaune. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont roux: il y a cependant de chaque côté de la tête deux



bandes brunes, qui partent d'au-près de l'origine du bec, dont l'une passe par les yeux, & l'autre au-dessous. Les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos, mais leurs bords tirent un peu plus sur le jaune. Les plumes de l'aile sont d'un brun-olivâtre sombre; & toutes, excepté la plus proche du corps, ont la plus grande partie de leur côté intérieur rousse. La queue est composée de douze plumes; les deux du milieu sont d'un brun-olivâtre sombre: toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & rousses du côté intérieur. Le demi-bec supérieur est noirâtre; l'inférieur est de couleur de chair. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à la Jamaïque.

rostri exortum ortæ, quarum una per oculos, altera infra oculos ducitur. Superiores alarum tectrices sunt dorso concolores; ipsarum tamen margines paulò magis ad flavum inclinant. Remiges sunt obscurè fusco-olivaceæ; omnes tamen, corpori finitimæ exceptæ, sunt in latere interiore maximâ parte rufæ. Duodecim rectricibus cauda conflatur: binæ intermediæ obscurè fusco-olivaceæ: laterales omnes in latere exteriori concolores, in interiore rufæ. Mandibula superior nigricans; inferior carneo colore tincta. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Jamaica*.

#### 76. LE FIGUIER DE PENSILVANIE.

*Ficedula superne saturatè viridi-olivacea, infernè albida, capite, collo inferiore & pectore aurantiis; duplici utrinque taniâ, unâ per oculos, alterâ supra oculos nigrâ; rectricibus superne saturatè viridi-olivaceis, subtus cinereis...*  
**FICEDULA PENSILVANICA.**

Mangeur de vers. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 200. chap. XCV; avec une figure exacte Pl. 305.*

*Les Anglois l'appellent WORM-EATER. Edwards.*

Il est un peu plus gros que le précédent. La tête, la gor-      Præcedentem paululùm crassitie superat. Caput, gut-



tur, collum inferius & pectus sunt eleganter aurantia : qui color est in pectore non-nihil dilutior quàm in reliquis prædictis partibus. In utroque capitis latere binæ extant tæniæ nigræ, prope mandibulæ superioris exortum ortæ, quarum una per oculos, altera supra oculos ducitur : quas binas tænias distinguit fascia flavicans, immediatè supra oculum ducta. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ rectrices sunt saturatè viridi-olivaceæ. Venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices candicant. Pennæ alas subtus obtegentes ex albo flavicant. Alarum remiges sunt superne saturatè viridi-olivaceæ, subtus cinereæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Mandibula superior fusca ; inferior carneo colore imbuta. Pedes sunt quoque carneo colore tincti. Habitat in *Pensylvania*.

ge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un bel orangé : cette couleur est un peu plus claire sur la poitrine qu'ailleurs. De chaque côté de la tête sont deux bandes noires, qui partent d'auprès de l'origine du demi-bec supérieur, dont l'une passe par les yeux, & l'autre au-dessus : ces deux bandes sont séparées par une bande jaunâtre, qui passe immédiatement au-dessus de l'œil. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un verd-d'olive foncé. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un blanc-jaunâtre. Les plumes de l'aîle sont d'un verd-d'olive foncé en-dessus, & cendrées en-dessous. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aîle. Le demi-bec supérieur est brun ; & l'inférieur est de couleur de chair. Les pieds sont de cette dernière couleur. On le trouve en *Pensylvanie*.



## 77. LE FIGUIER A GORGE NOIRE DE PENSILVANIE.

*Ficedula superne viridi-olivacea, infernè alba; genis, collo ad latera & pectore supremo luteis; gutture & collo inferiore nigris; lateribus nigro variegatis; taniâ duplici transversâ in alis candidâ; rectricibus saturatè cinereis, tribus utrinque extimis interiùs albo maculatis . . . FICEDULA PENSILVANICA GUTTURE NIGRO.*

Moucheroles verte à gorge noire. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 190: chap. XC; avec une figure exacte Pl. 300.*

*Les Anglois l'appellent BLACK-THROATED GREEN FLY-CATCHER: Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur du *Becfigue*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-d'olive. Les côtés de la tête ou les joues, & les côtés du col sont d'un beau jaune. La gorge & la partie inférieure du col sont noires. Le haut de la poitrine est jaune. Le reste de la poitrine & le ventre sont blancs. Les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont de la même couleur. Les côtés sont variés de blanc & de noir. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un verd-d'olive : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont

Magnitudine & crassitie cum *Ficedula* circiter convenit. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices viridi-olivaceo tinguntur. Caput ad latera sive genas, collumque ad latera tingit color eleganter luteus. Guttur & collum inferius nigra sunt. Pectus supremum luteum. Reliquum pectus & venter albescent. Crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes pariter albicant. Latera albo & nigro variegantur. Superiores alarum tectrices minimæ sunt viridi-olivaceæ : mediæ, sicut & majores corpori viciniore, saturatè cinereæ, apicibus candidis præditæ, quibus fit in utraque



utraque ala duplex tænia transversa concolor : majores à corpore remotiores penitus saturatè cinereæ. Omnes alarum remiges tingit color similiter saturatè cinereus, sed albo interiùs marginantur; corpori viciniores sunt quoque exteriùs & in apice candicante fimbriatæ. Cauda duodecim constat rectricibus saturatè cinereis : tres tamen utrinque extimæ ad marginem interiorem albo maculantur. Rostrum nigrum. Pedes fusci. Habitat in *Pensylvania*.

d'un cendré foncé, & terminées de blanc; ce qui forme sur chaque aîle deux bandes transversales de cette couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont entièrement d'un cendré foncé. Toutes les plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur, & bordées intérieurement de blanc; les plus proches du corps sont aussi bordées de blanchâtre extérieurement & par le bout. La queue est composée de douze plumes d'un cendré - foncé : les trois plus extérieures de chaque côté sont tachetées de blanc sur le bord intérieur. Le bec est noir. Les pieds sont bruns. On le trouve en *Pensylvanie*.

#### 78. LE FIGUIER A TESTE JAUNE DE PENNSYLVANIE.

*Ficedula superne viridi-olivacea, (nigricante maculata mas);* infernè alba; vertice luteo; fasciâ utrinque infra oculos nigra; (capite posteriore nigro *mas*); tæniâ duplici transversâ in alis albidâ; lateribus saturatè rubris; rectricibus nigricantibus, utrinque extimâ interiùs albo maculatâ . . .  
FICEDULA PENNSYLVANICA ICTEROCEPHALOS.

Moucherole à gorge rouge. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 193. chap. XCI; avec des figures assez exactes du mâle & de la femelle Pl. 301. Les Anglois l'appellent RED-THROATED FLY-CATCHER. Edwards.*

Magnitudine & crassitie cum præcedente circiter convenit. Capitis verticem tingit color luteus. Caput posterius nigrum est. Pars  
*Suppl.*

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur du précédent. Le sommet de la tête est jaune. Le derriere de la tête est noir. La partie supérieure du



col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-d'olive, varié de taches noirâtres, qui occupent le milieu de chaque plume. Les côtés de la tête, la gorge, le bas de la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un beau blanc. De chaque côté de la tête est une bande noire, qui part d'auprès de l'origine du bec, & passe par-dessous les yeux. Le haut de la poitrine est d'un rouge foncé : cette couleur s'étend sur les côtés. Les plus petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus éloignées du corps, sont noirâtres : les moyennes, & les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes du dos, & terminées de blanchâtre ; ce qui forme sur chaque aile deux bandes transversales de cette couleur. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres en-dessus, & cendrées en-dessous : les moyennes sont de la même couleur, & bordées de verd-d'olive extérieurement & par le bout. La queue est composée de douze plumes noirâtres :

colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt viridi-olivaceæ, nigricantibus variegatæ maculis, cujuslibet pennæ medium occupantibus. Caput ad latera, guttur, pectus infimum, venter, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obregentes eleganter albescent. In utroque capitis latere fascia extat nigra, prope rostri exitum orta, infra oculos protensa. Summum pectus est saturatè rubrum : qui color supra latera extenditur. Superiores alarum rectrices minimæ, sicut & majores à corpore remotiores, sunt nigricantes : mediæ, majoresque corpori finitimæ pennis dorsum vestientibus concolores, apicibus albidis præditæ, quibus fit in utraque ala duplex tænia transversa concolor. Remiges alarum majores superne nigricantes, subtus cinereæ : minores concolores, sed viridi-olivaceo exteriùs & in apice marginatæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus nigricantibus, quarum utrinque extrema in latere interiore albo maculata. Rostrum, pe-



des ; unguisque nigri. la plus extérieure de chaque côté est tachetée de blanc sur son côté intérieur. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs.

*Fœmina à mare* discrepat capite posteriore nequaquam nigro , dorso nullomodo nigricante maculato , & lateribus non multum rubris. In reliquis cum illo perfectè convenit.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de noir sur le derrière de la tête , qu'elle n'est point tachetée de noirâtre sur le dos , & qu'elle a fort peu de rouge sur les côtés. Du reste elle lui ressemble parfaitement.

Habitant in *Pensylvania*.

On les trouve en *Pensylvanie*.

### 79. LE FIGUIER CENDRÉ DE PENSILVANIE.

*Ficedula superne cinereo-cœrulea , infernè alba ; ( tæniâ utrinque supra oculos nigrâ mas ) ; palpebris candidis ; rectricibus octo intermediis cinereo - cœruleis ( mas ) cinereofuscis ( fœmina ) , binis utrinque extimis candidis , proximè sequenti apice albâ . . . . FICEDULA PENSILVANICA CINEREA.*

Petite Moucherole gris de fer. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 194; chap. XCII; avec des figures exactes du mâle & de la femelle Pl. 302.*  
Les Anglois l'appellent *LITTLE BLUE-GREY FLY-CATCHER. Edwards.*

Præcedenti nonnihîl crassitie cedit ; sed caudâ donatur , servatâ proportionè , magis elongatâ. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , superioresque caudæ rectrices sunt cinereo - cœruleæ. Palpebræ candidæ. In utroque capitis latere tænia extat nigra , ab exortu rostri orta , supra oculos ducta ,

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le précédent ; mais il a la queue proportionnellement plus allongée. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-bleu. Les paupières sont blanches. De chaque côté de la tête est une bande noire , qui part de l'origine du bec , passe



par-dessus les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous des ailes sont blanchâtres. Celles du dessus sont d'un cendré-brun. Toutes les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur en-dessus, cendrées en-dessous, & bordées intérieurement de blanchâtre : les plus proches du corps sont aussi bordées de la même couleur extérieurement & par le bout. La queue est composée de douze plumes : les huit du milieu sont d'un cendré-bleu ; la plus extérieure de celles-là est terminée de blanc : les deux plus extérieures de chaque côté sont entièrement blanches. Le bec est noir, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est rougeâtre. Les pieds & les ongles sont noirs.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de bande noire au-dessus des yeux, & que les huit plumes du milieu de sa queue sont d'un cendré-brun. Du reste elle lui ressemble parfaitement.

On les trouve en *Pensylvanie*.

& versus occipitium usque protensa. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices albicant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt candicantes. Superiores alarum rectrices cinereo-fuscæ. Omnes alarum remiges sunt quoque superne cinereo-fuscæ, subtus cineræ, candicante interiori marginatæ : corpori viciniores albedo similiter exteriori & in apice fimbriantur. Duodecim rectricibus cauda conflatur : octo intermediæ cinereo-cœuleæ ; ex illis autem utrinque extrema est apice alba : binæ utrinque extremæ penitus candidæ. Rostrum nigrum, excepto mandibulæ inferioris exortu rubescente. Pedes, unguesque nigri.

*Fœmina à mare discrepat in eo quod taniâ nigrâ supra oculos careat, & octo rectrices intermediæ sint cinereo-fuscæ. In reliquis cum illo perfectè convenit.*

*Habitant in Pensylvania,*



## 80. LE FIGUIER CENDRÉ A GORGE NOIRE DE PENSILVANIE.

*Ficedula superne cinereo-cœrulescens, infernè alba; vertice & macula in alis luteis; fascia per oculos, gutture & collo inferiore nigris; rectricibus cinereis, utrinque extimâ interiorius albo maculatâ . . . . FICEDULA PENSILVANICA CINEREA GUTTURE NIGRO.*

Moucherole aux aîles dorées. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 189. chap. LXXXIX; avec une figure exacte Pl. 299.*

*Les Anglois l'appellent GOLDEN-WINGED FLY-CATCHER. Edwards.*

*Craffitie præcedentem paululum antecellit. Capitis verticem tingit splendidus color luteus. Caput posterius, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices ex cinereo cœrulescunt. Caput ad latera albicat, & latâ insignitur fasciâ nigrâ, ab oris angulis ortâ, & per oculos ductâ. Guttur & collum inferius nigro imbuuntur colore. Pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescent. Superiores alarum rectrices minimæ sunt cinereo-cœrulescentes: mediæ concolores, sed apicibus luteis præditæ: majores corpori viciniore penitus luteæ; unde fit in utraque ala majuscula macula concolor: majores tandem à corpore*

*Il est un peu plus gros que le précédent. Le sommet de la tête est d'un jaune brillant. La partie postérieure de la tête, le dessus du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-bleuâtre. Les côtés de la tête sont blancs, & marqués d'une large bande noire, qui part des coins de la bouche, & passe par les yeux. La gorge & la partie inférieure du col sont noires. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont d'un cendré-bleuâtre: les moyennes sont de la même couleur, & terminées de jaune: les grandes les plus proches du corps sont entièrement jaunes; ce qui forme sur chaque*



aîle une grande tache de cette couleur : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré foncé. Les plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur en-dessus, d'un cendré plus clair en-dessous, & bordées intérieurement de blanchâtre. La queue est composée de douze plumes d'un cendré foncé en-dessus, & d'un cendré plus clair en-dessous : la plus extérieure de chaque côté est marquée d'une tache blanche sur son côté intérieur. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve en *Pensilvanie*.

remotiores saturatè cinereæ. Alarum remiges superne quoque cinereo saturato imbutæ, subtus dilutiùs cinereæ; candicante interiùs fimbriatæ. Caudam componunt duodecim rectrices superne saturatè cinereæ, subtus cinereo dilutiore tinctæ; utrinque autem extrema maculâ albâ in latere interiøre notatur. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque fusci. Habitat in *Pensilvania*.

#### 81. LE FIGUIER CENDRÉ TACHETÉ DE PENSILVANIE.

*Ficedula superne cinereo-cœrulea (mas) fusco-rufescens (fœmina), maculis nigricantibus variegata, infernè alba, nigricante ad latera maculata; vertice, pectore ad latera & uropygio luteis; (taniâ utrinque per oculos nigrâ; summo pectore nigro, cinereo-cœrulescente vario mas); taniâ duplici transversâ in alis candidâ; rectricibus superne nigricantibus, tribus utrinque extimis interiùs albo maculatis . . . . FICEDULA PENSILVANICA CINEREA NÆVIA.*

Moucherole couronnée d'or. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 187. chap. LXXXVIII; avec des figures exactes du mâle & de la femelle Pl. 298. Les Anglois l'appellent GOLDEN CROWNED FLY-CATCHER. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur de la *Fauvette*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos,

Magnitudine & crassitie *Currucam* circiter æmulatur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, pennæ sca-



pulares , superioresque caudæ rectrices sunt cinereo-cœruleæ , nigricantibus variegatæ maculis , uniuscujusque pennæ medium occupantibus. Capitis verticem tingit tamen color eleganter luteus. Uropygium eodem imbuatur colore. Caput ad latera & guttur albicans ; attamen in utroque capitis latere lata extat tænia nigra , prope rostri exortum orta , & per oculos ducta. Collum inferius & summum pectus nigra sunt , cinereo-cœrulescente varia. Pectus ad latera luteum , maculis nigricantibus variegatum. Reliquum pectus , venter , latera , crura , inferioresque caudæ rectrices albescent : latera autem maculis quibusdam nigricantibus insigniuntur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt griseæ. Superiores alarum rectrices nigricantes ; mediæ tamen , sicut & majores corpori finitimæ , apicibus candidis præditæ , quibus fit in utraque ala duplex tænia transversa concolor. Alarum remiges superne nigricantes , exterius griseo fimbriatæ , subtus penitus griseæ. Caudam componunt duodecim rectrices superne nigricantes , inferne griseæ ,

les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-bleu , varié de taches noirâtres , qui occupent le milieu de chaque plume. Le sommet de la tête est cependant d'un beau jaune. Le croupion est de la même couleur. Les côtés de la tête & la gorge sont blancs ; mais il y a de chaque côté de la tête une large bande noire , qui part d'auprès de l'origine du bec , & passe par les yeux. La partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont d'un noir varié de cendré-bleuâtre. Les côtés de la poitrine sont jaunes , & variés de taches noirâtres. Le reste de la poitrine , le ventre , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs : ces derniers sont marqués aussi de quelques taches noirâtres. Les couvertures du dessous des ailes sont grises. Celles du dessus sont noirâtres ; mais les moyennes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aile deux bandes transversales de cette couleur. Les plumes de l'aile sont en-dessus noirâtres & bordées extérieurement de gris ; & en-dessous elles sont entièrement grises. La queue est composée de



douze plumes noirâtres en-dessus, & grises en-dessous : les trois plus extérieures de chaque côté sont marquées chacune d'une tache blanche sur leur côté intérieur. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est d'un brun-roussâtre où le mâle est d'un cendré-bleu. Elle n'a point de bande noire qui passe par les yeux, ni de noir sur la poitrine. Du reste elle lui ressemble parfaitement.

On les trouve en *Pensylvanie*.

quarum tres utrinque extremæ maculæ albæ in latere interiore notantur. Rostrum, pedes, unguisque nigricant,

*Fœmina à mare differt in eo quod fusco-rufescente tingatur iis in locis in quibus mas est cinereo-coeruleus. Tæniâ nigrâ per oculos ductâ caret; & nigro in pectore nullo modo notatur. In reliquis cum illo perfectè convenit.*

Habitant in *Pensylvania*.

## \*\* 82. LA FAUVETTE GRISE TACHETÉE.

*Voyez Pl. V. Fig. 2.*

*Ficedula superne griseo-olivacea, mediis pennarum obscurè fuscis, infernè fulvescens; oculorum ambitu, gutture & medio ventre candicantibus; lateribus dorso concoloribus; rectricibus superne fusco-fulvescentibus, infernè cinereis . . . CURRUCA GRISEA NÆVIA.*

Elle est à peu près de la grosseur du *Becfigue*; mais elle a le corps plus allongé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins

Cum *Ficedula* crassitie circiter convenit; sed corpore magis elongato donatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quinque pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & lineas binas. Rostrum



trūm ab ipsius apice ad oris angulos usque septem lineas longum est; cauda duos pollices cum quatuor lineis; pes novem cum semī lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem lateralium longitudinem paululū antecellit. Alis expansis, extremitates majorum remigum septem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium & latera vestiunt pennæ in medio obscurè fuscæ, ad margines griseo-olivaceæ. Scapulares, superioresque caudæ tectrices concolores. Oculorum ambitus & guttur candicant. Pars colli inferior, pectus, venter, crura, inferioresque alarum tectrices fulvescunt: medius tamen venter candicat; & colli inferioris pars infima minutis quibusdam maculis fuscis insignitur. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt in exortu griseo-fulvæ, in extremitate albidæ, & in ipsarum medio lineâ obscurè fuscâ, secundum ipsarum scapi longitu-

*Suppl.*

de la bouche a sept lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; son pied neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Elle a sept pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les cotés sont couverts de plumes d'un brun obscur dans leur milieu, & d'un gris-olivâtre sur leurs bords. Les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Le tour des yeux & la gorge sont blanchâtres. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes & les couvertures du dessous des aîles tirent sur le fauve: le milieu du ventre est cependant blanchâtre; & le bas de la partie inférieure du col est marqué de quelques petites taches brunes. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-fauve à leur origine, blanchâtres à leur extrémité, & marquées dans leur milieu d'une ligne d'un brun obscur, qui

P



s'étend selon la longueur de leur tige. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes sont d'un brun obscur, & bordées de gris-fauve. Toutes les plumes de l'aile sont d'un brun clair en-dessus, & cendrées en-dessous ; les grandes sont bordées extérieurement de gris, & les moyennes de gris-fauve. La première des plumes de l'aile est extrêmement courte ; la troisième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un brun tirant sur le fauve en-dessus, & cendrées en-dessous. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est gris. Les pieds & les ongles sont de cette dernière couleur. Cette espèce est fort rare. On la trouve en France. Du cabinet de M. Costelle.

dinem protensâ, notatâ. Superiores alarum testrices minores pennis dorsum vestientibus concolores : majores obscurè fuscæ, griseo-fulvo fimbriatæ. Omnes alarum remiges superne dilutè fuscæ, subtus cineræ ; majores autem griseo, minores verò griseo-fulvo exteriùs marginantur. Remix prima est valdè brevis ; tertia reliquarum omnium longitudinem excedit. Cauda duodecim constat rectricibus superne fusco-fulvescentibus ; infernè cinereis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm antecellunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Mandibula superior fusca ; inferior grisea. Pedes, unguesque griseo quoque tincti. Rarissima est hæc species. Habitat in Gallia. Ex museo D. Costelle.

## SECTION I.

## SECTION II.

XLI. Le genre de la Mésange.

XLI. Genus *Pari*.

1. LA GROSSE MÉSANGE OU LA CHARBONNIERE.

*Parus capite nigro, temporibus albis, nucha lutea. Parus major. Linr. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 2.*



Fig. 2.



2. Fauvette grise tachetée.









Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Gros-bec bleu d'Amérique.

2. Fauvette grise tachetée.







## 2. LA MÉSANGE BLEUE.

*Parus remigibus cœrulescentibus : primoribus margine exteriori albis, fronte alba, vertice cœruleo. Parus cœruleus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 4.*

## 5. LA MÉSANGE A TESTE NOIRE.

*Parus capite nigro, dorso cinereo, occipite pectoreque albo. Parus ater. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 5.*

## 7. LA MÉSANGE DE MARAIS OU LA NONETTE CENDRÉE.

*Parus capite nigro, temporibus albis, dorso cinereo. Parus palustris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 6.*

## 8. LA MÉSANGE HUPÉE.

*Parus capite cristato. Parus cristatus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 1.*

## 11. LA MÉSANGE DE POLOGNE OU LE RÉMIZ.

*Motacilla capite ferrugineo, macula nigra oculari, remigibus rectricibusque fuscis margine utroque ferrugineis. Pendulinus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 33.*

## 12. LA MÉSANGE BARBUE OU LE MOUSTACHE.

*Parus vertice cano, cauda corpore longiore. Parus Biarmicus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 8.*

## 13. LA MÉSANGE A LONGUE QUEUE.

*Parus vertice albo, cauda corpore longiore. Parus caudatus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 7.*

## 17. LE POUL OU SOUCI OU LE ROITELET HUPÉ.

*Motacilla remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis. Regulus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 30.*



## ORDRE XI.

## ORDO XI.

XLII. *Le genre du Torche-pot.*XLII. *Genus Sitta.*

## 1. LE TORCHEPOT.

*Sitta rectricibus nigris : lateralibus quatuor infra apicem albis. Sitta Europæa. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 55. sp. 1.*

## 4. LE TORCHEPOT DE LA CAROLINE.

*Sitta rectricibus nigris : lateralibus quatuor infra apicem albis. Sitta capite nigro. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 55. sp. 1. var. 1.*

## 5. LE PETIT TORCHEPOT DE LA CAROLINE.

*Sitta rectricibus nigris : lateralibus quatuor infra apicem albis. Sitta capite fusco. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 55. sp. 1. var. 2.*

## ORDRE XII.

## ORDO XII.

## SECTION I.

## SECTIO I.

XLIII. *Le Genre du Grimpereau.*XLIII. *Genus Certhiæ.*

## 1. LE GRIMPEREAU.

*Certhia supra grisea, subtus alba, remigibus fuscis : decem macula alba. Certhia familiaris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 59. sp. 1.*

## 9. LE GRIMPEREAU DES INDES.

*Certhia supra grisea, subtus alba, rectricibus fuscis : extimis apice albis. Certhia pusilla. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 59. sp. 2.*

## 12. LE GRIMPEREAU BLEU DE CAYENNE.

*Certhia cœrulea, remigibus rectricibusque nigris. Certhia cœrulea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 59. sp. 3.*



## 13. LE GRIMPEREAU BLEU DU BRÉSIL.

Grimpereau noir & bleu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 114. chap. LIV; avec une figure exacte Pl. 264.*

*Les Anglois l'appellent BLACK AND BLUE CREEPER. Edwards.*

## 14. LE GRIMPEREAU VERD DU BRÉSIL.

*Motacilla viridis, remigibus primoribus nigricantibus. Muscicapa viridis capite cœruleo. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 27. var. 1.*

## 15. LE GRIMPEREAU VERD A TESTE NOIRE DU BRÉSIL.

*Motacilla viridis, remigibus primoribus nigricantibus. Spiza. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 99. sp. 27.*

## 20. LE GRIMPEREAU A COLLIER DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Grimpereau pourpre des Indes. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 116. chap. LV; avec des figures assez exactes du mâle & de la femelle Pl. 265. Les Anglois l'appellent PURPLE INDIAN CREEPER. Edwards.*

*Fœmina à mare discrepat*  
universo corpore inferiore  
corpori superiori concolore;  
maculis tantummodo luteis  
ad latera donatur.

*La femelle diffère du mâle*  
en ce que tout le dessous du  
corps est de la même couleur  
que le dessus, ayant seulement  
les taches jaunes sur les côtés.

## 31. LE GRIMPEREAU DE BENGALÉ.

*Certhia nigro-cœrulescens, subtus alba, vertice, cervice, dorso, uropygioque rubris. Certhia cruentata. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 59. sp. 4.*

## 33. LE GRIMPEREAU OU SUCRIER DE LA JAMAÏQUE.

*Certhia superne nigra, internè lutea; tæniâ supra oculos candidâ; gutture & collo inferiore nigris; uropygio luteo; imo ventre pallidè luteo; remigibus majoribus in exortu candidis; rectricibus nigris, lateralibus apice albis . . .*  
*CERTHIA SIVE SACCHARIVORA JAMAÏCENSIS.*



*Certhia nigra*, uropygio pectoreque luteo, superciliis, macula alarum rectricumque apicibus albis. *Certhia flaveola*. Linn. *Systh. Nat.* ed. 10. *Gen.* 59. *sp.* 5.

Grimpereau noir & jaune. *Edwards. Tom. III. pag. CXXII ; avec une figure exacte Pl. 122.*

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur du *Grimpereau de la Martinique* ou *Sucrier*. La tête, la gorge, le col, le dos, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un beau noir. De chaque côté de la tête est cependant une bande blanche, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe au-dessus des yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La poitrine, le haut du ventre, les côtés, le bord des ailes & le croupion sont d'un très-beau jaune. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune pâle. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les grandes plumes de l'aile sont de la même couleur à leur origine, & noires vers leur extrémité : les moyennes sont entièrement noires. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noires : toutes les latérales sont de la même couleur, & terminées de blanc. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à la *Jamaïque*.

Magnitudine & crassitie *Certhiam Martinicanam* sive *Saccharivoram* circiter æmuletur. Caput, guttur, collum, dorsum, scapulares pennas, alas superne ventientes, superioresque caudæ rectrices tingit color splendide niger. In utroque tamen capitis latere tænia extat candida, prope rostri exortum orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Pectus, venter supremus, latera, margines alarum & uropygium elegantissimo tinguntur luteo. Venter imus, crura, inferioresque caudæ rectrices luteo pallido imbuuntur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt candidæ. Remiges alarum majores in ipsarum exortu concolores, versùs ipsarum extremitatem nigræ : minores penitus nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae nigræ : laterales omnes concolores, sed apicibus albis præditæ. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Jamaica*.



XLIV. *Genus Polytmi.*XLIV. *Le Genre du Colibry.*

## 7. LE COLIBRY DU MEXIQUE.

*Trochilus curvirostris rectricibus æqualibus supra nigris, corpore supra viridi, pectore cœruleo, abdomine nigro. Trochilus holosericeus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 9.*

## 8. LE COLIBRY DE LA JAMAÏQUE.

*Trochilus rectricibus subæqualibus ferrugineis, corpore testaceo, abdomine atro. Mango. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 16.*

## 11. LE COLIBRY VIOLET DE CAYENNE.

*Colibri gorge rouge. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 118. chap. LVI; avec une figure passable Pl. 266.*

*Les Anglois l'appellent RED-BREASTED HUMMING BIRD. Edwards.*

## 15. LE COLIBRY ROUGE A LONGUE QUEUE DE SURINAM.

*Trochilus curvirostris, rectricibus intermediis longissimis, corpore rubro, capite fusco, gula aurata uropygioque viridi. Pella. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 3.*

## 16. LE COLIBRY ROUGE HUPÉ A LONGUE QUEUE DU MEXIQUE.

*Trochilus curvirostris ruber, alis cœruleis, capite cristato, rectricibus duabus longissimis. Trochilus Paradiseus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 1.*

## SECTIO II.

## SECTION II.

XLV. *Genus Mellisugæ.*XLV. *Le genre de l'Oiseau-mouche.*

## 1. L'OISEAU-MOUCHE.

*Trochilus rectricibus lateralibus margine exteriori albis, corpore fusco nitente, subtus albido. Trochilus minimus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 18.*

## 4. L'OISEAU-MOUCHE DE SURINAM.

*Trochilus rectricibus lateralibus violaceis, corpore testaceo-fusco sub-*



maculato. *Trochilus ruber*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 15.*

### 5. L'OISEAU-MOUCHE DE S. DOMINGUE.

*Trochilus rectricibus ferrugineis, remigibus nigris, corpore aureo sub-  
tus albicante. Trochilus Surinamentis. Linn. Systh. Nat. ed. 10.  
Gen. 60. sp. 12.*

### 6. L'OISEAU-MOUCHE DE CAYENNE.

*Trochilus rectricibus subæqualibus, corpore nigro subtus aurato, ano  
albo. Trochilus niger. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 13.*

### 10. L'OISEAU-MOUCHE A POITRINE BLEUE DE SURINAM.

*Colibri gorge verte. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 118. chap. LVI;  
avec une figure assez exacte Pl. 266. (c'est un jeune).  
Les Anglois l'appellent GREEN-THROATED HUMMING BIRD. Edwards.*

### 11. L'OISEAU-MOUCHE A COLLIER DE SURINAM.

*Trochilus rectirostris, rectricibus nigris : lateralibus albis, capite  
cœruleo, dorso viridi abdomine albo. Trochilus mellivorus. Linn.  
Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 14.*

### 12. L'OISEAU-MOUCHE HUPÉ.

*Trochilus rectirostris viridis, alis fuscis, abdomine cinereo, crista  
cœrulescente. Trochilus cristatus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60.  
sp. 17.*

### 13. L'OISEAU-MOUCHE A GORGE ROUGE DE LA CAROLINE.

*Trochilus rectricibus nigris : lateralibus tribus apice albis, gula rubra:  
Colubris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 6.*

*Trochilus rectricibus subæqualibus basi ferrugineis apice albis, corpore  
supra fusco subtus albo. Tomineo. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60.  
sp. 11. (fœmina).*

### 18. L'OISEAU-MOUCHE A QUEUE FOURCHUE DE LA JAMAÏQUE.

*Trochilus curvirostris, rectricibus lateralibus longissimis, corpore  
viridi pileo rectricibusque cœruleis. Trochilus forficatus. Linn. Systh.  
Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 5.*

### 19. L'OISEAU-



19. L'OISEAU-MOUCHE A TESTE NOIRE ET QUEUE FOURCHUE  
DE LA JAMAÏQUE.

*Trochilus curvirostris*, rectricibus lateralibus longissimis, corpore virescente, pileo rectricibusque fuscis. *Polytmus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 60. sp. 4.*

## ORDO XIII.

## ORDRE XIII.

## SECTIO I.

## SECTION I.

XLVI. *Genus Torquilla.*

XLVI. *Le Genre du Torcol.*

## 1. LE TORCOL.

*Tynx*. *Torquilla*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 53. sp. 1.*

XLVII. *Genus Pici.*

XLVII. *Le genre du Pic.*

## 1. LE PIC VERD.

*Picus viridis*, vertice coccineo. *Picus viridis*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 7.*

## 2. LE PIC VERD DE BENGALÉ.

*Picus viridis*, occipite rubro, nucha nigra, subtus anticeque albus nigro maculatus. *Picus Benghalensis*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 8.*

## 6. LE PIC NOIR.

*Picus niger*, pileo coccineo. *Picus Martius*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 1.*

## 7. LE PIC NOIR DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

*Picus niger*, occipite coccineo, humeris albido punctatis. *Picus Hirundinaceus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 4.*

## 9. LE PIC NOIR HUPÉ DE LA CAROLINE.

*Picus niger*, crista coccinea, linea utrinque collari remigibusque  
*Suppl.* Q



cundariis albis. Picus principalis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 2.*

### 10. LE PIC NOIR HUPÉ DE VIRGINIE.

Picus niger, capite cristato rubro, temporibus alisque albis maculis.  
Picus pileatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 3.*

### 13. LE GRAND PIC VARIÉ.

Picus albo nigroque varius, ano occipiteque rubro. Picus major. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 10.*

### 14. LE PIC VARIÉ.

Picus albo nigroque varius, ano verticeque rubris. Picus medius. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 11.*

### 15. LE PETIT PIC VARIÉ.

Picus albo nigroque varius, vertice rubro, ano albedo. Picus minor.  
*Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 12.*

### 19. LE PIC A TESTE ROUGE DE VIRGINIE.

Picus capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomine albo. Picus erythrocephalus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 5.*

### 20. LE PIC VARIÉ DE CAYENNE.

Picus albo nigroque varius, pedibus tridactylis. Picus tridactylus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 13.*

### 23. LE PIC VARIÉ DE LA JAMAÏQUE.

Picus pileo nuchaque rubris, dorso fasciis nigris, rectricibus mediis albis nigro punctatis. Picus Carolinus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 54. sp. 6.*

### 28. LE PIC RAYÉ DE CANADA.

Cuculus cauda subforcipata, gula pectoreque nigris, nucha rubra.  
Cuculus auratus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 52. sp. 8.*



## SECTIO II.

## SECTION II.

XLVIII. *Genus Galbula.*XLVIII. *Le genre du Jacamar.*

## 2. LE JACAMAR A LONGUE QUEUE.

*Alcedo rectricibus duabus longissimis, corpore nigro-cœrulescente, alis virefcentibus. Dea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 56. sp. 7.*

## SECTIO III.

## SECTION III.

L. *Genus Cuculi.*L. *Le genre du Coucou.*

## 1. LE COUCOU.

*Cuculus cauda æquali nigricante albo punctata. Cuculus canorus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 52. sp. 1.*

## 3. LE COUCOU DE LA CAROLINE.

*Cuculus cauda cuneiformi, corpore supra cinereo: subtus albo, maxilla inferiore lutea. Cuculus Americanus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 52. sp. 7.*

## 4. LE COUCOU DE LA JAMAÏQUE.

*Cuculus cauda cuneiformi, corpore subfusco: subtus testaceo, ciliis rubris. Vetula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 52. sp. 3.*

## 10. LE COUCOU D'ANDALOUSIE.

*Cuculus cauda cuneiformi, capite subcristato, fascia oculari nigra. Cuculus glandarius. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 52. sp. 4.*

## 13. LE COUCOU TACHETÉ DE BENGALÉ.

*Cuculus cauda cuneiformi, corpore undique griseo fuscoque nebuloso. Cuculus Scolopaceus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 52. sp. 5.*

## 17. LE COUCOU NOIR DE BENGALÉ.

*Cuculus cauda cuneiformi, corpore nigro nitido, rostro flavo. Cuculus niger. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 52. sp. 6.*



## 24. LE COUCOU VERD HUPÉ DE GUINÉE.

Cuculus cauda æquali, capite crista erecta, remigibus primoribus rubris. Persa. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 52. sp. 2.*

## SECTION IV.

## SECTIO IV.

LII. Le genre du Bout-de-Petun.

LII. Genus *Crotophagi.*

## 1. LE BOUT-DE-PETUN.

*Crotophaga. Ani. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 47. sp. 1.*

LIII. Le genre du Perroquet.

LIII. Genus *Psittaci.*

## 2. L'ARA DE LA JAMAÏQUE.

*Psittacus macrourus ruber*, remigibus supra cœruleis, subtus rufis; genis nudis rugosis. Macao. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 1.*

## 4. L'ARA BLEU ET JAUNE DU BRÉSIL.

*Psittacus macrourus supra cœruleus*, genis nudis : lineis plumosis. Ararauna. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 2.*

## 6. L'ARA VERD DU BRÉSIL.

*Psittacus macrourus viridis*, genis nudis, remigibus rectricibusque cœruleis subtus purpurascens. *Psittacus severus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 5.*

## 9. LE KAKATOES A HUPE JAUNE.

*Psittacus brachyurus albus*, crista dependente flava. *Psittacus cristatus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 16.*

## 12. LE KAKATOES A AILES ET QUEUE ROUGES.

*Psittacus brachyurus cinereus*, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis. *Psittacus erythroleucus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 19.*

## 13. LE LORY DE CERAM.

*Psittacus brachyurus coccineus*, alis viridibus nigrisque, rectricibus



flavis medietate postica virescentibus. *Psittacus Auroræ. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 22.*

## 14. LE LORY DES MOLUQUES.

*Psittacus brachyurus ruber*, genibus alisque viridibus, rectricibus medietate postica cœruleis. *Psittacus garrulus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 21.*

## 15. LE LORY DES INDES ORIENTALES.

*Psittacus brachyurus ruber*, pileo fusco, alis viridibus, humeris genibusque cœruleis. *Domicella. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 23.*

## 16. LE LORY DES PHILIPPINES.

*Psittacus brachyurus purpureus*, pileo nigro, alis viridibus, pectore genibus caudaque cœruleis. *Lory. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 24.*

## 23. LE PERROQUET DE CAYENNE.

*Psittacus submacrourus viridis*, rectricibus remigum primorum cœrulescentium fulvis, cauda subtus rubra. *Psittacus agilis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 15.*

## 25. LE PERROQUET A GORGE ROUGE DE LA JAMAÏQUE.

*Psittacus brachyurus viridis*, collo rubente. *Psittacus collarius. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 34.*

## 26. LE PERROQUET DE LA MARTINIQUE.

*Psittacus brachyurus viridis*, remigibus cœruleis fronte alba. *Psittacus leucocephalus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 26.*

## 30. LE PERROQUET A FRONT ROUGE DU BRÉSIL.

*Psittacus brachyurus viridis*, facie rubra, temporibus cœruleis. *Psittacus Brasiliensis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 30.*

## 36. LE PERROQUET AMAZONE DE LA JAMAÏQUE.

*Psittacus macrourus viridis*, genis nudis, humeris coccineis. *Psittacus nobilis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 4.*



## 37. LE PERROQUET AMAZONE VARIÉ.

*Psittacus brachyurus viridis*, fronte cœrulea, humeris sanguineis. *Psittacus æstivus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 27.*

## 40. LE PERROQUET D'AMÉRIQUE.

*Psittacus brachyurus viridis*, fronte remigumque macula coccinea; vertice remigibusque primoribus cœruleis. *Psittacus autumnalis*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 31.*

## 42. LE PERROQUET A POITRINE BLANCHE DU MEXIQUE.

*Psittacus brachyurus viridis subtus luteus*, pileo nigro, pectore albo. *Psittacus melanocephalus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 33.*

## 43. LE PERROQUET VARIÉ DES INDES.

*Psittacus brachyurus viridis*, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo vario, remigibus rectricibusque apice cœruleis. *Psittacus Accipitrinus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 32.*

## 45. LE PERROQUET DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

*Psittacus brachyurus subfuscus*, gula cœrulea, alis caudaque viridibus, rostro anoque rubris. *Psittacus sordidus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 18.*

## 46. LE PERROQUET BLEU DE LA GUIANE.

*Psittacus brachyurus*, capite pectore dorsoque cœruleis, ventre uropygio caudaque viridibus, vertice flavo. *Psittacus cœrulocephalus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 25.*

## 48. LE PERROQUET JAUNE DE CUBA.

*Psittacus brachyurus luteus*, angulo abdominis rectricibusque basi rubris. *Psittacus Paradisi*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 28.*

## 49. LE PERROQUET CENDRÉ DE GUINÉE.

*Psittacus brachyurus canus*, temporibus albis, cauda coccinea. *Psittacus erithacus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 20.*



## 52. LE PERROQUET MASCARIN.

*Psittacus macrourus niger*, genis nudis, vertice cinereo-nigrescente vario cauda cinerea. *Psittacus obscurus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 3.*

## 53. LE PERROQUET NOIR DE MADAGASCAR.

*Psittacus brachyurus niger*. *Psittacus niger*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 17.*

## 54. LA PERRUCHE.

*Psittacus macrourus viridis*, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice cœrulescentibus. *Psittacus rufirostris*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 13.*

## 55. LA PERRUCHE A COLLIER.

*Psittacus macrourus viridis*, collari pectoreque rubro, gula nigra. *Psittacus Alexandri*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 9.*  
*Perroquet à collier*. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 175. chap. LXXXII; avec une figure exacte Pl. 292.*  
*Les Anglois l'appellent RING PARRAKEET. Edwards.*

<p>Illa cujus descriptionem dedit <i>Edwardus</i> ab illa à me descripta differt maculâ in utraque ala rubrâ, &amp; crassitie quâ eam antecellit.</p>	<p>Celle d'<i>Edwards</i> diffère de celle que j'ai décrite, par une tache rouge qu'elle a sur chaque aîle; &amp; parce qu'elle est plus grosse.</p>
---	--

## 62. LA PERRUCHE A FRONT ROUGE DU BRÉSIL.

*Psittacus macrourus viridis*, fronte rubra, occipite remigibusque extimis cœruleis. *Psittacus canicularis*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 11.*

## 67. LA PERRUCHE DE LA CAROLINE.

*Psittacus macrourus viridis*, capite collo genibusque luteis. *Psittacus Carolinensis*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 8.*

## 68. LA PERRUCHE ILLINOISE.

*Psittacus macrourus viridis*, genis fulvis, remigibus rectricibusque



canescentibus. *Psittacus pertinax*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 10.*

### 69. LA PERRUCHE DE LA MARTINIQUE.

*Psittacus macrourus viridis*, vertice remigibusque primoribus cœruleis. *Psittacus æuginosus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 12.*

### 73. LA PERRUCHE VARIÉE DES INDES.

*Psittacus macrourus luteo-viridis*, occipite gula pectoreque rubris, vertice auribusque cœruleis. *Psittacus ornatus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 14.*

### 76. LA PERRUCHE JAUNE D'ANGOLA.

*Psittacus macrourus luteus*, alarum rectricibus viridibus, cauda forficata. *Psittacus solstitialis*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 7.*

### 77. LA PERRUCHE ROUGE DE BORNEO.

*Psittacus macrourus ruber*, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula cœrulea. *Psittacus Borneus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 6.*

### 83. LA PETITE PERRUCHE A CUL BLEU DU BRÉSIL.

*Psittacus brachyurus luteo-virens*, macula alarum alisque subtus cœruleis. *Psittacus Passerinus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 37.*

### 85. LA PETITE PERRUCHE DE GUINÉE.

*Psittacus brachyurus viridis*, fronte rubra, cauda fulva fascia nigra. *Psittacus pullarius*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 35.*

### 86. LA PETITE PERRUCHE DES INDES.

*Psittacus brachyurus viridis*, uropygio pectoreque coccineis, vertice cœruleo. *Galgulus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 44. sp. 36.*

### 87. LA PETITE PERRUCHE DES PHILIPPINES.

Perrique couronnée de Saphir. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 177. chap. LXXXIII; avec une figure exacte du mâle Pl. 293. fig. 1.*

Les Anglois l'appellent SAPPHIRE-CROWNED PARRAKEET. *Edwards.*

Hæc



Hæc ab *Edwardo* descripta ab illa cujus descriptionem dedi, differt in eo quod in syncipite nil rubri habeat; sed in capitis vertice maculâ eleganter cœruleâ insigniatur. Rostrum nigrum est. Pedes, unguisque nigricantes. Habitat in *Sumatra*.

Celle d'*Edwards* diffère de celle que j'ai décrite, en ce qu'elle n'a point de rouge sur le synciput; mais elle a sur le sommet de la tête une tache d'un beau bleu. Son bec est noir. Ses pieds & ses ongles sont noirâtres. On la trouve à *Sumatra*.

## 96. LA PERRUCHE A TESTE BLEUE DES INDES.

*Psittacus minor longicaudus*, viridis, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; capite & gutture cyaneis; maculâ in alis luteâ; rectricibus superne cœruleis, subtus obscurè luteis . . . . *PSITTACA CYANOCEPHALOS INDICA*.

Perroquet à tête bleue. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 175. chap. LXXXII; avec une figure exacte Pl. 292.*

Les Anglois l'appellent BLUE-HEADED PARRAKEET. *Edwards.*

Cum *Columba* crassitie circiter convenit. Caput & guttur tingit elegantissimus cyaneus color. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices viridi imbuuntur satis saturato. Collum inferius, pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obtegentes viridi nonnihil dilutior tinguntur. Rectrices alarum inferiores minores sunt dilutè viridi-cœrulescentes: majores cinereæ. Superiores eodem imbutæ viridi ac dor-

*Suppl.*

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon*. La tête & la gorge sont d'un très-beau bleu. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd assez foncé. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd un peu plus clair. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un verd-bleuâtre clair: les grandes sont cendrées. Celles du dessus sont du

R



même verd que le dos, excepté quelques-unes des moyennes, qui sont jaunes; ce qui forme sur chaque aîle une tache de cette couleur. Toutes les plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous, & vertes en-dessus; mais le bord extérieur des grandes tire un peu sur le bleu. La queue est composée de douze plumes bleues en-dessus, & d'un jaune obscur en-dessous. Les deux du milieu ont jusqu'à treize pouces de long : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont entourés d'une peau nue, de couleur de chair : leur iris est d'un bel orangé. Le bec est rouge. Les pieds & les ongles sont cendrés. On la trouve dans les *Indes*.

sum ipsum tingitur, exceptis tamen mediis quibusdam luteis, quibus fit in utraque alae macula concolor. Omnes alarum remiges subtus cinereae, superne virides; majorum tamen margines exteriores nonnihil ad caeruleum colorem vergunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne caeruleis, subtus obscurè luteis. Binæ intermediæ tredecim pollicum longitudine pollent : laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculos ambit cutis nuda, carneo colore imbuta : ipsorum irides sunt eleganter aurantiæ. Rostrum rubrum. Pedes, unguesque cinerei. Habitat in *India*.

#### 97. LA PETITE PERRUCHE AUX AILES D'OR.

*Psittacus minor brevicaudus, viridis, superne saturatius, infernè dilutius; majoribus alarum rectricibus & remigibus intermediis aurantiis, remigibus quatuor primoribus exteriùs saturatè caeruleis; rectricibus viridibus.... PSITTACULA ALIS DEAURATIS.*

Perruche aux aîles d'or. *Edwards. Glanur, Part. II. pag. 177; avec une figure exacte Pl. 1293; fig. 2.*

Les Anglois l'appellent GOLDEN-WINGED PARRAKEET. *Edwards.*

Elle est un peu plus grosse qu'une *Alouette*. La tête, la Crassitie *Alaudæ* paululum superat. Caput, partem



colli superiorem, dorsum, uropygium, scapulares pennas, superioresque caudæ tectrices tingit color viridis satis saturatus. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obregentes viridi nonnihil dilutiore tinguntur. Tectrices alarum inferiores minores sunt fuscæ: majores obscurè cœruleæ. Superiores minores, sicut & majores corpori viciniore & à corpore remotiores, virides: majores intermediae aurantio colore imbutæ. Remiges quatuor primores superne in latere exteriori saturatè cœruleæ, in interiori & extremitate fuscæ, contra verò subtus exterius fuscæ, interiùs & in extremitate saturatè cœruleæ: quatuor proximè sequentes, à quinta scilicet ad octavam usque inclusivè, superne aurantiæ, infernè luteæ: ex proximè sequentibus quædam quatuor primoribus concolores: corpori tandem viciniore superne virides, subtus saturatè cœruleæ. Duodecim rectricibus viridibus cauda conflatur. Oculos ambit cutis nuda candicans. Rostrum pariter candicat. Pedes, unguesque carneo colore pal-

partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd assez foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd un peu plus clair. Les petites couvertures du dessous des ailes sont brunes: les grandes sont d'un bleu obscur. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches & les plus éloignées du corps, sont vertes: les grandes intermédiaires sont orangées. Les quatre premières plumes de l'aile sont en-dessus d'un bleu foncé du côté extérieur, & brunes du côté intérieur & à leur extrémité; en-dessous au contraire elles sont brunes du côté extérieur, & d'un bleu foncé du côté intérieur & à leur extrémité: les quatre suivantes, savoir depuis la cinquième jusqu'à la huitième inclusivement, sont orangées en-dessus & jaunes en-dessous: quelques-unes des suivantes sont de la même couleur que les quatre premières: enfin les plus proches du corps sont vertes en-dessus, & d'un bleu foncé en-dessous. La queue est composée de douze plumes vertes. Les yeux sont



entourés d'une peau nue & blanchâtre. Le bec est de la même couleur. Les pieds & les ongles sont d'un couleur de chair pâle. *Edwards* croit qu'elle vient des *Indes*. lido imbuti. Secundum *Edwardum*, habitat in *India*.

## SECTION V.

## SECTIO V.

LIV. Le genre du Toucan.

LIV. Genus *Tucanæ*.

## I. LE TOUCAN.

*Ramphastos* rostro rubro : apice nigro : carina compressa. *Ramphastos* picatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 45. sp. 3.*

## 3. LE TOUCAN A GORGE BLANCHE DU BRÉSIL.

*Ramphastos* rostro nigro : maxilla superiore lateribus alba, basi trilobata. *Aracari. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 45. sp. 4.*

## 5. LE TOUCAN A GORGE JAUNE DU BRÉSIL.

*Ramphastos* rostro nigro : carina crassissima. *Ramphastos* piperivorus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 45. sp. 1.*

## 10. LE TOUCAN A COLLIER DE CAYENNE.

*Ramphastos* rostro rubro : carina obtusa alba. *Tucanus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 45. sp. 2.*

## ORDRE XIV.

## ORDO XIV.

## SECTION I.

## SECTIO I.

LV. Le Genre du Coq-de-roche.

LV. Genus *Rupicolæ*.

## I. LE COQ-DE-ROCHE.

*Widdehop. Edwards. Glanur. Part. II. pag. 114. chap. LIV ; avec une figure exacte de la tête & du col Pl. 264.*  
*Les Anglois l'appellent HOOPOE HEN. Edwards.*



LVI. *Genus Manaci.*LVI. *Le genre du Manakin.*

## 3. LE MANAKIN A TESTE BLANCHE.

*Parus ater* : capite supra albo. *Pipra*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 9.*

## 4. LE MANAKIN A TESTE D'OR.

*Parus niger*, capite femoribusque fulvis. *Parus erythrocephalus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 10.*

## 6. LE MANAKIN ROUGE.

*Parus niger*, capite pectoreque coccineis, remigibus antrorsum macula alba. Aureola. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 100. sp. 11.*

Manakin rouge & noir. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 109. chap. LI; avec une figure exacte Pl. 261.*

*Les Anglois l'appellent RED AND BLACK MANAKIN. Edwards.*

## 10. LE MANAKIN NOIR HUPÉ.

Manakin à dos bleu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 109. chap. LI; avec une figure exacte Pl. 261.*

*Les Anglois l'appellent BLUE-BACKED MANAKIN. Edwards.*

## SECTION III.

## SECTION III.

LVIII. *Genus Ispida.*LVIII. *Le genre du Martin-pêcheur.*

## 1. LE MARTIN-PESCHEUR.

*Alcedo brachyura*, supra coerulea, subtrus fulva. *Ispida*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 56. sp. 1.*

## 13. LE MARTIN-PESCHEUR DE SMYRNE.

*Alcedo macroura ferruginea*, alis cauda dorsoque viridibus. *Alcedo Smyrnenfis*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 56. sp. 5.*

## 15. LE MARTIN-PESCHEUR A COLLIER DE BENGALÉ.

*Alcedo brachyura*, dorso coeruleo, abdomine luteo, capite uropygio-  
R iiij



que purpureo, gula nuchaque albis. *Alcedo erithaca*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 56. sp. 2.*

### 21. LE MARTIN-PESCHEUR HUPÉ DE LA CAROLINE.

*Alcedo brachyura nigra*, abdomine albo, pectore ferrugineo. *Alcyon*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 56. sp. 3.*

### 24. LE MARTIN-PESCHEUR BLANC ET NOIR.

*Alcedo macroura fusca albido varia*. *Alcedo rudis*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 56. sp. 6.*

LIX. *Le genre du Todier.*

LIX. *Genus Todi.*

### 1. LE TODIER.

*Alcedo brachyura viridis*, gula sanguinea, abdomine albo. *Todus*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 56. sp. 4.*

### 3. LE TODIER CENDRÉ.

*Todus superne saturatè cinereus*, infernè luteus; syncipite nigro; rectricibus binis intermediis nigricantibus, lateralibus fuscis, apice albis . . . . *TODUS CINEREUS.*

*Moucherolle ardoise & jaune*. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 110. chap. LII; avec une figure exacte Pl. 262.*

*Les Anglois l'appellent GREY AND YELLOW FLY-CATCHER.* *Edwards.*

Il est un peu plus gros que le *Todier*. Le synciput est noir. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue

*Craffitie Todum* nonnihil antecellit. Synciput nigro tingitur colore. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt saturatè cinereæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crura, inferiores caudæ tectrices &



pennas alas subtus obtegentes tingit color eleganter luteus. Superiores alarum rectrices minimæ sunt fusco-nigricantes : mediæ & majores eodem imbutæ colore, sed marginibus luteis præditæ. Omnes alarum remiges subtus cineræ, superne fusco-nigricantes, exterius luteo, interiùs candicante marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ nigricantes : laterales omnes fuscæ, apicibus albis præditæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Mandibulæ superioris basis peninis obsita est rigidis, pili-formibus, antrorsum versis. Rostrum rubescens, exceptâ extremitate nigricante. Pedes carneo colore saturato imbuti. Habitat in *Surina*.

& celles du dessous des ailes sont d'un beau jaune. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un brun-noirâtre : les moyennes & les grandes sont de la même couleur, mais elles sont bordées de jaune. Toutes les plumes de l'aile sont cendrées en-dessous, d'un brun-noirâtre en-dessus, bordées extérieurement de jaune & intérieurement de blanchâtre. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres : toutes les latérales sont brunes, & terminées de blanc. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La base du demi-bec supérieur est garnie de plumes roides, en forme de poils, tournées en-devant. Le bec est rougeâtre, excepté son extrémité, qui est noirâtre. Les pieds sont d'un couleur de chair foncé. On le trouve à *Surinam*.

## SECTION IV.

## SECTION IV.

LX. Genus *Apiastri*.

LX. Le genre du Guépier.

## I. LE GUESPIER.

*Merops* dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi-cœrulescente,



rectricibus duabus longioribus. *Apiaster. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 57. sp. 1.*

### 5. LE GUESPIER DU MEXIQUE.

*Merops rubro flavoque variegatus, subtus flavo-rubescens, rectricibus duabus longissimis rubris. Merops cinereus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 57. sp. 3.*

### 8. LE GUESPIER A COLLIER DE MADAGASCAR.

*Merops dorso ferrugineo, abdomine alisque viridibus, gula caudaque cœruleis. Merops viridis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 57. sp. 2.*

### 9. LE GUESPIER A COLLIER DE BENGAL.

*Merops dorso ferrugineo, abdomine alisque viridibus, gula caudaque cœruleis. Merops viridis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 57. sp. 2.*

## SECTION V.

## SECTIO V.

LXI. *Le genre du Calao.*

LXI. *Genus Hydrocoracis.*

### 1. LE CALAO.

Oiseau peu connu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 150. chap. LXXI; avec une figure passable du bec Pl. 281. fig. C.*

### 2. LE CALAO DES PHILIPPINES.

*Buceros fronte ossea plana antrorsum bicorni. Buceros bicornis. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 46. sp. 1.*

Oiseau peu connu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 150. chap. LXXI; avec une figure peu exacte du bec Pl. 281. fig. D.*

### 4. LE CALAO DES INDES.

*Buceros cornu maxillari frontis recurvato. Rhinoceros. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 46. sp. 2.*

Oiseau peu connu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 150. chap. LXXI; avec une figure exacte du bec Pl. 281. fig. B.*

ORDO



## ORDO XV.

## ORDRE XV.

## SECTIO III.

## SECTION III.

LXV. *Genus Raphi.*LXV. *Le genre du Dronte.*

## I. LE DRONTE.

Dodo. Edwards. *Glanur. Part. II. pag. 179. chap. LXXXIV; avec une figure exacte Pl. 294.*

*Les Anglois l'appellent DODO. Edwards.*

## ORDO XVI.

## ORDRE XVI.

## SECTIO III.

## SECTION III.

LXIX. *Genus Pluvialis.*LXIX. *Le genre du Pluvier.*

## 14. LE PLUVIER HUPÉ DE PERSE.

Pluvier à ailes éperonnées. Edwards. *Glanur. Part. II. pag. 146. chap. LXX; avec une figure exacte de la femelle Pl. 280.*

*Les Anglois l'appellent SPUR-WINGED PLOVER. Edwards.*

Hæc ab *Edwardo* descripta hujus speciei est *fœmina*. A *marè* discrepat universo collo candido, nigro colore guttur tingente pectoris nigredini nequaquam coadunato, colore nigro altero colore nullomodo adumbrato, & caudæ rectrice utrinque extimâ albo terminatâ.

In hac specie, supra cuiuslibet alæ partem supremam, scilicet versùs articulum carpo humano respon-

*Suppl.*

Ce dernier d'*Edwards* est la femelle de cette espece. Elle diffère du mâle en ce que tout son col est blanc, que le noir de la gorge ne se réunit pas à celui de la poitrine, que sa couleur noire n'est nuancée d'aucune autre couleur, & que la plume de sa queue la plus extérieure de chaque côté est terminée de blanc.

Dans cette espece, sur le haut de chaque aile, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est un éperon fort

S



pointu, d'une substance semblable à de la corne. *Edwards* a négligé de l'observer dans la figure qu'il a donnée du mâle *Tom. I. Pl. 47.*

dentem, calcar extat acutissimum, substantiâ cornu æmulâ conflatum. Illud non indicavit *Edwards* in icone *maris* ab ipso depicta *Vol. I. Tab. 47.*

## ORDRE XVII.

## SECTION IV.

LXXIV. *Le Genre du Râle.*

## 9. LE RÂLE DE PENSILVANIE.

Rallus superne nigricans, marginibus pennarum rufescentibus, infernè obscurè fulvus; genis cinereis; taniâ utrinque supra oculos, summo gutture & marginibus alarum candidis; maculâ in alis castaneâ; lateribus & imo ventre saturatè fuscis, albo transversim striatis; rectricibus nigricantibus, rufescente terminatis. . . . RALLUS PENSILVANICUS.

Râle d'eau d'Amérique. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 144. chap. LXIX; avec une figure exacte Pl. 279.*

*Les Anglois l'appellent AMERICAN WATER-RAIL. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur de notre *Râle d'eau*. Le dessus de la tête est noirâtre. Les joues sont cendrées. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend au-dessus des yeux. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & roussâtres sur leurs bords. Les scapulaires & les couvertures du

Magnitudine & crassitie *Rallum aquaticum nostratem* circiter æmulatur. Caput superius nigricat. Genæ sunt cinereæ. In utroque capitis latere tania extat candida, prope rostri exortum orta, supra oculos protensa. Partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufescentes. Scapulares, superioresque caudæ tectrices concolores. Sum-



mum guttur albicat. Reliquum guttur, partem colli inferiorem, pectus & ventrem supremum tingit color obscurè fulvus. Venter imus, crurum suprema pars & latera fusco imbuuntur saturato, & albo transversim striantur. Inferiores caudæ rectrices albo, nigricante & rufescente variegantur. Pennæ alas subtus obtegentes fuscescunt, & albo terminantur. Alarum margines similiter candidæ. Superiores ipsarum rectrices minimæ sunt eleganter castaneæ; unde fit in utraque ala macula concolor: mediæ & majores nigricantes, rufescente fimbriatæ. Remiges alarum minores superne concolores, infernè cinereæ: majores subtus simili cinereo imbutæ, superne verò penitus nigricantes. Cauda duodecim conflatur rectricibus nigricantibus, rufescente terminatis. Rostrum fuscum, excepto mandibulæ inferioris exortu rufescente. Pars crurum plumis denudata, pedes & digiti carneo colore saturato imbuti. Habitat in *Pensylvania*.

doigts sont d'un couleur de chair foncé. On le trouve en *Pensylvanie*.

dessus de la queue sont de la même couleur. Le haut de la gorge est blanc. Le reste de la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un fauve obscur. Le bas - ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un brun foncé, rayé transversalement de blanc. Les couvertures du dessous de la queue sont variées de blanc, de noirâtre & de roussâtre. Celles du dessous des ailes sont brunâtres, & terminées de blanc. Le bord de l'aile est de cette dernière couleur. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un beau marron; ce qui forme sur chaque aile une tache de cette couleur: les moyennes & les grandes sont noirâtres, & bordées de roussâtre. Les moyennes plumes de l'aile sont de la même couleur en-dessus, & cendrées en-dessous: les grandes sont pareillement cendrées en-dessous, mais entièrement noirâtres en-dessus. La queue est composée de douze plumes noirâtres, & terminées de roussâtre. Le bec est brun, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est rougeâtre. La partie des jambes qui est dégar- nie de plumes, les pieds & les



## 10. LE RASLE DE LA JAMAÏQUE.

*Rallus superne fusco-rufescens, taniis nigricantibus transversis variegatus, infernè obscurè fuscus, cinereo-albo transversim striatus; capite & gutture nigris; collo inferiore & pectore cinereo-cœrulescentibus; alis maculis rotundis albis aspersis; rectricibus superne fusco-rufescentibus, nigricante transversim striatis, & maculis rotundis albis insignitis . . . RALLUS JAMAÏCENSIS.*

*Fulica minima miscella, fronte plumata, pectore subplumbeo, membrana digitorum angustissima. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 479. Petite Poule d'eau. Edwards. Glanar. Part. II. pag. 142. chap. LXVIII; avec une figure exacte Pl. 278.*

*Les Anglois l'appellent LEAST WATER-HEN. Edwards.*

*Les Habitans de la Jamaïque, BIDY-BIDY. Edwards.*

Il n'est pas si gros que la *Marouïette*. La tête & la gorge sont noires. La partie supérieure du col est d'un brun tirant un peu sur le marron. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-roussâtre, varié de bandes transversales noirâtres. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un cendré-bleuâtre. Le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un brun obscur, rayé transversalement de gris-blanc. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Celles du dessous des ailes sont cendrées, & rayées transversalement de blanc. Le bord de l'aile est de la même couleur. Les couver-

*Maruettæ crassitie cedit. Caput & guttur nigro tinguntur colore. Pars colli superior ex fusco nonnihil ad castaneum vergit. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt fusco-rufescentes, taniis transversis nigricantibus variegatæ. Pars colli inferior & pectus ex cinereo cœrulescunt. Ventrem, crurum partem supremam & latera tingit color obscurè fuscus, cinereo-albo transversim striatus. Inferiores caudæ tectrices sunt candidæ. Pennæ alas subtus obtegentes cinereæ, albo transversim striatæ. Margines alarum concolores. Superiores alarum tectrices eodem im-*



buuntur colore ac dorsum ipsum tingitur, & maculis insuper rotundis albis asperguntur. Omnes alarum remiges sunt subtus cinereæ, superne verò fusco-rufescentes, tæniis transversis nigricantibus insignitæ; minores insuper maculis rotundis albis aspersæ. Cauda duodecim constat rectricibus infernè cinereis, superne fusco-rufescentibus, nigricante transversim striatis, & maculis rotundis albis insuper insignitis. Rostrum nigrum, at tamen in mandibulæ inferioris exortu rubescens. Pars crurum plumis denudata, pedes, digiti, unguisque fusci. Habitat in *Jamaica*.

tures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos, & parsemées de taches rondes blanches. Toutes les plumes de l'aile sont cendrées en-dessous; mais en-dessus elles sont d'un brun-roussâtre, & marquées de bandes transversales noirâtres; les moyennes sont de plus parsemées de taches rondes blanches. La queue est composée de douze plumes cendrées en dessous, d'un brun-roussâtre en-dessus, rayées transversalement de noirâtre, & marquées de plus de taches rondes blanches. Le bec est noir, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds, les doigts & les ongles sont bruns. On le trouve à la *Jamaïque*.

## SECTIO V.

## SECTION V.

LXXVII. *Genus Scolopacis.*LXXVII. *Le genre de la Beccasse.*

\*\* 6. LA BECCASSINE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

*Voyez Pl. VI.*

*Scolopax* superne saturatè cinerea, nigricante transversim striata & violaceo adumbrata, infernè alba; fasciâ longitudinali in capite superiore albo-rufescente maculatâ; oculorum ambitu & taniâ ponè oculos candidis; genis gutture & collo inferiore rufis; taniâ in summo pectore transversâ nigricante; fasciâ utrinque à scapulis versùs uropygium albo-flavicante, maculis nigricantibus utrinque



præditâ; reëtricihus cinereis, nigricante transversim striatis & flavicante maculatis . . . GALLINAGO CAPITIS BONÆ SPEI.

Elle à peu près de la grosseur de notre *Beccassine*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes & demie de long; sa queue un pouce huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur seize lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derrière cinq lignes & demie seulement. Elle a dix-huit pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le dessus de la tête est couvert de plumes d'un cendré foncé, rayé transversalement de noirâtre; il est de plus marqué dans son milieu d'une bande longitudinale, tachetée de blanc-roussâtre, qui part de l'origine du bec, & s'étend jusqu'à l'occiput. Le tour des yeux est blanc. Derrière chacun des yeux est

Cum *Gallinagine nostrate* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices explet, & ad extremos unguës duodecim pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & decem cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem cum octo lineis; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem & octo lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem cum septem lineis, extimus sexdecim lineas, intimus quatuordecim lineas; posticus autem quinque cum semi lineas tantum. Alis expansis, extremitates majorum remigum octodecim pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput superius obtegunt pennæ saturatè cinereæ, nigricante transversim striatæ; caput superius in medio insuper notatur fasciâ longitudinali albo-rufescente maculatâ, ab



exortu rostri ortâ, & ad occipitium usque productâ. Oculorum ambitus candidus. Ponè utrumque oculum lata extat tania concolor, ab oculo ad occipitium usque protensa. Caput ad latera, infra oculos, sive genas, gutturque tingit color dilutè rufus. Collum inferius rufo imbuitur saturatiore : qui color supra latera & partem colli superiorem paululum extenditur. Dorsum & scapulares pennæ sunt saturatè cinereæ, nigricante transversim striatæ : qui colores omnes, secundum quemdam ad lucem aspectum, violaceo adumbrantur : in scapularibus latæ insuper extant taniæ transversæ nigricantes ; & scapulares exteriores aliquâ olivacei tincturâ adumbrantur. Uropygium cooperiunt pennæ eleganter cinereæ, nigricante transversim striatæ. Superiores caudæ tectrices concolores ; sed quibusdam insuper maculis flavicantibus variegatæ. In summo pectore tania extat transversa nigricans, versûs dorsum producta : quam taniam, supra alarum exortum, sequitur altera fascia alba supra dorsum extensa : quæ

une large bande de la même couleur, qui s'étend depuis l'œil jusqu'à l'occiput. Les côtés de la tête, au-dessous des yeux, ou les joues, & la gorge sont d'un roux clair. La partie inférieure du col est d'un roux plus foncé : cette couleur s'étend un peu sur les côtés & même sur le dessus du col. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un cendré foncé, rayé transversalement de noirâtre ; toutes ces couleurs, vues dans un certain jour, sont nuancées de violet : sur les scapulaires sont de plus de larges bandes transversales noirâtres ; & les scapulaires extérieures sont nuancées d'une légère teinte d'olivâtre. Le croupion est couvert de plumes d'un joli cendré, rayé transversalement de noirâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, mais elles sont de plus variées de quelques taches jaunâtres. Sur le haut de la poitrine est une bande transversale noirâtre, qui remonte vers le dos : elle est suivie, au-dessus de l'origine des ailes, d'une autre bande blanche, laquelle s'étend sur le dos : elle devient alors d'un blanc-jaunâtre, est bordée des deux côtés de taches noirâtres, va joindre celle de l'autre côté vers



le croupion, & forme un angle avec elle. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous des ailes sont cendrées, & rayées transversalement de noirâtre : les grandes sont de plus mêlées d'un peu de blanc. Le bord de l'aile est varié de petites taches jaunâtres. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont cendrées à leur origine, olivâtres dans le reste de leur longueur, le tout étant rayé transversalement de noirâtre : il n'y a que leur partie olivâtre qui paroisse ; & les petites sont de plus variées de quelques taches jaunâtres : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré rayé transversalement de noirâtre, & marqué de grandes taches jaunâtres, lesquelles sont rondes sur le côté extérieur de chaque plume, & transversales sur leur côté intérieur : les grandes qui occupent le milieu, sont de la même couleur que ces dernières, mais depuis la moitié de leur longueur jusqu'à leur extrémité elles sont du côté extérieur d'un gris-fauve varié de taches rondes jaunâtres, sur-

novissima fascia tunc ex albo flavicat, maculis nigricantibus utrinque prædita est, alteram ex alio latere prævenientem versus uropygium attingit, & simul cum illa angulum efformat. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores caudæ tectrices alben. Pennæ alas subtus obtegentes sunt cinereæ, nigricante transversim striatæ : majores aliquid insuper albi admixtum habent. Margines alarum variegant minutæ maculæ flavicantes. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ, sicut & majores corpori viciniore, sunt in exortu cinereæ, in reliqua longitudine olivaceæ, & per totam superficiem nigricante transversim striatæ ; pars autem olivacea sola est conspicua ; & minimas insuper variegant maculæ quædam flavicantes : majores à corpore remotiores cinereæ, nigricante transversim striatæ, & majusculis insignitæ maculis flavicantibus, in latere cujuslibet pennæ exteriori rotundis, in interiori verò transversis : majores medium locum obtinentes novissimis istis concolores, attamen ab ipsarum media longitudine versus



versus extremitatem usque sunt in latere exteriori griseo-fulvæ, rotundis variegatæ maculis flavicantibus, & supra unamquamque maculam tænia nigricans extat. Alam componunt viginti quinque remiges, quarum viginti primores sunt in ipsarum exortu, sed exterius tantum, nigre, in reliquis eleganter cinereæ, nigricante transversim striatæ : quos colores omnes variegant majusculæ maculæ flavicantes, in latere cujuslibet remigis exteriori rotundæ, in interiori verò transversæ : quinque corpori viciniore saturatè cinereæ, tæniis striatæ transversis nigricantibus, quibusdam scilicet valdè latis, alteris strictissimis. Quæ quinque novissimè dictæ remiges maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereæ, nigricante transversim striatæ, & quatuor in utroque latere insignitæ maculis flavicantibus, supra quatuor rectrices intermedias transversis, & supra quatuor utrinque extimas subrotundis. Quæ duodecim rectrices omnes æqua-

*Suppl.*

montées chacune par une bande noirâtre. L'aile est composée de vingt - cinq plumes : les vingt premières sont noires à leur origine seulement du côté extérieur ; tout le reste est d'un joli cendré, rayé transversalement de noirâtre : le tout est varié d'assez grandes taches jaunâtres, lesquelles sont rondes sur le côté extérieur de chaque plume, & transversales sur leur côté intérieur : les cinq plus proches du corps sont d'un cendré foncé, rayé de bandes transversales noirâtres, dont quelques-unes sont fort larges, & les autres fort étroites. Ces cinq dernières plumes sont très - longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes cendrées, rayées transversalement de noirâtre, & marquées sur chaque côté de quatre taches jaunâtres, lesquelles sont transversales sur les quatre plumes du milieu, & presque rondes sur les quatre plus extérieures de chaque côté. Ces douze plumes sont toutes d'égale longueur. Le bec est d'un brun-rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve au *Cap de*

T



*Bonne Espérance. Du cabinet* lem obtinent longitudinem.  
*de Madame de Bandeville.* Rostrum ex fusco rubescit:  
 Pars crurum plumis denu-  
 data, pedes, unguesque nigricant. Habitat in *Capite Bonæ*  
*Spei. Ex museo D. de Bandeville.*

*Fin du Supplément.*





*line du cap de Bonne Espérance .*









Dessiné et Gravé par Martinet.

*Beccassine du cap de Bonne Espérance.*







# INDEX ALPHABETICUS.

Nominum in Supplemento contentorum.

*Littera G Genus designat ; Littera V, varietatem ; &  
Littera S, Speciem.*

A.

	G.	S.		G.	S.
<b>A</b> ccipiter Freti Hud- sonis ,	8	37	Alauda rectricibus nigris, &c.	39	8
Acredula ,	40	45	— subtus flava , &c.	22	15
Aigle ,	9	1	— trivialis ,	39	4
— à queue blanche ,	9	5	Albicilla ,	9	5
— à tête blanche ,	9	2	Alcedo brachyura , dorso coeruleo , &c.	58	15
— de mer ,	9	10	— brachyura nigra , &c.	58	21
— doré ,	9	7	— brachyura , supra cœ- rulea , &c.	58	1
— hupé du Brésil ,	9	13	— brachyura viridis , &c.	59	1
— noir ,	9	8	— erithaca ,	58	15
Alario ,	33	17	— macroura ferruginea , &c.	58	13
Alauda Alpestris ,	39	12	— macroura fusca , &c.	58	24
— arborea ,	39	2	— rectricibus duabus lon- gissimis , &c.	48	2
— arvensis ,	39	1	— rudis ,	58	24
— campestris ,	39	5	— Smyrnenfis ,	58	13
— capite vitta annulari alba cincto ,	39	2	Alcyon ,	58	21
— cristata ,	39	8	Alouette ,	39	1
— magna ,	22	15	— de bois ,	39	2
— Pensilvanica ,	39	13	— de buisson ,	39	4
— pratensis ,	39	3	— de champ ,	39	5
— rectricibus dimidio in- feriore albis , &c.	39	12	— de Pensilvanie ,	39	13
— rectricibus extimis duabus extrorsum albis , &c.	39	3	— de prez ,	39	3
— rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter al- bis , &c.	39	1	— de Virginie ,	39	12
— rectricibus fuscis , &c.	39	4	— ( Grosse )	39	6
—	39	5	— hupée ,	39	8
			Aluco ,	12	3
			Amandava ,	33	62
			American Gold-Finch ,	32	3



	G.	S.		G. V. S.
American Water-Rail,	74	9	Bird, ( Red-breasted	
Ani,	52	1	Humming)	44 11
Apiaster,	60	1	— ( Reed- )	35 8
Apus,	30	15	Black and blue Creeper,	43 13
Aquila capite albo,	9	2	— and white Creeper,	40 69
Ara bleu & jaune du Bré-			— and yellow frizled	
fil,	53	4	Sparrow,	33 74
— de la Jamaïque,	53	2	— Bird, ( Red-breasted)	31 29
— verd du Brésil,	53	6	— -throated Green Fly-	
Aracari,	54	3	Catcher,	40 77
Ararauna,	53	4	— Vulture, ( Coped )	10 14
Asio,	11	6	— Vulture, ( Crested )	10 14
Astrild,	33	64	Blue-backed Manakin,	56 10
Atricapilla,	40	6	— grey Fly - Catcher,	
Aura,	10	10	( Little )	40 79
Aureola,	56	6	— headed Parrakeet,	53 96
Autour,	8	3	— Manakin,	40 72
Azulam,	34	19	Bonasia,	5 3
B.			Bondrée,	8 33
	G.	S.	Bout-de-petun,	52 1
B Altimore,	19	19	Bouvreuil,	37 1
Baniahbow,	22	25	— bleu de la Caroline,	37 7
Bartavelle,	6	12	— noir,	37 A. 1
Bec-croisé,	38	1	— noir du Mexique,	37 3
— de cire,	33	64	— violet de Bahama,	37 9
Beccassine du Cap de			Brasilian Sparrow,	33 19
Bonne Espérance,	77	6	Bruant,	35 1
Becfigue,	40	1	Bubo,	11 1
Beco de Prata,	33	74	Buceros bicornis,	61 2
Beiffer, ( Kern- )	34	1	— cornu maxillari fron-	
Bengali,	33	60	tis recurvato,	61 4
— piqueté,	33	62	— fronte ossea plana, &c.	61 2
Benguelinha,	33	71	Busard du marais,	8 29
Bergeronette du prin-			Buse,	8 32
temps,	40	40	— ( Passe- )	40 12
Bidy-bidy,	74	10	Buteo,	8 32
Bill, ( Cross- )	38	1		
Bird, ( Curasso- )	7	12	C.	
— ( Cushew- )	7	14		
— ( Green - throated				
Humming )	45	10		
— ( Red - breasted				
Black- )	31	29		
			C Aille,	6 14
			Calandra,	35 10
			—	39 6
			Calandre,	39 6
			Calao,	61 1



# ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Calao des Indes ,	61	4	Certhia coerulea ,	43	12
— des Philippines ,	61	2	— coerulea , &c.	43	12
Calidris ,	40	75	— cruentata ,	43	31
Canaria ,	33	52	— familiaris ,	43	1
Canorus ,	22	25	— flaveola ,	43	33
Caprimulgus America-			— Jamaicensis ,	43	33
nus ,	29	4	— nigra , &c.	43	33
— Europæus ,	29	1	— nigro - coerulefcens ,		
— minor Americanus ,	29	3	&c.	43	31
— narium tubis obsole-			— pusilla ,	43	9
tis ,	29	1	— supra grisea , &c.	43	1
—	29	3	—	43	9
— narium tubulis emi-			Chantre ,	40	45
nentibus ,	29	4	Charbonniere ,	41	1
Cardinal brun ,	31	30	Chardonneret ,	32	1
— d'Amérique ,	31	34	— Amériquain ,	32	3
— d'Angola ,	33	69	— d'Amérique ,	32	3
— (Dominicain) ,	33	22	— de Suede ,	32	2
— Dominiquain ,	33	22	— verd ,	32	7
— du Cap de Bonne Ef-			Chathuant ,	12	1
pérance ,	33	21	— blanc de la Baye de		
— hupé ,	34	17	Hudson ,	12	8
— pourpré ,	31	29	Cheveche ,	12	5
Cardinalis ,	34	17	Chloris ,	33	54
— Americanus ,	31	34	Choucas ,	14	6
— Angolenfis ,	33	69	Chouette , ( Grande )	12	4
Carduelis ,	32	1	— ( Petite )	12	5
— viridis ,	32	7	Chrysaëtos ,	9	7
Carnifex ,	23	7	Ciris ,	33	58
Carouge à tête jaune d'A-			Citrinella ,	35	1
mérique ,	19	32	Coccothraustes ,	34	1
— tacheré ,	19	29	— Americana coerulea ,	34	20
Caryocatactes ,	17	1	— Angolenfis cyanea ,	34	19
Casse-noix ,	17	1	Cochevis ,	39	8
Catcher , ( Black-throa-			Colheirinho ,	33	73
ted Green Fly- )	40	77	Colibri gorge rouge ,	44	11
— ( Golden crowned			— gorge verte ,	45	10
Fly- )	40	81	Colibri de la Jamaïque ,	44	8
— ( Golden winged Fly- )	40	80	— du Mexique ,	44	7
— ( Grey and yellow			— rouge à longue queue		
Fly- )	59	3	de Surinam ,	44	15
— ( Little Blue grey Fly- )	40	79	— rouge hupé à longue		
— ( Red-throated Fly- )	40	78	queue du Mexique	44	16



	G. V. S.			G. V. S.	
Colibry violet de Cayenne,	44	11	Columba rectricibus apice albis, &c.	1	7
Collared Finch,	33	73	— rectricibus cinereis, &c.	1	15
Collurio,	21	3	—	1	30
Colubris,	45	13	— rectricibus dorsoque fuscis, &c.	1	16
Columba Asiatica,	1	15	— rectricibus posticè atris, &c.	1	6
— capite cœruleo,	1	32	— rectricibus remigibusque obscurioribus, &c.	1	19
— cauda alba, &c.	1	44	— risoria,	1	8
— cauda cuneiformi longa, &c.	1	12	— Sinica,	1	16
—	1	13	— supra lutescens, &c.	1	8
— cauda erecta, &c.	1	P. 2	— tremula,	1	P. 2
— vera lata verrucosa, &c.	1	I. 2	Condor,	10	12
— cœrulescens, &c.	1	1	Contra,	26	2
—	1	5	Coped Black Vulture,	10	14
—	1	33	Coq,	3	1
— corpore purpureo, &c.	1	42	— de Bruyere à longue queue de la Baye de Hudson,	5	1
— cucullata,	1	E. 2	— de Bruyere noir & marqueté,	5	6
— cyanocephala,	1	32	— -de-Bruyeres,	5	1
— domestica,	1	1	— -de-Bruyeres à queue fourchue,	5	2
— Guinea,	1	30	— de Perse,	3	5
— gutturosa,	1	K. 2	— -de roche,	55	1
— hispida,	1	G. 2	— frisé,	3	3
— Indica,	1	42	— hupé,	3	A. 1
— leucocephala,	1	33	— paru,	3	A. 2
— leucoptera,	1	15	— sans croupion,	3	5
— macroura,	1	12	Coracias,	13	1
—	1	13	— aurea,	19	31
— montana,	1	27	— cœrulea, &c.	18	1
— Nicobarica,	1	44	— flaya, &c.	22	58
— obscure rufa, &c.	1	29	—	22	61
— palpebris nudis cœruleis, &c.	1	15	— flavo-fulva, &c.	19	31
— Passerina,	1	19	— fulva, &c.	19	19
— pectore inflato,	1	K. 2	— hupé,	13	2
— pennis in pectore recurvatis,	1	F. 2	Corax,	14	1
— pennis occipitis reflexo-erectis,	1	E. 2			
— plumis minimis erectis, &c.	1	G. 2			



# ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Corbeau,	14	1	Crapaud-volant,	29	1
— blanc du Nord,	14	11	Crax nigra,	7	12
Corneille,	14	2	—	7	13
— bleue,	18	1	— rubra,	7	16
— mantelée,	14	4	— rubra, &c.	7	16
— moiffonneufe,	14	3	Creeper, ( Black and		
Cornix,	14	4	blue )	43	13
Corone,	14	2	— ( Black and white )	40	69
Corvus albo nigroque va-			— ( Pine- )	40	55
rius, &c.	15	1	— ( Purple Indian )	43	20
—	24	29	Cresserelle,	8	27
— ater, &c.	14	1	Crested Black Vulture,	10	14
—	14	3	Crofs Bill,	38	1
— atro-cœrulescens, &c.	14	2	Crotophaga,	52	1
— Bengalensis,	18	2	Cuculus Americanus,	50	3
— Borealis albus,	14	11	— auratus,	47	28
— cinerascens, &c.	14	4	— canorus,	50	1
— cristatus,	16	4	— cauda aequali, &c.	50	1
— dorfo cinereo,	22	13	—	50	24
— frugilegus,	14	3	— cauda cuneiformi,		
— fuscus, &c.	14	6	&c.	50	3
— fuscus alboque punc-			—	50	4
tatus, &c.	17	1	—	50	10
— glandarius,	16	1	—	50	13
— infaustus,	22	13	—	50	17
— Paradisi,	24	29	— cauda subforcipata,		
— tectricibus alarum cœ-			&c.	47	28
ruleis, &c.	16	1	— glandarius,	50	10
— tectricibus alarum li-			— niger,	50	17
neis transversis ni-			— Scolopaceus,	50	13
gis, &c.	16	4	Cujelier,	39	2
— vertice al. s caudaque			Cul-blanc,	40	33
cœruleis, &c.	18	2	— -blanc gris,	40	34
Cotinga rouge,	23	7	— -blanc roux,	40	37
Coturnix,	6	14	Cupido,	5	10
Coucou,	50	1	Curaffo-Bird,	7	12
— d'Andalousie,	50	13	Curruca,	40	7
— de la Caroline,	50	3	— grisea nævia,	40	82
— de la Jamaïque,	50	4	— lepiaria Jamaicen-		
— noir de Bengale,	50	17	sis,	40	74
— tacheré de Bengale,	50	13	Curvirostra,	38	1
— verd hupé de Gui-			Cusco,	7	14
née,	50	24	Cushew-Bird,	7	14



		G.	S.			G.	S.
D.		G. V. S.		Epervier,		8	1
D <sup>E</sup> a,	48	2		— de la Baye de Hud-	son,	8	37
Dindon,	2	1		— de la Caroline,		8	21
— du Brésil,	2	2		Epops,		27	1
— hupé,	2	A. 1		Eremita,		13	2
— sauvage,	2	B. 1		Erithacus,		40	17
Dodo,	65	1		Etourneau,		26	1
Domicella,	53	15		— du cap de Bonne Es-			
Dominicain Cardinal,	33	22		pérance,		26	2
Dominicana,	33	22		— jaune des Indes,		22	61
Dronte,	65	1		— noir & blanc des In-			
Duc de la Caroline,				des,		26	2
(Petit)	11	6		Excubitor,		21	1
— de Laponie, (Grand)	11	3		F.			
— (Grand)	11	1		G. V. S.			
— (Moyen)	11	4		F <sup>A</sup> isan,		7	1
— (Petit)	11	5		— blanc de la Chine,		7	5
Dusky Linnet,	33	14		— cornu de Bengale,		7	17
				— doré de la Chine,		7	4
				Falco æruginosus,		8	29
				— apivorus,		8	33
				— barbatus,		8	A. 6
				— Bengalenfis,		8	38
				— Canadensis,		9	1
				— cera cœrulea, &c.		8	A. 19
				— cera flava, &c.		8	7
				—		8	35
				—		8	36
				—		9	1
				—		9	2
				—		9	5
				— cera fusca, &c.		8	29
				— cera lutea, &c.		8	16
				—		8	21
				—		8	25
				—		9	7
				—		9	8
				— cera nigra, &c.		8	3
				—		8	33
				— cera palpebris pedibus			
				subtusque luteus,			
				&c.		8	38
E.		G.	S.				
E <sup>A</sup> ter, (Worm-)	40	76					
Emberiza capite cœ-							
ruleo, &c.	33	58					
— capite pectoreque a-							
tro, &c.	33	17					
— cinereo fusca, &c.	33	35					
— fusca, &c.	31	30					
—	33	25					
— grisea, &c.	33	21					
—	35	10					
— militaris,	31	30					
— nivalis,	35	9					
— Paradisea,	33	25					
— Plittacea,	33	35					
— rectricibus nigricanti-							
bus, &c.	35	1					
— remigibus albis, &c.	35	9					
— remigibus nigris, &c.	35	4					
Emeria,	21	14					
Emerillon de la Caroline,	8	25					
Enucleator,	34	15					



# A L P H A B E T I C U S.

vij

G. V. S.

G.

S.

Falco cera pedibusque			Ficedula Pensilvanica ci-		
coeruleis, &c.	9	10	nerea gutture ni-		
— cera pedibusque fla-			gro,	40	80
vis, &c.	8	5	— Pensilvanica cinerea		
—	8	20	nævia,	40	81
—	8	27	— Pensilvanica gutture		
— cera pedibusque lu-			nigro,	40	77
teis, &c.	8	A. 6	— Pensilvanica icteroce-		
—	8	32	phalos,	40	78
— cera viridi, &c.	8	1	Figuier à gorge noire de		
— coeruleus,	8	38	Pensilvanie,	40	77
— Columbarius,	8	21	— à tête jaune de Pen-		
— forficatus,	8	36	silvanie,	40	78
— fulvus,	9	1	— cendré à gorge noire		
— gentilis,	8	5	de Pensilvanie,	40	80
— Palumbarius,	8	3	— cendré de la Caroline,	40	66
— pedibus pennatis,	8	39	— cendré de Pensilvanie,	40	79
— Sparverius,	8	25	— cendré tacheté de Pen-		
Farlouse,	39	3	silvanie,	40	81
Faucon à collier,	8	7	— de Bengale,	40	47
— à queue annelée,	8	37	— de la Caroline,	40	48
— de Barbarie,	8	A. 6	— de la Jamaïque,		
— de Bengale,	8	38	(Grand)	40	75
— de marais,	8	7	— de la Louisiane,	40	55
— gentil,	8	5	— de Pensilvanie,	40	76
— noir & orangé des In-			— varié de S. Domingue,	40	69
des, (Petit)	8	38	Finch, (American Gold-)	32	3
— patu,	8	39	— (Collared)	33	73
Fauvette,	40	2	— (Green Gold-)	32	7
— à tête noire,	40	6	— (Painted)	33	58
— babillarde,	40	7	Fly-Catcher, (Black-		
— de bois,	40	11	throated Green)	40	77
— de haye,	40	12	— Catcher, (Golden-		
— de haye de la Jamaï-			crowned)	40	81
que,	40	74	— Catcher, (Golden-		
— de roseaux,	40	5	winged)	40	80
— grise,	40	4	— Catcher, (Grey and		
— grise tachetée,	40	82	yellow)	59	3
Ficedula,	40	1	— Catcher, (Little Blue-		
— Jamaicensis major,	40	75	grey)	40	79
— Pensilvanica,	40	76	— Catcher, (Red-throa-		
— Pensilvanica cine-			ted)	40	78
rea,	40	79	Francolin,	6	13



	G. V. S.			G. V. S.	
<i>Fringilla alarum basi sub-</i>			<i>Fringilla rectricibus fus-</i>		
<i>tus flavissima</i> ,	33	37	<i>cis</i> , &c.	35	5
— <i>Angolensis</i> ,	33	60	— <i>rectricibus purpureis</i> ,		
— <i>artubus nigris</i> , &c.	33	36	&c.	33	62
— <i>artubus remigibus rec-</i>			— <i>remigibus antrorsum</i>		
<i>triticibus nigris</i> ,			<i>luteis</i> , &c.	32	1
&c.	33	A. 36	— <i>remigibus medio lu-</i>		
— <i>Brasiliana</i> ,	33	67	<i>teis</i> , &c.	32	4
— <i>butyracea</i> ,	33	55	— <i>remigibus primoribus</i>		
— <i>cannabina</i> ,	33	30	<i>rectricibusque ni-</i>		
— <i>capite nigricante ma-</i>			<i>gris</i> , &c.	33	30
<i>culato</i> , &c.	33	38	— <i>remigibus rectricibus-</i>		
— <i>capite nigro</i> , &c.	33	43	<i>que fuscis</i> , &c.	33	1
— <i>capite pectoreque ni-</i>			—	33	2
<i>gris</i> , &c.	33	59	—	33	31
— <i>cauda cuneiformi</i> , &c.	33	67	— <i>rostro corporeque al-</i>		
— <i>Chinensis</i> ,	34	7	<i>bicante</i> , &c.	33	52
— <i>cinerea Indica</i> ,	33	72	— <i>rubra</i> ,	24	37
— <i>coelebs</i> ,	33	36	— <i>rubra tota</i> ,	24	37
— <i>crispa</i> ,	33	74	— <i>sylvatica</i> ,	33	A. 36
— <i>domestica</i> ,	33	1	— <i>torquata Indica</i> ,	33	73
— <i>dorso fusco</i> , &c.	33	60	— <i>tristis</i> ,	32	3
— <i>erythrophthalma</i> ,	33	44	— <i>violacea</i> ,	31	18
— <i>facie caudaque rubris</i> ,			— <i>violacea</i> , &c.	31	18
&c.	32	7	— <i>virens</i> , &c.	33	55
— <i>ferruginea</i> , &c.	34	7	— <i>viridis</i> , &c.	31	13
— <i>flammea</i> ,	33	E. 36	<i>Frizled Sparrow</i> , (Black		
— <i>flava</i> , &c.	32	3	and yellow)	33	74
— <i>flavirostris</i> ,	33	B. 36	<i>Fulica minima miscella</i> ,		
— <i>fulca</i> , &c.	32	2	&c.	74	10
—	33	B. 36		G.	
—	33	E. 36		G. V. S.	
—	35	8	<i>G</i> <i>Albula</i> ;	19	19
— <i>grisea</i> , &c.	19	29	<i>Galgulus</i> ,	53	86
— <i>hyemalis</i> ,	35	C. 9	<i>Gallinago Capitis Bonæ</i>		
— <i>Laponica</i> ,	33	38	<i>Spei</i> ,	77	6
— <i>Lulensis</i> ,	32	2	<i>Gallo-pavo sylvestris No-</i>		
— <i>melancholica</i> ,	19	29	<i>væ Angliæ</i> ,	2	B. 1
— <i>montana</i> ,	33	2	<i>Gallo-pavo</i> ,	2	1
— <i>nigra</i> , &c.	35	C. 9	— <i>cristatus</i> ,	2	A. 1
— <i>nigra rubro relucens</i> ,			<i>Gallus</i> ,	3	1
&c.	33	44	— <i>crispus</i> ,	3	3
— <i>oryzivora</i> ,	35	8	— <i>cristatus</i> ,	3	A. 1
				<i>Gallus</i>	



# ALPHABETICUS.

	G. V. S.			G. S.	
Gallus Curaſſavicus,	7	13	Grand Figuier de la Ja-		
— ecaudatus,	3	5	maïque,	40	75
— puſillus,	3	A. 2	— Martin de l'Améri-		
Garrulus,	18	1	que,	30	18
—	22	63	— Moqueur,	22	29
— Carolinenſis,	22	64	— Oiſeau de Paradis,	20	1
Geay,	16	1	— Pic varié,	47	13
— bleu de Canada,	16	4	— Traquet,	40	26
Gelinote,	5	3	Grande Chouette,	12	4
— blanche,	5	12	— Hirondelle d'Eſpa-		
— de la Baye de Hudſon,	5	6	gne,	30	11
— hupée d'Amérique,	5	10	— Linotte de vignes,	33	30
Gerfault d'Iſlande,	8	A. 19	Green Fly - Catcher,		
Gobe-mouche blanc lu-			(Black-throated)	40	77
pé du Cap de Bon-			— Gold-Finch,	32	7
ne Eſpérance,	24	29	— -throated Humming		
— -mouche d'Amérique,	24	14	Bird,	45	10
— -mouche hupé de Vir-			— Tit-mouſe, (Spotted)	31	11
ginie,	24	28	Grenadier,	33	21
— -mouche rouge de la			Grenadin,	33	67
Caroline,	24	37	Grey and yellow Fly-Cat-		
— -mouche roux de Ca-			cher,	59	3
yenne,	24	38	— Fly-Catcher, ( Little		
Gold-Finch, ( American)	32	3	Blue - )	40	79
— Finch, ( Green )	32	7	Grimpereau,	43	1
Golden crowned Fly-Cat-			— à collier du Cap de		
cher,	40	81	Bonne Eſpérance,	43	20
— Tit-mouſe,	31	18	— bleu de Cayenne,	43	12
— winged Fly-Catcher,	40	80	— bleu du Bréſil,	43	13
— winged Parrakeet,	53	97	— de Bengale,	43	31
Gorge-bleue,	40	19	— de la Jamaïque,	43	33
— bleue de la Caroline,			— de Sapin,	40	55
( Rouge- )	40	23	— des Indes,	43	9
— ( Rouge- )	40	21	— noir & blanc,	40	69
Gracula criſtatella,	22	21	— noir & bleu,	43	13
— nigra, &c.	22	21	— noir & jaune,	43	33
— nigro - cœruleſcens,			— pourpre des Indes,	43	20
&c.	21	19	— verd à tête noire du		
— nigro-violacea,	15	3	Bréſil,	43	15
— nigro-violacea, &c.	22	49	— verd du Bréſil,	43	14
— religioſa,	22	49	Grifette,	40	4
Grand Duc,	11	1	Grive brune des Indes,	22	25
— Duc de Laponie,	11	3	— de la Caroline,	22	8

\*

b



	G.	V.	S.		G.	S.
Grive dorée ,	22	58		Hirondelle de cheminée ,	30	1
— ( Grosse )	22	1		— de la Baye de Hud-		
— ( Petite )	22	2		son ,	30	18
—	22	4		— de la Caroline ,	30	9
Gros-beak , ( Malacca )	33	65		— de rivage ,	30	12
— -bec ,	34	1		— de rivage de la Co-		
— -bec bleu d'Amérique ,	34	20		chinchine ,	30	14
— -bec bleu d'Angola ,	34	19		— ( Petite )	30	2
— -bec cendré de la Chi-				Hirundo cinerea , &c.	30	12
ne ,	34	12		— esculenta ,	30	14
— -bec de Canada ,	34	15		— Freti Hudsonis ,	30	18
— -bec de Gambie ,	34	5		— fusca , &c.	30	11
— -bec de la Chine ,	34	7		— nigricans , &c.	30	15
— -bec de Malacca ,	33	65		— nigro - coeruleus ,		
— -bec de Virginie ,	34	17		&c.	30	18
— -bec du Mexique ,	34	18		— pelagica ,	30	9
— -bec tacheté de Java ,	34	9		— rectricibus æqualibus ,		
Gros-bec ,	34	1		&c.	30	9
Grosse Alouette ,	39	6		— rectricibus , exceptis		
— Grive ,	22	1		duabus interme-		
— Mésange ,	41	1		diis , macula alba		
— Perdrix du Brésil ,	6	5		notatis ,	30	1
— Pivoine ,	34	15		— rectricibus immacu-		
Gryphus ,	10	12		latis , &c.	30	2
Guêpier ,	60	1		— rectricibus omnibus		
— à collier de Bengale ,	60	9		macula alba nota-		
— à collier de Madagaf-				tis ,	30	14
car ,	60	8		— riparia ,	30	12
— du Mexique ,	60	5		— rustica ,	30	1
Gyrfalco ,	8	A. 19		— urbana ,	30	2
Gyrola ,	31	13		Hobreau ,	8	20
				Hocco de Curassow ,	7	13
				— de la Guiane ,	7	12
				— du Mexique ,	7	14
				— du Perou ,	7	16
				Hoopoe Hen ,	55	1
				Hortulana ,	35	4
				Hulote ,	12	3
				Humming Bird , ( Green-		
				throated )	45	10
				— Bird , ( Red - breast-		
				ted )	44	11
				Hupe ,	27	1

## H.

	G.	S.		G.	S.
<b>H</b> Aliaetus ,	9	10			
Harpyja ,	9	13			
Hawk , ( Marsh- )	8	7			
Hen , ( Hoopoe )	55	1			
— ( Least Water- )	74	10			
Hibou ,	11	4			
Hippolais ,	4	2			
Hirondelle d'Espagne ,					
( Grande )	30	11			



# ALPHABETICUS.

			xj	
			G.	S.
I.				
	G.	S.		
<b>J</b> Acamar à longue			33	71
queue,	48	2		
Jacarini,	31	16		14
Jaseur de Bohême,	22	63		
— de la Caroline,	22	64		
Icterus,	22	58		
— Indicus,	19	31		
Indian Creeper, (Purple)	43	20		
Isfida,	58	1		
Lynx,	46	1		
K.				
	G.	S.		
<b>K</b> Akatoes à aîles &				
queue rouges,	53	12		
— à hupe jaune,	53	9		
Kern-beisser,	34	1		
L.				
	G.	S.		
<b>L</b> Agopus,	5	12		
Lanarius,	8	16		
Lanier,	8	16		
Lanius caudâ cuneiformi,				
&c.	21	1		
—	21	13		
— cauda forficata, &c.	21	22		
— cauda integra, &c.	21	3		
— cauda subcuneiformi,				
&c.	21	3		
— coeruleus,	21	22		
— corpore rubro, &c.	23	7		
— cristatus,	21	13		
— remigibus secundariis				
apice membrana-				
ceo colorato, &c.	22	63		
—	22	64		
— vertice nigro, &c.	24	18		
Lark from Pensilvania,	39	13		
Lavandiere,	40	38		
Least Water-Hen,	74	10		
Linaria,	33	31		
Linaria Angolenfis,			33	
Linnet, (Dusky)			33	
Linotte à longue queue				
du Brésil,			33	35
— brune,			33	14
— d'Angola,			33	71
— de vignes, (Grande)			33	30
— de vignes, (Petite)			33	31
Litorne,			22	5
Little Blue-grey Fly-Cat-				
cher,			40	79
— Thrush,			22	4
Long-tailed Sparrow,			33	70
Loriot,			22	58
— de Bengale,			22	61
Lory,			53	16
— de Ceram,			53	13
— des Indes Orientales,			53	15
— des Moluques,			53	14
— des Philippines,			53	16
Loxia artubus nigris, &c.			37	1
— Benghalensis,			33	11
— bicolor,			33	40
— cana,			33	72
— cana, &c.			33	72
— cinerascens, &c.			33	69
— coerulea,			37	7
— coerulea, &c.			34	19
—			37	7
— cyanea,			34	19
— erythrocephala,			33	69
— ferruginea, &c.			34	9
— flavicanti-virens, &c.			33	54
— fusca, &c.			33	40
—			34	12
— grisea, &c.			33	11
—			33	12
—			33	64
— linea alarum duplici				
alba, &c.			34	15
— linea alarum simplici				
alba, &c.			34	1
— lutea, &c.			34	5



	G. V. S.			G. V. S.	
Loxia Mexicana,	33	12	Martin-pêcheur à collier		
—	34	18	de Bengale,	58	15
— melanocephala,	34	5	— -pêcheur blanc &		
— nigra,	37	3	noir,	58	24
— nigra, &c.	33	22	— -pêcheur de Smyrne,	58	13
—	37	A. 1	— -pêcheur hupé de la		
—	37	3	Caroline,	58	21
— oryzivora,	34	12	Martinet,	30	15
— panicivora,	37	A. 1	— à cul blanc,	30	2
— punctulata,	34	9	Mauvis,	22	3
— rostro forficato,	38	1	— de la Caroline,	22	4
— rubra, &c.	34	17	Melanætus,	9	8
—	34	18	Melba,	30	11
— violacea,	37	9	—	32	7
— violacea, &c.	37	9	Meleagris,	4	1
Luscinia,	40	13	— capite caruncula fron-		
Luteolus,	22	61	tali, &c.	2	1
			—	2	A. 1
			—	2	B. 1
			— capite cornubus duo-		
			bus, &c.	7	17
			— capite pennis erectis		
			cristato, &c.	2	2
			— cristata,	2	2
			Merle,	22	10
			— à collier,	22	12
			— à collier d'Amérique,	22	15
			— à gorge rouge,	31	29
			— à tête noire du Cap		
			de Bonne Espé-		
			rance,	22	66
			— bleu,	22	37
			— cendré d'Amérique,	22	40
			— de Bengale,	22	25
			— de roche,	22	13
			— de Surinam,	22	65
			— hupé de la Chine,	22	21
			— verd de la Caroline,	22	55
			Merops cinereus,	60	5
			— dorso ferrugineo,		
			&c.	60	1
			—	60	8
			—	60	9

M.

	G. S.			G. S.	
MAcao,	53	2			
Maia de la Chine,	33	65			
Mainate,	22	49			
Malacca Gros-beak,	33	65			
Manakin à tête blanche,	56	3			
— à tête d'or,	56	4			
— (Blue)	40	72			
— (Blue-backed)	56	10			
— noir hupé,	56	10			
— (Red and Black)	56	6			
— rouge,	56	6			
Manaquin à dos bleu,	56	10			
— bleu,	40	72			
— rouge & noir,	56	6			
Mangeur de vers,	40	76			
Mango,	45	6			
Maracaxao,	32	7			
Mariposa,	33	58			
— pintada,	33	58			
Marsh-Hawk,	8	7			
Martin de l'Amérique,					
(Grand)	30	18			
— -pêcheur,	58	1			



# A L P H A B E T I C U S .

xiiij

	G.	S.		G.	S.
Merops rubro flavoque			Motacilla alba ,	40	38
variegatus , &c.	60	5	— campestris ,	40	74
— viridis ,	60	8	— capite ferrugineo , &c.	41	11
—	60	9	— cinerea , &c.	40	5
Merula ,	22	10	— cinereo-virens , &c.	40	45
— atricapilla Capitis Bo-			— coerulea , &c.	40	73
næ Spei ,	22	66	— dorso cano , &c.	40	33
— Surinamensis ,	22	65	— dorso remigibusque		
Mésange à longue queue ,	41	13	cinereis , &c.	40	17
— à tête noire ,	41	5	— ferruginea , &c.	40	37
— barbue ,	41	12	— flava ,	40	40
— bleue ,	41	2	— grisea , &c.	21	14
— de marais ,	41	7	—	40	21
— de Pologne ,	41	11	—	40	24
— dorée ,	31	18	—	40	74
— ( Grosse )	41	1	— gula nigra , &c.	40	15
— hupée ,	41	8	— Hispanica ,	40	37
— verte tachetée ,	31	11	— modularis ,	40	12
Milan de la Caroline ,	8	36	— nigra , &c.	24	14
— royal ,	8	35	— nigricans , &c.	40	26
Milvus ,	8	35	— pectore abdomineque		
Moineau à bec rouge du			flavo , &c.	40	40
Sénégal ,	33	19	— pectore ferrugineo ,		
— à gorge blanche ,	33	68	&c.	40	19
— à longue queue ,	33	70	— pectore nigro , &c.	40	38
— de Bengale ,	33	11	— remigibus nigricanti-		
— de buillon de l'Amé-			bus , &c.	40	15
rique ,	40	74	— remigibus secundariis		
— de Montagne ,	33	2	exteriori margine		
— de Paradis ,	33	69	flavis , &c.	41	17
— de Pensilvanie ,	33	68	— rufo-cinerea ,	40	13
— de Virginie ,	33	14	— subfusca , &c.	40	1
— des Indes à tête jaune ,	33	11	— subtus pallida , &c.	40	34
— du Brésil ,	33	19	— Suecica ,	40	19
— du Cap de Bonne Ef-			— supra cinerea , &c.	40	4
pérance , ( Petit )	33	17	— supra cinereo-vires-		
— du Mexique ,	33	12	cens , &c.	40	45
— franc ,	33	1	— supra coerulea , &c.	40	23
— frisé jaune & noir ,	33	74	— supra fusca , &c.	40	7
Monedula ,	14	6	— supra fusco-virescens ,		
Montifringilla ,	33	37	&c.	40	75
Moqueur ,	22	27	— supra grisea , &c.	40	7
— ( Grand )	22	29	— supra griseo-fusca , &c.	40	12

b iij



	G.	S.		G.	V.	S.
Motacilla testacea , &c.	40	6	Oiseau de Paradis de cou-			
— testaceo-fusca , &c.	40	11	leur d'or ,	19	31	
— virecente - cinerea ,			— de Paradis , (Grand)	20	1	
&c.	40	2	— -de-Paradis , (Petit)	20	2	
— viridis , &c.	40	47	— -mouche ,	45	1	
—	43	14	— -mouche à collier de			
—	43	15	Surinam ,	45	11	
Moteux ,	40	33	— -mouche à gorge rou-			
Moucherole à gorge rou-			ge de la Caroline ,	45	13	
ge ,	40	78	— -mouche à poitrine			
— aux ailes dorées ,	40	80	bleue de Surinam .	45	10	
— couronnée d'or ,	40	81	— -mouche à queue four-			
— gris de fer , (Petite)	40	79	chue de la Jamaï-			
— verte à gorge noire ,	40	77	que ,	45	18	
Moucherolle ardoise &			— -mouche à tête noire			
jaune ,	59	3	& queue fourchue			
Mountain Sparrow ,	33	2	de la Jamaïque ,	45	19	
Mouise , (Golden Tit-)	31	18	— -mouche de Cayenne ,	45	6	
— (Spotted Green Tit-)	31	11	— -mouche de S. Do-			
Moustache ,	41	12	mingue ,	45	5	
Moyen Duc ,	11	4	— -mouche de Surinam ,	45	4	
Muscicapa Cayanensis			— -mouche hupé ,	45	12	
rufa ,	24	38	— peint ,	33	58	
— viridis capite cœru-			— peu connu ,	61	1	
leo ,	43	14	—	61	2	
			—	61	4	
N.			Oiseaux du Paradis ,			
	G.	S.	(Roy des)	20	2	
Negral ,	33	71	Oriolus ,	22	58	
Negretto ,	31	16	Orix ,	33	21	
Nifus ,	8	1	Orpheus ,	22	27	
Nonette cendrée ,	41	7	Ortolan ,	35	4	
Nonpareil ,	33	53	— de la Caroline ,	35	8	
Nyctea ,	12	8	— de neige ,	35	9	
			— de neige noir ,	35	C. 9	
O.			— de roseaux ,	35	5	
	G.	S.	Otus ,	11	4	
Oenanthe ,	40	33				
Oenas ,	1	5	P.			
Oiseau de Curassau ,	7	12		G.	S.	
— de neige de la Baye			Painted Finch ,	33	58	
de Hudson ,	35	9	Palumbus ,	1	6	
— -de-Paradis ,	20	1	Paon ,	7	7	
—	24	29	— de la Chine ,	7	9	



# ALPHABETICUS.

xv

	G.	S.		G. V. S.
Paon, (Pigeon-)	1	P. 2	Pavo sylvestris Novæ-	
Papa,	10	11	Angliæ, (Gallo-)	2 B. 1
Pape,	33	58	Peintade,	4 1
Paradisæa apoda,	20	1	Pella,	44 15
— cirrhis caudalibus fili-			Pendulinus,	41 11
formibus, &c.	20	2	Pernopterus,	10 8
— pennis hypochondriis			Perdix,	6 1
corpore longiori-			Perdrix d'Amérique,	6 7
bus, &c.	20	1	— de la Nouvelle An-	
— regia,	20	2	gleterre,	6 6
Parrakeet, (Blue-headed)	53	96	— de montagne,	1 29
— (Golden-winged)	53	97	— du Brésil, (Grosse)	6 5
— (Ring)	53	55	— grise,	6 1
— (Sapphire-crowned)	53	87	Perrique aux ailes d'or,	53 97
Parus Americanus,	40	66	— couronnée de Saphir,	53 87
— ater,	41	5	Perroquet à collier,	53 55
— ater, &c.	56	3	— à front rouge du Bré-	
— Biarmicus,	41	12	sil,	53 30
— capite cristato,	41	8	— à gorge rouge de la	
— capite nigro, &c.	41	1	Jamaïque,	53 25
—	41	5	— à poitrine blanche du	
—	41	7	Mexique,	53 42
— caudatus,	41	13	— à tête bleue,	53 96
— cœrulescens, &c.	40	66	— Amazone de la Jamaï-	
— cœruleus,	41	2	que,	53 36
— cristatus,	41	8	— Amazone varié,	53 37
— erythrocephalus,	56	4	— bleu de la Guiane,	53 46
— major,	41	1	— cendré de Guinée,	53 49
— niger, &c.	56	4	— d'Amérique,	53 40
—	56	6	— de Cayenne,	53 23
— palustris,	41	7	— de la Martinique,	53 26
— remigibus cœrulef-			— de la Nouvelle Espa-	
centibus, &c.	41	2	gne,	53 45
— vertice albo, &c.	41	13	— jaune de Cuba,	53 48
— vertice cano, &c.	41	12	— Mascarin,	53 52
Pashu, (Sashaun)	30	18	— noir de Madagascar,	53 53
Passe-buse,	40	12	— varié des Indes,	53 43
Passer Pensilvanicus,	33	68	Perruche,	53 54
Passero de Paradiso,	33	69	— à collier,	53 55
Pavo bicalcaratus,	7	9	— à cul bleu du Brésil,	
— capite crista erecta,	7	7	(Petite)	53 83
— capite lævi, &c.	7	9	— à front rouge du Bré-	
— cristatus,	7	7	sil,	53 62



	G.	S.		G. V. S.
Perruche à tête bleue des Indes,	53	96	Petite Tourterelle d'A-mérique,	1 19
— aux ailes d'or, ( Petite )	53	97	Phaïsan cornu des Indes,	7 17
— de Guinée, ( Petite )	53	85	Phasianellus,	5 1
— de la Caroline,	53	67	Phasianus albus, &c.	7 5
— de la Martinique,	53	69	— Bengalensis cornutus,	7 17
— des Indes, ( Petite )	53	86	— cauda compressa, &c.	3 1
— des Philippines, ( Petite )	53	87	—	3 A. 1
— jaune d'Angola,	53	76	—	3 A. 2
— Illinoïse,	53	68	—	3 3
— rouge de Borneo,	53	77	— Colchicus,	3 5
— variée des Indes,	53	73	— cristà flava, &c.	7 1
Perfa,	50	24	— nycthemerus,	7 4
Petit Duc,	11	5	— pictus,	7 5
— Duc de la Caroline,	11	6	— rufus, &c.	7 4
— Faucon noir & orangé des Indes,	8	38	— vertice calloso, &c.	7 1
— Moineau du Cap de Bonne Espérance,	33	17	Philomela,	40 7
— Oiseau-de-Paradis,	20	2	Phoenicurus,	40 15
— Pic varié,	47	15	Pic à tête rouge de Virginie,	47 19
— Pinçon rouge,	33	40	— noir,	47 6
— Torchepot de la Caroline,	42	5	— noir de la Nouvelle Angleterre,	47 7
Petite Chouette,	12	5	— noir hupé de la Caroline,	47 9
— Grive,	22	2	— noir hupé de Virginie,	47 10
—	22	4	— rayé de Canada,	47 28
— Hirondelle,	30	2	— varié,	47 14
— Linotte de vignes,	33	31	— varié de Cayenne,	47 20
— Moucherole gris de fer,	40	79	— varié de la Jamaïque,	47 23
— Perruche à cul bleu du Brésil,	53	83	— varié, ( Grand )	47 13
— perruche aux ailes d'or,	53	97	— varié, ( Petit )	47 15
— Perruche de Guinée,	53	85	— verd,	47 1
— Perruche des Indes,	53	86	— verd de Bengale,	47 2
— Perruche des Philippines,	53	87	Pica,	15 1
— Pie des Indes,	21	19	Picus albo nigroque varius, &c.	47 13
— Poule d'eau,	74	10	—	47 14
			—	47 15
			—	47 20
			— Benghalensis,	47 2
			— capite toto rubro, &c.	47 19



# ALPHABETICUS.

xvij

	G. V. S.			G. V. S.	
Picus Carolinus,	47	23	Pigeon nonain,	1	E. 2
— erythrocephalus,	47	19	— -Paon,	1	P. 2
— Hirundinaceus,	47	7	— ramier,	1	6
— major,	47	13	— ramier d'Amboine,	1	42
— Martius,	47	6	— roux de Cayenne,	1	29
— medius,	47	14	— sauvage,	1	5
— minor,	47	15	— sauvage d'Amérique,	1	12
— niger, &c.	47	6	Pinçon,	33	36
—	47	7	— à ailes & queue noi-		
—	47	9	res,	33	A. 36
—	47	10	— à collier des Indes,	33	73
— pileatus,	47	10	— au ventre bleu,	33	60
— pileo nuchaque rubris,			— brun,	33	B. 36
— &c.	47	23	— cendré des Indes,	33	72
— principalis,	47	9	— d'Ardenne,	33	37
— tridactylus,	47	20	— de Bahama,	33	43
— viridis,	47	1	— de la Caroline,	33	44
— viridis, &c.	47	1	— de Montagne,	33	38
—	47	2	— frisé,	33	74
Pie,	15	1	— gris,	33	72
— de la Jamaïque,	15	3	— hupé,	33	E. 36
— de Paradis,	24	29	— rouge & bleu du Bré-		
— des Indes, (Petite)	21	19	fil,	33	67
— -grièche à queue four-			— rouge, (Petit)	33	40
chue de Bengale,	21	22	Pine-Creeper,	40	55
— -grièche brune de			Pinson à collier,	33	73
Bengale,	21	14	— peint,	33	58
— -grièche grise,	21	1	Pipit bleu de Cayenne,	40	72
— -grièche noire de Ben-			— bleu de Surinam,	40	73
gale,	21	19	Pipra,	56	3
— -grièche rousse,	21	3	Pivoine, (Grosse)	34	15
— -grièche rousse de			Plover, (Spur-winged)	69	14
Bengale,	21	13	Pluvier à ailes éperon-		
Pigeon à gorge frisée,	1	F. 2	nées,	69	14
— de Guinée,	1	30	Pluvier hupé de Perse,	69	14
— de Nicobar,	1	44	Polytmus,	45	19
— de roche de la Jamaï-			Pouillot,	40	45
que,	1	33	Poul,	41	17
— des Indes,	1	15	Poule,	3	1
— domestique,	1	1	— d'eau, (Petite)	74	10
— frisé,	1	G. 2	Promerops hupé des In-		
— grand gosier,	1	K. 2	des,	28	3
— Messager,	1	1. 2	Proyer,	35	10



	G.	S.		G.	S.
<i>Pittaca cyanocephalus</i>			<i>Pittacus cœrulocephalus</i>	53	46
— <i>Indica</i> ,	53	96	— <i>collarius</i> ,	53	25
<i>Pittacula alis deauratis</i> ,	53	97	— <i>cristatus</i> ,	53	9
<i>Pittacus Accipitrinus</i> ,	53	43	— <i>erithacus</i> ,	53	49
— <i>æruinosus</i> ,	53	69	— <i>erythroleucus</i> ,	53	12
— <i>æstivus</i> ,	53	37	— <i>garrulus</i> ,	53	14
— <i>agilis</i> ,	53	23	— <i>leucocephalus</i> ,	53	26
— <i>Alexandri</i> ,	53	55	— <i>macrourus luteo-viri-</i>		
— <i>Aurora</i> ,	53	13	— <i>dis</i> , &c.	53	73
— <i>autumnalis</i> ,	53	40	— <i>macrourus luteus</i> , &c.	53	76
— <i>Borneus</i> ,	53	77	— <i>macrourus niger</i> , &c.	53	52
— <i>brachyurus albus</i> , &c.	53	9	— <i>macrourus ruber</i> , &c.	53	2
— <i>brachyurus canus</i> , &c.	53	49	—	53	77
— <i>brachyurus</i> , capite			— <i>macrourus supra cœ-</i>		
— <i>pectore dorsoque</i>			— <i>ruleus</i> , &c.	53	4
— <i>cœruleis</i> , &c.	53	46	— <i>macrourus viridis</i> , &c.	53	6
— <i>brachyurus cinereus</i> ,			—	53	36
— &c.	53	12	—	53	54
— <i>brachyurus coccineus</i> ,			—	53	55
— &c.	53	13	—	53	62
— <i>brachyurus luteo-vi-</i>			—	53	67
— <i>rens</i> , &c.	53	83	—	53	68
— <i>brachyurus luteus</i> , &c.	53	48	—	53	69
— <i>brachyurus niger</i> ,	53	53	— <i>melanocephalus</i> ,	53	42
— <i>brachyurus purpureus</i> ,			— <i>niger</i> ,	53	53
— &c.	53	16	— <i>nobilis</i> ,	53	36
— <i>brachyurus ruber</i> , &c.	53	14	— <i>obscurus</i> ,	53	52
—	53	15	— <i>ornatus</i> ,	53	73
— <i>brachyurus subfuscus</i> ,			— <i>Paradisi</i> ,	53	48
— &c.	53	45	— <i>Passerinus</i> ,	53	83
— <i>brachyurus viridis</i> ,			— <i>pertinax</i> ,	53	68
— &c.	53	25	— <i>pullarius</i> ,	53	85
—	53	26	— <i>rufirostris</i> ,	53	54
—	53	30	— <i>severus</i> ,	53	6
—	53	37	— <i>solstitialis</i> ,	53	76
—	53	40	— <i>sordidus</i> ,	53	45
—	53	42	— <i>submacrourus viridis</i> ,		
—	53	43	— &c.	53	23
—	53	85	<i>Psophia</i> ,	6	5
—	53	86	— <i>crepitans</i> ,	6	5
— <i>Brasilienfis</i> ,	53	30	<i>Puput</i> ,	27	1
— <i>canicularis</i> ,	53	62	<i>Purple Indian Creeper</i> ,	43	20
— <i>Carolinensis</i> ,	53	67	<i>Pygargus</i> ,	8	7



# ALPHABETICUS.

xix

	G.	S.		G.	S.
Pyrrhocorax ,	13	1	Rouge-gorge ,	40	21
Pyrrhula ,	37	1	— -gorge bleue de la Ca-		
			roline ,	40	23
	G.	S.	— -queue ,	40	17
<b>Q</b> uiscula ,	15	3	— -queue des Indes ,	21	14
			Rousserolle ,	22	6
			Roussette ,	40	11
	R.		Roi des Oiseaux du Pa-		
	G.	S.	radis ,	20	2
<b>R</b> ail , ( American			Rubecula ,	40	21
Water- )	74	9	Rubetra ,	40	26
Râle d'eau d'Amérique ,	74	9	Ruticilla ,	24	14
— de la Jamaïque ,	74	10		S.	
— de Pensilvanie ,	74	9		G.	S.
Rallus Jamaicensis ,	74	10	<b>S</b> accharivora Jamai-		
— Pensilvanicus ,	74	9	centis ,	43	33
Ramphastos picatus ,	54	1	Salicaria ,	40	5
— piperivorus ,	54	5	Sapphire-crowned Parra-		
— rostro nigro , &c. ,	54	3	keet ,	53	87
—	54	5	Sashaun Pashu ,	30	18
— rostro rubro , &c. ,	54	1	Satyra ,	7	17
—	54	10	Saularis ,	21	19
Red and Black Manakin ,	56	6	Saulary ,	21	19
— -breasted Black-Bird ,	31	29	— Mad. &c. ,	21	19
— -breasted Humming			Schoenictus ,	33	5
Bird ,	44	11	Schoenobæus ,	40	11
— -throated Fly-Cat-			Scops ,	11	5
cher ,	40	78	Senator ,	21	3
Reed-Bird ,	35	8	Sénégal rayé ,	33	64
Regulus ,	41	17	Serin des Canaries ,	33	52
Rémiz ,	41	11	Sialis ,	40	23
Rhinoceros ,	61	4	Sitta capite fusco ,	42	5
Ring Parrakeet ,	53	55	— capite nigro ,	42	4
Roi des Vautours ,	10	11	— Europæa ,	42	1
Roitelet ,	40	24	— rectricibus nigris , &c. ,	42	1
— hupé ,	41	17	—	42	4
— jaune ,	40	48	—	42	5
Rollier ,	18	11	Souci ,	41	17
— de Mindanao ,	18	2	Sparrow , (Black and yel-		
Rossignol ,	40	13	low Frizled )	33	74
— de l'Amérique ,	40	75	— ( Brasilian )	33	19
— de muraille ,	40	15	— ( Long-tailed )	33	70
Roucherolle ,	22	6	— Mountain )	33	2



	G.	S.		G.	S.
Sparrow, ( White-throated )	33	68	Tangara noir & jaune du Brésil,	31	18
Spinus,	32	4	— noir hupé de Cayenne,	31	33
Spipoletta,	39	5	— varié à tête bleue de Cayenne,	31	32
Spiza,	43	15	— varié à tête verte de Cayenne,	31	31
Spotted Green Tit-moufe,	31	11	— verd du Pérou,	31	13
Spur-winged Plover,	69	14	— verd piqueté des Indes,	31	11
Strix capite auriculato, &c.	11	1	Tarier,	40	26
—	11	3	Tarin,	32	4
—	11	4	Tetrao Canadensis,	5	6
—	11	5	— Marilandicus,	6	6
— capite aurito, &c.	11	6	— Orientalis,	6	13
— capite lævi, &c.	12	1	— pedibus anticè pilosis, &c.	6	13
—	12	3	— pedibus hirsutis, &c.	5	1
—	12	4	—	5	2
—	12	5	—	5	3
—	12	8	—	5	6
— funerea,	12	4	—	5	10
— passerina,	12	5	— pedibus lanatis, &c.	5	12
— Scandiaca,	11	3	— pedibus nudis, &c.	6	1
— stridula,	12	1	—	6	6
Sturnus luteus, &c.	22	61	—	6	7
— macula oculari fascia alari abdomineque albis,	26	2	—	6	14
— rostro flavescente, &c.	26	1	—	6	12
— vulgaris,	26	1	—	6	12
Subbuteo,	8	20	— rostro pedibusque sanguineis, &c.	6	7
Subis,	30	18	— rufus,	6	12
Sucrier de la Jamaïque,	43	33	— Virginianus,	6	2
Sylvia,	40	4	Tetrix,	5	2
T.			Tette-Chèvre,	29	1
	G. V. S.		— -Chèvre de la Jamaïque,	29	4
Tabellaria,	1	1. 2	— -Chèvre de Virginie,	29	3
Tangara Cayanensis nigra cristata,	31	33	Thrush, ( Little )	22	4
— Cayanensis varia chlo-rocephalos,	31	31	Tinnunculus,	8	27
— Cayanensis varia cyanocephalos,	31	32	Tiphia,	40	47
— noir du Brésil,	31	16	Tit-moufe, ( Golden )	31	18
			— moufe, ( Spotted Green )	31	11



# ALPHABETICUS.

xxj

G. V. S.

	G.	S.			
Titys ,	40	15	Trochilus rectricibus la-		
Tobaque ,	33	71	teralibus margine		
Todier ,	59	1	exteriore albis, &c. 45	1	
— cendré ,	59	3	— rectricibus lateralibus		
Todus ,	59	1	violaceis , &c. 45	4	
— cinereus ,	59	3	— rectricibus nigris , &c. 45	13	
Tomineo ,	45	13	— rectricibus subæquali-		
Torchepot ,	42	1	bus , &c. 44	8	
— de la Caroline ,	42	4	—	45	6
— dela Caroline, (Petit)	42	5	—	45	13
Torcol ,	46	1	— ruber ,	45	4
Torquilla ,	46	1	— Surinamenfis ,	45	5
Toucan ,	54	1	Troglodytes ,	40	24
— à collier de Cayenne ,	54	10	Troupiale des Indes ,	19	31
— à gorge blanche du			Tucanus ,	54	10
Brésil ,	54	3	Turbita ,	1	F. 2
— à gorge jaune du Bré-			Turdus alis subtus ferru-		
fil ,	54	5	gineis , &c. 22	3	
Tourdelle ,	22	5	— alis subtus flavescen-		
Tourterelle ,	1	7	tibus , &c. 22	2	
— à collier ,	1	8	— arundinaceus ,	22	6
— d'Amérique ,	1	13	— ater , &c. 22	10	
— d'Amérique , (Petite)	1	19	— capite colloque cœru-		
— de la Jamaïque ,	1	32	lescente , &c. 24	28	
— rayée de la Chine ,	1	16	— cœrulescens , &c. 22	40	
Traquet , (Grand)	40	26	— cœruleus , &c. 22	37	
Trochilus ,	40	45	— crinitus ,	24	28
— cristatus ,	45	12	— dorso fusco , &c. 22	1	
— curvirostris , &c. 44	7		—	22	27
—	44	15	— ferrugineus , &c. 22	8	
—	44	16	— griseus , &c. 22	6	
—	45	18	—	22	25
—	45	19	— Iliacus ,	22	2
— forficatus ,	45	18	— muscus ,	22	3
— holosericeus ,	44	7	— nigricans , &c. 22	12	
— mellivorus ,	45	11	— nigro-virens , &c. 22	55	
— minimus ,	45	1	— obscurè cinereus , &c. 22	29	
— niger ,	45	6	— pilaris ,	22	5
— Paradiseus ,	44	16	— plumbeus ,	22	40
— rectirostris , &c. 45	11		— polyglottos ,	22	29
—	45	12	— rectricibus nigris , &c. 22	5	
— rectricibus ferrugi-			— rufus ,	22	8
neis , &c. 45	5		— solitarius ,	22	37



	G.	S.		G.	S.
Turdus torquatus,	22	12	Urogallus,	5	1
— virens,	22	55	Water-Hen, (Least)	74	10
— viscivorus,	22	1	— Rail, (American)	74	9
Turtur,	1	7	White-throated Sparrow,	33	68
Tyran,	24	18	Widdehop,	55	1
Tyrannus,	24	18	Vultur albidus, &c.	10	13
V.			— Arabicus,	10	14
	G.	S.	— barbatus,	10	13
V Autour barbu,	10	13	— fusco-griseus, &c.	10	10
— d'Arabie,	10	14	— maximus, &c.	10	12
— des Alpes,	10	8	— naribus carunculatis,		
— du Brésil,	10	10	&c.	10	11
— noir chaperonné,	10	14	— occipite subcristato,	9	13
— noir couronné,	10	14	— remigibus nigris, &c.	10	8
Vautours, (Roi des)	10	11	Vulture, (Coped Black)	10	14
Velia,	40	73	— (Crested Black)	10	14
Verdier,	33	54	Worm-Eater,	40	76
— de Bahama,	33	59	Wren, (Yellow)	40	48
— de la Louisiane,	33	58	X.		
— des Indes,	33	55		G.	S.
Vers, (Mangeur de)	40	76	X Anthornus,	22	61
Verula,	50	4	— iæterocephalus A-		
Veuve,	33	25	mericanus,	19	32
— d'Angola,	33	70	Y.		
Vidua Angolenfis,	33	70		G.	S.
Vitreca,	40	33	Y Elbow Wren,	40	48
Ulula,	12	4	Z.		
Upupa atra, &c.	13	1		G.	S.
— cristata variegata,	27	1	Z Ena,	33	43
— Paradifæa,	28	3	Z—	33	59
— rectricibus duabus lon-					
gissimis,	28	3			
— viridis, &c.	13	2			

F I N.



---

## AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées de manière qu'en s'ouvrant, elles puissent sortir du livre, & se voir à droite dans l'ordre qui suit.

Page	26.	Planche I.
40	. . . .	II.
54	. . . .	III.
70	. . . .	IV.
114	. . . .	V.
146	. . . .	VI.

---

## ERRATA.

Page	18	ligne	18.	MILAND	lisez	MILAN
51			30.	fig. 2.	lisez	fig. 3.
89			16.	duodedecim	lege	duodecim
118			11.	ventientes	lege	vestientes
138			9.	Lalli,	lege	Ralli.



THE  
LIBRARY OF THE  
MUSEUM OF NATURAL HISTORY  
AND  
ZOOLOGY  
OF THE  
CITY OF LONDON

1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1871 1872 1873

1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900







































